

















# DIPTERA SCANDINAVIÆ

DISPOSITA ET DESCRIPTA.

J. M. ALDRIDGE

London

1844

Auctore

PH.D:RE JOHANNE WILHELMO ZETTERSTEDT

AD UNIVERSITATEM LUNDENSEM BOTAN. ET OECON. PRACT.  
PROFESS. REG. ET ORD.; EQUITE AURATO REG. ORDINIS DE  
WASA; REG. ACAD. SCIENT. HOLM., SOCIET. ENTOMOL. PARIS.,  
NATUR. CURIOS. LIPS., SOCIET. CUVIER. PARIS., SCIENTIAR.  
LITTERARUMQUE ELEGANT. GOTHOB., PHYSIOGRAPH. LUND.,  
CULTURÆ BOMBYCINÆ SUECANÆ HOLM., ENTOM. SCANDINAV.  
HAFNIE., ET OECON. MALMOG., SODALI; REG. SOCIET. OECO-  
NOM. BOTN. OCCIDENTALIS ET SOC. PRO FAUNA ET FLORA  
FENNICA HELSINGFORSIÆ, MEMBRO HONORIFICO;  
ATQUE SOCIET. ENTOM. STETINI  
CORRESPONDENTE.

---

TOMUS TERTIUS.

---

LUNDÆ,

EX OFFICINA LUNDBERGIANA,  
SUMTIBUS AUCTORIS.

---

1844.



## 92. SCENOPINUS Latr.

*Corpus* parvum, elongato-lineare, subopacum, glabriulum. Antennæ subdeflexæ, capite paullo breviores, articulo ultimo elongato, subcylindrico absque seta. Epistoma minime prominens. Proboscis retracta, occulta. Oculi rotundi nudi, linea media transversa purpurea sæpe notati. Abdomen depresso, 8-annulatum. Alæ incubentes. Nervi longitudinales: 2 in apice subapproximati, & 2 in marginem inferiorem descendentes; longitudinalis 3:tius ante apicem ut in *Empide* furcatus; transversus ordinarius pone medium alæ situs. Area angularis basalis subretracta. Halteres nudi. Pedes validi, nudi, mutici, tibiis posticis apice interdum incrassatis. Color ater. Motu tardus. Habitatio in fenestris & foliis plantarum. Larvæ forte in ligno degunt. Pupa (cfr. *S. fenestralis*). Differentia sexus; mas: oculis sæpissime cohærentibus; femina: oculis modice remotis.

\*). Oculi in ♂ contigui. Tibiæ posticæ in ♂♀ simplices. Pedes rufi.

1. *S. fenestralis*: ater, thorace ænescenti nigro; fronte punctulata, ænea; pedibus fusco-rufis; alis cinereo-hyalinis, halteribus fuscis, clava subtus nivea. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  sere 2 lin.).

Var. a. ♂♀. pedibus totis rufescitibus.

Fabr. Antl. 335. 1. ♂. Latr. Gen. 4. 349. Fall. Scen. 5. 1. ♂♀. certe. Meig. Dipt. 4. 113. 1. var.? Macq. Buff. 2. 6. 1? ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 618. 1. ♂♀. *Musca* Linn. Fn. Su. 1815. vera. — *Nemotelus* De Geer Ins. 6. 189. 11. *Scen. senilis* Fabr. Antl. 336. 3. ♀. Meig. Dipt. 4. 115. 7. ♂♀.

Var. b. ♂♀. tarsis fuscis, metatarso postico rufo.

Var. c. ♂♀. sæpe in copula cum var. a. & b. pedum

posticorum femoribus leviter, tibiisque intensius, nigricantibus; tarsis omnibus fuscis, metatarso postico rufo.

*Scen. domesticus* Meig. Dipt. 4. 116. 8. Macq. Buff. 2. 7. 5. *Sc. fenestralis* var. Fall. l. c.

Hab. in fenestris, per Scandinaviam temperatam, 20 Jun.—Jul.—21 Aug. ( $\delta$  8 Martii, &  $\varphi$  12 Sept., etiam rarius visi), vulgaris; scilicet in tota Scania omnes varietates promiscue obviae aequae frequentes; in Ostrogothia ex. gr. ad Lärketorp, Wadstena, Fredensborg, Gusum, Häradschammar &c. vulgaris; in Ölandia & Gotllandia, haud raro; in Nericia ad Kärr; in Bahusia ad Uddevalla; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania freq., D. *Staeger*. (E Finlandia, D. *Sahlberg*; e Petropoli, D. *Hummel*; e Berolino, var. c., D. *Hoffmann*; e Glogavia, var. b., D. *Zeller*). E pupa cylindrica, 2 lin. longa, pallide flava, nuda, constante e 9 segmentis (præter caput & thoracem) subæqualibus, singulo serie media setularum pallidarum obsito; ano acuto setis 2 terminato, specimen semineum 20 Jul. exclusum.

$\delta\varphi$ . Antennæ obscuræ l. nigræ. Frons ænea, subtiliter punctulata, in  $\delta$  acute triangularis, striola in medio tenuissima laevi; in  $\varphi$  modice & paralleliter lata, lineolis 3 laevibus, nitidis, quarum 1 in medio, & 2 juxta oculos. Oculi in  $\delta$  postice cohærentes, in utroque sexu (in vivo) obscure brunnei, æneo-submicantes, linea media transversa, angusta, purpurea. Thorax ænescens, subopacus, subtilissime punctulatus l. strigulosus, omnium tenuissime & brevissime puberulus, postice utrinque inter alas & scutellum linea elevata picea. Scutellum ænescens, summo margine inflexo albo, quæ pictura vix nisi in insecto a posteriori viso observatur. Abdomen atrum, nitidum, glabrum, transversim sulcatum, in  $\delta$  segmentis 3, 4 & 5 apice lineola utrinque abrupta nivea. Alæ cinerascentes, lineola juxta

costam a basi & paullo pone medium, fusca. Ramulus superior nervi 3:ti*i* fureati paullo inflexus. Nervus long. 4:tus arcuatim fleetitur, fere in apice alæ l. mox ante apicem nervo long. 3:tio appropinquans. Squamæ sub alis parvæ, sordide albidae. Halteres fusi, clava aut plerumque subitus nivea, aut interdum nivea, superne puncto fusco, aut rarissime tota nivea (& hic forte *Sc. fenestralis* Meig. genuinus). Pedes breviusculi, validi, postici longiores; toti aut rufo- l. fusco-ferruginei, coxis fuscis; aut rufi, tarsis fuscis; aut denique in var. c. rufi, coxis tarsisque obscuris, femoribus posticis plus minus obscuris, tibiis posticis fere totis nigricantibus, metatarsis postieis flavis. In omnibus varietatibus occurunt individua tarsis fuscis, metatarso fere toto, & articulis 2 & 3 basi, flavis.

2. *S. furcinervis*: aler, thorace ænescenti nigro; fronte punctulata ænea, pedibus flavis, tarsis fuscis; alis hyalinis, nervo longitudinali 3:tio bifurcato, halteribus niveis. ♂. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Scania ad Lund rarissime; in fenestra cubiculi mei d. 20 Jun. 1841 specimen unicum inveni.

♂. Similis videtur *Sc. sulcicollis* Meig. (qui ♀ est), sed *S. fuscinervis* selenulo dorsali parum perspicuo, coxis rufis, nec nigris, tibiis flavis, nec brunneis, & præcipue alarum nervis aliter directis, distinctus. A priori, cui etiam similis, magnitudine minore, pedibus flavis, nec rufis, halterem clava tota nivea, alis magis albido-hyalinis, & nervorum directione, mox dignoscitur. Thorax niger, dorsi foveola media parum profunda (an e casu orta?). Pedes flavi, tarsis fuscis, metatarso postico flavo. Alæ albido-hyalinæ, nervis ut in priori directis, sed nervo 3:tio longitudinali bifurco. Scilicet inter apicem alæ & ramulum superiorem, qui in hac specie brevior & rectior est quam in *S. fenestrali*, excurrit e nervo 3:tio in costam nervulus perpendicularis, qui cum ramulo ordinario quadratum l. fere triangulum format.

\*\*). Oculi in ♂♀ remoti. Pedes nigri. Tibiae posticæ in ♂ dilatatae.

3. *S. niger*: ater, pedibus concoloribus, tarsis flavo-annulatis; halteribus nigricantibus; alis infuscatis. ♂♀ (Long. 1½ fere 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 116. 9. ♂. Macq. Buff. 2. 8. 7. ♂.  
Zett. Ins. Lapp. 619. 2. ♂♀. *Nemotelus* De Geer Ins. 6.  
188. 10. t. 11. f. ♂. *Nemotelus tarsatus* Panz. Fn. Germ.  
98. 20. ♂. *Scen. rugosus* Fabr. Antl. 336. 2. ♀. Meig.  
Dipt. 4. 117. 10. ♀. Macq. Buff. 2. 7. 6. ♀. *Scen. ater*  
Fall. Scenop. 5. 2. ♂♀.

Hab. in fenestris, saepe in floribus Umbellatarum ut *Aegopodii* &c., interdum in foliis fruticum *Syringæ*, *Rosæ*, *Carpini*, rarius in graminosis, per Scandinaviam, 20 Maj. — Jun., Jul.—4 Aug., passim, in copula diversis locis multoties captus; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c.; in Smolandia ad Råby prope Junecopiam; in Ostrogothia ad diversorium Ödeshög, Lärketorp, Wadstena, Godegård, Gusum, Häradshammar & Sudercopiam; in Gotlandia ad Ejsta rar.; in Helsingia ad Norrala freq.; in Jemtlandia ad Jemtkrogen; in Ångermannia ad Hernösand haud raro; in Norvegia ad Thynæs & Levanger in parœc. Skogn, frequens. (E Finlandia a D. *Sahlberg*, & e Kilia a D. *Wiedemann* missus).

♂♀. Totus ater, subnitidus. Frons in ♂ modice angusta, in ♀ paullo latior, in utroque sexu rugulosa, antice supra antennas foveola profundius impressa. Abdomen maris in segmentis 3, 4, 5 striga transversa nivea. Alæ obscuræ l. brunnescentes, nervis validis, fuscedine cinctis, ut in *S. fenestrati* directis. Squama fusca. Halteres nigri. Pedes atri, tarsorum articulis 1 toto, 2 & 3 basi late flavis l. rufis. Tibiae posticæ in ♂ cylindricæ, versus apicem in.

crassatæ. Specimina Jemtlandica Ostrogothicis & Scanicis plerumque minora. — Variat sæpe tarsis saltem anticis fere totis fuscis.

---

### 93. PLATYPEZA Meig.

*Corpus parvum, oblongo-ovatum, subpubescens, opacum, sub-incurvum. Antennæ breves, porrectæ, articulis basalibus cylindricis, ultimo ovali, compresso, seta longa, capillari, terminali, nuda. Epistoma latum minime prominens. Proboscis occulta. Palpi subelavati. Oculi magni, nudi, rufobrunnei, unicolores. Abdomen subovale. Alæ incubentes. Nervus longitudinalis 5:tus \*) ad apicem furcatus. Area angularis retracta. Nervuli transversi longe remoti, ordinario antico ad basin retracto, & ante apicem nervi auxiliaris sæpissime sito. Halteres nudi, clava magna. Pedes validi, nudi, inermes, postici tarsis dilatatis, articulis subæqualiter latis, 3:tio sæpe longiori 5:to parvo. Color plerumque niger, pictura ♀ sæpe cinereo-fasciata l. maculata. Motu agilissima; reptatus scilicet in foliis fere circulatim; at volatus haud celer, fere perpendicularis. Habitatio in pratibus & pascuis, loca umbrosa inter frutices amans, ubi mares, sole inter ramos lucente, choreas interdum instituunt. Versus autumnum provenit & viget. Larvæ in Boletis vivunt. Pupæ cylindricæ, nudæ, glabræ, albæ. Differentia sexus; mas: unicolor, oculis arcte cohærentibus; femina: glabriæ, plerumque variegata, oculis remotis, interstitio frontali posterius sensim latiore.*

- A. Nervi longit. 5:ti furca ramo altero arenato.  
α). Nervus longit. 5:tus apice abbreviatus.

---

\*) in Dispositione p. 42, pro "nervus 4:tus longit." lege: nervus 5:tus longit,

**I.** *P. boletina*: atra, abdomine fasciis cinereis ( $\delta$ ), aut cinerea, abdomine fasciis 5 atris ( $\varphi$ ); antennarum basi pallida; alis hyalinis, nervulo transverso antice ante apicem auxiliaris sito, area angulari modice retracta; pedibus halteribusque aut fuscis ( $\delta$ ), aut flavis ( $\varphi$ ).  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

**Mas:** holosericeo-ater. Oculi rufi. Thoracis limbus posticus saepe, & scutellum subtus, brunnescens. Abdomen posterior fasciis cinerascentibus obsoletis, ano summo apice cinereo. Halteres nigricantes, petiolo fusco. Pedes obscuri, tibiis anterioribus tarsisque omnibus dilatioribus, in nuper exclusis pallescentibus; tarsi postici artieulis subaeque longis;

**Fem.:** cinerea. Oculi brunnei. Thoracis lineae 2 fuscæ obsoletæ. Abdomen fasciis 5 atris, 4 anticis utrinque acutis. Palpi, halteres pedesque toti, flava. Tarsi postici articulo 3:tio ceteris longiori.

Fall. Platypezin. 4. 1.  $\delta\varphi$ . genuina. Meig. Dipt. 4. 5. 1.  $\delta\varphi$ . Macq. Buff. 2. 18. 4.  $\delta\varphi$ .

Hab. in foliis fruticum Syringæ vulgaris, Populi tremulae &c., per Sueciam meridionalem & medium, 1 Jul. — 24 Sept., passim; scilicet in Scania ad Abusa & Esperöd; in Ostrogothia ad Lärketorp, Fredensborg (D. Dahlbom), Godegård, Gusum (D. Wahlberg), &c., haud infrequenter; in Smolandia ad Wärnauäs; in Nericia ad Kärr; in Dania, D. Staeger. E pupis, in Boleto Pruni Cerasi captis, specimina utriusque sexus, 25 Jul., 26 Aug., egressa, ad Lärketorp, Fredensborg & Abusa invenimus D. Dahlbom & ipse.

$\delta\varphi$ . Antennæ basi flavæ. Alæ hyalinæ. Nervi longitudinalis 5:ti apex, qui ramulum alterum furcæ efficit, infra basin furcæ vix  $\frac{1}{2}$  lin. continuatus, non usque ad marginem extensus. Nervuli transversi: ordinarius medius circiter  $\frac{3}{4}$  lin. (ab angulo inferiore) a margine alæ remotus: anticus

perspicue ante apicem nervi auxiliaris retractus. Nervus infra aream angularem, ad basin alæ modice retractam, longitudinem dimidiæ areæ paullo superat.

2. *P. fasciata*: alra, ano cinereo ( $\delta$ ), aut cinerea, abdome fasciis 4 alris ( $\varphi$ ): alis subhyalinis, nervulo transverso antico apici auxiliaris opposito, area angulari modice retracta; pedibus fuscis; halteribus aut obscuris ( $\delta$ ), aut flavis ( $\varphi$ ).  $\delta\varphi$ . (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas.*: totus holosericeo-ater, pubescens, ano perspicue cinereo, basi puncto atro. Oculi rufi. Alæ subhyalinæ, costa stigmatical subflavescente. Halteres nigrantes. Pedes obscure brunneis.

*Fem.*: cinerea, subglabra, thorace subimmaculato, l. dorso tantum leviter fusco. Oculi brunnei. Antennæ nigræ. Scutellum cinereum, immaculatum. Abdominis segmenta: 1:um fascia basali atra, 2, 3 & 4 apice fascia triangulari ejusdem coloris. Singula harum per angulum medium proximæ fasciæ cohæret. Alæ subhyalinæ. Halteres flavi. Pedes fusi l. brunnescentes.

Meig. Dipt. 4. 6. 2. certa.  $\varphi$ . (exclus. syn. Fall. quod ad *P. pictam* pertinet. Zett. Ins. Lapp. 529. 1.  $\delta\varphi$ . *Dolichopus fasciatus* Fabr. Antl. 271. 22.  $\varphi$ . teste D. Meigen l. c. — Sub nomine: *Plat. media* Macq. & Meig. 7. 146. 13° a D. Staeger mecum communicata.

Hab. cum priori passim, 24 Jul.—20 Sept., inventa; scilicet in Scania ad Esperöd & Abusa; in Smolandia; in Ostrogothia ad Lärketorp & Gusum; in Lapponia Umensi ad Åsele rariss.; in Dania, D. Staeger. E pupa, in Boleto Pruni Cerasi ad Lärketorp Ostrogothiae capta, exclusa.

$\delta\varphi$ . Praeter picturam feminæ aliam differt uterque sexus a priori, cui alias similis, antennis totis nigris, alis minus pure hyalinis & præsertim nervulo transverso antico apici nervi auxiliaris præcise opposito. Forte etiam nervulus

transversus medius (qui in hoc genere posticus apte vocandus) magis retractus, margini alae interiori nempe proprius situs. Scutellum apice setosum. — Sub nomine *Pl. bisetosa* a me olim divulgata.

3. *P. vittata*: atra, ano cinereo ( $\delta$ ), aut cana, thoracis vittis 3 antice confluentibus abdominisque fasciis 4, atris ( $\varphi$ ); antennis nigris; alis hyalinis, nervulo transverso antico ante apicem auxiliaris sito; area angulari modice retracta; halteribus obscuris; pedibus aut fuscis ( $\delta$ ), aut flavescensibus ( $\varphi$ ); tarsis in utroque sexu dilutioribus.  $\delta\varphi$ . (Long. 1 lin.).

Hab. in foliis fruticum, 4 Aug.—15 Sept., rarius; nempe in Scania ad Abusa; in Ostrogothia in Krogårängen prope Wadstena; uterque sexus e Dania a D. Staeger sub nomine *Plat. holosericea* Meig., d. 24 Oct. 1812 pro comparatione mihi missus.

$\delta\varphi$ . Similis *Pl. boletinæ*, a qua vero magnitudine minore, antennis totis nigris, halteribus pedibusque paullo obscurioribus, & præcipue pictura feminæ, facile dignota. *Mas.*: totus ater, ano apice cinereo. Alæ hyalinæ, costa stigmaticaliter subpallescente. Nervi omnino ut in *Pl. boletina* directi. Nervus long. 5:tus quoque non usque ad summum marginem alæ continuatus, unde ad *Pl. holosericeam* Meig. hanc nostram speciem referre non possum. Squamæ fuscæ, ciliatæ. Halteres nigri, petiolo fusco. Pedes nigri. Tibiae fuscæ, geniculis & tarsis dilutioribus. Tarsi postici ut in *boletina*. *Fem.*: glauco-cana, glabra. Antennæ nigræ. Thoracis dorsum vittis 3 latis, atris, antice inæqualiter confluentibus (media scilicet subgemina usque ad caput extensa), postice ante scutellum abbreviatis, tricuspidatis seu tridentem formantibus. Scutellum canum, immaculatum. Abdomen fasciis 4 atris, 1:ma segmentum 2:dum fere totum occupante; 2:da in segmento 3:to cum 1:ma in medio late cohærente; 3:ta & 4:ta liberis in apice segmentorum 4 & 5

locatis. Alæ ut in ♂, at stigmate non pallescente. Halteres obscuri, petiolo albido. Pedes fusi & sordide testacei, tarsis præsertim basi dilutioribus, interdum flavescentibus. Tarsi postici ut in *boletina*. Similis *Pl. ornata* Meig. Dipt. 7. 145. 11. ♀; sed illa magnitudine paullo majore, abdominis segmentis posticis tantum punctis nigris notatis, halteribus albis, & nervo long. 5:to non abbreviato, a nostræ speciei ♀ mox distinguitur.

4. *P. modesta*: atra, thorace anoque obscure cinereis, illo vittis 4 nigris (♂); aut cinerea, thoracis lineolis 3 brunneis & abdominis fasciis 4 sub-triangulatis nigris (♀); antennis nigris, basi testaceis; alis subfumatis (♂), aut hyalinis (♀); nervulo transverso antico ante apicem auxiliaris sito; area angulari valde retraeta; halteribus, ventre pedibusque fusco-testaceis (♂), aut flavescentibus (♀). ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: ater, parum pilosus. Fâcies cinerea. Thorax & scutellum obscure cinerea, ille vittis 4 latioribus, approximatis, nigris. Abdomen cylindricum (ut in *Callomyia*), atrum, ventre livido, ano distincte inflexo, obscure cinereo. Alæ infuscatae. Halteres lividi. Squamæ fuscæ, ciliatae. Pedes lividi, coxis, femoribus tarsorumque apice, plus minus infuscatis. Tarsi postici subæque magni;

*Fem.*: cinerea, glabricula. Thorax dorso lineolis 3 tenuibus fuscis, & antice (ante occiput) strigulis 2 minutis brevibus, nigris. Scutellum immaculatum. Abdomen fasciis 4 atris, subtriangulatis, vix cohærentibus, in segmentis 2, 3, 4 & 5 locatis. Anus immaculatus, acutus. Venter lividus. Alæ hyalinæ. Squamæ sordide albidae, ciliatae. Halteres flavi. Pedes, etiam quoad structuram tarsorum, ut in ♂, sed paullo dilutiores.

Stæger in litt. 24 Oct. 1842. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali, rarius; in Scania

rarissime capta; in Dania ad Hafniam mense Octob. frequentius lecta, in ulroque sexu a nobil. D. Staeger mihi benigne missa.

$\delta\varphi$ . Species vere distineta. A prioribus mox differt: ventre livido, alarum area angulari parva, ad basin valde retracta, & hinc nervo infra aream solito longiore, longitudine scilicet totius areæ & ultra, abdomine maris cylindrico, thorace feminæ lineolis 3 brunneis, &c. Alar. nervus long. 5:tus apice distincte abbreviatus; transversus ordinari. medius a margine modice remotus, ita ut nerv. long. 6:tus infra transversum ad 1 lin. long. continuatur. Nervulus transvers. antieus longe (præsertim in  $\delta$ ) ante apicem nervi auxiliaris situs. Palpi & proboscis rufa.

Var. b.  $\delta$ . abdominis lateribus lividis, incisuris nigris, alarum costa stigmaticalii pallescente; forte specimina juvenilia. Affinis *Pl. rufæ* (9), sed nervo long. 5:to ad sumimum marginem alæ non extenso &c., ab illa dignotus. In Scania ad Esperöd & Abusa 9—20 Sept. 2 specimina inveni. A D. Staeger etiam communicatus.

5. *P. consobrina*: cinerea ( $\varphi$ ), thorace subimmaculato; abdominis fasciis 4 subtriangulatis, antennisque, nigris; alis hyalinis, nervulo transverso antico apici auxiliaris opposito; area angulari valde retracta; halteribus pedibusque flavescentibus.  $\varphi$ . (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarius; in foliis Syringæ horti villæ Lärketorp Ostrogothiae, atque etiam in Populetis, pauca specimina inveni. E pupa cylindrica, nuda, alba, in Boleto capta, individuum egressum quoque obtinui.

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed antennis totis nigris, nec basi rufis, thorace immaculato seu lineolarum brunnearum vix vestigio, & essentialiter nervo transverso medio ad marginem alæ magis retracto (hinc nervi long. 6:ti apex infra nervum hunc transversum brevissimus), atque nervulo transv.

antico apici nervi auxiliaris præcise opposito, distineta. Tarsi postici paullo latiores quam in præcedente videntur. Fascia abdominis 4:ta (in segmento 5:to) obsoleta, ita ut vix nisi 3 fasciae nigræ manifestæ observantur. — Mas deest.

**6. *P. media*:** atra ( $\delta$ ); halteribus pedibusque nigricantibus, tarsis fuscis; alis hyalinis, nervo transverso medio margini valde approximato, nervulo transverso antico paullulum ante apicem auxiliaris sito; area angulari modice retracta.  $\delta$ . (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Maeq. Buff. 2. 18. 6.  $\delta$ . Meig. Dipt. 7. 146. 3.  $\delta$ .

Hab. in Suecia rarissime; in Ostrogothia ad Lärketorp specimen descriptum mens. Sept. inveni.

$\delta$ . Tribus primis speciebus similis & affinis, sed a *P. boletina* fasciis griseis nullis, ano non cinereo, antennis totis nigris; a *fasciata* ano atro, nec cinereo, alarum nervulo transverso nonnihil ante apicem auxiliaris locato, nec præcise hujus apici opposito; & a *vittata* ano atro, nec cinereo, & nervo transverso medio ad marginem alæ magis retracto, ita ut apex nervuli long. 6:ti infra transversum vix  $\frac{1}{3}$  lin. extendatur. Nervi 5:ti ramulus inferior ita quoque abbreviatus est, ut vix  $\frac{1}{2}$  lin. infra basin foreæ continuetur. Costa stigmaticalis parum pallescens. Area angularis ut in *boletina*. Tarsi postici nigri ut in *boletina* constructi.

**7. *P. atra*:** atra, antennis, halteribus pedibusque pieco-nigris; alis aqueis, nervulo transverso antico ante apicem auxiliaris sito; area angulari valde retracta.  $\delta\varphi$ . (Long.  $3-\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Platyp. 6. 3.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 7. 1.  $\delta\varphi$ . Macq. Buff. 2. 18. 7. Zett. Ins. Lapp. 529. 3.  $\delta\varphi$ .

Hab. in foliis fruticum Alni, Populi, Carpini &c., per Scandinaviam, 18 Jun. — tota aestate — usque ad 19 Sept., passim; scilicet in Scania ad Rästen, Löberöd

(D. *Holm*), Abusa, Esperöd &c., sat frequens; in Cstrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Hagalund, Gusum &c., haud raro; in Gotllandia rar.; in Nericia ad Kärr; in Lapponia meridionali Umensi ad Wilhelmina rarissime.

$\delta\varphi$ . Aterima, holosericea. Antennæ nigræ. Caput brunneonigrum. Oculi rufo-ferruginei, in viva æneo-nicantes. Thorax  $\varphi$  niger, parum holosericeus. Alæ ( $\delta\varphi$ ) aquæ, area angulari brevi ad basin valde retracta, & hinc nervus infra angulum areæ diametro longitudinali areæ dimidium saltem longior. Nervulus transversus anticus sat longe ante apicem nervi auxiliaris curvati situs; transversus medius prope ad marginem retractus. Nervus 5:tus infra furcam brevissimus. Squamæ parvæ, obscuræ. Halteres nigri. Pedes nigri aut pieei, ut in *P. boletina* constructi.

$\beta$ ). Nervus longitudinalis 5:tus ad summum marginem alæ continuatus.

8. *P. picta*: alra, ano obscure cinereo ( $\delta$ ); aut cana, thoracis pictura dorsali abdominisque fasciis inæqualibus, atris ( $\varphi$ ); antennarum basi pedibusque aut lividis ( $\delta$ ), aut flavescentibus ( $\varphi$ ); alis fuscaneis ( $\delta$ ), -aut hyalinis ( $\varphi$ ); nervulo transverso antico ante apicem auxiliaris in utroque sexu sito; area angulari ad basin non retracta.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere 2 lin.).

*Mas*: holosericeo-ater, pilosulus. Caput griseo-nigrum. Instrumenta oris obscura. Antennæ nigræ, basi lividae. Oculi rufo-ferruginei. Anus obscure cinereus. Alæ subfuscaneæ, costa stigmaticalí cinereo-flavicante. Squamæ fuscae. Halteres nigri, petiolo fuso. Pedes brunnei, geniculis tarsisque dilutioribus;

*Fem.*: glauco-cana, subglabra. Palpi fusco-testacei. Antennæ fuscae, basi testaceæ. Oculi brunnei. Thoracis dorsum lineis 2 mediis approximatis, integris, nigris, antice perspicuis, postice in nigredine evanescentibus; juxta illas

utrinque maculis 3 nigro-brunneis, posterius præsertim dilatatis & confluentibus. Scutellum atrum, lateribus canum. Abdomen albo-canum, segmento 1:mo in medio macula atra; 2:do toto atro, sæpe puncto utrinque parvo albo; 3, 4 & 5 macula basali triangulare atra, quarum illa in segmento 3:tiō sita per apicem medium cum sequente cohæret; 6:to toto atro. Venter canus. Alæ paullo latiores quam in ♂, hyalinæ. Squamæ albidae. Halteres fusi, petiolo albidus. Pedes flavidi, tarsis posticis nonnihil latioribus quam in ♂. In copula.

Meig. Dipt. 6. 358. 9. ♀ (per lapsus calamis "Mänchen"). *P. fasciata* Fall. Platyp. 5. 2. ♂♀. certe. (exclus. synonymis). — Panz. Fn. 103. 20 vix eadem? *P. fumipennis* Zett. Ins. Lapp. 529. 2. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum Syringæ, Populi, Alni, Coryli &c., per Scandinaviam, 4 Aug.—16 Sept., passim frequens; in copula sæpe visa; scilicet in Scania ad Abusa & Esperöd raro; in Smolandia, D. *Bohemian*, 1835 missa; in Ostrogothia ex. gr. ad Lärketorp, in pratis ad Haga-lund prope Wadstena copiose, D. *Dahlbom*, ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Nericia ad diversorium Kils Blacksta freq.; in Helsingia ad Storbyn in parœc. Färila, & Jersö, haud raro; in Jemtlandia ad Faxelven, Berge in Alsen, Uppland, Ristansfors, atque in parœcia Undersåker præsertim in pratis circa Pastoris sedem, vulgaris; in Botnia boreali ad Torneå, D. *Deutsch*; in Lapponia Norvegica ad Björkvik Nordlandiae d. 17 Jul. 1821 rarissime.

♂♀. In hoc genere magna. Alarum nervi: longitudinalis 5:tus apice non abbreviatus; transversus medius a margine in ♂ paullo, in ♀ magis, remotus; transversus anticus aperte ante apicem auxiliaris situs. Area angularis ita elongata, ut nervus infra aream diametro longitudinali areæ saltem triplo brevior evadot. Tarsi postici valde lati, articulo 3:tiō

longitudine 1 & 2 simul sumtorum. — Femina sœpe variat abdominis segmentis 1:mo & 5:to ad latera puncto atro.

9. *P. rufa*: griseo-cinerea, abdomine flavo, incisuris nigris; antennarum basi, ano, halteribus pedibusque pallescensibus; alis subhyalinis, nervulo transverso antico ante apicem auxiliaris sito; area angulari ad basin longe retracta. ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

*Mas*: abdomine cylindrico, ano rufo longe inflexo,

*Fem.*: abdomine subdepressim conico, ano acuto.

Meig. Dipt. 6. 358. 10. ♂. & 7. 115. 10. — *P. rufiventris* Maeq. Buff. 2. 17. 2. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali, 19 Sept.—4 Octob., minus frequens; scilicet in Scania in foliis fruticum silvae Esperöd pauca specimina iuveni; in Dania, D. Staeger. (Ex Hamburgo in utroque sexu a D. v. Winthem 1838 communicata).

♂♀. *Pl. modestæ* (4) proxima, & præsertim ejus var. b. valde similis; sed thorace in utroque sexu grisescente, subimmaculato, abdomine fere toto aurantiaco, incisuris tantum nigris, & nervo longitud. 5:to sœpissime integro (in individuis masculis hunc nervum apice abbreviatum aliquando vidi), distineta videtur. Glabricula. Caput cinereum, instrumentis cibariis flavis. Antennæ nigræ, basi flavæ. Oculi ferruginei. Thorax cinereus, disco dorsali præsertim in ♂ griseo, plerumque antice ante occiput strigulis 2 longitudinalibus minutis obscuris. Scutellum cinereum. Abdomen flavum, segmento 1:mo in ♂, & incisuris in utroque sexu, nigrieantibus. Alæ in ♂ cinereo-hyalinæ, in ♀ hyalinæ, costa stigmaticaliter in ♂♀ levissime pallescente. Nervi utin *P. modesta* directi; sed long. 5:tus plerumque non abbreviatus. Squamæ albidae. Hatteres flavidæ. Pedes flavi, tarsorum articulis 3 primis modice dilatatis, subæque longis. Abdo-

minis segmentum ultimum in ♂ plerumque obscuro, ano inflexo rufo.

B. Nervi longit. 5:ti furca ramis rectis, altero abbreviato.

10. *P. furcata*: brunneo-nigra, pedibus fuscis; alis subfuscaneis, nervis transversis: medio longe a margine remoto; antico areaque angulari brevissima ante apicem nervi auxiliaris sitis. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Supplem. Dipt. Suec. Platyp. pag. 2. 4. ♂♀.  
Meig. Dipt. 6. 357. 8. Maeq. Bull. 2. 18. 8. ♂♀.

Hab. in graminosis atque in foliis Alni, in vicinitate aquæ, per Sueciam meridionalem, 5—13 Jul., minus frequens, in copula deprehensa; scilicet in Seania ad villam Esperöd in pratis sylvaticis atque in pascuo Östervång, ante plures annos specimina 3 mascula totidemque feminea inveni.

♂♀. Directione nervorum in alis ab omnibus conspeciebus differt. Partes corporis ut in *P. boletina* constructæ. Tota grisea, ♂ obscurior. Glabricula. Antennæ nigræ, basi interdum dilutiores. Abdomen depressiusculum, subnitidum, ano in ♂ distincte inflexo, in ♀ acuto. Alæ cinereo-hyalinæ, costa stigmatically intensius cinerea. Nervi longitud. 5:ti furca ramis rectis, horum altero fere ad dimidium abbreviato. Nervus transversus mediis longe a margine distans, fere in medio alæ situs. Nervulus transversus anticus longe ante apicem auxiliaris locatus. Area angularis brevis ut in *P. atra* (7), ad basin alæ valde retraeta. Halteres obscuri. Pedes in ♂ fusi, in ♀ flavescentes, tarsis dilutioribus, ut in *boletina* constructis.

## 94. CALLOMYIA Fall.

*Corpus* parvum, elongatum, subpubescens, opacum, subincurrum. *Antennæ* breves, porrectæ, articulus basalibus cylindricis, ultimo compresso, acuto, seta longa, terminali nuda. *Epistoma* minime prominens. *Proboscis* occulta. *Palpi* cylindrici. *Oeuli* ut in *Platypeza*. *Abdomen* elongato-cylindricum. Alæ incubentes, aqueæ, in ♂ interdum levissime infuseanæ. *Nervi longitudinales* omnes simplices, recti, integri; costalis pone apicem eum 5:to conjunctus, auxiliaris fere ad medium costæ extensus; transversi remoti, horum medius (ordinarius) paullo a margine alæ distans, anticus ante apicem nervi auxiliaris situs. *Area angularis* elongata. *Halteres* nudi. *Pedes* pubescentes, inermes, posticii validi, elongati, metatarso elongato, fere longitudine reliquorum tar- sorum simul sumitorum. *Color* niger, cinereus, raro flavescentia, pictura interdum, præsertim in ♀, insigni. *Motus, habitatio, mores & tempus vigendi* ut in *Platypeza*. *Differentia sexus* manifesta; *mas* scilicet: corpore obscuriore, linearis, abdo- mine subcylindrico, incurvo, ano inflexo, oculis arete cohærentibus; *femina*: corpore glabriore, pallidiore, sæpe pulchre pecto, abdome depresso-culoso, oblongo, parum incurvo, ano obtuso non inflexo, oculis remotis, interstitio frontali posterius sensim latiore. *Typus generis*: *Call. leptiformis*.

A. *Antennarum articulus ultimus ovalis, apice aento l. acuminato.*

\*) *Antennæ breves, ovatae, apice acutæ.*

I. *C. leptiformis*: aterrima, abdome albo-tristri- gato (♂); aut fasciis 4 interruptis, 1:ma lutea, reliquis argenteis (♀); pedibus fusco-flavis (♂), aut flavis (♀); alis levissime fuscanis (♂), aut hyalinis (♀); halteribus in utroque sexu fulvis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: aterrimus, abdominis strigulis 3 lateralibus parvis

argenteis; pedibus fuscis aut melleis; oculis rufo brunneis, in medio transversim impressis;

*Fem.:* minor atra, thoracis maculis 3 argenteis; abdominis fasciis 3 interruptis, prima lutea, reliquis argenteis, pedibus flavis, tibiis tarsisque posticis nigris; oculis brunneis, obscurioribus.

Fall. Flatyp. 6. 1. ♂♀. (sub qua vero plures species latent). — Zett. Act. Holm. 1819. I. 78. 31. var. a. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 13. 4. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 530. I. ♂♀. Macq. Buff. 2. 20. 3. ♂♀. *Heteroneura* Fall. Method. Dipt. 1810. p. 25. f. 2.

Hab. in foliis fruticum locis umbrosis, per Scandinaviam, 25 Jun.—28 Sept., passim; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Lindholmen, Esperöd &c., sat frequens, individua feminea tamen rarius obvia; in Calmaria ad Berga; in Ostrogothia ad Wadstena, Hagalund, Lärketorp &c., haud raro; in Gotlandia; in Västergötlandia ad Årås; in Norvegia ad Dyræn Nordlandiæ rarius.

♂♀. Antennarum artculus ultimus brevis, ovatus. *Mas.:* oculi in medio linea impressa. Pleuræ grisecentes. Abdominis segmenta 2, 3, 4 ad latera striga argentea, ad certum luminis situm perspicua, ad alium situm ægre observanda. Alæ levissime infuscanæ, costa stigmaticalí distinctiore. Nervi transversi: medius ad marginem retractus; anticus longe ante apicem nervi auxiliaris & areæ angularis situs, ad basin alæ retractus. Area angularis ita elongata, ut nervus infra apicem diametro longitudinali totius areæ fere triplo brevior evadat. Tibiae posticæ versus apicem modice sensim dilatatiæ. Metatarsi postici modice compressim incrassati. *Femina:* oculi non impressi. Palpi flavi. Vertex griseiens. Thoracis maculae: 2 humerales & 1 ante scutellum, argenteæ. Abdominis segmenta: 2: dum flavum, linea longitudinali media nigra; 3 & 4 fascia argentea in-

terrnpa; 6:tum totum argenteum. Alæ hyalinæ, nervis ut in ♂. Pedes cum coxis toti flavi, tibiis tarsisque posticis nigris. Tibiae & metatarsi postica paullo minus quam in ♂ dilatata. Femora postica ad apicem superne plerunque macula fusca. — Reliqua ut in diagnosi.

**2. *C. speciosa*:** aterrima, abdomine immaculato (♂) aut fasciis 4 integris, 1:ma lutea, reliquis argenteis (♀); pedibus melleis (♂), aut flavis (♀); tibiis tarsisque posticis in utroque sexu nigricantibus; alis hyalinis; halteribus nigris (♂), aut fulvis (♀). ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

**Mas:** aterrimus, abdomine immaculato l. vix vestigio strigatum albidarum; pedibus fuscis aut melleis, posticorum tibiis tarsisque obscuris; oculis obscure rufis, linea media transversim impressa; tibiis metatarsisque posticis modice dilatatis; halteribus nigris, petiolo flavido;

**Fem.:** atra, thoracis maculis 3 argenteis; abdominis fasciis 4 integris, 1:ma (in segmento 2:do) aurantiaca, 2 & 3 angustis atque 4 (in segm. 6:to) lata, argenteis; pedibus totis flavis, posticorum femoribus apice, tibiis tarsisque paullo minus quam in ♂ dilatatis, totis fuscis; halteribus fulvis; in copula.

Meig. Dipt. 4. 14. 6. ♂. Macq. Buff. 20. 4.? Zett. Ins. Lapp. 530. 2. ♂♀. *C. leptiformis* var. *b.* Zett. Act. Holm. 1819. 1. 79. ♂.

Hab. in Scandinaviæ pratis sylvaticis & lucis, 27 Jun.—28 Aug., passim; in copula semel deprehensa; femina rarissima; scilicet in Scania ad Silfåkra prope Lund, Esperöd &c.; in Ostrogothia ad Hagalund prope Wadstena, Lärketorp, Gusum &c.; in Gotlandia ad Westös rarius; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; in Lapponia Umensi ad Badstuträsk, Barrsele & Wilhelmina, passim; in Dania, D. Staeger.

♂♀. Simillima priori, a qua ♂: halterum clava nigra, abdome subimmaculato; ♀: abdominis fasciis omnibus integris,

nee interruptis, 1:ma flava argenteo-micante, ut & uterque sexus alis subaqueis, differunt.

3. *C. elegans*: aterrima, abdomine albo-bistrigato ♂, aut fasciis 1 integris, anticeis 2 luteis, reliquis argenteis ♀; pedibus melleis ♂, aut flavis ♀; tibiis tarsisque posticis in utroque sexu nigricantibus; alis hyalinis; halteribus fulvis. ♂♀. (Long. 1—1  $\frac{1}{4}$  lin.).

*Mas*: aterrimus, abdominis segmentis 3 & 4 utrinque striga alba obsoleta; pedibus fuscis aut melleis, posticorum tibiis tarsisque obscuris;

*Fem.*: atra, thoracis maculis 3 argenteis; abdominis fasciis 4 integris, 1:ma latiore, 2:daque angusta, aurantiacis; 3:tia latitudine 2:dæ, 4:taque latitudine 1:mæ, argenteis; pedibus totis flavis, postieorum femoribus summo apice, tibiis tarsisque totis brunneis; instrumentis oris flavis,

Meig. Dipt. 4. 11. ♂♀. certe. — Panz. Fn. 103. 18. ♂. 19. ♀. — Zett. Ins. Lapp. 531. 3. ♂♀. Macq. Buff. 2. 19. 1. ♂♀. *Dolichopus* Fabr. Anti. 271. 21. *Call. leptiformis* Fall. Platyp. 6. 1. var. ♂. in descript.

Hab. in nemorum foliis fruticum, per Scandinaviam, Jul. Aug., passim; scilicet in Scania ad Abusa; in Ostrogothia ad Hagalund prope Wadstena, Gusum &c.; in Calmaria ad Berga; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Norvegia in alpe Dovre, D. *Boheman*.

♂♀. Prioribus valde affinis & similis, sed a *C. leptiformi*, maris alis hyalinis, nec levissime fuseanis, abdominis strigis albis utriusque 2, nec 3, feminæ abdominis fasciis 3 primis interruptis, nec integris, quarum 2 anticeis, nec solum anticea, aurantiacis; & a *C. speciosa*, maris abdomine utrinque albo bistrigato, nec immaculato, halteribus nigris, nec fulvis, abdominis fasciis 2 anticeis, nec solum prima, aurantiacis, leviter argenteo-micantibus, facile dignoscitur.

4. *C. amoena*: aterrima, abdomine immaculato ♂, aut antice late aurantiaco, postice fascia argentea

(♀); pedibus melleis (♂), aut flavis (♀); tibiis tarsisque posticis in utroque sexu nigricantibus; alis hyalinis; halteribus fulvis. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: aterrimus, abdomine immaculato; pedibus melleis aut fuscis, posticis obscurioribus;

*Fem.*: atra, fronte & epistomate argenteis, palpis flavis: thoracis maculis 3 argenteis; abdominis segmentis 1, 2 & 3 totis aurantiacis, 4:to atro, 5:to fascia lata subintegra, argentea, reliquis atris; pedibus totis flavis, posticorum femoribus apice fuscis, tibiis tarsisque totis nigricantibus.

Var. a. ♂♀. feminæ abdominis segmento 4:to toto atro.

Meig. Dipt. 4. 12. 2. ♂♀. t. 33. f. 13. ♀. — Macq. Buff. 2. 19. 2. ♂♀. certe. — Zett. Ins. Lapp. 531. 4. ♂♀.  
*Call. leptiformis* var. c. ♀. Zett. Act. Holm. 1819 p. 79.

Var. b. ♀. feminæ abdominis segmento 4:to fascia apicali aurantiaca.

Hab. in foliis fruticum Betulae, Alni &c., per Scandinaviam, 1 Jul.—4 Aug., passim; scilicet var. a. in Scania ad Abusa & Esperöd in paroec. Mellby; in Smoldnia rarius; in Ostrogothia ad Wadstena, Gusum & ad prædium Gottenvik in paroecia Jonsberg, D. Stenhammar; in Lapponia Umensi ad Barrsele & Wilhelmina; in Norvegia ad Evenäs Nordlandiae; in Dania, D. Staeger. E varietate b. 2 tantum specimina in Scania ad Esperöd in paroec. Tranås deprehendi.

♂♀. Simillima *C. speciosæ* (2), & mas ab ejus mare vix nisi halteribus fulvis petiolo obscuro, nec totis fulvis, discrepat; sed femina abdominis segmentis 3 primis totis (excepta incisura nigra) aurantiacis, & fascia tantum unica lata integra argentea in segmento 5:to, facile dignoscitur. — Hanc speciem in copula quidem non inveni, sed individua mascula & feminea talia, qualia descripserim, in societate semper deprehendi.

5. *C. dives*: aterrima, abdomine albo-bimaculato ♂, aut fasciis 1 integris, argenteis ♀; pedibus melleis ♂, aut flavis ♀; tibiis tarsisque posticis in utroque sexu nigricantibus; alis hyalinis, halteribus nigris ♂, aut fulvis ♀. ♂♀. (Long. 1 lin. parum ultra.).

*Mas*: aterrimus, abdomine utrinque in lateribus segmentorum 2 & 4 macula subquadrata alba; pedibus fuscis, posticis obscurioribus; halteribus nigris;

*Fem.*: aterrima, fronte, epistomate, thoracis maculis 3, abdominalisque fasciis 4 integris in segmentis 2, 3, 4 & 6 locatis, argenteis; pedibus flavis, posticorum femoribus apice, tibiis tarsisque totis, nigricantibus; halteribus fulvis.

Zett. Ins. Lapp. 531. 5. ♂♀.

Hab. in silvis Sueciae borealis, 22 Jun.—6 Aug., minus frequens; scilicet in Jemtlandia boreali in paroec. Undersåker ad habitationem Pastoris d. 6 Aug. 1810 unicam feminam invenit D. Dahlbom; in Lapponia Svecica meridionali Umensi ad Lycksele, Barrsele & Stensele, utrumque sexum 1832 rarius deprehendi.

♂♀. Similis *C. speciosæ*, a qua mas abdominis maculis 4 albis, & femina abdominis fasciis omnibus argenteis, nec prima flava, mox dignoscuntur.

\*\*). Antennæ breviusculæ, subovatae, apice acuminatae. Species minutæ.

6. *C. boreella*: aterrima, abdomine immaculato ♂, aut basi aurantiaco ♀; pedibus in utroque sexu fuscis; halteribus nigris; alis levissime fuscanis ♂, aut hyalinis ♀. ♂♀. (Long. fere  $\frac{3}{4}$  lin.)

*Mas*: aterrimus, abdomine immaculato, ventre pedibusque fuscis, tarsis posticis nigris; alis levissime fuscanis, iridicoloribus, halteribus nigris;

*Fem.*: atra, fronte, thoracis maculis humeralibus, pleuris quoque, argenteo-cinereis; abdomine basi fulvo; alis hya-

linis, halteribus nigris, petiolo pallido; pedibus fusco-melleis, tibiis tarsisque posticis parum dilatatis.

Var. a. ♂♀. ab domine maris immaculato, feminæ segmentis basalibus 1, 2, 3, fulvis.

Zett. Ins. Lapp. 532. 7. var. a. ♂♀.

Var. b. ♂. ab domini basi macula laterali fusco-ferruginea; alis subhyalinis.

Zett. l. c. var. b. ♂.

Var. c. ♀. ab domine tantum segmentis 2:do, aut 1:mo & 2:do, flavis.

Hab. in fruticibus, graminosis & foliis plantarum, quæ ad rivulos locis umbrosis læte vigent, per Sueciam in primis borealem, 1 Jul.—9 Aug., passim; scilicet var. a. in Jemtlandia ad diversorium Faxelfven atque in paroecia Undersåker; in Lapponia Umensi ad Barrsele, Granträsk & in Stöttingsfjellet, D. Dahlbom; specimen masculum ad Ahusa Scaniæ semel etiam lectum; var. b. ad Undersåker, Granträsk et Lycksele; var. c. in Stöttingsfjellet, rarius.

♂♀. Pusilla. A præcedentibus differt, præter magnitudinem minorem, etiam antennis apice magis acuminatis; area angulari ad basin alæ nonnihil magis retracta, & nervulo transverso medio forte paullo magis a margine interiore remoto. Mas proximus & valde similis *Call. speciosæ* (3) videtur. Alarum nervus costalis ater in utroque sexu. Oculi brunnei, in ♂ simul obscure euprei. — Variat ♀ macula obscura in flavedine abdominis baseos.

7. *C. elegantula*: aterrima, abdominis segmentis 2 & 3 aurantiaco-pellucidis; pedibus fusco-flavis; halteribus nigris; alis levissime fuscans (♂), aut hyalinis (♀). ♂♀. (Long. fere  $\frac{3}{4}$  lin.)

**Mas:** aterrimus, abdominis segmentis: 1:mo apice, 2:do toto, 3:tioque lateribus, fulvo-pellucidis; alis subfuscans, iridi-coloribus; pedibus sordide flavidis, tarsis posticis obscuris, articulo 1:mo distinete dilatato; oculis (in vivo) late rufis; metathorae griseo;

**Fem.:** atra, fronte, thoracis lateribus pleurisque cinereis; abdominis segmentis 2:do toto 3:tioque lateribus, fulvo-pellucidis, auro toto argenteo; pedibus fusco-flavis, tarsis posticis subsimplicibus; alis hyalinis.

Var. a. ♂♀. pedibus sordide flavis; alis in ♂ irideis.

Fall. Platyp. 7. 2. ♀. Zett. Act. Holm. 1819 p. 80.

33. ♂♀. var. a. — Fall. Dipt. Suec. Suppl. 4. 4. ♂♀.

Meig. Dipt. 4. 13. 3. ♀.

Var. b. ♂♀. pedibus praesertim posticis paullo obscurioribus; alis in ♂ hyalinis.

Hab. in fruticibus Coryli &c., 6. Aug.—20 Sept., minus frequens; scilicet var. a. in Scania ad Esperöd in parœcia Trauås rarius; in Smolandia ad Berga Calmariae; in Ostrogothia ad Lärketorp, & Gusum (D. Wahlberg); e var. b. 2 mares & 2 feminas in Jemtlandia boreali ad Undersåker 6 Aug. 1840 inveni.

♂♀. Valde affinis priori, & praesertim ejus var. b. & c. similima, sed propter picturam abdominis flavam in ♂, & pedum colorem dilutiorem in utroque sexu, forte distincta. Halteres nigri, petiolo fusco. Alarum nervi ut in *C. boreella* directi.

8. *C. scutellaris*: aterrima, scutello abdominalisque segmentis 2 & 3 aurantiacis; pedibus fascis; halteribus atris; alis aqueis. ♂. (Long. fere  $\frac{3}{4}$  lin.)

Zett. Ins. Lapp. 532. 8. ♂.

Hab. in Suecia borealis sylvaticis, 31 Jul.—6 Aug., rarius; scilicet in Jemtlandia boreali in parœcia Undersåker juxta domicilium Pastoris prope flumen Åre, parce;

in monte subalpino Stöttingsfjellet inter Lycksele & Åsele Lapponiae Umensis, minus frequens.

$\delta\varphi$ . Simillima *C. elegantulae*, a qua non differt nisi scutello toto fulvo, & alis purius hyalinis l. aqueis.

9. *C. Dahlbomi*: aterrima, thoracis dorso aut toto ( $\varphi$ ), aut limbo postico ( $\delta$ ), scutello abdomineque basi in utroque sexu, fulvis; halteribus pedibusque fuscis; alis hyalinis.  $\delta\varphi$ . (Long. sere  $\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: aterrimus, halteribus nigris; thoracis postico, scutello abdominisque segmentis 2 & 3, fulvis, pedibus fuscis aut nigro-fuscis;

*Fem.*: atra, halteribus fuseis; fronte anoque canis; thoracis dorso toto, scutello, abdominisque segmentis 1, 2 & 3, fulvis; pedibus fusco-testaceis.

Var. a.  $\delta\varphi$ . halteribus in  $\delta$  nigris, in  $\varphi$  fuscis.

Zett. Ins. Lapp. 532. 9.  $\delta\varphi$ . *Call. elegantula* var. b.  $\delta$ . Zett. Act. Holm. 1819. p. 80. Ejusdem It. Lapp. 1832. p. 206.

Var. b.  $\varphi$ . halteribus flavis.

Zett. Ins. Lapp. l. c. var. b.  $\varphi$ .

Hab. locis umbrosis in nemorum fruticibus Coryli, Alni, Populi &c., atque in foliis plantarum altiorum ad rivulos praeprimis in Suecia boreali, 31 Jul.—2 Sept., minus frequens; scilicet in Ostrogothiae pratis ad Hagalund prope Wadstena, rarissime; in Calmaria ad Berga, semel; in Jemtlandia boreali, ubi in Populetis parœciae Undersåker juxta Pastoris domicilium prope flumen Åre, utrumque sexum haud raro legit Amicus noster *Dahlbom*; in Lapponia Umensi ad Granträsk 31 Juli 1832 copiosius inventa ab Eodem & me.

$\delta\varphi$ . Species pulcherrima & distincta. Magnitudo, statura & similitudo proxime praecedentium, sed pictura thoracis mox dignata. *Mas*: thorace postice inaequaliter & indeterminate, scutello toto, abdominalis segmento 2:do toto, 3:tioque lateribus, fulvis. *Femina*: thoracis dorso toto fulvo, pilis aliquot nigris obsito, & maculis anticis 4 l. 5 fuscis, obsoletis, quarum una ante occiput majore, distinctiore. Scutellum & abdominalis segmenta 1, 2 & 3 fulva.

B. Antennarum articulus ultimus elongato-conicus  
seu subulatus,

10. *C. Falleni*: obscure cinerascens ( $\delta$ ), aut late cinerea ( $\varphi$ ); abdomen in utroque sexu flavo, maculis lateralibus fuscis; antennarum halterumque basi pedibusque pallidis; alis levissime fuscis.  $\delta\varphi$ . (Long. fere 2 lin.).

*Mas*: oculi linea media transversim impressa; thoracis dorsum obscurum; abdomen lateribus utrinque maculis 3 l. 4 brunneis, segmento ultimo superne nigricante; alae leviter fuscanae; halterum clava obscura; metatarsi postici magni, valde dilatati;

*Fem.*: oculi non lineati; frons & thorax totus, late cinerea; abdomen maculis brunneis majoribus cingula 3 l. 4 formantibus; alae subhyalinae; halteres flavescentes; metatarsi postici subsimplices.

Zett. Act. Holm. 1819. p. 77. 30.  $\delta\varphi$ . Fall. Dipt. Su. Suppl. I. p. 3. 1.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 16. 9.  $\varphi$ . *Call. Megerlei* Meig. I. c. 10.  $\delta\varphi$ . certe eadem.

Hab. locis umbrosis in soliis fruticum, per Succiam meridionalem, 13 Sept.—17 Novemb., minus frequens; scilicet in Sania in Paradislykan juxta urbem Lund, ad villam Abusa prope Lund, & ad Esperöd utrumque sexum inveni: sub nomine *Call. Megerlei* Meig. mas a D. Stae-

ger 1837 communicatus. (Ex Hamburgo individuum masculum sub nomine *Call. Megerlei* a D. v. *Winthem* 1837 quoque obtinui.).

$\delta\varphi$ . Nostratom maxima. Caput cinereum. Oculi rufi. Antennæ flavæ, articulo ultimo nigro-brunneo. Proboscis pallida; Thorax lète cinereus, dorso in  $\delta$  obscuro l. nigricante, lineolis in utroque sexu nigris, setulosis. Abdomen ut in diagnosi. Alarum nervi ut in *C. leptiformi* (1), sed area angularis adhuc brevior & nonnihil magis ad basinalæ retracta; nervus transversus medius paullo quoque longius a margine remotus. Pedes toti pallidi, tarsis apice interdum subinfuscatis. Femora postica utrinque setulosa.

11. *C. Zetterstedti*: cinerea, ab domine aurantia-co, apice cinereo, atro-notato; pedibus testaceis; halteribus fulvis.  $\varphi$ . (Long. circit.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Wahlberg in litteris 1842.

Hab. in foliis Coryli Suecæ mediae rarissime; scilicet in Ostrogothia in Populeto Adela-lunden sic dicto ad Gusum initio mensis Septembris a Cel. D. Profess. & Equite *Wahlberg* detecta.

$\varphi$ . Cum speciem ipse non vidi, descriptionem a Cel. Detectore mecum communicatam integre afferam. "*C. amoena* parum minor, antennarum forma vero *C. antennatæ*, cinerea, ab domine aurantia-co, ano cinereo, atro-notato. Caput cinereum, oculis castaneis. Antennæ nigrae in setam longiusculam attenuatae. Palpi testacei. Thorax cum pectore cinereus, antice vestigio linearum 2 fuscarum. Sentellum cinereum. Abdomen segmentis 1—3 aurantiacis, immaculatis, 4:to aurantiaco, macula marginali (utrinque) atra majore minoreve, 5:to cinereo, apice atro, nigredine ad latera & medio præsertim altius adscendente, ut segmentum cinereum, atro-trimaculatum vel atrum cinereo-bimaculatum dices, 6:to &c. cinereis, immaculatis. Pedes testa-

cei, tarsis infuscatis. Alæ ut in congeneribus (conspeciebus?).  
Halteres fulvi?" *Wahlb.*

12. *C. antennata*: aterrima ( $\delta$ ), aut cinerea, abdome nigro ( $\varphi$ ); halteribus pedibusque fuscis ( $\delta$ ), aut flavescentibus ( $\varphi$ ); alis subhyalinis.  $\delta\varphi$ . (Long. 1—1½ lin.).

*Mas.*: aterrimus, immaculatus, antennæ nigræ; sternum obscurum; alæ levissime fuscantæ, iridicolores; halteres nigri, petiolo fuso; pedes brunnei, posticorum tibiis metatarsisque parum dilatatis;

*Fem.*: caput & thorax cinerea; antennæ fuscæ; abdomen nigricans, utriusque ad basin griseum, in individuis vero illæsis griseum, maculis 4 dorsalibus trigonis anque nigris pictum; alæ hyalinae; halteres flavidi; pedes testacei, posticorum tibiis metatarsisque subsimplicibus.

Zett. Act. Holm. 1819. p. 79. 32.  $\delta\varphi$ . Fall. Dipt.  
Suec. Suppl. 1. p. 1. 3.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 1. 15. 7.  $\delta\varphi$ .  
Macq. Bußl. 2. 20. 5.  $\delta\varphi$ .

Hab. locis umbrosis in foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem & medianam, 14 Jul.—10 Sept., minus frequens; scilicet in Scania ad villam Esperöd in parœc. Tranås, rarius; in Smolandia ex. gr. ad prædium Berga Calmariae, parce; in Wermelandia ad prædium Årås, rar.; in Dania. D. Staeger.

$\delta\varphi$ . Oculi obscure ferruginei. Alarum nervi directi ut in *C. boreella* (6) & reliquis ejusdem subdivisionis, nempe area angularis brevis ad basin alæ valde retracta, & nervus transversus medius a margine remotiusculus. Pedes postici in utroque sexu subsimplices.

13. *C. viduella*: aterrima, thorace macula postica glauca; halterum petiolo pedibusque lividis; alis hyalinis.  $\varphi$ . (Long. fere 1½ lin.).

Zett. Ins. Lapp. 531. 6.  $\varphi$ .

Hab. in Norvegia rarissime; in alpe Dovre a D. Boheman mense Julio inventa. Specimen tantum descriptum pro examine subjiciendo missum vidi.

♀. Similis priori, sed forte nonnihil major, & thorace (♀) atro, nec griseo, halterumque clava nigra, ab illa distincta. Aterrima. Antennæ subulatæ, seta elongata, capillari. Vertex nudus, nitidus. Thorax macula postica certo luminis situ cinerea. Scutellum atrum. Abdomen cylindricum nigrum. Halteres lividi, clava magna, nigra. Alæ hyalinæ, metallicè nitentes. Pedes lividi, pubescentes, tarsis obscurioribus.

## 95. OPETIA Meig.

*Corpus* parvum, elongatum rectum, subpubescens, opacum. Antennæ longitudine capitis, porrectæ, articulis basalibus cyathiformibus, ultimo subulato s. elongato-conico, compresso, acuto, seta terminali microscopice pubescente. Epistoma nullibi prominens. Proboscis subexserta. Oculi ut in *Platypeza*. Abdomen elongato-cylindricum, apice acutum. Alæ incumbentes, fumatae. Areæ: angularis brevisima, ad basin valde retracta; discoidalis nulla. Nervi longitudinales: 5:tus longe furcatus, 4:tus simplex in apice alæ excurrentis, 7:mus (infra aream angularem) non usque ad summum marginem interiore ductus, at non ita longe abbreviatus ut in figura Meigeni. Nervuli transversi: medianus nullus, at anticus ante apicem nervi auxiliaris situs. Halteres nudi. Squamæ minutissimæ. Pedes subnudi, inermes, simplices, metatarsis posticis articulo sequente fere duplo longioribus. Color niger. Motus forte *Platypezæ*. Habitatio in fruticibus. Discrimen sexus; mas: oculis cohaerentibus; femina: oculis remotis.

I. *O. nigra*: nigra, alis fumatis; pedibus obseure fuscis. ♂♀. (Long. fere  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 6. 357. 1. t. 66. f. 17—19. ♂♀. Macq.  
Buff. 2. 21. 1. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum Coryli &c., per Sueciam medium, in fine mensis Jun. & iterum Septemb., rarius; scilicet in Smolandia & Ostrogothia (ad Omberg), D. Prof. Boheman, ad Gusum, D. Prof. Wahlberg, qui eandem etiam in Uplandia ad Holmiam invenit.

♂♀. Pusilla. Tota nigra, parum nitida. Oculi obscure rufi, in ♂ magni, arete cohaerentes, linea media transversim impressa. Alæ præsertim ad costam fumatae. Halteres nigri, petiolo dilutiori. Pedes fusco-nigri. — Generi *Cyrtomæ* (46) sat affinis, sed antennis perspicue 3-articulatis, nec 2-articulatis, tibiis posticis simplicibus &c., distincta.

---

## 96. CONOPS Linn.

*Corpus* mediæ aut majoris magnitudinis, elongatum, cylindricum, glabrum l. brevissime puberulum, opacum. *Caput* vesiculosum, nudum. *Antennæ* capite nonnihil longiores, porrectæ, basi approximatæ geniculatæque, articulo 1:mo cylindrico, 2:do 3:tioque clavatis, stylo apicali brevi, bi-articulato. *Haustellum* elongatum, porrectum, basi geniculatum. *Palpi* minuti. *Oculi* exserti, in utroque sexu remoti, nudi, brunnei, unicolor. *Ocelli* nulli. *Thorax* subquadratus. *Scutellum* parvum. *Abdomen* 6-annulatum (præter apparatus genitalium), basi angustatum, sæpe petiolatum, posterius sensim crassius, subclavatum, apice incurvum. Alæ abdomine paullo breviores, incumbentes. *Areae* apicales 2, quarum per nervulum brevem una in apicem, altera ad marginem interiorem excurrit. *Area angularis* elongata, nervulo brevi non usque ad marginem extenso, terminata. *Halteres* nudi. *Squamæ* vix ullæ. *Pedes* simplices, inermes, posticorum tibiis basi coaretatis, metatarsis articulo sequente fere triplo longioribus. *Color* niger,

abdomine flavo-cingulato. *Motus celer. Habitatio* in hor-  
torum & pratorum floribus; aestivalis. *Larvæ* parasitæ in  
nido *Bomborum* degunt. *Differentia sexus;* *mas:* abdomi-  
nis segmento 5:to subtus in laminam transversam, subformi-  
cataam, plus minus elongato; in mortuis elevatam, rectam;  
*Femina:* eodem segmento suhtus aut omnino mutato, aut  
leviter tantum elevato.

**A. Abdomen petioliforme. Caput flavum. Alarum  
costa testacea.**

**L. *C. rufipes:*** nigra, capite flavo, vitta frontali  
atra; antennis brunneis; abdominis cingulis 5 flavido-albis,  
segmento 2:do pedibusque, rufis. ♂♀. (Long. 1, raro  
5 lin.).

Fabr. Anll. 176. 7. Latr. Gen. 4. 336. Fall. Conops.  
7. L. ♂♀. Meig. Dipt. 1. 126. 9. ♂♀. Macq. Buff. 2.  
21. 7. ♂♀.

Hab. in floribus *Epilobii angustifolii*, *Achilleæ Mil-*  
*lefolium*, &c., per Sveciam medium & meridionalem, 8  
Jul.—5 Aug., passim; scilicet in Scania ad Esperöd in  
parœc. Tranås, Gyllebo &c.; in Ostrogothia ad Gusum,  
D. *Wahlberg*, Wadstena, D. *Dahlbom*, & Lärketorp,  
ipse; in Dania, D. *Staeger*.

♂♀. Nigra. Caput flavum. Vitta frontalis lata, quæ in li-  
neolas 3, medium elongatam, sub antennis dividitur, atra.  
Antennæ obscure lividae. Haustellum & genæ, atra. Tho-  
rax in illæsis antice maculis 2 flavo-albis. Abdominis seg-  
menta: 1—5 margine apicali, 6 dorso toto, & ano superne,  
flavo-albis; 2:dum rufum aut piceum. Alæ hyaline, vitta intra-  
costali testacea. Halteres flavi. Pedes testaceo-rufi, coxis  
& tarsis apice, obscuris. Valvula ventralis maris elevata,  
parum elongata, nitida nigra, in individuo duplo majore,  
picea; abdominis segmentum 2:dum in ♀ filiforme & duplo  
tenuius, quam in mare.

2. *C. vittata*: nigra, antennis concoloribus; capite flavo; abdominis cingulis 4 albis, segmento 2:do toto, 3:tio basi late, thoracis lateribus pedibusque rufis. ♂♀. (Long. 4  $\frac{1}{2}$  lin.).

Fabr. Antl. 176. 6. Meig. Dipt. I. 129. 12. Macq. Buff. 2. 27. 13. ♂♀.

Hab. in Suecia media rarissime; in Gotlandia ad diversorum Kinnare in parœc. Lummelund d. 2 Aug. 1811 specimen masculum inveni, atque in parœc. Fardhem 2 Jul. ejusdem anni individuum femineum legit D. Dahlbom. (Sub nomine *Con. vittata* Fabr. specimina utriusque sexus e Gallia meridionali a D. v. Winthem missa).

♂♀. Similis priori, sed capite toto flavo, tantum striga verticis transversa & lineolis 2 l. 3 sub antennis obsoletissimis, fuscis, callo humerali, thoracis lateribus abdominisque segmento 2:do toto, & 3:tio a basi ad medium, rufis, distincta. Antennarum clava subtus rufescens. Calli humerales rufi, macula flava. Thoracis latera anguste rufa. Pleuræ rufæ, maculis nigris. Sternum nigrum. Ale albo-hyalinæ, vitta brunnea intra costam, versus apicem abbreviata, relieta in apice tantum macula fusca, per nervulum infuscatum (in ♀) cum vitta cohærente. Costa fere a basi ad medium anguste alba. Area apicalis apice obtusior, quam in priore, ubi magis acuta. Pedes rufi, coxis nigris, tibiis basi flavis, tarsorum articulis 2 ultimis nigris. *Mas*: abdomen atrum, cingulis 4 albis, 4:to ad latera abbreviato; segmento 2:do toto, 3:tio ad dimidium, rufo, 5:to immaculato, 6:to & ano superne leviter cinerascentibus; valvula ventrali mediocri, nigra. *Femina*: abdomen rufum l. rufescens, basi valde tenue, cingulis 5 albis, segmento 1:mo, exceptis tuberculis lateralibus rufis, nigricante, 3:tio posteriorius obscurō, 4 & 5 fere totis nigricantibus. — Specimina exotica a nostris descriptis pictura leviter discrepant.

3. *C. macrocephala*: nigra, capite antennisque flavis, vitta frontali atra; abdominis cingulis 5 flavidio-albis; pedibus luteis, femoribus basi annulo nigro. ♂♀. (Long. circiter 5 lin.).

Linn. Fn. Su. 1902. Fabr. Antl. 176. 9. Fall. Conops. 7. 2. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 125. 7. l. 36. f. 27. ♀. Macq. Buff. 2. 24. 2.

Hab. in Suecia media, 24 Jun.—2 Aug., passim; flores visitans, terræ sæpe insidens; scilicet in Ostrogothiae pascuis ad Lärketorp, Gusum &c.; in Wermelandia; in Uplandia ad Holmiam (in Caltha), D. *Wahlberg*; specimen masculum e pupa brunnea in abdomine Bombi Muscorum, in Wermelandia a D. *Elfven Dahl* 1836 capti, d. 1 Maj. 1837 egressum, mecum communicavit Cel. D. *Dahlbom*.

♂♀. Prioribus nonnihil major robustior. Antennæ luteæ, femorum annulus basalis niger, & segmentum 2:dum nigrum, nec rufum, speciem a præcedentibus distingvunt. Caput ut in *C. rufipede* pictum, sed haustellum in medio sæpe luteum. Thorax niger, immaculatus; in illæsis striga infra tuberculum humerale flava. Abdominis cinguli 5 flavidi, 3 posteriores angustiores. Alæ ut in *rufipede*. Halteres flavi. Pedes lutei, coxis, trochanteribus, femorum basi 1. annulo basali, nigris. Tarsorum artieuli apice lateribus fusco. Valvula ventralis in ♂ medioeris, nigra.

Var. b. ♀ abdomine toto nigro, cingulo tantum unico basali albo, Fall. l. c. var. β., mibi ignota.

B. Abdomen basi paullo coarctatum, non vero petiolatum.

\*). Alarum costa testacea.

4. *C. vesicularis*: nigricans, capite flavo, macula frontali nigra; antennis, thoracis lateribus, scutello, ano

pedibusque rufo-ferrugineis; abdomine cingulis 5 flavidis (♂), aut cingulis 2 flavidis & segmentis posterioribus griseoflavis (♀). ♂♀. (Long. 4— $4\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas.*: epistoma flavum, immaculatum; abdomen nigrum, segmentis: 1:mo angustissime luteo-marginato, 2:do apice late flavo-cingulato, 3, 4 & 5 albido-marginatis, reliquis analibus ferrugineis, superne leviter griseo-micantibus; valvula ventralis sat magna, ferruginea, intus nigra;

*Fem.*: epistoma flavum, carina media nigra; abdomen ferrugineum, segmentis 1:mo basi fusco, 2:do nigro, apice cingulo flavo, 3:to basi nigro, apice late, & reliquis totis, griseo-flavido-nitentibus.

Linn. Fn. 1903. Fabr. Antl. 174. 1. Fall. Conops. 8.  
3. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 120. 1. ♂♀. Macq. Buff. 2. 24. 1. ♂♀.

Hab. in floribus Ranunculi Ficar., Ribis rubri, Salicis pentandræ &c., per Sueciam meridionalem & medium, 9 Maj.—24 Jun. mihi obvia, minus frequens; scilicet in Scania ad Lund; in Ostrogothia ad Lärketorp, ipse, ad Häradshammar, D. Stenhammar, ut & ad Gusum, D. Wahlberg, qui eandem in Uplandia ad Holmiam quoque invenit; in Dania, D. Staeger.

♂♀. Similis *C. macrocephalæ*, sed adhuc robustior & in multis diversa. Macula supra radicem antennarum atra, & alia in fronte, fusca, varie dilatata, & intra lineam fere quadratam nigram inclusa; hæc pictura in ♀ præsertim perspicua. Calli humerales, thoracis limbus posticus, pleuræ & scutellum, ferruginea. Abdominis segmentum primum fasciculo pilorum nigrorum supra tuberculum laterale flavidum. Alæ albo-hyalinæ, vitta costali lata usque ad apicem extensa, testacea. In singula arearum apicalium adest macula albida, sed linea illa alba a basi ad medium costæ, quæ in *C. vittata* observatur, in hac specie non adest. Nervi ut in *C. rufipede*. Pedes cum coxis toti ferruginei,

tarsorum articulis apice laterali nigro. Coxæ anticæ anteice albo-micant. — *C. elegans* Meig. Dipt. 4. 122. 2. ♀. parum a nostra differre videtur.

5. *C. flavipes*: nigra, capite flavo (♂), aut nigro (♀); thoraci macula humerali, puncto pone alas, abdominis cingulis 2 (♂), aut 3 (♀), pedibusque in utroque sexu, flavis; femorum medio late, tarsorumque apice, nigris. ♂♀. (Long. 3½ fere 4 lin.).

*Mas*: caput flavum, vitta frontali sinuata nigra; epistoma in medio album, apice circa emarginaturam oris brunneum; abdomen segmentis 2 & 3 cingulo apicali flavo, 5:to margine apicali anguste albido; valvula ventralis ovato-elongata, nigra;

*Fem.*: caput saepissime nigrum, vesica verticali flava nitida; epistoma in medio flavid-lineatum; abdomen segmentis 2, 3, 4 apice flavo-cingulatis, reliquis argenteo-cinereis, nitidis; in copula.

Var. a. ♂♀, in copula: ♂ capite flavo, fronte nigro-maculata, ♀ capite nigro.

Liun. Fn. 1904. ♀. — Fabr. Antl. 177. 10. ♀. — Fall. Conops. 8. 4. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 122. 3. ♂♀. Macq. Buff. 2. 24. 3. ♂♀. — *C. trifasciata* DeGeer Ins. 263. 2. t. 15. f. 7. 8.

Var. b. ♂♀, in copula: capite in utroque sexu flavo, frontis macula plus minus dilatata, nigra.

Panz. Fn. Germ. 73. t. 21. ♀. (immerito "Mas"), 22. ♂. (immerito "Femina"). Fall. I. c. var.

Hab. in floribus Ericæ vulgaris, Achilleæ, Dauci &c., per Sueciam medium, 16 Jul.—18 Aug., passim; in copula; scilicet var. a. in Ostrogothia: ad Lärketorp, Ömberg, Lindenäs & Norra Fredberga (D. *Dahlbom*), Gusum (D. *Wahlberg*), Häradshammar (D. *Stenhammar*); in Westrogothia ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Dania,

D. Staeger; Var. b. cum var. a. ad Lärketorp &c. rarius capta.

$\delta\varnothing$ . Præcedente paullo minor, angustior, colore nigro intensiore. Antennæ nigræ, articulo ultimo subitus plerumque obscure rufescente. Scutelli summi apex & membranula inter radicem alarum & scutellum, pallide flava. Abdominis segmentum primum totum nigrum, tuberculo laterali flavo, supra quod fasciculus pilorum nigrorum ut in priori. Alæ omnino ut in *C. vesiculari*, at costa minus intense testacea. Halteres & pedes flavi, coxis, trochanteribus, femorum anticorum medio latissime, posterioribus ab apice ad medium & ultra, tarsorumque omnium articulis 4 (raro 3) ultimis, nigris. Maris abdominis segmenta 4 & 5 subhantia, per membranam sæpissime nigram, raro flavidam, connexa. — In  $\delta$  varietatis b. genæ macula nigra.

\*\* $\gamma$ . Alæ totæ hyalinæ, immaculatae.

6. *C. quadrifasciata*: nigra, capite, thoracis macula humerali, abdominalisque cingulis 1, flavis; antennis fronteque atris; vesica verlicis, aro pedibusque luteis.  
 $\delta\varnothing$ . (Long.  $\delta$  1 $\frac{1}{2}$ ,  $\varnothing$  3 $\frac{3}{4}$ —4, lin.).

*Mas*: abdominalis angustioris segmentis 2, 3, 4, 5 cingulo apicali mediocri-flavo, reliquis fere totis luteis, basi nigro-fasciatis 1. maculatis, valvula ventrali breviter ovata, valde fornicata, lutea, supra nigro pilosula;

*Fem.*: abdominalis crassioris segmentis 2, 3, 4 cingulo apicali mediori flavo, 5:to cingulo apicali lato sinuato, anōque toto ochraceo-flavis, micantibus; in copula.

De Geer Ins. 6. 261. I. t. L5. f. 1. Fall. Conops. 9.  
 5.  $\delta\varnothing$ . Meig. Dipt. 4. 123. 4. Macq. Buff. 2. 25. 5.  $\delta\varnothing$ .  
*C. aculeata* Fabr. Antl. 174. 2.

Hab. in floribus Achilleæ, Chrysanthemi, Dauci &c., per Sueciam medium, 20 Jul.—14 Aug., passim; in co-

pula; scilicet in Smolandia rarius; in Ostrogothia ad Lärketorp, Omberg, Gusum, Häradshammar &c., haud infrequens; in Gotlandia ad Lummelund, Westös, Kellunge, Gothem, Martebo, Stenkyrka, Furillen &c., sat frequens; in Nericia ad diversorum Skärmarboda, rar., D. *Dahlbom*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*.

$\delta\varphi$ . Similis *C. flavipedi*, sed alis hyalinis & pedibus luteis subinimaculatis, præcipue distincta. Caput flavum, antennis, fronte tota inter oculos, & vitta supra os, nigris. Thorax niger, callis humeralibus flavis. Scutellum nigrum. Maculæ pleurarum 2 geminatæ & 2 simplices ad latera metathoracis, albo-micantes. Abdomen nigrum, segmento 1:mo omnino ut in *C. flavipede*, sed margine apicali tenuiter flavo; reliqua segmenta ut in diagnosi sexuum picta. Alarum nervi nt in priori directi. Halteres flavi. Coxæ & trochanteres nigra. Femora rufo-lutea, basi præsertim posterioribus latere indeterminate sœpe submaculatis. Tibiæ tarsique luteo-flava, articulo ultimo fusco. Coxæ antice latere antico albo-flavido-micant.

### \*\*\*) Species dubia.

7. *C. aculeata*: nigra, capite, thoracis macula humerali, scutello abdominisque cingulis 5, flavis; antennis frontisque vitta nigris; vesica verticis pedibusque luteis. (Long. circ. 4 lin.).

Linn. Fn. Su. 1906. Meig. Dipt. 4. 124. 5. Macq. Buff. 2. 25. 6.  $\delta\varphi$ .

Hab. in Suecia, teste D. a Linnè, post illius vero tempora nemini, quantum novi, obvia, mihique omnino ignota.

Similis erit *C. 4-fasciatæ*, sed scutello flavo &c, diversa videtur. "Caput flavum, antennis & vitta antice dilatata

nigris. Vesica verticis lutescens. Calli humerales & maculæ 2 pone alas, flava. Pleuræ maculis albo-micantibus. Scutellum flavum. Alæ hyalinæ, ad costam leviter testaceæ, sed non usque ad apicem ita pictæ. Pedes lutei, tarsorum apice fusco. Abdominis cingula submarginata." Linn. & Meig.

*Obs.* Cum ill. Linnè l. c. affert: " *Aculeus* in femina niger, incurvus, inflexus"; hoc sine dubio ita interpretari debemus: valvula ventralis in mare nigra, incurva. Mares scilicet hujus generis ab auctoribus veteribus pro femina habitu fuerunt.

---

## 97. ZODION Latr.

*Corpus* minoris magnitudinis, oblongum, cylindricum, par-  
eissime setulosum, opacum. *Caput* vesiculosum, nudum.  
*Antennæ* capite nonnihil breviores, porrectæ, articulo 1:mo  
brevi cylindrico; 2:do clavato & 3:tio ovato subæque longis,  
hoc stylo dorsali brevi, nudo. *Haustellum* elongatum, filiforme,  
basi geniculatum. *Frons* in utroque sexu lata.  
*Oculi* parvi, rotundi, nudi, in vivo virescentes, in mortuo  
fovea media rotunda impressi. *Ocelli* 3. *Palpi* parvi. *Ab-*  
*domen* incurvum. Alæ incumbentes, nervis fere ut in *Co-*  
*nope* directis, at area angulari paullo minus elongata, unde  
nervus infra aream longior. *Nervi longitudinales* 3 & 4  
intra apicem alæ per angulum acutum coëunt. *Halteres*  
nudi. *Squamæ* parvæ. *Pedes* medios, simplices, tarso-  
rum ungibus pulvillisque mediocribus. *Metatarsus* posticus  
articulo sequente duplo longior. *Color* cinereus. *Motus*  
haud celer. *Habitatio* in floribus. *Larvæ* parasitæ putan-  
tur. *Differentia sexus: mas:* ano inflexo, magno, plano,  
atro, glaberrimo, nitido, abdominis segmento 4:to ventrali  
in valvulam ovatam elongato: *femina:* ano inflexo, parvo,  
nigro; abdominis segmento 4:to ventrali mutico.

1. *Z. cinereum*: obscure cinereum, capite albo-

flavo, fronte postice fusca, antennis rufis, basi et apice setaque nigris; thoracis lineis abdominalisque punctis nigro-brunneis; alis cinerascentibus, basi pallidis; pedum geniculis summis rufescentibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 1. 133. I. ♂♀. Macq. Buff. 2. 39. I. Germar in Ahrens. Fn. Eur. fasc. 11. t. 25. *Myopa cinerea* Fabr. Antl. 181. 12. ♂. Fall. Conops. 12. 7. ♂♀. *Zodion conopsooides* Latr. Gen. 4. 336.

Hab. in floribus pratensibus & campestribus, in Ericetis &c. per Scandinaviam meridionalem & medium, 7 Jun.—30 Jul., passim, in copula; scilicet in Scania ad Esperöd, in campo Kjeflinge prope Lund, & ad Fjelkinge, haud raro; in Ostrogothia ad Lärketorp, Häradschammar & Gusum; in Ölandia, D. *Wahlberg*; in Gotllandia ad Garde, Stenkyrka (specimina majora) &c., passim; in Dania rarius.

♂♀. Cinereum. Caput flavo-album. Frons flavida, posterius brunnea. Orbita oculorum alba. Antennae aut rufae, articulo primo toto & ultimo apice, setaque nigris; aut nigræ, articulo ultimo basi & medio præsertim subtus rufo-ferrugineo. Thoracis dorsum lineis 4 brunneo-nigris, interioribus 2 minntis, brevissimis; ad latera utrinque puncta 2, & postice 6 l. 8 fere in orbem disposita, nigra. Abdomen subpilosum, in singulo segmentorum 2, 3, 4 serie punctorum nigrorum, & præterea in medio segmentorum 2 & 3, macula gemina fusea obsoleta. Halteres flavi. Pedes cinerei, geniculis summis sœpe testaceis, tarsis nigricantibus. Tibiae extus certo situ albo-micant. Valvula ventralis in ♂ mediocris, nigra.

2. *Z. notatum*: obscure cinereum, capite albo-flavo, fronte postice fusca, antennis totis atris; thoracis lineis abdominalisque punctis nigro-brunneis; alis cinerascentibus, basi pallidis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 139. 2. Macq. Buff. 2. 40. 2. *Myopa irrorata* Fabr. Antl. 180. 7. ♂. *Myopa tessellata* Fabr. Antl. 181. 11. teste D. Meigen.

Hab. cum priori, 24 Jun.—20 Jul., passim; scilicet in Scania ad Lund, Björnstorps, Esperöd &c.; in Ostrogothia ad Wadstena, Fredensborg, D. Dahlbom & Häradshammar, D. Stenhammar; in Ölandia ad Borgholm, D. Wahlberg.

♂♀. Præcedenti simillimum, nec differt ab illo nisi magnitudine plerumque minore & antennis cuni seta totis atris. Auctoritate D. Meigeni ut distinctam speciem propono, varietatem tantum prioris esse suspicans.

---

## 98. MYOPA Fabr.

*Corpus* mediæ, raro minoris magnitudinis, elongatum, subcylindricum, subpubescens, sœpissime opacum. *Caput* vesiculosum, nudum, raro pubescens. *Antennæ* fronti prominenti insertæ, capite breviores, porrectæ, articulo 1:mo brevissimo, subcyathiformi, piloso, 2:do sequente duplo longiori, clavato, basi compresso, toto pubescente, 3:tiō rotundato aut breviter orato, nudo, in medio stylo dorsali, brevi, biarticulato, nudo. *Haustellum* longissimum, filiforme, bis seu basi medioque geniculatum. *Frons* in utroque sexu lata. *Oculi* parvi oblongiuseuli, nudi, in viva obscure ferruginei, unicolores. *Ocelli* 3. *Palpi* longitudine, forma & pilositate varii. *Abdomen* segmentis 6; apice incurvum, obtusum. *Alæ* incumbentes, subangustatæ. *Area angularis* elongata. *Nervi* longitudinales 3 & 4 nonnihil ante summum apicem in costam paullo remotim excurrentes, unde area 1:ma apicalis ibi sœpissime aperta. *Haltes* nudi. *Squamæ* non magnæ. *Pedes* simplices, pilosulli, femoribus validis, tarsorum ungibus pulvillisque majusculis. *Metatarsus* posticus articulo sequente duplo major.

*Color ferrugineus aut nigricans. Motu tarda, sed territa mox avolat. Habitatio in floribus. Differentia sexus; mas: ano inflexo, maximo, subplano aut convexiusculo, nitido; femina: ano inflexo parvo, nitido.*

*Sect. 1. Ferrugineo-brunneæ. Antennæ capite breviores. Frons latissima, (in *M. ferruginea* (6) modice lata). Area angularis elongata. Nervus longit. 4:tus juxta nervulum transversum fere rectangulatum in costam flexus. Valvula ventralis segmenti 4:ti in ♂ vix ulla. Genuinæ. Majores.*

#### A. Capite ad genas villosulo.

1. *M. buccata*: ferrugineo-cinereoque variegata; epistomate albido, pilosulo; antennarum articulo ultimo fulvo; thoracis dorso obscuero; alis nebulosis, nervulis transversis anticis pallidis; pedibus nigro-annulatis. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{3}{4}$  lin.).

Fabr. Antl. 179. 5. Panz. Fn. Germ. 12. 24. Fall. Conops. 10. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 142. 2. certe. Macq. Buff. 2. 31. 2. Zett. Ins. Lapp. 619. 1. ♂♀. *Conops* Linn. Fn. Su. 1905. *Sicus buccatus* Scopol. Carneol. n. 1005.

Hab. in floribus Salicium, Leontodontis &c. etiam in graminosis, per Scandinaviam, 12 Maj.—26 Jun., passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Kjellby, Abusa, Björnstorps &c.; in Ostrogothia ad Lärketorp & Gusum; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Lapponia Tornensi ad Wittangi, rar.; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

♂♀. Caput album & præsertim ad genas albo pubescens. Frons ferrugineo-flava, maculis & pilis fuscis. Antennæ testaceæ, nigro-pilosulæ, articulo ultimo rotundato, fulvo, nudo, seta lutea, apice nigra. Pone genas puncta utrinque 1 l. 2 brunnea. Palpi breves. Thorax ferrugineus, disco dor-

sali & punctis 2 pectoralibus, nigris; dorso lineis 2 cinereis. Scutellum obscure ferrugineum. Abdomen luteo-ferrugineum, ad latera & postice (præsertim in ♀) cinereo-variegatum, segmento 1:mo (et in ♂ interdum etiam incisuris) fuscum. Alæ albo-hyalinæ, nervis late fuscatedine cinctis, unde nebulosæ. Nervi auxiliaris apex ad exitum in costa, niger. Nervuli transversi antie pallidi. Squamæ albæ & albo-ciliatæ, Halteres flavo-albi. Pedes ferruginei, nigro-pilosæ, femoribus pone medium fascia plus minus lata, nigra 1. fusca. Tibiæ annulis 2, uno ante, altero pone medium, fuscis. Tibiæ basi extus albo-nicantes. Tarsi ferrugineo-flavi. Abdominis apex in ♂ angustior, quam in ♀.

Var. b. ♀. duplo minor. In Scania ad Räfsten prope Lund d. 16 Jun. 1839 semel a D. *Dahlbom* inventa; & altera vice ad Lund a me deprehensa.

2. *M. testacea*: ferrugineo-cinereoque variegata, epistomate albido, pilosulo, antennarum articulo ultimo fulvo; thoracis dorso obscuro; alis subnebulosis, nervulo transverso antico nigro; pedibus nigro-annulatis. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{1}{2}$  lin.).

Fabr. Antl. 179. 4. Fall. Conops. 11. 3. ♂♀. Latr. Gen. 4. 337. Meig. Dipt. 4. 142. 3. Macq. Buff. 2. 32. 3. Zett. Ins. Lapp. 619. 2. ♂♀. *Conops* Linn. Syst. Nat. 2. 1006. 11. *Myopa ferruginea* Panz. Fn. Germ. 22. 24. videtur.

Hab. in floribus Salicis cinereæ, Syngenesistarum &c. per Scandinaviam, 27 Maj.—Jun. — 29 Aug., haud raro, in copula multoties capta; scilicet in Scania ad Lund, Kjeflinge, Abusa, Esperöd &c., sat frequens; in Smolandia, D. Boheman; in Ostrogoth. ad Wadstena, Gusum & Härads-hammar; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Da-

Iecarlia rar.; in Lapponia Umensi ad Lycksele rarissime; in Dania, D. *Dreusen*. (Mas ad Sedinum 8 Jun. 1842 a Cel. *Dahlbom* captus).

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed vere differt: genis albis immaculatis, nec punetis fuscis notatis, alis vix nebuloisis, sed potius fusco-hyalinis, nervulo transverso antico atro, unde quasi punctum nigrum fere in medio alae exstat, ut & apice nervi auxiliaris flavido, nec nigro. Magnitudine saepe etiam paullo minor, quam *M. buccata*. Annuli femorum in *M. buccata* simplices & plerumque nigri, in *M. testacea* vero saepius duplicati & fusi, interdum obsoleti. Palpi filiformes, pilosi. Omnia reliqua ut in praecedente.

#### B. Capite glabriculo aut glaberrimo.

3. *M. dorsalis*: antennarum fuligarum articulo 2:do ultimo vix dimidium longiore, ferruginea, capite albido, fronte flava, macula vertieis magna triangulari, pallida, lueda, fusco-obumbrata; thoracis diseo, scutello abdominisque dorso, nigris, segmentorum 2, 3, 4 margine apicali, reliquisque totis, cinereis; alis fuscaneis; femoribus macula superna nigra; tibiis annulo fuso, extus albo-micantibus.  
 $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Fabr. Antl. 178. 1.? Fall. Conops. 10. 2.  $\delta\varphi$ . certissime. — Meig. Dipt. 1. 113. 1? *M. ephippium* Fabr. Antl. 180. 8 videtur. — Forte etiam *M. fasciata* Meig. Dipt. 1. 114. 6. & Maeq. Buff. 2. 33. 7. hujus varietas.

Hab. in floribus Chrysanthemi Leucanthemi, Jasion, montanae &c., per Scandinaviam meridionalem & medium, 16 Jun.—Jul.—Aug.—15 Sept., vulgaris; in copula capta; scilicet in Scania ubique frequentissima; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Lindö (insula in lacu Western), Gusum &c., haud rara; in Westrogothia ad Gotho-

burgum D. *Wahlberg*; e Dania sub nomine: "M. fasciata Meig." a D. *Stæger* missa.

$\delta\varphi$ . Caput albido flavum, glabrieulum. Frons flava. Maeula verticis sat magna, triangularis, flava, albo-micans, nitidissima, basi puneto stemmatum nigro, anterius linea brunnea utrinque marginata. Antennæ fulvæ, articulo 2:do nigropilosulo vix dimidium longiore ultimo, qui ovatus & nudus est. Thorax ferrugineus, disco nigro, cinereo-vittato, ad latera (in ferruginedine) in illæsis albo-micans. Scutellum nigrum. Abdomen dorso nigrum, lateribus, ano & ventre ferrugineis. Segmenta 2 & 3 margine apicali in medio anguste, ad latera latius cinereo-alba; 4:rum album, basi fascia sub-interrupta brunnea l. nigra; reliqua segmenta tota alba. Alæ subfuscæ, immaculatæ, nervis basi flavescentibus. Nervulus transversus medius subperpendicularis apici nervi auxiliaris oppositus. Segmentum costæ inter exitum nervorum longitudinalium 2 & 3, duplo longius segmento costali inter exitum nervor. longitud. 1 & 2. Pedes ferruginei, femoribus præsertim anterioribus superne in medio plus minus late nigris. Femora postica l. posteriora sæpe immaculata. Tibiæ omnes mox infra medium annulo fuso, interdum obsoleto; extus albomicantes. Anns inflexus ferruginens, in ejus apice genitalia subexserta, nigra. Abdomen apice angustius in  $\delta$ , quam in  $\varphi$ . Pietura pedum variat-

4. *M. occulta*: anteunarum lutearum articulo 2:do ultimo fere duplo longiore, ferruginea, capite albido, fronte nigricante, macula verticis mediocri triangulari, pallida, lucida; thoracis disco, scutello abdominisque dorso, nigris, segmentorum 2, 3, 4 margine apicali reliquisque totis, cinereis; alis fuscanis; femoribus fere totis tibiisque nigritantibus, his basi extus albo-micantibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 2½ fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 115. 7.  $\delta\varphi$ . Macq. Buff. 2. 33. 8.  $\delta\varphi$ .

Hab. in floribus, Jul. Aug., cum priori minus frequens, & ♂ mihi rarissime obvius; scilicet in Scania ad Esperöd in paroec. Tranås, in Pinetis ad Lackalänga prope Lund; in Ostrogothia ad Lärketorp in paroec. Mjölby, rar. (E Reinerzi Silesiae specimen femineum sub nomine: "Myop. occulta Meig.", nostrae simillimum misit D. Zeller.)

♂♀. Priori valde affinis & similis, sed magnitudine plerumque minore, fronte pedibusque obscurioribus, ut & antennarum articulo 2:do paullo longiore, ultimo vero nonnihil breviore, breviter ovato, distincta, videtur. Femora subtus brevissime & rigide nigro-setulosa, unde in diagnosi *Meigeni* hujus speciei l. c. "femora subtus serrata" dicuntur. Ejusmodi autem armatura quoque in *M. dorsali* obtinet. Reliqua ut in præcedente.

5. *M. variegata*: antennarum lutearum articulo 2:do ultimo duplo longiore, obscure ferruginea, capite albido, fronte lutea, macula verticis mediocri, triangulari, pallida, lucida; thoracis albo-lineati disco, scutello abdominisque dorso, nigris, segmentorum 2, 3 margine apicali, reliquisque fere tosis, cinereis, horum 4, 5, 6 basi punctis 2 nigris; alis fuscanis; pedibus variegatis. (♀) (Long. 3 lin.).

Fall. Conops. 11. 4. ♀. Meig. Dipt. 4. 145. 8. l. 37. f. 16. Maeq. Buff. 33. 9. *M. nitidula* Fabr. Antl. 180. 6.

Hab. in Scania orientali mense Aug. rarius; scilicet in arvis ad Esperöd paroeciae Mellby 4 specimina inveni. Sub nomine "M. picta Panz." e Dania mecum communicata.

♀. Similis *M. dorsali*, sed antennarum articulo 2:do forte nonnihil longiore, maculis frontalibus 4 brunneis, quarum 2 striiformibus inter antennas & oculos, & 2 juxta maculam verticis, peristomio punctis 2 minutis nigris, nec immaculato,

thoracis lineis dorsalibus albis evidentioribus, scutello vitta media alba, nec immaculato, abdominis segmentis 2 ultimis cinereis, punctis 2 mediis & 2 lateralibus in singulo nigris, alarum segmento costæ inter exitum nervorum longitudinalium 2 & 3 duplo fere breviori, quam segmento costali inter exitum nervor. longit. 1 & 2, ut & tandem femorum tibiarumque medio late nigro, albo-annulato, vere distincta. Tarsi flavantes, articulis apicibus lateralibus nigro-pilosus, ultimo toto obscuro. Antennarum articulus ultimus fulvus, immaculatus. Thoracis calli humerales & latera ferruginea, maculis albo-micantibus. In illæsis cingula alba in femoribus anterioribus tantum unum, in posticis duo.

6. *M. ferruginea*: ferruginea, capite rufo-flavido, antennis fulvis, fronte lutea; thoracis dorso grisecente, vittis 3 nigris, lateralibus abbreviatis; metathorace atro; abdominis elongati incisuris cinereo-micantibus; alis fuscanis, basi flavescentibus. ♂♀ (Long. 4 lin.).

Fabr. Antl. 178. 2. Fall. Conops. 12. 6. ♂♀. Meig.  
Dipt. 4. 114. 5. Macq. Buff. 2. 32. 6. Zett. Ins. Lapp. 620.  
3. ♂♀. *Conops* Linn. Fn. Sv. 1907.

Hab. in graminosis, per Scandinaviam, 2 Jul.—26 Aug. sat vulgaris; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c., passim; in Calmaria ad Dalhem; in Ostrogothia ad Wadstena, Godegård, Gusum, Häradshammar &c., frequens; in Westrogothia ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Bahusiā ad Uddevalla, D. *Gyllenhal*; in Helsingia ad Glösbo & Stråtjära, freq.; in Lapponia Umensi ad Lycksele rar.; in Norvegia ad Thynæs & Levanger in paroee. Skogn, passim; in Dania, D. *Stäger*, non raro. (E Berolino a D. *Hoffmann* 1842 missa).

♂♀. Prioribus paullo longior, abdome angustiore, cylindrico, apice, praesertim in ♂ longe inflexo. Caput glaberrimum, occipite tantum nigropiloso; rufescenti flavum, epistomate sub antennis lucido, genis albo-nitentibus. Frons paullo an-

gustior, quam in prioribus, croceo-flava. Vertex puncto fuscō. Antennæ breviusculæ, fulvæ, artienlo ultimo brevi, rotundato, seta obscura. Haustellum longum, nigrum. Thorax ferrugineus nitidus, disco dorsali griseo, opaco, vittis 3 nigris, interdum confluentibus, media usque ad caput continuata. Scutellum rufum. Metathorax ater. Abdomen ferrugineum, nitidum, segmentis mediis maculis lateralibus & incisuris tenuiter, albo-micantibus. Abdomen basi apiceque præsertim in ♂ interdum nigro maculatum. Alæ fuscaneæ, basi flavidæ. Segmentum costæ inter exitum nervorum longitudinalium 2 & 3 triplo longius, quam segmentum eostale inter nervos longitudin. 1 & 2. Squalmæ albidae. Halteres flavi. Pedes toti ferruginei.

Var. b. ♂. antennis fronteque fulvis, thoracis disco dorsali griseo, lineolis 2 mediis angustis approximatis ferrugineis. Abdomen crassius, segmentis 2:do breviusculo 3:tioque fuscō-maculatis. In Scania ad Lund 18 Jul. semel leeta a D. Dahlbom. Exemplum simile etiam ex Helvetia per D. Konewkam obtinui. — Speciem distinctam suspicor, sed ♀ mihi deest pro specie rite determinanda.

*Sect. 2.* Obscure cinerascentes l. nigræ. Antennæ longitudine fere capit. Area angularis modice elongata. Nervus longitudinalis 4:tus juxta nervulum transversum obtusissime angulatum in ipso apice alæ flexus, ibique cum nervo long. 3:tio fere coiens. Valvula ventralis segmenti 4:ti mediocris, elevata, atra, nitida, glaberrima. Minores; forte proprii generis.

7. *M. atra*: obscure cinerea, thorace lineis tribus nigris; capite flavo-albido, antennis nigris, intus macula fronteque luteis, vertice obscuro; abdome nigro, nitido, cingulis albidis; alis subhyalinis, nervis longitudinalibus 3 & 1 apice subcoëuntibus; pedibus ad parlem luteis. ♂♀. (Long. 1 fere 2 lin.).

Var. a. ♂♀: antennæ nigræ, intus in medio plus minus late rufæ; abdomen nigrum, nitidum, segmento 2:do fere toto reliquisque 3 & 4 margine apicali albo-cinera-

scentibus; pedes nigri, tibiis ima basi femoribusque posticis a basi fere ad medium, luteis.

Fabr. Ent. Syst. 4. 397. 3. Panz. Fn. 12. 23. Fabr. Antl. 179. 3. Fall. Conops. 12. 6. var.  $\gamma$ . Meig. Dipt. 4. 146. 9. var. a. Macq. Buff. 2. 35. 15. *M. femorata* Fabr. Antl. 181. 14. teste *Meigen*. *M. tibialis* Fabr. Antl. 182. 16. Nec *M. pusilla* Meig. Dipt. 4. 150. 16. multum a nostra differre videtur.

Var. b. ♂♀ similis var. a., sed pedibus omnibus piceis, femoribus posticis basi flavis. Meig. Dipt. l. c. var.

Var. c. ♂♀ similis var. b., sed abdominis segmentis 1 & 2 etiam nigro-piceis; forte juvenilis.

Var. d. ♂♀ in copula; similis var. a.; pedibus ut in var. a. & b., sed thorace subimmaculato, & abdome minus nitido, subeinerascente. An *M. annulata* Fabr. Ent. Syst. 4. 399. 10? Media quasi inter *M. atram* & sequentem.

Hab. in graminosis locis aridis, per Scandinaviam meridionalem & medium, 17 Jun. — tota æstate — 11 Sept., passim; scilicet var. a. in Scania ad Lund, Abusa, Silfåkra, Esperöd &c., frequens; in Ostrogothia rarissime; in Gotlandia ad Gothem & Kjellunge; in Helsingia ad Jerfsö, raro; in Dania ad Hafniam, D. D. *Fabricio* & *Stæger*. ♂ ad Sedinum 8 Jun. 1842, & ♀ ad Hamburgum Jul. 1838, a D. *Dahlbom* lecti).

Var. b. in Scania ad Lund, Abusa & Esperöd prope Stenshusvud, passim; Var. c. in Scania ad Silfåkra, & in Gotlandia ad Garde, rarias; Var. d. in Scania & Ostrogothia ad Wadstena raro.

♂♀. Pusilla, magnitudine tamen variat. Abdomen nigrum, nitidum, incisuris albis, speciem præcipue distinguit. — Pilosula. Caput glabrum. Antennæ nigræ, in medio plus

minus lutescentes. Thorax cinerascens, callo humerali eano, dorso vittis 3 nigris, media angusta subintegra, lateralibus latioribus, abbreviatis & subinterruptis. Abdomen nigrum, nitidum, segmentis: 2:do fere toto, lateribus saltem late; 3 & 4 margine apicali, albidis. Anus inflexus aterrimus, nitidus. Alæ hyalinæ, leviter fuscanæ, basi pallescentes. Nervi longitudinales 3 & 4 in ipso apice alæ plus minus coëunt. Segmentum costæ inter exitum nervi longit. 1 & 2 parum brevius illo inter exitum nervi long. 2 & 3. Squamæ parvæ & halteres, alba. Pedes ut in diagnosi variant. Tibiæ ex-tus albo-micantes.

8. *M. Sundewalli*: cinerea, thoracee lineis tribus nigris; capite flavo-albido, antennis luteis, basi apiceque nigris, fronte fulva, vertice obscuro; abdomine grisescente, opaco, vitta dorsali nigra, obsoleta; alis fuscanis, basi flavescentibus, nervis longitudinalibus 3 & 4 apice non coëntibus; pedibus lutescentibus, coxis tarsisque nigris. ♂♀ (Long. 2 fere 3 lin.).

*Myopa atra* Var.  $\beta$ . Fall. Conops. 12. 6. Sub. variatibus *M. atræ* Meig. Dipt. 4. 146. forte etiam latet.

Hab. in Sveciæ graminosis, locis aridis, etiam in floribus Compositarum ut Achilleæ, Chrysanthemi & Apargiæ autumnalis, obvia, 15 Jul.—10 Sept. passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Kjeflinge, Abusa, Silfåkra, Högestad &c.; in Smolandia; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Gusum &c., non raro; in Gotllandia ad Kjellunge, rarius. (Ex Austria a D. Andersch sine synonymia olim missa).

♂♀. Affinis priori, sed magnitudine plerumque duplo majore, anteonis in medio latius luteis, abdomine densius pilosulo, toto griseo-cinereo, nec nigro, aperte opaco, minime nitido, alis basi flavescentibus, nec albicantibus, nervis longitudinalibus 3 & 4 in apice nonnihil magis remotis, saltem num-

quam coēuntibus, ut & pedibus maxima ex parte luteis, vere & abunde distincta. Nec nisi similis eum simili ex utraque specie in copula juneta deprehenditur. Abdomen in ♂ cinereo-nigroque tessellatum, in ♀ cinereum, linea dorsali sub-interrupta obseura. Anus in utroque sexū ater. Alarum costae segmentum 2:dom 3:0 paullo brevius, quam in *M. atra*. Pedes lutei, coxis posterioribus, femoribus anterioribus superne, posticis apice, tibiis omnibus apice, tarsisque totis, nigris. Variat uterque sexus femoribus tibiisque fere totis luteis, femoribus vero intermediis in ♂ plerumque nigris. — Reliqua ut in priori. — Species celeberrimo D. Professori *Carolo Jac. Sundewall*, Holmiensi, amice dicata.

9. *M. distincta*: cinerea, thorace lineis quatuor nigris; capite flavo-albido, antennis nigris, intus macula fronteque luteis, vertice obscuro, abdomine grisecente, opaco, vitta dorsali nigra, obsoleta; alis fuscans, basi flavescentibus, nervis longitudinalibus 3 & 4 apice non coēuntibus; pedibus nigris, femoribus intermediis subtus, posticisque fere totis, lutescentibus. ♂♀. (Long. 2 fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 149. 14. ♂.

Hab. in Scania, 20 Aug.—10 Sept., rarius, scilicet ad Lund & in Pinetis ad Lackalänga 4 mares & 1 femina invenimus amicus *Dahlbom* & ipse. (E Glogavia a D. Zeller sub nomine: "M. distincta Meig." quoque communicata).

♂♀. Simillima *M. Sundewalli*, sed antennis paullo obscurioribus, femoribus anticis fere totis, intermediis superne, posticisque apice, nigris, ut & lineis thoracis nigris 4, nec 3, certe distincta. — Haustellum longissimum, nigrum. Thorax cinerens, lineis 4 nigris, quarum 2 intermediis subapproximatis, angustis, & 2 lateralibus paullo latioribus, minus perspicuis. Alae hyalinæ, leviter fuscans, basi & nervo auxiliari ferrugineo-flavis. Pedes nigri, femoribus interme-

diis subtus, postieis totis, tibiarumque omnium basi, rufo-flavis. Cetera ut in praecedente. Variat ♂ femoribus intermediis fere totis, postieisque apice piceo-nigris.

---

## 99. STACHYNIA Macq.

*Corpus* minoris magnitudinis, ovatum, puberulum. *Caput* vesiculosum, nudum, occipite pubescente. *Antennæ* capite breviores, articulo 1:mo brevissimo, subcylindrico, parum pilosulo; 2:do cyathiformi pubescente 3:tioque ovato nudo, subæque longis, hoc in medio stylo dorsali brevi nudo. *Haustellum* ut in *Myopa*. *Oculi* parvi, rotundati, nudi, in utroque sexu æque & modice remoti. *Ocelli* 3. *Palpi* parvi, pilosuli. *Abdomen* segmentis 6, 2:do sequente non longiore; ovatum, depresso, subcurvum. *Alarum nervi* fere ut in *Myopa dorsali* ♂ *variegata* directi, scilicet segmentum costæ 2:dum, duplo fere brevius, quam 3:tium; nervi longitudinales 3 & 4 in apice alie paullo remotim excurrent; area vero angularis nulla. *Halteres* nudi. *Squamæ* parvæ. *Pedes* simplices, pubescentes, femoribus validis, tarsorum unctionibus pulvillisque mediocribus 1. minusculis. *Color* varius, pictura maculata. *Motus* ——. *Habitatio* ——. *Differentia sexus*; alter sexus (*femineus*?); ano inflexo, aculeo corneo lato, compresso, arenato nitido terminato; alter (*maesculus*?); annu illexo, tuberculato, tuberculo rotundo stylis 2 filiformibus puberculis terminato.

1. *S. punctata*: nigra, capite, callis humeralibus, scutelli apice, abdome pedibusque, flavis; antennis, abdominis fascia basali maculisque trifariam dispositis, tarsisque, atris. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{3}{4}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 37. 1. *Myopa* Fabr. Antl. 181. 9. Meig. Dipt. 4. 151. 18. *Myopa virens* Meig. Class. 1. 289. 11. Latr. Gen. 4. 338. Fall. Conops. 13. 8.

Hab. in Suecia rarissime, testantibus D. D. *Gyllenhal*, qui specimina utriusque sexus ut incolas Sueciæ misit, & Prof. *Wahlberg*, qui in Ölandia eam invenerit; mibi in Scandinavia numquam obvia. (E Glogavia a D. *Zeller*).

$\delta\varphi$ . *Musca domestica* plerumque minor. Caput pallide flavum, fronte saturatiore, genis albo-micantibus. Antennæ, macula stemmatum in vertice, occiput haustellumque, atra. Thorax niger, nitidus, dorso sat dense griseo-pubescentes, callis humeralibus, macula pleuralrum & alia utrinque juxta sentellum, citrinis. Scutelli apex late citrinus, nigro-pilosus. Abdomen flavum (in viva forte virescenti flavum), pallide pubescens, fascia basali lata, punetisque triplici serie dispositis, atris. Puneta hæc in serie media plerumque elongata, numero 2 aut 3; lateralia vero 2 aut 3, rarissime 4, subtrigona plerumque discreta, raro cohærentia. Aculeus analis in  $\varphi$  niger; tuberculum auale in  $\delta$  piecum, filis fusca. In  $\delta$  etiam, ni fallor, e sterno postice exit aculeus rectus niger, qui sub ventris basi occultatur. Alæ hyalinæ, parum fuscanæ, radiee flava. Area discoidalis 1:ma nonnihil ante apicem alæ terminatur, ibique modice aperta. Pedes citrini, parce nigro-pubescentes, coxis nitidis basi, tarsisque totis, atris, pulvillis pallidis. Metatarsus posticus articulo sequente vix duplo longior.

*Obs.* Individua ano aculeato feminea, & filato mascula esse forte jure putat D. *Meigen*. D. D. *Robineau* & *Macquart* vero contrariam fovent sententiam, cui, ob analogiam cum *Pipunculinorum* apparatu genitalium, in  $\delta$  rotundato inserui, in  $\varphi$  aculeato, accedere non possum.

2. *S. marginella*: nigra, epistomate tibiisque sordide albidis; puncto humerali abdoninisque segmentis 2 & 3 margine apicali, flavis; ano macula rufa.  $\delta$ . (Long. sere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime; in museo meo ut Scaniæ

incola annotata exstat, ante plures annos ab alio Collectore inventa, loco specialiori non indicato.

♂. Specimen bene conservatum. Affinis & similis *Myopæ marginatæ* Meig., sed magnitudine nonnihil minore, abdominis incisuris tantum 2 & 3, nec 2, 3 & 4, flavis, ut & femoribus nigris, nec flavis, certe distincta. Nigra, nitida. Epistoma sordide album. Frons parum prominens, nigra, opaca. Antennæ & haustellum atra. Thorax dorso-griseo- & scutellum nigro-pubescentia. Abdomen vix incurvum, supra planum, subtiliter punctulatum, præsertim lateribus cinereo-pilosulum, segmentis 2 & 3 apice linea transversa flava, non usque ad marginem lateralem extensa. In medio segmenti 5:ti macula rotunda rufa. Venter flavus. Alæ fusco-hyalinæ, radice subpallescente. Nervi ut in priori directi, sed 3 & 4 longitudinales in summo apice, nec paullo ante apicem, excurrunt. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes piceo-nigri, geniculis summis tibiisque (præsertim anticis) flavo-albidis, his in medio infuscatis. Tarsi tenues, nigri. Femora subtus cinereo-pilosula.

---

## 100. NEPHROCERUS Zett.

*Corpus* mediæ magnitudinis, elongatum, angustum, glabriulum, nitidum. *Caput* hemisphericum. *Oculi* magni, approximati, nudi immaculati, postice ad latera excisi. *Antennæ* capite multo breviores, articulo 1:mo brevissimo, transverso, nudo; 2:do etiam brevissimo, piloso; 3:to magno, reniformi, compresso, nudo, basi seta dorsali nuda, apice capillari. *Frons* & *epistoma* minime prominentia; hoc angustum, lineare. *Proboscis* magna subretracta. *Ocelli* in vertice 3. *Thorax* callo humerali vesiculoso. *Scutellum* inflatum. *Abdomen* 6-annulatum, thorace duplo & ultra longius, angustatum, lineare. *Anus* inflexus. *Alæ* ab domine longiores, hyalinæ. *Nervi* ut in *Myopa dorsali* & *variegata* directi, sed area angularis longior, & nervulus infra aream apic-

calem (1:mam a costa, seu 3:tiā a basi marginis interiores) excurrit. Area seilicet angularis elongata, hinc nervulus infra angulum apicalem brevis. Nervi longitud. 3 & 4 in apice alae approximati, non veri coēunt. Inter eurvataram nervi long. 4:ti & apicem excurrit nervulus appendiceus. Segmentum costae 3:tium \*) dimidium brevius segmento 4:to. Squamæ vix ullæ. Halteres subelongati, nudi. Pedes simplices, tenues, inermes. Metatarsi longissimi, longitudine seilicet reliquorum articulorum simul sumtorum & articulo sequente duplo longiores. *Color* niger, pietura flava. *Motus* fere *Pipunculi*, nempe aut volatus brevis, aut reptatus in foliis. *Habitatio* in foliis plantarum. *Differentia sexus*; *mas*: oculis in frontis postico arcte eohærentibus, ano rotundato, genitale dextrorsum flexo; *femina*: oculis in frontis postico rima angustissima disjunctis, ano obtuso, vagina aculeata inflexa. *Habitus* fere *Bacchæ* & *Asciæ*, sed abdomen basi non coaretatum.

1. *N. lapponicus*: ater nitidus; epistomate argenteo; antennis fusco-nigris; proboscide, callis humeralibus, thoracis limbo laterali, scutello, abdominis fasciis subbinis interruptis, halteribus pedibusque, flavis. ♂♀. (Long.  $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

\*) Propter brevitatem terminos quoad nervorum in aliis directionem sequentes, quos Cel. Stenhammar fixit & in descriptione *Ephydriuarum* apte usurpavit, libens adoptavi; scilicet: *segmentum costae 1:mum* dicitur longitudo nervi costalis inter basin alae & exitum nervi auxiliaris in costam; *2:dum*: longitudo ejusdem nervi inter exitum nervorum auxiliaris & longitudinalis primi; *3:tium*: longitudo nervi costalis inter exitum nervorum longitudinalium primi & secundi; & *4:tum*: longitudo nervi costalis inter exitum nervorum longitudinalium secundi & tertii, hic aut ante apicem, aut in apice, aut pone apicem in variis Familiis terminetur. — Quando nullus nervus auxiliaris adest, *segmentum 1:mum costae* a basi alae ad apicem nervi longitudinalis; & sic porro.

Var. a. ♂♀. abdominis segmentis 2 & 3 fascia apicali late interrupta, flava.

Zett. Ins. Lapp. 578. 1. ♀.

Var. b. ♀. abdominis segmento 2:do apice macula utrinque flava.

Zett. l. c. var. b.

Hab. in foliis Pini Abietis & Betulæ albæ, per Sveciam borealem & Lapponiam, 22 Jun.—21 Jul., rarius; scilicet in Jemtlandia ad radicem alp. Åreskutan 1810 utrumque sexum, & in Lapponia Umensi 1832 ad novaculum Gransele atque ad pagum Wilhelmina 3 feminas, inveni.

♂♀. Affinis *Pipunc. aucto*, sed magnitudine multo majore, pictura alia, & essentialiter callis humeralibus vesiculosis, proboscide majore, subexserta, antennarumque forma, longe diversa. Valde similis etiam videtur *Pipunc. scutellato* Macq. Buff. 2. 9. 1. & Meig. Dipt. 7. 147. 19; sed praeter antennas reniformes, nec ovatas, & proboscidem majorem, differt quoque antennarum articulo 2:do fusco, nec fulvo, & abdомине in medio flavo-maculato, nec toto nigro. — Lævis, nitidus, ater. Caput argenteum, certo situ nigro-micans, glabrum, occipite pubescente. Antennæ fusco-nigræ, articulo 2:do fusco-testaceo. Seta atra. Frons supra antenas longe triangularis. Proboscis magna, subexserta, flava. Oculi magni, ferruginei, unicolores. Thorax ad latera pallide flavus, setis paucis nigris. Calli humerales vesiculosi, pallide flavi. Pleuræ flavo-cinerascentes. Scutellum flavidum, margine apicali setis aliquot nigris. Abdominis parce pilosi segmentum 2:dum, aut 2:dum & 3:tum margine apicis fascia plus minus interrupta, relicta interdum tantum macula laterali flava. In segmento 1:mo saepe etiam utrinque punctum flavidum. Anus maris rotundatus, inflexus, nigricans, apice hians, margine & genitale parum exerto, flavis; feminæ vagina inflexa, cornea, ferruginea, basi latior, subdepressa, apice acuta. Venter præsertim basi fla-

vo-lineatus. Alæ parum fuscanae, radice flava. Nervi long. 4:ti nervus appendiceus non ad marginem extensus. Squamula & halteres, flava. Pedes flavi, brevissime puberuli, coxis basi, et saepe tarsorum articulo ultimo, fuscis.

2. *N. flavigornis*: ater, nitidus; epistomate argenteo; antennis totis flavo-fulvis; proboscide, callis humeralibus, thoracis limbo laterali, abdominis fasciis binis ad latera dilatatis, halteribus pedibusque, flavis. ♀. (Long. 3 lin.)

Hab. in Svecia meridionali rarissime; in Qveretis ad diversorium Röslånga Scaniæ specimen descriptum a Cel. D. *Dahlbom* 18 Jul. 1839 detectum.

♀. Simillimus praecedenti, sed antennis totis flavo-fulvis, seta tantum nigra, basi flava, abdominis segmentis 2 & 3 fascia apicali angusta, ad latera triangulariter dilatata, rufo-flava, 4 & 5 margine apicali anguste cinereo, ut & pedibus totis cum coxis pallide flavis, his albomicantibus, certe distincta. Loco natali quoque differunt. Reliqua ut in priori.

---

## 101. PIPUNCULUS Latr.

*Corpus* parvum aut minutum, subcylindricum, puberulum, saepe opacum. *Caput* hemispherium. *Oculi* ut in *Nephrocero*, sed postice haud excisi. *Antennæ* capite multo breviores, articulo 1:mo exiguo, nudo; 2:do etiam minuto, cyathiformi, pilosulo; 3:to deflexo, compresso, nudo, aut acuto, aut ovato, aut rotundato, basi seta dorsali erecta (in ♂), nuda, apice capillari. *Frons*, ocelli & epistoma ut in *Nephrocero*. *Proboscis* occulta, retraeta. *Thorax* callo humerali opaco, non vesiculoso. *Scutellum* opacum. *Abdomen* 6-annulatum, thorace nonnihil longius, subcylindricum. *Anus* inflexus. *Alæ* normaliter ut in *Nephrocero*, sed nervulus appendiceus nervi long. 4:ti non nisi in *P. aucto* adest. *Raro* nervuli

transversi desunt; hinc areæ discoidales in speciebus ultimis nullæ. Squamæ vix ullæ. Halteres nudi. Pedes simplices, validiusculi, subglabri, inermes. Metatarsi elongati; reliqui articuli breves, subæque longi. *Color* niger. *Motus*: volatus continuus, placidus, velificans, aut reptatus in foliis. *Habitatio* in sæpibus vivis, graminosis & foliis planitarum. *Differentia sexus*; *mas*: oculis in fronte fere per totam longitudinem cohærentibus, ano rotundato, genitale dextrorsum flexo; *femina*: oculis in fronte per rimam æquilateriter angustam disjunctis, ano obtuso, cauda inflexa, aculeo elongato, terminata. Typus generis *P. Pratorum*.

*Sect. 1.* Areæ alarum discoidales tres. *Pipunculi* proprii.

\*<sup>)</sup> nervulo appendiceo pone curvaturam nervi longitudinalis 4:ti abbreviato.

1. *P. auctus*: ater holosericeus ( $\delta$ ), aut niger ( $\varphi$ ), abdome maculis lateralibus cinereis; pedibus nigris, geniculis pallidis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 23. 10.  $\delta$ . & 6. 358.  $\varphi$ . Macq. Buff. 2. 9. 1.  $\delta\varphi$ . — *Cephalops* Fall. Syrphici 61. 2.  $\delta\varphi$ .

Hab. in graminosis, libenter locis uliginosis, per prata Sveciæ meridionalis & mediæ, 4 Jul.—3 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Räften prope Lund, D. *Dahlbom*, & ad Esperöd, uterque sexus; in Ostrogothia ad Gusum & Lärketorp, rarius; in Gotlandia ad Kjellunge, rarissime; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*.

$\delta\varphi$ . Qvoad nervorum directionem in alis eum *Nephrocero* omnino convenit, præter quod in *P. aucto*, nervuli: transversus posticus paullo longius a margine remotus, & appendiculus nervi long. 4:ti nonnihil brevior sint. Cum *Pipunculus* reliquis vero cetera omnia quadrant. Epistoma & frons supra antennas, argentea. Antennæ nigræ, ovatæ, superne albomicantes. Oculi ferruginei. Thorax & scutellum, atra &

atro-pubescentia ( $\delta$ ), aut cinerascenti nigra, subnuda ( $\varphi$ ), setulis lateralibus paucis. Abdomen atrum, holosericeum, pilosum, maculis lateralibus cinerascentibus ( $\delta$ ), aut nigrum opacum, subpubescens, segmentorum margine apicali anguste, lateralii latius, cano ( $\varphi$ ). Anus obtusus ( $\delta$ ), aut aculeo longe arenatim inflexo, basi crasso nigro, apice subulato ferrugineo ( $\varphi$ ). Alæ hyalinæ, stigmate leviter fusco. Squamulæ albæ. Halteres albidi, clava fusca ( $\delta$ ), aut testacea ( $\varphi$ ). Pedes nigricantes, geniculis pallidis. Pulvilli albi, in  $\varphi$  majores. Pleuræ in  $\varphi$  canæ. Tarsi in  $\varphi$  sæpe pallescunt.

\*\*) nervulo appendiceo pone curvaturam nervi longit. 4:ti nullo.

a.) corpore glabro.

2. *P. Pratorum*: fusco-nigricans, opacus, antennis ovatis, fuscis; abdome nitido, atro, 1:mo segmento fascia, reliquisque macula laterali, cinereis; alis hyalinis, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo; halteribus pedibusque flavo-testaceis, femoribus in medio latissime nigris.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{4}$  fere 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 22. 7? Macq. Buff. 2. 11. 7. Zett. Ins. Lapp. 579. 1.  $\delta\varphi$ . *Cephalops* Fall. Syrph. 15. 1. var. (sub quo plures species latent.)

Hab. in gramine hortorum & pratorum ut & soliis Populi Tremulæ, Coryli &c., per Sueciam totam usque ad Lapponiam, 16 Jun.—8 Sept., ubique vulgatissimus, copulatus in aëre, choreas dicens multoties captus; scilicet in Scania, Smolandia, Ostrogothia, Ölandia, Gotländia & Nericia, frequentissimus; deinde rarescit & in Gestria atque paroecia Undersåker Jemtlandiæ parce lectus; in Norvegia ad Thynæs & Levanger iterum frequens; in Dania, D. *Stæger*.

$\delta\varnothing$ . Inter majores generis. Nigricans. Antennæ fuscæ, argenteo-nicantes, basi atræ. Caput nigrum, occipite cinereo, epistomate & fronte supra antennas argenteo-nicantibus. Thorax supra fuscus, opacus, limbo cinereo. Pleuræ cinereæ, scutellum nigrofuscum. Metathorax canus. Alæ hyalinæ, certo situ metallice nitentes, stigmate fusco. Segmentum costæ 2:dum & 3:tium (cfr. nota sub *Nephrocero*) fere æque longa. Nervulus transversus medius apici auxiliaris oppositus. Pedes testacei, coxis femorum medio late, tibiarum fascia media, tarsorumque apiee, nigricantibus. Femora uno latere subpubescentia. Tibiæ antice sæpe totæ testaceæ. Cauda in  $\varnothing$  inflexa atra, aculeo ferrugineo.

*Obs.* Individua, quæ sub nomine: "*Pip. campestris* Meig." e Danis obtinui, a nostro *P. Pratorum* haud differunt.

3. *P. campestris*: ciuereo-nigricans, opacus, anten-  
nis ovalis, nigris; abdome nitido, atro, 1:mo segmento  
fascia, reliquisque macula laterali, cinereis; alis hyalinis.  
nervo long. 4:to inter transversum & apicem subrecto;  
halteribus testaceis; pedibus nigris, trochanteribus, genu-  
bus tibiarumque basi, flavis.  $\delta\varnothing$ . (Long. fere 2 lin.).

Latr. Gen. 4. 332. Panz. Fn. Germ. 108. 17.  $\delta$ . Meig.  
Dipt. 4. 19. 1. Macq. Buff. 2. 10. 3.  $\delta\varnothing$ .

Hab. in Suecia rarius, 29 Jun.—21 Jul. mihi obvius;  
nempe in Scania ad Esperöd parœciæ Mellby 1816, &  
in insula Furillen Gotlandiæ 1841, pauca specimina inveni.

$\delta\varnothing$ . Magnitudo & summa similitudo præcedentis, sed alarum  
nervo longitudinali 4:to inter transversum & apicem magis  
recto, & pedibus fere totis nigris, trochanteribus, genubus  
tibiarumque basi tantum albo-flavis. Epistoma & frons,  
argentea. Antennarum articulus ultimus acutus, albo-mi-  
cans. Pleuræ cinereæ. Alæ radice albida. Palvilli & ungues,  
magna, alba, hi apice nigri. Thoracis dorsum in  $\delta$  obscure ci-  
nerascens, brunneo-lineatum, in  $\varnothing$  cinereum. Reliqua ut in

priori. — Ova hujus speciei a D. Prof. Löw in Horis Entom. Posnaniæ 1841. 1. fasc. 2. Tab. 4. f. 15. depicta sunt.

4. *P. ater*: fusco-nigricans; opacus, antennis ovatis, nigris; epistomate fronteque obscuris (♂), aut cinereis (♀); abdomine atro, nitido, aut segmentis basi opacis (♂), aut segmentis 1 & 2 fere totis, reliquisque puncto lateralī, canis (♀); alis subfuscānis, nervo long. 4:to inter transversum & apieem subflexo; halteribus līvidis (♂), aut flavis (♀); pedibus nigris, geniculis summis tibiarumque basi, flavidis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 23. 9. ♂. *Pip. dispar* Zett. Ins. Lapp. 579. 3. ♂♀.

Hab. in graminosis pratorum humidorum 21 Jun. & Aug.; rar.; scilicet in Scania semel lectus; in Lapponia Umensi ad Lycksele in copula captus; e Dania a D. Staeger missus; in Norvegia ad Björkvik Nordlandiæ rarissime.

♂♀. *P. Pratorum* similis, sed differt: magnitudine minore, epistomate fronteque angustioribus, obscurioribus; plenis obscuris; abdomine atro, aut in ♂ immaculato, lateribus tantum fusco, fere toto opaco, segmentorum 2, 3, 4 margine summo reliquisque totis nitidis; aut in ♀ segmentis 1 & 2 fere totis, reliquisque puncto lateralī, canis; alis subfuscānis, halteribus fusco-flavis (♂); & pedibus fusco-nigris, femoribus summo apice tibiarumque basi rufescētibus. Tarsi in ♀ basi flavi. Scutellum nitidum (♂♀). Femora postica subtus versus apicem brevissime spinulosā. — *P. spinipes* Meig. Dipt. 6. 359. 14 & ejusdem *P. dentipes* 7. 146. 15. forte etiam hoc pertinent.

5. *P. fuscipes*: nigro-fuscus, opacus; antennis ovatis, acuminatis, fuscis; epistomate fronteque argenteomicantibus; pleuris, metathorace abdominalisque maculis lateralibus, cinerascentibus; alis hyalinis, nervo long.

4:to inter transversum & apicem subrecto, stigmate integro, fusco; halteribus pedibusque nigricantibus, geniculis, tibiis basi metatarsisque, ruso-flavis. ♂♀. (Long. circiter 1 lin.).

Stæg. in litt. 24 Oct. 1842. ♂♀. *Cephal. pratorum*  
Fall. Syrph. 15. 1. var. minor.

Hab. in Scandinavia mense Julio & Aug. passim; in copuli; scilicet in Scania ad Silfakra & Röstånga, rarius; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Wadstena & Godegård, ipse; in Gotlandia ad Wamblingbo; e Dania a D. *Staeger* communicatus. (Ex Helvetia a D. *Konevka* Berolinensi sine synonymia missus).

♂♀. Parvus. Totus fuscus, opacus. Epistoma & frons, argentea. Antennæ fuscæ, acuminatæ, extus albo-nicantes. Pleuræ, metathorax & abdominis maculæ laterales, obscure cinerea. Anus vix nitidus. Alæ subfuscæ. Nervulus transversus medius brevissimus apici auxiliaris præcise oppositus. Linea stigmatalis obscura totum interstitium (segmentum costæ 2:dum) inter apice nervorum auxiliaris & longitudinalis 1:mi ad costam implet. Halteres nigri, petiolo pallido (♂), aut testacei (♀). Pedes nigricantes, geniculis summis, tibiarum basi anguste, metatarsisque, flavidis. Variat tarsis anticis fere totis fuscis; variat etiam tarsis posticis totis flavidis, articulo ultimo nigro. — Femina rarissime mihi obvia. — A *P. geniculato* stigmate distincto, & a *P. rurali* corpore opaco, hæc species præcipue dignoscitur. — In illæsis speciminibus maculæ laterales cinereæ in abdominis dorsum altius assurgunt, licet ibi sensim angustiores.

6. *P. unicolor*: nigro-fuscus, opacus; antennis ovatis, acuminatis, fuscis; epistomate fronteque cinereo-nicantibus; pleuris metathoraceque obscure cinerascentibus; alis subhyalinis, nervo long. 4:to inter transversum

& apicem subrecto, stigmate integro, fusco; halteribus pedibusque nigris, geniculis summis rufescentibus. ♂. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Gotlandia rarissime, ad Gothem 18 Jul. 1841 semel inventus.

♂. Similis priori, sed magnitudine nonnihil majore, abdomine nigro-fusco absque maculis lateralibus cinereis, halteribus pedibusque totis nigris, tantum geniculis summis levissime rufis, differt.

7. *P. fusculus*: nigro-fuscus, opacus; antennis ovatis, acuminatis, nigris; epistomate fronteque argenteo-micantibus; pleuris, metathorace abdominisque lateribus, cineraceousentibus; alis hyalinis, nervo long. 4:to inter transversum & apicem recto; stigmate dimidiatim, halteribusque, fuscis; pedibus nigricantibus. ♂♀. (Long.  $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime; in Ostrogothia: ad Gusum ♀ a Cel. Prof. *Wahlberg* detecta, mibique amicissime communicata; ad Lärketorp uterque sexus 21 Aug. a me lectus.

♂♀. Similis *P. fuscipedi* (5), sed magnitudine minore, abdominis maculis lateralibus haud determinatis, nervulo transverso medio paullo pone apicem nervi auxiliaris sito, nigredine stigmatis non totum interstitium sed tantum dimidium implente, & pedibus totis nigricantibus, tarsis fuscis, ut & geniculis summis tantum puncto pallido, distinctus. Abdomen breviusculum, ovale, fere totum cinereum, segmentorum basi obscura; cauda ♀ inflexa atra, aculeo ferrugineo.

8. *P. geniculatus*: niger, nitidus; antennis acuminatis, apice albis; fronte supra antennas epistomateque argenteo-micantibus; pleuris, metathorace abdominisque 1:mo segmento, cinereis; alis hyalinis, stigmate nullo,

nervis longitudinalibus: 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; pedibus nigris, geniculis halteribusque albidis. ♂. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. I. 20. 2. ♂. Macq. Buff. 2. 10. 4. Zett. Ins. Lapp. 579. 4. ♂. (exclus. ♀).

Hab. in pratis Scandinaviæ, 24 Jun.—18 Jul., rarius; scilicet in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Gothem &c., passim; in Lapponia Umensi ad Lycksele, rar.; in Dania, D. *Staeger*.

♂. Corpus proportione parvitatis elongatum, nigrum, nitidum, levissime cinereo-pollinosum, antennarum apex longe acuminatus, albus, oculi (in ♂) non cohærentes, nervorum directio, halteres albi, & pedes præter genicula summa albida nigri, sunt notæ, quæ speciem distingvunt.—Epistoma argenteum. Frons epistomate parum angustior, nigra, supra antennas cana. Thoracis dorsum disco fusco, opaco. Scutellum nigrum, nitidum. Abdomen elongatum, angustum, cylindricum, nigrum, subtus & segmento basali supra cinereum. Genitale ventri inflexum, rufum. Alæ hyalinæ stigmate nullo. Area angularis angulo acutissimo fere ad marginem extensa. Segmentum costæ 1:mum (confer. nota sub *Nephrocero*) elongatum, ejus apici opponitur nervulus transversus medius minutus; 2:dm̄ seu stigmatische brevissimum, immaculatum; 3:tium antecedente fere triplo longius; 4:tum longitudine 3:ii. Halteres albidi. Pedes nigri, geniculis anguste, & pulvillis, albis.

9. *P. sylvaticus*: ænescenti niger, nitidus; antennis acuminatis, apice albis; fronte supra antennas epistomateque argenteo-micantibus; metathorace abdominisque 1:mi segmenti margine, cinereis; alis hyalinis, stigmate nullo, nervo long. 1:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do breviusculo ejusque apici nervulo transverso

medio opposito; pedibus nigris, geniculis anguste, tarsorum basi late, halteribusque, albidis. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 20. 3. Macq. Buff. 2. 10. 5. Zett. Ins. Lapp. 579. 5. ♂♀.

Hab. in graminosis sylvaticis, etiam in Pinetis, 18 Jun.—Jul.—22 Aug., per Scandinaviam, passim; scilicet in Scania rarissime; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Oelandia, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Ejsta; in Medelpadia ad Kjällsta, D. *Dahlbom*; in Jemtlandia usque ad radicem alpium Åreskutan & Mullsjellen; in Lapponiis Umensi ad Lycksele & Tornensi ad Kengis; in Norvegia a Thynäs & Levanger usque ad Tromsö Nordlandiae & Bossekop Finmarkiae prope NordCap, rarius; in Dania, D. *Staeger*.

♂♀. Similis priori, sed oculis in fronte ♂ cohærentibus, abdome in utroque sexu ænescenti nitido, minime cinereo-pollinoso, segmento primo tantum margine apicali interrupte cinereo, nec toto cinerascente, segmento costæ 3:ti antecedente paullo tantum, sed vix duplo longiori, 4:to longissimo, nervulo transverso medio apici nervi long. 1:mi, nec auxiliaris, opposito, tibiis basi nonnihil latus flavis, ut & tarsis fere totis, præter articulum ultimum fuseum, albidis, vere distinctus. Nervus transversus posticus paullo pone apicem nervi longitudinalis 2:di ductus. — Variat tarsis sordide flavis, articulo ultimo nigro.

10. *P. nigritulus*: ater, nitidus; antennis acuminatis, apice albis; fronte supra antenuas epistomateque argenteo-micantibus; metathorace toto, abdominisque 1:mi segmenti margine apicali anguste, canis; alis hyalinis, stigmate nullo, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do breviusculo ejusque apici nervulo

transverso medio opposito; pedibus nigris, geniculis, thoracis puncto humerali halteribusque, albidis. ♂♀. (Long. 1 lin.).

Hab. in pratis Sueciæ, 21—28 Aug., rarius; scilicet in Scania ad Silfakra a D. *Dahlbom*, & in Ostrogothia ad Wadstena a me, lectus.

♂♀. Duobus proxime præcedentibus valde similis, sed a *P. geniculato* oculis in ♂ cohærentibus & alarum nervorum directione in utroque sexu, & a *P. sylvatico* pedum colore obseuriore, præcipue differt. Pedes omnino ut in *geniculato* colorati, alarum nervi præcise ut in *sylvatico* directi. Thorax puncto humerali albo. Abdomen vix ænescens. ♂: thoracis diseo dorsali fusco, opaco.

11. *P. albatarsis*: niger, nitidus; antennis acuminatis, apice albidis; fronte supra antenas epistomateque argenteo-micantibus; pleuris, metathorace abdominisque 1:ni segmenti margine, cinereis; alis hyalinis, stigmate nullo, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; pedibus nigris, geniculis, tarsorum basi late, halteribusque totis, albidis. ♂. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Suecia boreali rarissime; in Medelpadia ad diversorium Kjällsta 18 Jun. 1840 specimen unicum inventum.

♂. Simillimus *P. geniculato*, sed oculis (♂) cohærentibus, tibiis basi latius, tarsorumque articulis 3 primis, albidis, ut & area angulari longiori usque ad marginem extensa, differt. Nervi præterea ut in *geniculato* directi. A *P. sylvatico*, cui etiam similis, directione nervorum distinguitur. Thoracis dorsum fuseum, opacum. Venter basi cinereus.

12. *P. rufipes*: niger, nitidus, thoracis dorso fusco, opaco; fronte angustissima atra, antice supra antennas epistomateque argenteis; alis hyalinis, stigmate nullo, nervo long. 4:lo inter transversum & apicem recto, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; halteribus pedibusque rufo-flavis, coxis, femoribus pone medium tarsorumque apice, nigris. ♂. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 21. 4. ♂. Macq. Buff. 2. 10. 6. ♂.

Hab. in Scandinavia rarius, in Scania ad Lund 25 Maj. duo specimina inveni; ad Holmiam a D. *Wahlberg* capitus; in Dania mense Jun. a D. *Staeger* lectus.

♂. Epistoma modice latum, argenteum. Antennæ basi nigræ, apiee in nostris individuis mutilatæ. Rima frontalis angustissima, atra, anterius sensim nonnihil latior, argentea. Thorax niger, disco dorsali fusco, opaco. Scutellum nigrum. Metathorax cinerascens. Abdomen elongatum, subeylindricum, nigrum, nitidum, 1:mo segmento cinerascente, ultimo (anali) rotundato, piceo. Venter griseus. Alarum segmentum costæ 1:mum elongatum; 2:dum brevissimum; 3:tum antecedente duplo & ultra longius; 4:tum 3:tio paullo longius. Area angularis fere ad marginem descendit. Pedes fulvi, coxis, femoribus paullo pone medium tarsorumque articulis 2. 1. 3 ultinis, nigricantibus. Nervus transversus posticus apici nervi longit. 2:di oppositus.

*Obs.* Ni valde fallor, ambo specimina, a me capta, mascula sunt, licet simul deprehensa, & in copula juncta mentientia. Genitale inflexum, ventri arete applicatum, rufum, in utroque individuo simile videtur, & sine dubio masculum prodit; nec aculeum indagare possum.

13. *P. haemorrhoidalis*: niger, nitidus; antennis acuminatis, apice albis; fronte angusta atra, antice supra antennas epistomateque argenteis; alis hyalinis, stigmate

nullo, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; pedibus nigris, genibus, tibiarum tarsorumque apice, halteribusque, albo-flavis; cauda ♀ ferruginea. ♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 580. 6. ♀.

Hab. in Scandinavia boreali 2 Jul.—2 Aug., rarius; scilicet in Lapponia Suecica Umensi ad Lycksele & in alpe Brattiksfjell, 1832; in Norvegia ad Thynæs & Levanger, 1840.

♀. Valde similis priori, & forte ejus femina; sed differt thorace nigro, nitido, fronte nonnihil latiore, nervo longitudinali 4:to versus apicem subinflexo, nec recto, genibus tarsorumque basi albidis, nec rufis, tibiarum apice nigro, ut & cauda inflexa ferruginea. Antennæ nigrae, articuli ultimi apice acuminato, albido. Abdomen angustum, cylindricum, elongatum, nigrum, segmenti 1:mi margine anguste cinereo, cauda inflexa tota ferruginea, aculeo obscuro, summo apice pallido. Venter basi cinerascens. Alarium nervi subpallidi, basi albi; longitudinales 3 & 4 in apice fere coëntes. Pedes haud validi, nudi, nigri, genubus, tibiarum basi, tarsorumque articulis 1, 2, 3, albidis. Tibiae posticæ albidæ, fascia media fusca.

11. *P. fulvipes*: niger, nitidus; antennis nigris, articulo ultimo longe acuminato, albo; fronte epistomateque argenteis; alis hyalinis, stigmate nullo, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; halteribus pedibusque rufo-flavis; abdominis medio in ♂ macula laterali flava. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{3}$  fere 1 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: oculis in fronte cohærentibus; abdomine toto nigro;

*Fem*: oculis in fronte anguste remotis; abdominis segmentis 2:do & 3:tio lateribus flavis; in copula.

Var. a. ♂♀. pedibus rufo-flavis, coxis fere totis, femoribusque basi annulo angusto, nigris.

Maeq. Buff. 2. 11. 9. ♂. Meig. Dipt. 7. 147. 18. ♂. *P. lateralis* Maeq. Buff. 2. 11. 8. ♀. Meig. Dipt. 7. 147. 17. ♀. *P. annulipes* Zett. Ins. Lapp. 508. 7. (specimen feminineum Botniense).

Var. b. ♀. pedibus totis flavis, coxis basi fuscocinereis.

Hab. in graminosis & foliis fruticum Scandinaviæ, 6 Aug.—2 Sept., minus frequens; scilicet var. a. in Scania rarius; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum a D. *Wahlberg* in copula captus; in silva Fylla prope Wadstena, D. *Dahlbom*; in Botnia boreali ad Johannis Ro, rarissime; in Dania, D. *Staeger*; e varietate b. specimen tantum unicum 15 Aug. ad Abusa Seanicæ deprehendi.

♂♀. Similis & affinis priori, sed magnitudine nonnulli major, antennarum articulo ultimo paullo magis acuminato, toto albo (seta nigra), ut & pedum colore, mox differt. Aliae quoque omnino ut in praecedente. Abdomen eum ano introque sexu externe fere simile; aculeus feminæ ventri arete applicatus ægre discernitur.

*Obs.* Specimen masculum forte hujus speciei, magnitudine solito paullo minore, abdominis segmentis 3 & 4 lateribus leviter flavo-maculatis, oculis in fronte arctissime cohærentibus, e Smolandia 1834 mecum communicavit Cel. *Bohemian*, sed cum illud ad manum mihi diutius non est, hanc tantum observationem ex annotationibus meis afferre potui.

15. *P. flavipes*: niger, nitidus; antennis ovatis, fuscis; fronte epistomateque argenteo-micantibus; metathorace abdominalisque segmenti 1:mi margine, cinereis; alis hyalinis, stigmate fusco, nervo long. 4:to intertransversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo trans-

verso medio apici auxiliaris opposito; halteribus pedibusque flavis. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

**Mas.**: oculis in fronte cohaerentibus; abdomine nigro, nitidissimo, segmento 1:mo fascia cinerea;

**Fem.**: oculis in fronte modice remotis; abdomine subbreviore, nigro, subnitido, segmento 1:mo toto, reliquisque maculis lateralibus, cinereis; cauda inflexa, pieca, aculeo rufescente; in copula.

Var. a. ♂♀. pedibus totis flavis.

Meig. Dipt. 4. 21. 5. l. 33. f. 21. ♂. (sed nervus longit. 2:dus justo brevior, & area angularis nimis ad marginem retracta). — Macq. Buff. 2. 12. 13. ♂.

Var. b. ♂ (in copula cum ♀ var. a.), pedibus flavis, femoribus in medio superne macula fusca.

Hab. in Suecia rarissime; marem unicum ad Lärketorp Ostrogothiae, & utrumque sexum in copula junctum mens. Augusto ad Esperöd in parœcia Mellby Scaniæ semel, inveni.

♂♀. Antennis ovatis, pedibus flavis & stigmate fuscō, a proxime præcedentibus in primis dignoscitur. Antennæ basi obscuræ, articulo ultimo fuscō l. testaceo. Thoracis dorsum & scutellum in ♂ brunneo-nigra, in ♀ nigra; pleuræ in utroque sexu nigro-cinereæ. Abdomen in ♂ subænescenti nigrum, lucidum, 1:mo segmento margine cinereo; in ♀ paullo brevius, postice tantum nitidum, segmento 1:mo fere toto, reliquisque præsertim ad latera maena subtrigona, cinereis, ventre rufescente. Alæ cinereo-hyalinæ, certo situ iridicolores. Nervi longitudinales 3 & 4 in apice sat approximati. Segmentum costæ 2:dum seu stigmaticale dilute fuscum, & 3:tum æque longa; 4:tum seu ultimum duobus antecedentibus simul summis fere duplo longius. Pedes aut toti flavi, coxis basi fuscis, aut flavi, coxis, femorum annulo medio, tarsorumque apice, fuscis.

**16.** *P. varipes*: niger, nitidus; antennis ovatis, fuscis; fronte epistomateque argenteo-micantibus; metathorace abdominisque segmenti 1:mi margine, cinereis; alis hyalinis, stigmate fusco, nervo long. 1:to inter transversum & apicem subsfexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; halteribus pedibusque flavis, femoribus tibiisque fascia fusca. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

*Mas* & *Femina* ut in priori differunt; in copula.

Meig. Dipt. 4. 21. 6. ♂.

Hab. in Scandinavia, 24 Jun.—8 Jul., rarius; in copula bis deprehensus; scilicet in Scania ad Esperöd in parœcia Tranås; in Gotlandia ad Färdhem; in Norvegia ad Thynæs & Garnæs Værdaliiæ; in Dania, D. Staeger.

♂♀. Simillimus praecedenti, & vix nisi pedum pictura differt.

Antennæ nigrae, articulo ultimo l. obscuro, l. fuso l. denique testaceo. *Mas*: supra totus obscure æneus, nitidissimus, metathorace & abdominis 1:mo 2:doque segmentis margine, cinereis; *femina*: supra tota nigra, nitida, thoracis limbo anguste, metathorace, abdominis segmenti 1:mi reliquisque maculis lateralibus subtrigonis, cinereis. Alæ in utroque sexu ut in priori. Pedes flavi, coxis basi nigris, femoribus fascia plus minus lata, tibiisque annulo medio plus minus obsoleto, nigricantibus l. fuseis. Pulvilli & unges pallidi, hi apice nigri. Cauda ♀ inflexa atra, nitida, aculeo rufo.

**17.** *P. vittipes*: nigro-fuseus, nitidus; antennis ovatis, nigris, apice acuto albido; fronte epistomateque argenteis; abdome nigro, segmento 1:mo fere toto, reliquisque maculis lateralibus, cinereis; alis hyalinis, stigmate obscuro, nervo long. 1:to inter transversum & apicem subsfexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio

apici auxiliaris opposito; halteribus pedibusque flavis, coxis basi, femoribus superne vitta longitudinali, tarsorumque apice, nigro-fuscis. ♂♀. (Long. 1  $\frac{1}{2}$  lin.).

*Pip. annulipes* Zett. Ins. Lapp. 580. 7. (specimen lapponicum ad Stensele).

Hab. in Suecia boreali, 4—30 Jul., rarissime; scilicet in Jemtlandia ad radicem Mullsjellet utrumque sexum, & in Lapponia Umensi ad Stensele, unam seminam inveni.

♂♀. Simillimus iterum duobus proxime praecedentibus, sed thoracis disco dorsali olivaceo, stigmate paullo obscuriore & pedum pictura, distinctus. Antennæ parvæ nigræ, apice subacuto albo-micantes. Epistoma & frons angusta, argentea, vertice atro. Pleuræ & metathorax cinerea. Alæ ut in priori. Pedes flavi, coxis ad medium, femoribus superne a basi ultra medium vitta basi latiori, apice longe acuminata, tarsorumque articulo ultimo, fuso-nigris. Abdomen subcylindricum, nigrum, nitidum, in ♂ segmento 1:mo margine late, reliquisque macula lateralí inferne parva, cinereis; in ♀ segmento 1:mo fere totū; reliquisque macula lateralí, cinereis, cauda inflexa parva, nigra, aculeo recto ferrugineo. Thoracis limbus in ♀ cinereus.

18. *P. fascipes*: opacus, supra olivaceus; antennis acuminatis, fuscis, apice albis; fronte supra antennas epistomateque argenteis; pleuris, metathorace, abdominis 1:mi segmenti margine, reliquisque maculis lateralibus, cinerascentibus; alis hyalinis, stigmate fusco, nervo long. 4:to inter transversum & apicem subrecto, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; halteribus fuscis, coxis, femoribus in medio latisime, tarsorumque apice, nigris. ♂. (Long. 1—1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Ostrogothia rarissime; circa Wadstena mens. Julio 2 specimina capta.

♂. Simillimus *P. fuscipedis* (5) & *fuscus* (7); sed a posteriori magnitudine nonnihil majore, stigmate segmentum costæ 2:dnm totum implente, & ab utroque pedum trochanteribus, femoribus basi apiceque anguste, tibiis totis tarsorumque articulis 4 primis, flavis. Nervi: transversus posticus apici nervi longitudinalis 2:di præcise oppositus; reliqui omnino ut in *P. fuscipede* directi. Alterum individuum juvenile videtur, nam abdominis segmenta 1—4 basalia subrufescenti cinerea, & anus piceus deprehenduntur.

19. *P. ruralis*: nigro-fuscus, opacus (♂), aut niger, nitidus (♀); fronte epistomateque argenteis; pleuris abdominisque segmenti 1:mi margine, cinereis; alis hyalinis, stigmate halteribusque fuscis; pedibus fuscis, femoribus nigricantibus, genibus flavis. ♂♀. (Long. circiter 1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 22. 8. ♂♀. Macq. Buff. 2. 11. 10. ♂♀.

Hab. in Ostrogothia, teste D. *Wahlberg*; in Dania mens. Jun., D. *Staeger*; mihi in Scandinavia haud obvius.

♂♀. Species Meigeui gennina mihi non rite cognita, nisi inter specimina *P. fuscipedis* (n:o 5) occurrit & latet. Sed tamen in variis differre videntur hæ duæ species, ut ex comparatione pateat. Cum vero neque *Meigen*, neque *Macquart* de antennarum structura coloreque, nec de nervorum directione in alis, in hoc genere valde necessaria nota ad species dignoscendas, aliquid afferunt, dubium de identitate *fuscipedis* & *ruralis* semper manet. *Mas*: abdome nigro-fusco, opaco, ano nitido, nigro; & *femina*: abdome nitido, nigro, in *P. rurali* instructi erunt secundum *Meigen* l. c.

20. *P. obtusinervis*: opacus, supra olivaceus; antennis acuminatis fuscis, apice albis; fronte supra antenas epistomateque argenteis; pleuris, metathorace abdominisque 1:mi segmenti margine, cinerascentibus; alis hyalinis, stigmate fusco, nervo long. 4:to valde obtuse

angulato, inter transversum & apicem subfexo; nervulis transversis medio apiei auxiliaris præcise opposito, postico ante apicem longitudinalis 2:di elongati paullo dueto; halteribus pedibusque flavis, coxis, femorum medio late, tibiarum annulo medio, tarsorumque apice, nigris. ♂. (Long. 1 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; in Suecia meridionali semel inventus.

♂. Valde iterum similis *P. fascipedi* (18), sed nervi longitud. 4:ti angulo paullo magis obtuso (hinc transitus ad sequentem præparatur), nervo hoc 4:to inter transversum posticum & apicem nonnihil longiore, nervulo transverso postico paullo ante apicem nervi longit. 2:di dueto, nec præcise opposito, area angulari fere in summum marginem descendente, halteribus flavis, nec fuscis, abdomine forte nonnihil angustiore, & annulo tibiarum in medio nigro, nec tibiis totis flavis, distinctus.

21. *P. opacus*: opacus, cinerascens; antennis ova-tis, fuscis; capite nigro, epistomate argenteo-micante; abdome atro (♂), aut cinereo (♀); alis hyalinis, stigmate fusco, nervo long. 1:to leviter arcuato; nervulis transversis: medio apiei auxiliaris subopposito, postico ante apicem longitudinalis 2:di elongati paullo dueto; halteribus pedibusque fuscis, geniculis summis tarsisque albidis. ♂♀. (Long. ¾ lin.).

Meig. Dipt. 6. 359. 13? Macq. Buff. 2. 11. 11? *Cephalops* Fall. Syrph. 15. 2. ♂. (specimen nostræ descriptionis typicum.).

Hab. in Suecia media rarissime; ad Lärketorp Ostrogothiae ante plures annos unicum marem unicamque feminam deprehendi. Individuum masculum in Blekingia a D. *Aspegren* olim captum, etiam vidi.

♂♀. Pusillus. ♂ niger, ♀ cinerea. Antennæ minutæ, ovatæ, parum acutæ, fuscae, apiee albicantes. Epistoma valde angustum. Alæ ut in priori, sed nervi long. 4:ti angulus ad nervum transversum posticum fere adhuc obtusior, ita ut hic nervus 4:tus leviter tantum areuatus ad apicem ducitur. Fuscedo stigmatis non usque ad apicem nervi auxiliaris extenditur, fere ut in *P. fuscule* (7). Nervi transversi: medius non præcise apiei auxiliaris oppositus, sed paullulum pone apicem ductus; posticus vero non nihil ante apicem nervi long. 2:di situs. Segmentum costæ 2:dum seu stigmatiale 1:mo duplo saltem brevius, at 3:ti circiter dimidio longius; 3:tiū iterum 4:to s. ultimo duplo brevius. Pedes fuscæ, geniculis puncto pallido, & tarsis albidis. Feminæ cauda nigra, aculeo incurvo, rufo. — Nostra species cum *Falleni* certe identica, a *Meigeni* & *Macquarti* in variis discrepat.

*Obs.* *Pip. annulipes* Zett. Ins. Lapp. 580. 7. deleatur, specimena enim l. c. descripta partim ad *P. fulvipedem* (14), & partim ad *vittipedem* (17) rectius referenda.

b.) corpore piloso.

22. *P. pilosus*: niger, pilosus, opacus; antennis ovatis, albo-micantibus; fronte supra antenas epistomateque argenteis; alis hyalinis, stigmate fusco; nervo long. 4:to inter transversum & apicem subflexo, 2:do elongato; nervulo transverso medio apici auxiliaris opposito; halteribus fuscis l. albis; pedibus fuscis, geniculis tarsisque albidis. ♂♀. (Long. fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: totus ater & distincte nigro-pilosus; oculis in fronte cohærentibus; pleuris, metathorace abdominisque maculis lateralibus, cinerascentibus; halteribus aut nigris, petiolo pallido, aut, ut in individuo Dovreensi, totis pallidis;

*Fem.*: obscure cinerea, parum pilosa; fronte angusta, cinerea, antice argentea; halteribus pallidis; cauda inflexa nigra, aculeo incurvo ferrugineo; in copula.

Zett. Ins. Lapp. 579. 2. ♂♀.

Hab. in Scandinaviæ mediæ & borealis graminosis & foliis fruticum, mense Julio, rarius; in copula; scilicet in Ostrog. ad Gusum; D. *Wahlberg*; in Dalecarlia rarissime; in Norvegia: in alpe Dovre 1832, D. *Bohemian*, ad Björkvik Nordlandiæ 1821, ipse.

♂♀. Antennæ nigræ, articulo ultimo ovato, parum acuto, fusco, superne albo-nicante. Epistoma modice latum (fronte tamen feminæ latius). Instrumenta cibaria flava. Segmentum costæ 1:um fere ad medium extenditur, 2:um duplo & ultra brevius, 3:um antecedente dimidium fere brevius, & 4:um 3:io duplo longius. Nervus transversus posticus ante apicem nervi long. 4:ti ductus. Area angularis non ad marginem retracta. Pedes fusi l. obscuri, tenuiter fusco-pilosæ, geniculis albis, tarsis sordide albidis aut fusci.

*Sect. 2.* Areæ alarum discoidales nullæ. Antennæ rotundatae. *Atelenevra* Macq.

23. *P. spurius*: pilosulus; opacus, ater holosericeus (♂), aut nigricans (♀); alis fusco-hyalinis; halteribus fuscis (♂), aut pallidis (♀); pedibus nigricantibus. ♂♀. (Long. 1 lin.).

*Mas*: ater holosericeus, halteribus fuscis;

*Fem.*: parum pilosa, nigricans; halteribus pallidis; cauda inflexa parva nigra, aculeo ineurvo rufo; in copula.

Var. a. ♂♀. pedibus nigris aut fuscis.

Meig. Dipt. I. 24. II. 1. 33. f. 24. ♂. Zett. Ins. Lapp. 580. 8. ♂♀. *Cephalops* Fall. Syrph. 16. 3. ♂ (exclus. ♀). — *Atelenevra velutina* Macq. Buff. 12. 1.

Var. b. ♂♀. pedibus aut totis flavis, aut femoribus nigris; ♀ etiam in copula cum var. a. ♂ deprehensa.

*Cephal. spurius* var. β. Fall. I. c. *Pip. obscurus* Zett. Ins. Lapp. 580. 9. ♀ (immerico ut ♂ descripta).

Hab. in graminosis & foliis fruticum Betulæ, Carpini &c., per Scandinaviam, 18 April.—20 Aug., vulgaris, præsertim ♂ frequens; in copula aliquoties captus; scilicet var. a. in Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia, Gotlandia (in Thorsborg, Nähr & Lummelunda), Nericia, Uplandia (ad Holmiam, D. *Wahlberg*), usque ad Jemtlandiam ad Fanbyn & Grimnäs, ubique frequens; in Lapponia Umensi ex. gr. ad Lycksele, Stensele & Stöttingsfjellet, haud raro; in Norvegia passim ex. gr. ad Levanger, ut & ad Björkvik Nordlandiæ; in Dania D. *Dahlbom*.

Var. b. cum var. a. deprehenditur, sed multo rarius.

♂♀. Parvus. Antennæ nigræ aut fuscæ, superne albo-mican-tes. Rima frontalis angustissima nigra, antice argentea. Epistoma angustum, nigrum, certo situ albo-micans. Oculi rufi, juxta frontem profundius facietati. Abdomen subdepres-sum, opacum, ano subnitido. Alæ fusco-hyalinæ, stigmate abbreviatim obscuro. Nervulus transvers. medius paullo ante apicem auxiliaris situs. Nervi long. 4:ti vix vestigium. Area angularis incompleta, nervo scilicet interiori fere deficiente I. tantum rudimentario. Segmentum costæ 1:mum vix ad medium dueitur; 2:dum duplo brevius; 3:tum antecedente triplo brevius; 4:tum 3:io iterum duplo longius. Pedes in ♂ plerumque toti nigri; in ♀ fusi I. plerumque albidi, femoribus tibiarumque annulo, nigris I. fuscis. — Sed variat color pedum. — In individuis detritis feminarum corpus cinerascens, subnitidum.

*Obs.* *Pip. holosericeus* Meig. 4. 24. 12; "ater holosericeus, femoribus nigris, tibiis tarsisque rufo-micantibus, facietatis oculorum juxta frontem majoribus" forte inter specimina variantia *Pip. spurii* mihi, latet!

---

## 102. OESTRUS Linn.

*Corpus magnum, oblongo-oratum, hirtum (in *Oestr. Ovis* glabriculum). Antennæ foveis sub frontis antico insertæ, brevissimæ, articulis 1 & 2 parvis, ultima subgloboso, seta nuda. Oculi non magni, ovales, in utroque sexu late remoti, nudi, ferruginei, unicolores. Os clausum (tuberculis 3 parvis loco oris). Ocelli 3 in vertice. Abdomen 4—5-anulatum. Alæ divaricatæ. Nervus longit. 4:tus pone transversum ordinarium obliquum angulatim l. arcuatim flexus plerumque in costam ante apicem alæ excurrit, ibique cum nervo costali cessante conjungitur. Nervulus transversus medius apici auxiliaris sæpissime oppositus. Area angularis nulla, sed loco ejus nervus oblitteratus, abbreviatus versus marginem tendit. Squama sub alis duplex, inferior magna fornicata, halteres obtigit. Pedes validi, hirti. Color corporis niger; hirsutie varie colorata *Syrphum* majorem l. *Bombum* minorem mentientes. Motu celerrimus. Volatus rapidissimus sæpe altus & longus, continuus. Habitatio larvarum incrassatarum in pecoribus, modo sub acute, modo in intestinis, vel capite; segmentis 11 sæpe spinuloso-annulatis aut scabris; pupæ brunneæ in terra 4—6 hebdomat. sepultæ, segmentis æque spinuloso-annulatis; imagines Tarandos & Boves circumvolant, terræ ipsi sæpe insidentes, in provinciis borealibus frequenter obviæ, sed vix nisi tempore calido soleque sereno sub brevi vitræ curriculo vigentes & observandæ. Differentia sexus; mas: ano obtuso, genitale brevi, inflexo; femina: vagina articulata, sæpe longe erumpente, & oculis interdum latius remotis. (Cfr. etiam die *Oestraciden* a Prof. Schwab. München 1840).*

Subd. 1. Alarum nervus longit. 4:tus ab angulo ad costam perspicuus. Oviductus ♀ brevis, sub ano retractus. Larvæ in sinu frontali mammalium versantes.

1. *Oe. Ovis*: parum pubescens, griseo-cinereus, fusco-adspersus; pedibus pallidis; alarum nervo long. 4:to ad 3:tiuum apice leviter flexum curvato. ♂♀. (Long. 4 lin.).

*Mas:* oculis subexsertis, versus verticem nonnihil approximantibus;

*Fem.:* oculis paullo minoribus, subdepressis, in fronte latissime & subaeque remotis.

Linn. Fn. Su. 1734. Fabr. Antl. 230. 10. Schrank Austr.

813. Modeer Act. Holm. 1786 p. 125. Svensk Zoologi I.

23. Fall. Hæmatomyz. 9. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 165. 1.

♂♀. t. 38. f. 16. ♀. — Schwab. Oestrac. 51. Dahlb. Skand.

Ins. 310. 210. *Cephalemyia* Macq. Buff. 2. 51. 1. ♂♀. —

Suecis: *Nosmask. Färstyng.*

Hab. imagines in rimis parietum argillacearum extra domicilia Ovium, per Scandinaviam meridionalem & medium, 23 Jul.—24 Sept., passim; scilicet in Scania sat vulgaris; in Smolandia; in Ostrogothia ad Lärketorp & Gusum, minus frequens; in Ölandia ad Ottenby &c. haud raro; in Hafnia, D. *Westermannu.* Femina ovipara 30 Aug. Larvas ex ovis nuper egressas, vix  $\frac{1}{4}$  lin. longas, apodas, 11-annulatas, albas, pellucidas, tentaculis (hamulis) capitis 2 nigris, vidi. Ova in margine interiori natum Ovium deponuntur.

♂♀. Magnitudo & statura fere *Syrphi Arbustorum.* Corpus subcylindricum. Antennæ in fovea simplici insertæ. Caput buccatum flavidum, articulo antennarum ultimo, & frontis utrinque foveolis, nigris. Thorax supra obscurus, seabropunctatus. Scutellum flavidum, punctis elevatis, sebris, nigris. Abdomen in fundo canum, maculis irregularibus & punctis fusco variegatum. Alæ cinereo-hyalinæ. Nervi longitudinales: 3:tus sat proen ab apice alæ in eostam excurrit, 4:tus versus 3:tium curvatur, 5:tus fere ad marginem obsolete producitur. Nervuli transversi: ordinarius l. posticus obliquus & leviter flexus, anticus (medius) brevis, perpendicularis, apici auxiliaris oppositus, niger. Nervus costalis pallidus, punctis minutis nigris. Segmentum costæ 1:mum (cfr. nota sub *Nephrocero*, gen. 100) fere ad medium

extensus, 2:dum brevissimum, 3:tum antecedente duplo longius, 4:tum longitudine 2:di. Squamæ albæ. Halteres testacei. Pedes flavidi, femoribus basi sæpe infuscatis. Tarsi spinulosi, metatarso articulo sequente duplo longiore.

2. *Oe. Trompe*: flavo-hirtus, thoracis fascia media pedibusque nigris; alarum nervo long. 4:to ad costam angulatim flexo. ♂♀. (Long. 5 lin.).

Modeer Act. Holm. 1786. Fabr. Antl. 229. 6. Panz. Fn. 107. f. 20. Fischer Dissert. Cont. 2. 78. 3. Fall. Hæmat. 10. 2. Meig. Dipl. 4. 170. 5. Læstad. Journal 1831. p. 447. Zett. Iter Lappon. 1821. P. 2. p. 39. & Ins. Lapp. 622. 1. *Cephenemyia* Macq. Buff. 2. 50. 1. — Lapponibus Fennicis: *Klupuperä*; Lapponib. meridionalibus: *Suörp*; Fennonibus: *Saulakat* (larvae); Lapponibus: *Sadgim* (larvae). — (Specimina sub nomine *Oestr. stimulator* Meig. e Silesia a D. *Zeller* etiam obtinui quæ nostræ speciei simillima).

Hab. larvæ in sinubus frontalibus & fauce ad radicem linguae Tarandi; pupæ in terra; imagines mense Julio proveniunt. In Norvegia septentrionali ut in Nordlandia & Finmarkia, præsertim ad radicem montis subalpini Skaaddavaara initio mensis Aug. legi. (Quoad specimina Reinerzensia conferatur D. *Zelleri* observatio in Actis Sedinensibus 1841. p. 181 not.).

♂♀. Late ovatus. Niger, hirsutie (in bene conservatis) eapitis, thoracis, sentelli abdominalisque griseo-flava, in abdominis rotundati basi minus crebra. Proboscis & palpi, minuta. Antennæ foveæ simplici insertæ, articulo ultimo compresso, basi seta dorsali. Fascia thoracis nigra. Alæ hyalinæ, nervis obscuris; ima basi nigræ. Nervus longitudinalis 4:tus angulatim flexus (nervulo appendiceo sub angulo fere ut in *Tachina grossa*) exurrit in costam, ubi area paullo aperta. Nervuli transversi: ordinarius flexus, medius

infuscatus perpendicularis, paullo pone apicem nervi auxiliaris situs. Segmentum costæ 1:um non usque ad medium costæ extensum, 2:dum duplo & ultra brevius, 3:tum antecedente nonnihil longius, 4:tum 3:tio duplo brevius, 5:tum (quod ex apertura areæ efficitur) 4:to triplo brevius. Squamæ albæ. Pedes nigri. — Frons nigra, ad latera nigro-, in medio flavido-hirta, in quibusdam individuis latissima, quæ feminæ puto, in aliis antice lata, posterius nonnihil angusta, quæ maseula existimo.

*Subd. 2.* Alarum nervus long. 4:tus ab angulo ad costam obsoletus. *Mas:* ano obtuso, inflexo, oculis modice remotis, versus verticem paullo propioribus: *femina:* ano acutiori, vagina articulata subexserta, oculis in fronte latissime & subæque remotis. Larvæ sub cute mammalium degentes. *Oedemagena* Macq.

3. *Oe. Tarandi:* flavo-hirtus, fronte, thoracisque fascia postica lata, nigro-hirsutis; abdomine fulvo-villoso, basi pallido; tibiis tarsisque testaceis; alarum nervo 4:to ab angulo ad costam arcuatim flexo. ♂♀. (Long. 6 lin.).

Linn. Fn. Su. 1731. Modeer Act. Holm. 1786 p. 136. Fabr. Antl. 229. 5. Fall. Hæmat. 10. 3. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 169. 3. ♂♀. t. 38. f. 15. ♀. Læstad. Journal 1831. p. 447. Zett. It. Lapp. 1821. P. 2. p. 39. 40. & Ins. Lapp. 622. 2. ♂♀. Dahlb. Skand. Ins. p. 311. 211. *Oedemageua* Clark. Act. Soc. Linn. Oestr. Tab. 2. fig. 13.—14. Macq. Buff. 2. 49. 1. ♂♀. Fennouibus: *Parma*; Lapponicis: *Spetha* (imago), *Kurbma* s. *Kurbmutter* (larva); Suecicis: *Rensstyng*.

Hab. per omnes Lapponias, ubi Tarandi pascuntur, usque ad Öfver-Torneå Botniae borealis descendens. Larvæ obovatae, multiannulatae, obscure brunneæ, in dorso & lateribus Tarandorum in primis juniorum, per totam

hiemem sub cute commorantes, diebus canicularibus prodientes. Pupæ in terra & sub lapidibus degunt. Imagines circumvolant Rangiferos, eorum hostes. Ad Talvig Finmarkiæ Norvegiae, atque in alpibus Gamst-lind & Skaaddavaara, ut & in ipso alpium Tornensium iugó, 30 Jul.—10 Aug., præsertim legi.

$\delta\varphi$ . *Oestr. Trompe* paullo longior, at fere angustior, *Bombyum* minorem referens. Flavescenti hirtus. Frons atra & atro-villosa. Antennæ foveæ biloculari insertæ, nigræ. Epistoma flavum & dense flavo-villosum, rarissime nigro-hirtum. Proboscis nulla. Palpi 2. Oeuli (in vivo) ænescenti violacei. Thorax fascia nigra inter alas. Anus in  $\delta$  hamulis 2 incurvis, intra quos genitale; in  $\varphi$  vagina sub-compressa, 6-articulata, nigra, sœpe longe erumpente. Alæ cinereo-hyalinæ, nervulo transverso medio fuscedine cincto. Nervus long. 4:us inter transversum & costam levissime arcuatim flexus, pallidus, rudimentarius. Segmenta costæ fere ut in *Trompe*. Squamæ albæ. Halteres fusi. Pedes nigri, femoribus postice pallido-hirtis, tibiis tarsisque testaceis, griseo-hirtis. Ungues nigri & pulvilli fusi, utrique magni.

4. *Oe. Bovis*: flavo-hirtus, fasciis, thoracis postica, abdominisque media, latis nigris; ano fulvo-villoso; pedibus nigris, subtus griseo-pilosis, tibiarum apice tarsisque testaceis; alarum nervo 4:to ab angulo ad costam subrecto.  $\delta\varphi$ . (Long. 4— fere 5 lin.).

Modeer Act. Holm. 1786 p. 148. De Geer Ins. 6. 297. t. 15. f. 22. Fabr. Antl. 228. 3. Svensk Zoologi. 4. Fall. Haemat. 11. 4.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 167. 2.  $\delta\varphi$ . — Dahlb. Skand. Ins. p. 312. 212. Zett. Ins. Lapp. 623. 3.  $\delta\varphi$ . Schwab Oestrae. p. 43.  $\delta$ . *Hypoderma* Clark. Act. Soc. Linu. Oestr. T. 2. f. 8. 9. Macq. Buff. 2. 48. 1. Suecic: *Nötsstyng*, *Krokhumla*; Norwegic: *Wärreflue* s. *Kuewärre* & *Buwärre*.

Hab. per totam Scandinaviam, vulgaris. Larva apoda, rugosa, brunnea, intra cutem boum, ulcera caussans. Imago bestias præsertim juniores infestat, 3 Jun.—14 Aug. obvia. In viis arenosis Scaniæ sæpe vidi. — In Blekingia, Gotllandia, Ostrogothia, Westrogothia, haud raro capta; in Jemtlandia usque ad Skalstugan, raro. In Lapponia Norvegica uterque sexus a D. *Bohemian* lectus. (E Berolino 1840, D. *Bökman*).

♂♀. Priori paullo minor. Pallide flavo- seu sordide albido-hirtus. Frons grisea. Antennæ foveæ biloculari insertæ, nitidæ, fuscae l. testaceæ. Epistoma ut in priori. Palpi & proboscis subdeficientia. Thorax dorso trisulcatus. Organa sexus ut in priori. Alæ sordide albæ, nervis pallidis, costalibus fuscis. Nervi: 4:tus inter angulum & costam subobsoletus, rectus; transversus ordinarius etiam subobsoletus, nonnihil flexus. Præterea segmenta costæ fere ut in *Oe. Tarandi*. Squamæ albæ. Halteres fusi. Tibiæ obsbare testaceæ. Tarsi albidi, nigro-spinulosi, ungvibus pulvillisque magnis.

*Obs* Sub hac specie sine dubio latet *Oe. hæmorrhoidalis* Linn. Fn. Su. 1733, diagnos., nulla vero habita ratione ad verba: "habitat in recto ani Equorum". Cfr. *Modeer* l. c. p. 149.

### 103. GASTRUS Meig.

*Corpus* majoris magnitudinis, oblongum, hirtum. Antennæ foveæ sub frontis antico insertæ, brevissimæ, articulis 1 & 2 parvis, ultimo rotundato, compresso, seta dorsali nuda. Cavitas oralis nulla. Os tuberculis 2 parvis (palpis?). Oculi, ocelli & abdomen ut in *Oestro*. Alæ incumbentes. Nervus long. 4:tus rectus longe pone apicem alæ in marginem excurrit. Nervuli transversi: medius & ordinarius sæpe quasi in eadem linea perpendiculari apici nervi auxiliaris fere

opponuntur. Nervus long. 3:tius in costam ante apicem alæ recta ducitur. Area angularis nulla. Squamæ mediocres, ciliatæ. Halteres nudi. Pedes mediocres, hirti. Color hirsutiei griseo-ferrugineus, parum varius. Motus celer. Volatus velox. Habitatio, larvarum in ventriculo mammalium; puparum in terra; imaginum in pratis & pascuis, equos, boves &c. infestantium. Differentia sexus; mas: oculis modice distantibus, ano brevi, incurvo; femina: oculis latissime remotis, cauda crassa, longe inflexa.

A. Alæ albido-hyalinæ, fusco-maculatæ.

1. *G. Equi*: ferrugineus, griseo-hirtus, thoracis cingulo alarumque fascia media & maculis duabus apicalibus, fuscis. ♂♀. (Long. 5 lin.).

Meig. Dipt. 4. 75. 1. ♂♀. t. 38. f. 21. ♂. 28. ♀. Zett. Ins. Lapp. 623. 1. ♂♀. *Oestrus* Fabr. Antl. 228. 1. Fall. Hæmat. 13. 8. ♂♀. Svensk Zool. 4. — Dahlb. Skand. Ins. 313. 213. fig. 22. — Macq. Buff. 2. 52. 1. ♂♀. *Oe. Bovis* Linn. Fn. 1730. *Oe. intestinalis* De Geer Ins. 6. 291. 1. 15. f. 16. *Oe. haemorrhoidalis* Modeer Act. Holm. 1786. p. 110. *Oestr. gastricus major* Schwab. Oestrac. p. 31. — Frisch Ins. 5. p. 21. t. 7.

Var. b. ♂. duplo minor, oculis brunneis, nec glaucis. Exclus. in Scania 8 Sept.

Hab. in Scandinavia temperata, 10 Jul.—2 Sept., var. a. vulgaris; scilicet in Scania (ubi in summitate montis Stenshufvud minoris innumerum agmen d. 13 Aug., sole sereno, quasi examinantes & in aëre sub volatu copulantes observavi), Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia, Gotllandia, Nericia & Uplandia, frequens; deinde rarescit, & in provinciis magis borealis non nisi parce occurrit. In Norvegia meridionali & Dania, haud raro. — Larva apoda, flavo-grisea, 8 lin.

longa (ad maturitatem proventa), ungvibus 2 corneis oris ventriculo Equorum adhæret. Ova nempe in crinibus genuum & abdominis laterum Equi a matre sub volatu deponuntur, deinde lingua equi excipiuntur, & cum cibo in ventriculum descendunt. Pupas oblongas, cylindricas, brunneas, in segmentis coronatas vidi, in terra, etiam in stercore equino captas. Larvæ mense Julio in pupas abeunt, quæ post 1 mensem excluduntur. Imagines femineæ Equos persequuntur.

$\delta\varphi$ . Corpus lividum s. ferrugineo-testaceum pareissime nigropictum, hirsutie flavo-grisea undique tectum. Antennæ pallidæ in fovea biloculari minus profunde insertæ, articulo 2:do superne fasciculo pilorum. Faseia thoracis media angusta, nigra. Abdomen pubescens. Alarum nervi pallidi, puneto ad basin nigro. Nervi transversi medius & ordinarius paullo pone apicem nervi auxiliaris ducti. Segmentum costæ 1:um non usque ad medium extensum, 2:um duplo brevis, 3:um longitudine 2:di, 4:um antecedente fere triplo brevis. Squamæ albæ & albo ciliatæ. Halteres testacei. Pedes pallidi. Anus incurvus, apice in  $\delta$  laminis 2 corneis nigris, nitidis, conniventibus, intra quas genitale; cauda in  $\varphi$  longa, cylindrica, inflexa, nigra, nitida,

*Obs.* *Oe. ferruginatus*, alis obsoletissime maculatis, sub n:o 3 inveniendus.

B. Alæ subhyalinæ, immaculatæ (in *Oe. ferruginato* (3) obsoletissime maculatæ).

\*<sup>o</sup>) nervulo transverso ordinario deficiente.

2. *G. Pecorum*: niger, thorace abdominalisque basi sordide luteo-hirtis; alis infuscatis, tibiis tarsisque pallidis.  $\varphi$ . (Long. 5 lin.).

Meig. Dipt. 4. 176. 2. t. 38. f. 23. Zett. Ins. Lapp. 623. 2.  $\varphi$ . *Oestrus* Fabr. Antl. 228. 2. Fall. Hæmat. 12. 5.  $\varphi$ . Macq. Buff. 2. 53. 2.

Hab. in Lapponia, museo D. *Gyllenhali*, mihi nec in Lapponia, nec alibi in Scandinavia obvius. Larva in intestinis pecorum degit, teste *Fabricio*.

♀. "Magnitudo *Gastr. Equi*. Caput obscurum, vertice cincinato-hirto. Oculi oblongi, parvi. Thorax cum scutello dense cinereo- s. luteo-hirsutus, pectore nigro. Abdomen aterrimum, segmento basali luteo-hirto; ano incurvo, conico. Pedes nigri, tibiis tarsisque pallidis, breviter pilosis. Alae subnigricantes, basi pallidiores. Nervi alarum similiter diriguntur atque ut in *Anthomyia*; at nervus transversus ordinarius deest? Squama haud magna, & margine distinete lanata". Fall. I. c.

*Obs.* 1. In figura *Meigeni* I. c. nervus transv. ordinarius adesse videtur; an rite delineatus?

*Obs.* 2. Individuum masculum *Gastri* cuiusdam ex Uplandia a D. *Marklin* olim mecum communicatum fuit, cuius magnitudo, color, hirsuties & alia cum descriptione supra data *G. Pecorum* haud male quadrant, praeter quod femora omnia genibus albis & anteriora in nostro specimine subtus in medio fasciculo pilorum & dente magno nigro antrorsum incurvato gaudent. Sed hoc exemplum, e pupa brunnea nitida, supra laevi, subtus in segmentis seriatim seabra, egrediendum, alas convolutas & vestitum illæsum obtinuit, unde determinatu difficile.

3. *G. ferruginatus*: ferrugineus, totus ferrugineo-flavo-hirtus; thorace postice fasciola brunnea; alis albidis, maculis fuscis obsoletissimis. ♂. (Long. vix 4 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in gramine prato arido ad Esperöd in parœcia Tranås Scaniae d. 1 Aug. 1820 specimen descriptum inveni.

♂. *G. Jubatum* Meig. 4. 179. 7. affinis & similis videtur, & ejusdem speciei a me olim habitus; sed magnitudine minore, thoracis fascia postica brunnea, nec nigra, pectore non

nigro, alis levissime maculatis &c., forte distinctus. Antennæ foveæ simplici haud profunde insertæ, ferrugineæ, summo apice & seta obscurioribus; articulo 2:do distincte flavo-piloso. Epistema ferrugineum, flavo-villosum. Frons brunnea, posterius angustata, tota griseo-pilosa. Oculi majusculi, in vertice anguste remoti. Thorax supra niger, subtus ferrugineus, totus flavo-villosus, fascia postica brunnea. Scutellum dense flavo-pilosum. Abdomen incurvum, ferrugineum, pilis nitidis flavis tectum, ventre parere fusco-piloso. Alæ subalbidæ, costa anguste, fascia media & macula apicali, fuscis, valde obsoletis. Nervi pallidi; transversi: ordinarius nullus, sed medius apici auxiliaris oppositus. Segmenta costæ ut in *G. Equi*. Squamæ albæ & albo-ciliatæ. Halteres fusco-testacei. Pedes ferruginei, flavo-hirti, femoribus basi subfuscis, ungvibus apice nigris.

\*\*) nervulo transverso ordinario præsentе.

†. *Nervulus transv. ordinarius* cum medio unam quasi lineam formans, apici nervi auxiliaris suboppositam.

4. *G. nasalis*: corpore nigro; capite ferrugineo thoraceque rufo-villosis; abdome basi cano-, medio nigro-, postice flavo-hirto; pedibus brunneis, femoribus flavo-hirtis, tibiis ferrugineis, geniculis tarsisque testaceis. ♂♀. (Long. vix 4 lin.).

Meig. Dipl. 4. 178. 5. Zett. Ins. Lapp. 624. 3. ♂♀. *Oestrus* Linn. Fn. Su. 1732. vix Modeer Act. Holm. 1786. p. 145? ♂♀. — Panz. Fn. 107. 21. Macq. Buff. 2. 51. 5. ♂♀. *Oe. veterinus* Fabr. Antl. 230. 8. Fall. Hæmat. 12. 6. ♂♀. certe.

Hab. in Suecia, 20 Jul.—10 Aug., rarius; scilicet in Scania in prato prope urbem Ystad, D. A. *Lundström*; in Ölandiae paludosis ad Ottenby Alunbruk 1817, ipse; in Lapponia, D. a *Linnè*. — Larvas per nares intrantes,

in faucibus Equi, Cervi, Capreæ &c. habitare, contendunt auctores.

$\delta\varphi$ . Inter minores generis. Similis *G. ferruginato*. Caput cum antennis ferrugineum, rufo-villosum. Antennarum articulus 2:dus superne flavo-pilosus. Margo soveæ supra antennas albus, nitidus. Oculi in  $\delta$  modice, in  $\varphi$  late remoti. Thorax & scutellum nigra, dense fulvo-hirta; in thoracis postico & scutello pilis aliquot obseuris præsertim in  $\varphi$ . Abdomen atrum, segmentis 1 & 2 albido-hirtis, 3 nigro-, & reliquis, flavo-hirtis. Venter flavo-hirtus. Cauda  $\varphi$  ut in *G. Equi*. Alæ albidae, immaenlatæ, nervis costalibus saturate flavis. Præterea directio nervorum omnino ut in *G. Equi*. Squamæ albæ. Halteres pallidi, paucis fuscis. Femora fusa, postice, & subtns flavo-villosa.

5. *G. salutaris*: corpore nigro; capite ferrugineo thoraceque rufo-villosis; abdomine basi cano-, medio nigro-, postice flavo-hirto; pedibus brunneis, femoribus nigro-hirtis, tibiis ferrugineis, geniculis tarsisque testaceis.  $\delta$ . (Long. 4 lin.).

Meig. Dipt. 4. 176. 3?  $\delta\varphi$ . *Oestrus* Clark, Tab. I. f. 35—36. Numan, T. 6. f. 10, a & b.? Hertwig, T. I. f. 31 & 35? *Oestr. duodenalis* Schwab. Oestrac. p. 35?

Hab. in Suecia rarissime; in Bahusia ad Quille specimen descriptum d. 4 Aug. a D. Prof. B. F. Fries captum mihiique communicatum.

$\delta$ . Magnitudo, color, directio nervorum in alis & omnia ut præcedente, a quo non differt, nisi femoribus anterioribus postice & subtns dense & longe nigro-villosis. Alarum nervi albi, ad costam parum flavescentes. Thorax in nostro individuo postice tantum paucis pilis brunneis inter fulvos gaudet. Alæ etiam ad basin albidae, tantum nervis ibi superne atris. Reliqua cum adumbratione *Heigeni* & *Schwabii* hujus speciei bene convenient.

6. *G. nigritus*: ater & atro-villosus; capite fuseo; pectore antice abdominalisque basi cano-hirtis; ano rufo-villoso; geniculis albis. ♂. (Long. 4½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania inter Lund & diversorum Kjesslinge 1837 a Cel. D. *Dahlbom* detectus. Larva in sterecore equino 14 Jul. capta, in pupam obscure brunneam, segmentis ad incisuras coronatis d. 15 ejusdem mensis abiit, & imago declarata 18 Aug. ejusdem anni egressa.

♂. Habitu & fere pictura *Oestro Bovis* sat similis, sed praeter nervorum directionem aliam differt quoque magnitudine nonnihil minore ♀ thorace fere toto, scutelloque atris. Caput fuseo-rufescens, nigro hirtum. Antennæ foveæ subsimpliei insertæ, fuscae. Margo foveæ supra antennas flavidus. Thorax totus atro-hirtus, pilis aliquot flavis l. albis in humeris & postice inter alas & scutellum atrum. Pleuræ macula albo-villosa. Abdomen atrum, segmentis 1 & 2 albidio-villosis, 3 atro-hirto, reliquis fulvo-villosis. Ate albidæ. Nervi toti albi, costalis obscurus. Nervuli transversi medius & ordinarius in eadem linea ducti apici nervi auxiliaris præcise oppositi. Præterea nervi ut in *G. nasalis* directi. Squamæ albæ & albo-ciliatæ. Halterum clava fusca. Pedes nigri, femoribus postice nigro-hirtis. Summa flexura genuum alba. Tarsi fusi, pulvillis ungvibusque albidis, his apice nigris.

††. Nervuli transversi ordinarius & medius distantes.

7. *G. haemorrhoidalis*: corpore nigro, capite subferrugineo, thorace antice scutelloque, sordide flavo-villosis; antennis femorumque basi fuscis; abdomine basi cano-, medio nigro-, postice fulvo-hirto; pedibus ferrugineis. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Meig. Dipt. 4. **177.** 4. verus. *Oestrus* Fabr. Antl. 229. **7.** (excl. forte syn. Linn.). — Fall. Hæmat. 13. **7.** ♂♀. certe. — Macq. Buff. 2. 53. 4. ♂♀. Schwab Oestrac. p. 37. *Oe. nasalis* Modeer Act. Holm. 1786. p. 145. 4. forte.

Hab. in Suecia meridionali mense Julio rarius; in Scania ad Lund 1836, D. Andr. Sjöbeck, ad Abusa, ipse. — *Ova* in labiis aut naribus equorum deponuntur. *Larvæ* in intestinis equorum hospitantur.

Var. b. ♀. fronte altra & atro-villosa; macula supra anteunas nigras lunata alba; epistomate albo & albo-pubescente. Ad Esperöd Scaniæ, D. J. Pettersson 1842 rarissime.

♂♀. *O. Boris* habitu non dissimilis, sed paullo minor, angustior, pictura corporis minus determinata; nervis transversis remotis ab antecedentibus mox dignotus. Caput ferrugineum, flavo-hirtum, antennis foveæ subbilooculari insertis, fuscis. Oculi ♂ in vertice subappropinquantes, ♀ in fronte modice distantes. Thorax niger, flavidu-hirtus, hirsutie postice fasciam nigram formante. Scutellum nigrum, flavo-hirtum. Abdomen nigrum, basi sæpe ferrugineum, hirsutie basi (segmentis 1 & 2) albida, medio (segmento 3) nigra, apice fulvo. Cauda ♀ nigra. Alæ albidæ, nervis albis, costali nigricante. Nervi transversi: medius apici auxiliaris oppositus, ordinarius paullo ante apicem longitudinalis 1:mi situs. Segmenta costæ fere ut in *G. Equi*. Squamæ albæ. Halteres pallidi. Pedes ferruginei l. flavi, coxis femorumque griseo-hirtorum basi, tarsorum annulis artienloque ultimo, fuscis. Ungues apice nigri. Femora in ♂ fere tota nigro-fusca.

## 104. PROSENA St. Farg. &amp; Serv.

*Corpus* majoris magnitudinis, subcylindricum, pubescens & setosum, opacum. Antennæ incumbentes, longitudine canthi inferioris oculorum, subnudæ, articulis 1 & 2 brevissimis, 3 elongato, compresso, linearis, obtuso, basi seta dorsali undique plumata. Caput margaritaceum. Frons prominula, canaliculata, biseriatim setosa. Epistoma carinatum. Oculi mediocre, oblongi, in utroque sexu distantes, nudi, ferruginei, in viva æneo-micantes. Os mystacinum. Haustellum horizontaliter longe porrectum, basi geniculatum. Palpi parvi, breves, clavati, pilosuli. Thorax dorso antice sutura transversa. Abdomen 4-annulatum (præter segmenta analia parva, retracta). Alæ divaricatæ, hyalinæ; nervus long. 4:tus subrectangulatim flexus mox ante apicem alæ cum nervo costali ibi cessante & long. 3:tio fere in eodem puncto (area nempe apice anguste aperta) conjunctus. Nervi transversi: ordinarius a margine paullo remotus, levissime flexus; medius apici nervi auxiliaris suboppositus s. fere inter apicem nervi auxiliaris & long. 1:mi ductus. Segmenta costæ (cfr. *Nephrocerus* gen. 100 in nota): 1 non ad medium extensum, 2 duplo brevius, 3 antecedente fere duplo longius, 4 3:tio nonnihil brevius. Squamæ duplicatae, magnæ. Halteres tecti. Pedes elongati, simplices, spinosi. Tarsi, præter spinulas articulorum apicales, inermes, metatarsis articulo sequente duplo longioribus. Pulvilli & ungues non magni. Color cinerascens. Motus hand celer. Habitatio in foliis plantarum, in floribus mellificantes, minime pungentes. Differentia sexus; mas: oculis per frontem æque approximatis, setarum seriebus simplicibus, abdomine conico, lateribus diaphano; femina: oculis per frontem æque & modice remotis, setarum seriebus postice subduplicatis, abdomine ovato, non diaphano. Genus affine *Dexiae*, haustello elongato absque labiis proboscidis perspicuis mox dignotum. — Meig. Dipt. 7. p. 276. 8. T. 73. f. 35—37. ♂♀.

**1.** *P. siberita*: cinerea, capite margaritaceo; antennis pedibusque flavis, tarsis nigris; abdominalis segmentis basalibus 3 ad latera in ♂ flavo-subpellucidis. ♂♀ (Long. 3—3½ lin.).

Macq. Buff. 2. 208. 1. T. 15. f. 14. — *Stomoxys* Fabr. Antl. 280. 4. ♂. Fall. Hæmatomyz. 5. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 160. 2. ♂♀. T. 38. f. 2. ♂. *Stom. grisea* Fabr. Antl. 279. 2. ♀. — *Stom. irritans* Panz. Fn. 5. 24. ♀. (cum *St. calcitrante* ut videtur commixta).

Hab. in foliis & floribus Umbellatarum &c., truncis arborum viventium saepe insidens, per Scandinaviam meridionalem & medium, 10 Jul.—20 Aug., vulgaris, in copula capta; seilicet in Scania frequens; in Smolandia passim; in Ostrogothia ex. gr. ad Lärketorp, Wadstena, Gusum &c.; in Westrogothia ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Bahusia rarius; in Dania circa Hafniam, D. D. *Fabricius* & *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg*).

♂♀. Cinerea, setis nigris. Caput albo-corneum, nitens. Antennæ & seta, flavæ. Canalicula frontis pallida, setis utrinque nigris armata. Mystaceæ serie simplici sub genis continuantur. Haustellum nigrum, basi palpisque flavis. Thorax cano-subpubescens, setis nigris sparsis; lineolis 4 fuscis quarum 2 mediis anticis, postice abbreviatis, & 2 lateralibus interruptis. Scutellum parce nigro-pubescens, apice indeterminate flavidum, setis nigris. Abdomen parce nigro-pubescens, segmentorum singulo margine apicali setis 5 l. 6 rigidis, nigris. Alæ cinereo-hyalinæ, nervo costali nigro, reliquis pallidis. Area angularis rudimentaria. Squamæ albæ & albo-ciliatæ. Halteres flavi. Pedes flavi, coxis basi cinereis. Tarsi nigri. Femora antica subtus una serie sat dense, posteriora & tibiæ omnes parce, nigro-setosa.

---

## 105. STOMOXYS Geoffr.

*Corpus* mediæ aut minoris magnitudinis, ovatum, pubescens, vix l. parum setulosum, opacum. *Antennæ* incumbentes, longitudine fere epistomatis impressi, articulis 1 brevissimo, 2 brevi setuloso, 3 elongato, compresso, linearī, obtuso, seta dorsali latere supero plumata. *Caput* albidum. *Frons* haud prominula, subplana, utrinque setulosa. *Epistoma* non prominulum. *Oculi* valde oblongi, infra antennas longe descendentes, nudi, ferruginei; in utroque sexu distantes. *Os mystacinum*, sed series setarum haud sub genis continuata. *Haustellum* horizontaliter porrectum, basi geniculatum. *Palpi* breves l. elongati; pilosuli. *Thorax* sutura transversa. *Abdomen* 4-annulatum, setis nullis. *Alæ* divaricatæ, hyalinæ; nervus long. 4:tus leviter arcuatim flexus, mox infra apicem alæ eum nervo costali ibi cessante conjunctus. Nervus long. 3:tius in apicē alæ excurrit, unde area ibi latius aperta. *Nervi transversi* ut in *Prosenæ*. Segmentum costæ 1 non ad medium extensum, 2 fere triplo brevis, 3 longitudine 1:mi, 4 longitudine 2:di. *Squamæ* mediocres. *Halteres* subtecti. *Pedes* mediocres, simplices, pubescentes. *Metatarsi* articulo sequente duplo longiores. *Pulvilli* & unges parvi. *Color* cinerascens. *Motus* tardior. *Habitatio* in domibus; in parietibus sœpe tranquillæ sedentes; sangvisugæ. *Larvæ* coprophagæ. *Differentia sexus*; *mas*: oculis in fronte propioribus; *femina*: oculis sat late remotis, & ab domine sœpe tumido. — *Stomoxyx* a *Musca* ut *Pangonia* a *Tabano*, aut *Orthochile* a *Dolichopo*, fere dignoscitur.

A. *Palpi* breves fere intra os occultati. *Oculi* in ♂ paullo distantes. *Domesticæ*. *Stomoxyx* Macq.

1. *S. calcitrans*: cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque maculis tripliei serie dispositis, nigricantibus; palpis brevibus flavis. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Fabr. Antl. 280. 5. Fall. Hæmat. 6. 3. ♂♀. Meig.  
 Dipt. 4. 160. 3. ♂♀. Macq. Buff. 2. 212. 1. Zett. Ins.  
 Lapp. 221. 1. ♂♀. *Conops* Linn. Fn. Su. 1900. Schrank  
 Austr. 990. *Stom. tessellata* Fabr. Antl. 281. 6. —  
 Suecis: *Stick-fluga*.

Hab. in parietibus stabulorum, per totam Scandinaviam, a primo vere (mense Majo) usque ad serum autumnum (Novemb.), omnium vulgatissima; scilicet a Scania extrema usque ad Lapponiam supremam, iis nempe tractibus, ubi homines exstruxerunt domicilia & pecuariam faciunt; sangvinem mammalium hauriens, strenue pungens, præsertim instantे pluvia. — Pupas in stereore equino recenti inveni, d. 25 Maj. excludendas. — In Norvegia & Dania æque frequens ac in Suecia.

♂♀. *Museæ domesticæ* habitu similis. Cinerea. Caput albo-nitens. Antennæ, vitta frontalis didyma, & haustellum, nigra. Palpi filiformes, flavi. Thoracis dorsi lineæ 4, scutelli punctum basale, abdominisque maculæ triplici serie dispositæ, fusca. Alæ hyalinæ. Squamæ & halteres, albi-da. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, tibiis basi anguste pallidis.

B. Palpi elongati haustelli apicem fere attingentes. Oculi in ♂ fere cohærentes. Pratenses l. *sylvaticæ*. *Hæmatobia* Macq.

2. *S. stimulans*: cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque maculis triplici serie dispositis, nigricantibus; palpis elongatis, flavis. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 161. 4. ♂♀. T. 38. f. 8. ♀. — Zett. Ins. Lapp. 621. 2. ♂♀. *Hæmatobia* Macq. Buff. 2. 243. 1. ♂♀. T. 16. f. 7. — *Stomoxys irritans* Fabr. Antl. 281. 10. Fall. Hæmat. 7. 4. ♂♀.

Hab. in sylvis, pratis & pascuis, per Scandinaviam totam, tota æstate, æque ac præcedens vulgaris, pecora infestans eorum dorso insidens, flores rarius visitans, in copula sæpe deprehensa. E pupis cylindricis, nudis, rufotestaceis, punctis in apice antico 2 nigris, ad Wittangi & Juckasjervi Lapponie Tornensis captis, 18 Jun. & 3 Jul. exclusa.

$\delta\varphi$ . Simillima priori, plerumque paullo minor, & palpis multo longioribus, subclavatis, alarum nervo transverso ordinario magis recto, ut & oculis in  $\delta$  fronte cohærentibus, facile dignota. Lineæ thoracis laterales brunneæ interruptæ, in  $\varphi$  relictis tantum utrinque maculis 2. Maculæ abdominis fusce in serie media conicæ, in seriebus lateralibus rotundatæ; hæc vero pictura in segmentis 2 & 3 præsertim perspicua, in ceteris valde obsoleta. — Femora postica in  $\varphi$  testacea. Abdomen in junioribus basi quoque sæpe pallescit.

3. *S. irritans*: obscure cinerea, subimmaculata; palpis elongatis, nigris.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 162. 5.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 621. 3.  $\delta\varphi$ . *Conops* Linn. Fn. Su. 1901. *Hæmatobia* Macq. Buff. 2. 243. 3.  $\delta\varphi$ . *Stomox. pungens* Fabr. Antl. 282. 12. Fall. Hæmat. 7. 5.  $\delta\varphi$ .

Hab. in bovibus præsertim nigris, dorso insidens, per Scandinaviam meridionalem & medium, Jun.—Aug., sæpe copiosissime, bobus molesta, sangvisuga; in copula; scilicet in Scania vulgatissima; in Ostrogothia ad Wadstena &c., passim; in Gotlandia ad Westö in Hall, Lausmyr &c.; in Nericia; deinde rarescit & in provinciis borealibus non nisi rarissime occurrit.

$\delta\varphi$ . Simillima iterum præcedenti, sed adhuc paullo minor, & corpore toto obscure cinereo, haud maculato, pubescente, antennis nonnihil brevioribus, palpis nigris, nervis trans-

versis: ordinario omnino recto, medio apici nervi longit. 1:mi præcise opposito, ut & oculis in fronte maris tantum approximatis, nec cohærentibus, vere distincta. Genicula pallida. Tibiæ & tarsi in juvenilibus sœpe etiam pallescunt. In illæsis thorax linearum fuscarum rudimento. — Synonymon *Linnæi* (Fn. Sv.) non certissimum propter brevitatem descriptionis. Parvitas corporis l. c. alijata identitatem cum nostra affirmat, habitatio speciei nec tam longe, nec tam late, ac *S. stimulantis*, extensa, negat. — *Hæmatobia* (Stomox.) *tibialis* Macq., "griseo-fusca; pedibus fuscis: tibiis anterioribus rufis", parum a nostris speciminibus junioribus ab ludere videtur.

---

## 106. SIPHONA Meig.

*Corpus* minoris magnitudinis, ovatum, pubescens, rigide setosum, opacum. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis seu canthi inferioris oculorum, articulis basalibus parvis, ultimo elongato, linearis, apice suboblique obtuso, basi seta dorsali 3-articulata, nuda. Caput albidum. Frons haud prominula, subplana, subquadrifariam setosa. Oculi mediocres, ovati, in istroque sexu late distantes, nudi, obscure ferruginei. Os mystacinum. Genæ haud pilosæ. Haustellum horizontaliter longe porrectum, filiforme, basi medioque geniculatum. Palpi mediocres, subelavati, pilosuli. Thorax absque sutura transversa, lateribus & postice setosus. Scutellum setosum. Abdomen oblongum, segmentis 4, eorum singulo margine apicali setis 4—6 nigris. Alæ divaricatæ, hyalinæ. Nervus long. 4:tus subangulato-arcuatim flexus, in ipso apice alæ cum nervis costali ibi cessante & long. 3:tio in eodem fere puncto conjunctus. Nervi transversales: ordinarius rectus a margine alæ sat longe remotus, medius apici nervi auxiliaris oppositus. Area angularis nulla, sed loco illius nervus unicus ad marginem ductus. Nervus tertius long. basi setulis 5—6. Segmentum costæ 1:mum ad 3:tiam partem totius alæ extensem, brevissime

ciliatum s. serratum, basi setulosum, apice setulis 2 terminatum; 2:dum brevissimum, 3:tum longitudine 1 & 2 simul sumitorum, 4:tum 1:mo duplo brevius. Squamæ duplicatæ, inferiores magnæ, fornicatæ, marginatæ, vix ciliatæ, halteres supertegentes. Pedes mediocreis parce setosi, tarsis inermibus articulo 1:mo sequente duplo longiore. Pulvilli & ungues minimi, nec ut in maribus Tachiniarum magni. *Color* griseus. *Motus* agilis: volatus sat celer, brevis. *Habitatio* in floribus & graminosis. *Larvæ* in pupis Noctuarum degunt. *Discrimen sexus* vix nisi antennis *maris* majoribus, ab domine nonnihil angustiore & ano obtusiore, quam in *femina*, externe detegendum. Articulus ultimus antennarum setæ in ♂ quoque brevior est, quam in ♀. Frons maris subbifariam, feminæ quadrifariam setosa.

1. *S. geniculata*: grisea, capite albido; antennarum basi, macula frontali, palpis, halteribus, pedibus, & in ♂ abdominis lateribus, testaceis; antenarum articulo ultimo, haustello tarsisque nigris. ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 620. 1. ♂♀. *Musca* De Geer Ins. 6. 38. 15. f. 19. 20. vera. *Stomoxys* Fall. Hæmat. 5. 2. ♂♀. certe. — *Stomoxys cristata* Fabr. Antl. 281. 9. ♂. *Stomox. minuta* Fabr. Antl. 282. 17. ♀. — *Siphon. tachinaria* Meig. 4. 156. 3.? (a qua Ejusdem *Siph. geniculata* & *cinerea* parum ab ludunt). Macq. Buff. 2. 91. 3. ♂♀. *Bucentes cinereus* Latr. Gen. 4. 339.

Hab. in graminosis & floribus, per totam Scandinaviam, 10 Maj.—26 Sept., vulgatissima, in copula multoties capta; scilicet in Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia atque Gotllandia, ubique frequentissima; in Nericia ad Öskevik, non rara; in Babusia; in Jemtlandia ad Faxelfven &c. passim; in Lapponia Umensi ad Almsele, rarissime; in Nordlandia & Fin

markia Norvegica usque ad Bossekop, parce; in Dania haud infrequens. — E pupis cylindricis, nudis, ferrugineis imagines egressæ 10—21 Maj. — (Ad Eldena prope Gryphiam; & Jungfern-Heyde atque ad Moabite prope Berolinum, utrumque sexum Jul. Sept. 1812 collegit mihiique communicavit Cel. D. Dahlbom).

$\delta\varphi$ . Magnitudine variat. Caput albo-corneum. Frons supra antenas macula sordide rufescente. Antennæ rufæ, articulo ultimo cum seta atro. Mystaces pauei. Thorax griseus. Scutellum apice summo testaceum. Abdomen griseum, in  $\delta$  lateribus plus minus late testaceo-diaphanis, in  $\varphi$  unicolor, in utroque sexu segmentorum margine apicali albido, & siepe ponctis 2 minutis atris in singulo segmentorum. Alæ cinereo-hyalinæ. Squamæ albæ. Pedes cum coxis flavi, tarsis nigris.

Inter plures hujus varietates, quas partim ipse inveni partimque ab Amicis Entomologicis sub variis Auctorum nominibus, communicatas possideo, præcipue afferam.

Var. b.  $\delta$ . abdomine toto testaceo-diaphano. Ad Faxelfven Jemtlandiæ, cum var. a. 9 Aug. 1840. rar.

Var. c.  $\delta\varphi$ . similis var. a. paullo minor, antennis etiam basi obscuris. Scania, Ostrogothia & Holmia.

Var. d.  $\delta\varphi$ . similis var. a. abdomine aut toto ( $\varphi$ ), aut apice (segmentis analibus 1 l. 2.) ( $\delta\varphi$ ) nigro nitido; in speciminibus sine dubio detritis. — *Siph. analis* Meig. 4. 157. 5. T. 37. f. 24. — In Scania & Ostrogothia, non raro, in copula cum var. a. aliquoties capta.

Var. e.  $\delta\varphi$ . similis etiam var. a, paullo minor, abdomine toto cinereo, segmentorum marginibus albis. Forte *Stom. minuta* Fabr. Antl. 282. 17. genuina. In Scania, Ostrogothia, Gotlandia &c. — Sub nomine: *Siph. cinerea* Meig. e Dania quoque missa. (E Glogavia a D. Zeller quoque communicata).

Var. f. ♀. similis iterum var. a. abdominis 1:mo segmento testaceo-subpellucido. *Stom. cristata* Fabr. Antl. 281. 9. Scania, Ostrogothia.

---

## 107. ECHINOMYIA Dumeril.

*Corpus magnum, crassum, ovatum, pubescens, setosum. Antennæ fronti prominenti insertæ, oblique deflexæ, longitudine canthi inferioris oculorum, articulo ultimo antecedente breviori, latiori, subquadrato, compresso, ante basin seta dorsali nuda, 3-articulata, articulo 2:do 1:mo longiori. Os mystacinum, margine antieo reflexo. Palpi (in nostris) saepissime filiformes. Facies ciliis vibrissisque nullis. Setæ frontales infra antennarum basin nonnihil descendunt. Oculi non magni, oblongi, in utroque sexu distantes, obscure ferruginei. Abdomen rotundato-ovatum, tantum ad incisuras rigide multisetosum, segmento anali postice sparse setoso. Alæ divaricatæ. Nervus long. 4:tus angulatim flexus, per nervulum subcurvum in costam ante apicem alæ excurrens; infra angulum vix continuatus. Nervi transversi: ordinarius a margine longe remotus, obliquus, flexus; medius paullo pone apicem auxiliaris duetus. Nervus long. 3:tius basi 2:4-setulosus. Segmentum costæ (cfr. *Nephrocerus* gen. 100): 1 non ad medium extensem, 2 1:mo duplo & ultra brevius, 3 antecedente duplo fere longius, 4 3:tiio fere triplo brevius, 5:tum iterum 4:to fere triplo brevius. Squamæ duplicatæ, marginatæ, parum ciliatæ, inferiores magnæ halteres obtengentes. Pedes simplices, validi, spinosi, tarsorum articulo 1:mo sequente duplo longiori, reliquis subæqualibus. Ungues & pulvilli magni. Color niger l. nigricans. Motu agilissima, valde inquieta. Habitatio in floribus, etiam in graminosis l. arenosis. Æstivalis. Larvæ in aliorum insectorum larvis præsertim Noctuarum parasitæ. Differentia sexus; mas: oculis modice remotis, antennarum articulo ultimo*

subbreviore, latiore, fronte serie simplici utrinque setosa, ano obtusiore, hamulis 2 cornēis inflexis, ungvibus pulvillisque majoribus, tarsis antecis simplicibus, a *femina*: oculis latius distantibus, antennarum articulo ultimo non-nihil longiore, fronte serie subduplici setosa, vagina australi brevi, articulata, sēpe recondita, tarsis antecis subdilatatis, dignoscitur. — Abdominis segmenta non in medio, sed tantum ad incisuram esse setosa, probe attendas ut *Echinomyiam* a *Tachinis* pluribus similibus distingyas.

A. Palpi filiformes, intra os suboccultati.

1. *E. grossa*: atra, capite alarumque basi flavis; antennarum articulis 1 & 2 ferrugineis; squamis fuscis; tibiis rufo-piceis. ♂♀. (Long. 5—6 lin. — lat. 3 lin.).

Latr. Gen. 4. p. 343. Macq. Buff. 2. 71. I. t. 14. f. 1. *Musca* Linn. Fn. Su. 1837. De Geer Ins. 6. p. 21. Tab. I. f. 1. Reaum. Ins. 4. t. 26. f. 10. Panz. Fn. 32. f. 21. (Ejusdem vero *Musca grossa* 10. 18 alia omnino species, ad *Tachin. Radicum* nobis potius forte referenda). — *Tachina* Fabr. Antl. 310. 7. Fall. Act. Holm. 1810. 261. 1. ♂♀. Dipt. Suec. Muscid. 3. I. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 239. I.

Hab. in floribus pratensibus & sylvestribus, per Scandinaviam meridionalem & medium, 26 Jun.—28 Aug., passim; scilicet in Scania haud raro; in Smolandia; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Hagalund, Gusum &c., sat frequens; ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Ölandia, D. *B. F. Fries*; in Gotlandia ad Thorsborg, Ruthe &c.; in Helsingia ad Jerfsö, Arbrå &c.; in Dania, passim, D. *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

♂♀. Maxima nostratum; lata. Tota atra & atro-setosa. Caput flavum. Frons ochracea, vitta grisea. Barba occipitis pallida. Antennarum articulus 2:dus longissimus, ferrugineus, supra in medio setulosus; ultimus subquadratus, niger,

seta nigra. Series setarum nigrarum sub genis. Scutellum piceum. Abdomen late rotundatum. Alae basi fulvæ, costa basi nigro-setosa. Squamæ fuscae. Ungues rufi. Pulvilli albidi.

*Obs.* Feminam hujus speciei in copula cum mare *Echin. feræ* semel inveni.

2. *E. Marklini*: nigra, nitida; epistomate flavide albido; fronte cinerascente, vitta obscuriore; antennarum articulis 1 & 2 scutelloque ferrugineis; abdominis lateribus inæqualiter pellucido-rufis; alarum basi squamaque flavescentibus. ♂♀. (Long. 4½—5 lin.).

*Tachina* Zett. Ins. Lapp. 631. 1. ♂♀.

Hab. in Scandinavia septentrionali, 22 Jul.—28 Aug., minus frequens; scilicet in Lapponia sylvatica Umensi ad Lycksele, Wilhelmina & Frederica, passim; e Lapponia in Botniam descendit, & ad Öfver-Torneå, Haparanda, Luleå, Skellefteå atque Hernösand Ångermanniae, rarius quoque deprehensa.

♂♀. Affinis & similis sequenti, sed paullo major, & corpore nigra, nitidissimo, abdominis vitta dorsali atra latiore, squamis flavis, pedibus totis atris &c., ab illa certe distincta; nec cohabitant. Caput cum antennis ut in præcedente constructum & setosum, sed oculi in ♂ multo propiores & antennarum articulus ultimus nonnihil longior. Caput postice flavo-villosum. Epistoma ad latera fusco-pubescentia. Palpi flavi. Abdomen atrum segmentis aut plerumque 2, 3, aut 1, 2, 3, aut rarius 1, 2, 3 & 4 basi, lateribus pellucido-ferrugineis, relicta vitta media lyrata, atra. Segmentum 4:um sumnio margine interdum etiam rufum. Ungues rufi. Pulvilli albidi.

*Obs.* Specimen femineum vidi, epistomate albidiore ad latera parum pubescente, & utrinque prope canthum inferiorem oculorum setis 2 distinctis nigris armato, scutello nigro, vix piceo, at abdominis lateribus latius rufis, dignotum;

forte propria species; ex unico vero exemplo, haud bene conservato, novam fingere nolui.

3. *E. fera*: nigra, nitida, epistomate flavide albido, ad latera nudo; fronte cinerascente, vitta media, antennarum articulis 1 & 2, scutello pedibusque rufo-ferrugineis; palpis alarumque basi flavis; squamis albis; abdome pellucido-testaceo, vitta dorsali subangusta, femoribusque basi late, nigris. ♂♀. (Long. circumf. 4 lin.).

Macq. Buff. 2. 72. 5. ♂♀. *Musca* Linn. Fn. 1836. Schrank Austr. 931. Vix Panz. Fn. 20. 18? *Tachina* Fabr. Antl. 308. 1. Fall. Act. Holm. 1810. 262. 2. Muscid. 3. 2. ♂♀. (sub qua vero plures species latent). Meig. Dipt. 1. 240. 3. ♂♀.

Hab. in Umbellatis, etiam in campis & viis, per Scandinaviam temperatam, 8 Jul.—5 Sept. vulgaris; scilicet in Scania ad Lund, Bjärsågård, Öfvedskloster, Esperöd &c., passim; in Smolandia; in Ostrogothia ad Wadstena, Lärketorp, Gusum &c., frequens; in Ölandia, D. B. Fries; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; in Helsingia ad Lösvik & Stråtjära; in Dania haud rara. ♀ e Glogavia sub nom. \**Tach. Virgo* Meig.? missa).

♂♀. Similis priori, minor, & vitta frontali rufa, abdominis vitta dorsali nigra angustiori, squamis sub alis albidis, ut & pedibus fere totis ferrugineis, distineta. Frons bifariam setosa. Antennarum articulus 2:dus longissimus rufus, ultimus praesertim in ♂ latus, rotundato-quadratus, niger, interdum brunneus l. rufescens. Thorax niger, levissime cinerascenti micans, lineis obscurioribus parum perspicuis. Pleuræ rufo-maculatæ. Abdomen rufescenti flavo-pellucidum, vitta media atra in primi segmenti basi subdilatata; tota in ♂ angustata, ante anum abbreviata, in ♀ plerumque latiori, inaequali s. angulata, ad annum saepe extensa, ibique interdum dilatata. Incisusæ certo situ leviter albo-micant. Nervi

flavi. Pedes in ♂ rufi, coxis femoribusque ultra medium indeterminate, nigris; in ♀ nigri, femoribus in primis posticis apice, tibiis omnibus, tarsorumque posticorum articulis 2 basalibus, rufis. Genitale maris ferruginem. Epistoma in ♂ & ♀ ad angulum inferiorem oculorum setis nullis.

Var. b. ♂♀. macula humerali & altera ad scutellum rufis. Ostrogothia. — Variant etiam ♂♀ tarsis apice obscuris.

*Obs.* Marem hujus speciei in copula cum femina *Echin. grossæ* junctum semel observavi. — Teste D. Siebold unica femina circiter 20,000 larvas parere valet.

4. *E. Virgo*: nigra, nitida, epistomate flavide albido, ad latera nudo; fronte grisea, vitta media, antennarum articulis 1 & 2, callo humerali, scutello pedibusque totis, rufo-ferrugineis; palpis alarumque basi flavis, squamis albis; abdomine pellucido-testaceo, vitta dorsali modice lata, nigra. ♀. (Long. 4 lin.).

Macq. Buff. 2. 73. 9. *Tachina* Meig. Dipt. 4. 243. 6. ♀. *Tach. fera* var.  $\beta$ . Fall. Muse. 4. *Musca fera* Panz. Fn. 20. 18. videtur.

Hab. in Suecia meridionali, 30 Aug.—15 Sept., passim; scilicet in Scania circa Lund, ad Abusa & Fogelsång, 9 specimina inveni.

♀. A priori, cui simillima, tantum pedibus totis, præter coxas & trochanteres nigra, rufo-ferrugineis differt. Antennarum articulus 2:us forte etiam nonnihil brevior est quam in *E. fera*. Frons obscure grisea. Antennarum articulus ultimus medioeris, rotundato-subquadratus, nigro-fusens 1. saepe rufus, & tunc parum ab *Echin. ruficorni* Meig. Dipt. 7. 183. 9. abludere videtur. Thorax in fundo niger, levissime cinereo-nicans; dorso obsolete nigro-lineatus, scapulis & lateribus usque ad scutellum rufus, pleuris rufomaculatis. Abdomen rufo-testaceum, vittis nigris: dorsali mediocri, subangulata, ad summum anum non extensa;

ventrali angusta. Segmenta ultima in illæsis albo-micant. Alæ cinereo-hyalinæ, basi flavæ, nervis, longitudinali 4:to ab angulo ad apicem, & transverso ordinario flexo, fuscis. Epistoma ad angulum oculorum inferiorem nudum h. e. absque pubescentia & setis.

5. *E. magnicornis*: nigra, nitida, epistomate albidu-  
do, ad latera nudo; fronte grisea, vitta media, anten-  
narum articulis 1 & 2, scutello, tibiis tarsorumque basi,  
obscure ferrugineis; palpis alarumque basi flavis, squa-  
mis albis, antennarum articulo ultimo magno, cuneiformi,  
pedibusque, atris; abdomine pellucido-testaceo, vitta dor-  
sali modice lata, nigra. ♂♀. (Long. 4—5 lin.).

*Tach. fera* variet. Fall. Muscid. 4.

Hab. in floribus pratensibus præsertim Sueciæ mediae,  
2 Jul.—2 Aug., passim; in copula; seilicet in Ostrogothia  
ad Wadstena, Omberg &c., haud rara; in Gotlandia ad  
Gothem, Rohne, Storugns, Fårön &c., frequens. (Sub  
 nomine: "Tach. Virgo ut videtur" e Glogavia a D. Zeller  
mas communicalus).

♂♀. Duabus proxime præcedentibus valde affinis & similis,  
sed interdum nonnihil major, & differt: ab *E. fera* femo-  
ribus fere totis tarsorumque apice late, nigris, & oculis in  
♂ latius remotis, ab *E. Virgo* pedum colore, & ab utraque  
epistomate margaritaceo, nec flavidio, antennarum articulo  
ultimo (præsertim in ♂) multo majore, cuneiformi seu ex-  
trorsum distincte dilatato, toto atro, articulo 2:do setæ  
paullo longiore, ut & antennarum articulis basalibus, scu-  
tello tibiisque obscurius ferrugineis, fere piceis. Similis  
etiam *E. argentifronti* Macq. Buff. 2. 73. 7. ♂. seu *E. ar-  
gentifera*. Meig. Dipt. 7. 184. 15. ♂, sed antennarum setæ  
articulo 2:do 1:mo longiori, nec æque longo, thorace nigro,  
nec cœruleo-nigro, scapulis nigricantibus, nec ferrugineis,  
distincta videtur. Epistoma ad oculorum angulum inferio-

reni pilis aliquot parvis obscuris vestitum, sed setis 2 l. 3 nullis. Frons in utroque sexu 4-fariam- (nec ut in ♂ *E. feræ bifariam-*) setosa. Thorax niger, leviter cinereo-micans, lineis obscuris. Scapulae raro subferrugineæ. Scutellum plerumque obscure ferrugineum, saltem apice. Abdominis vitta dorsalis nigra subangulata, in basi segmenti 1:mi, & apice ultimi paullo dilatata ad anum extensa, relictio tantum marginæ summo segmenti 4:ti flavo. Segmenta ultima lateribus albo-micant. Genitale masculum obscurum aut ferrugineum. Alæ ut in *E. Virgo*. Tarsi intermedii articulo 1:mo, postici articulis 1, 2, 3 basalibus, rufi.

6. *E. tessellata*: nigra, nitida, epistomate argenteo, ad latera 2- l. 3-setoso; fronte cana, vitta grisea; anten-nis pedibusque atris; scutello tibiisque rufescentibus; palpis flavis; alis basi subfuscis; squamis albis; abdome pellucido-testaceo, vitta dorsali modice lata, nigra. ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

Maeq. Buff. 2. 73. 10? *Tachina* Fabr. Antl. 309. 5. Meig. Dipl. 4. 242. ♂♀. *Tach. fera* var. γ. Fall. Museid. pag. 4. Forte etiam *Echin. nigricornis* Meig. Dipt. 7. 182. 8. ♂♀.

Hab. in campis aridis & collibus arenosis, 15 Jun. —30 Aug., per Scandinaviam temperatam, vulgaris; saepè in copula deprehensa; scilicet in Scania ubique frequens, præsertim in campis arenosis ad Silfakra copiose; in Smolandia; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Omberg, sed imprimis in Wadstena-löt valde frequens; in Ölandia pass.; in Gotlandia ad Hafdhem &c., non rara; in Dania Maj. Jun., D. Stæger.

♂♀. A proxime præcedentibus mox differt præter alias notas antennis nigris, & setis 2 l. 3 atris in latere utrinque epistomatis juxta angulum inferioris oculorum. Epistoma argenteum, vix rubenti micans. Frons in utroque sexu lata, 4

fariam setosa. Antennæ totæ nigræ, articulo ultimo modice magno, suboblongo-quadrato, setæ artiente 2:do 1:mo parum breviore. Thorax cinereo-micans, lineis nigris. Abdominis vitta dorsalis nigra angulata, in 1:mo segmento dilatata, segmentum ultimum fere totum & supra & subtus ocellans; pone incisuras albo-micans. Segmentum 4:um lateribus etiam albo-micans. Linea ventralis nigra parum perspicua. Genitale maris nigrum. Alæ subfuseo-hyalinæ, nervis basi fuseo-flavescens. Pedes nigri, tibiis posticis piccis. Ungues fuscus. Pulvilli albidi.

7. *E. ferina*: nigra, nitida, epistomate argenteo, ad latera bisetoso; fronte fusca, vitta media rufescens; antennis ferrugineis, articulo ultimo modice magno, rotundato-quadrato, atro; palpis flavis; alis basi fuscis; squamis albis; pedibus nigris; abdomine pellucido-testaceo, vitta dorsali modice lata, nigra. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Wahlb. in litteris 1812. ♀.

Hab. in Suecia media rarius; mares duos in Gotlandia ad Hoburg & Thorsborg 6—14 Jul. 1811 inveni; feminam e Gusum Ostrogothiæ a D. Wahlberg missam obtinui.

♂♀. Simillima priori, antennis basi rufis & fronte in ♂ angustiore præcipue distincta. Ab *E. fera*, eni quoque similis, pedibus totis nigris & epistomate ad angulum oculorum inferiorem setis 2 nigris, facile dignota. Caput ut in *tessellata*, fronte antice multo minus prominente posterius obscura; antennarum articulo ultimo quoque forte paullo breviore. Scutellum interdum picuum. Alarmus nervus transversus ordinarius fere rectus. Tibiæ posticæ in ♂ piccae, an semper?

*Obs.* An hæc ant præcedens sit *Tach. tessellata* Fabr. genina pro certo dicere non possum.

B. Palpi clavati, extra os breviter exserti. *Fabricia* Rob. Desv.

8. *E. ferox*: nigra, nitida, epistomate albido, ad latera nudo; fronte flavo-cinerasecente, vitta rufescente; antennis pedibusque nigris; palpis alarumque basi flavi-cantibus; squamis albescentibus; abdome pellucido-testaceo, vitta dorsali angulata, nigra. ♀. (Long.  $4\frac{1}{2}$  lin. & ultra).

Macq. Buff. 2. 75. 17. *Tachina* Panz. Fn. Germ. 101. 20. Meig. Dipt. 4. 240. 2. ♂♀.

Hab. in Suecia rarissime; in Ostrogothia ad Lärketorp semel inveni, ad Gusum, D. *Wahlberg*, qui in floribus Succissæ eandem ad Holmiam etiam legit.

♀. Similis *E. magnicorni*, capite subflavido, antennis nigris, palpis clavatis &c. distincta. Robusta. Caput flavo-albidum, epistomate ad latera inermi. Antennæ nigræ, articulo 2:do apice superne puneto rufo, ultimo sat magno cuneatim sub-quadrato. Scutellum picenum. Abdomen pellucido-testaceum, segmentis 1, 2, 3 macula sat magua, trigona, nigra, 4:to & supra & subtus fere toto nigro, macula utrinque basali testacea. Alæ fusco-hyalinæ, basi pallidæ, nervo transverso ordinario subrecto. Squamæ albido-flavæ. Pedes nigri, tibiis postieis obscure ferrugineis.

*Obs.* In mare abdominis vitta dorsalis in segmento 3:tio abbreviato.

---

## 108. TACHINA Meig.

*Corpus* magnuni, medium aut parvum, oblongo-ovatum, pubescens & setosum. Antennæ fronti plerumque prominenti insertæ, deflexæ aut incumbentes, articulo ultimo saepius elongato, basi seta dorsali saepissime nuda, bi- l. triarticu-

lata, recta. Caput non buccatum, vibrissis faciei saepe, & mystacibus oris semper, distinctis. Oris margo anticus saepe subreflexus. Palpi filiformes. Oculi ovati, obscurè ferruginei, in utroque sexu saepissime distantes (in *T. atrata* & quibusdam affinibus oculi maris cohaerentes). Ocelli 3 in vertice. Setæ frontales infra antennas saepissime descendentes. Thorax sutura transversa. Abdomen plerumque ovato-conicum, segmentis 4 praeter ultimum retractum; rigide setosum. Anus non cundatus. Alæ divaricatae. Nervus long. 4:tus angulatim, raro arenatim flexus, cum nervo 3:to recto aut in apice aut ante apicem alæ in costa connivens. Nervi transversi normaliter ut in *Echinomyia*. Segmenta costæ fere quoque ut in illa. Squamæ & halteres ut in *Echinomyia*. Pedes etiam ut in illa; plerumque nigri. Color nigricans, einnerseens, raro viridis. Motu agilissima, valde inquieta. Habitatio in floribus, foliis fruticum & graminosis. Media æstate l. versus finem, imagines praesertim vigent. Feminæ saepe viviparæ. Larvæ in larvis aliorum insectorum, præprimis Lepidopterorum, vivunt. Hinc *Tachinæ* in oeconomia naturæ utiles, larvarum nocentium multiplicationem moderantes. Pupæ oblongæ, cylindricæ, nudæ, inermes, obscure ferrugineæ. Discrimen sexus varium; mas: aut oculis interdum approximatis & fronte utrinque simplici serie setosa, aut semper uno obtusiore, hamulis 2 cornis inflexis, & pulvillis intra unges majoribus longioribus, albidis, a femina oculis semper remotis, fronte postice utrinque duplii serie setosa, vagina anali brevi articulata, saepe retracta, digneatur.

E speciebus ab una in alteram per leviores gradus saepe transientibus (cfr. ex. gr. *T. elegantula*, 13, *spathulata*, 21, *Goniæoides*, 60, & 94, 129, 138, &c.) vix nisi genera notis vacillantibus exstructa & multis exceptionibus obnoxia, proponere potuissem. Numerosæ igitur *Tachinarum* gentis examen (quando quæstio fuit describere Diptera Scandinaviæ, nam inter Exotica specierum formæ & plures & magis evolutæ & determinatæ exstant) per Subdivisiones artificiales æque facile ac per carum in genera vaga distributio-

nem \*), me reddere posse credidi. Interea indicem sequentem harum Subdivisionum loco generum sæpe dubiorum allegare hand inutile duxi.

*Sect. 1:ma.* Nigricantes l. cinerascentes, rarissime flavicantes.

*Subd. I.* Seta antennarum nuda (in *T. collaris* 68, & *stulta* 106, subtilissime microscopice puberula).

*Phalanx 1:a.* Oculi nudi, in utroque sexu sæpissime distantes (in ♂ *T. nigrisquamæ* 62, cohærentes).

\*) Si methodus Meigeniana (in Suppl. P. 7), generibus *Tachinariarum* abundans, cuidam magis arrideret, is Conspectum ejusdem ad nostras quoque *Tachinæ* species accommadatæ heic habeat:

*I. Antennarum articulus ultimus longitudine 2:di aut illo parum longior.*

a.) *Oculi nudi.*

\*) *Alarum cellula (area) media apice aperta.*

*Tachina:* *Lavarum* 3. *sannio* 9. *pilitarsis?* 10. *devia* 12. *vilis?* 22. *plebeja* 24. *Soror* 25. *futilis* 26. *albisquama* 27. *sordidisquama* 28. *tibialis* 51. *nigripes* 52. *mutabilis* 53. *discolor* 54. *incana* 55. *incurva* 56. *scutellifera* 57. *albinervis* 58. *spathulæcornis* 59. *nigrisquama* 62. *bisignata* 147. *circumflexa* 173. *pubicornis* 174. *cingulata* 177.

*Plagia:* *ruralis* 4. *ambigua* 5. *currinervis* 6. *ruficornis* 7. *interrupta* 8. *trepida* 14. *sübcincta* 15. *marginata* 76. *cuneicornis* 77. *ruricola* 90.

*Uromyia?: hirticornis* 175.

*Medoria:* *pullula* 176. *funesta* 178.

*Clytia:* *pellucens* 81. *continua* 82. *rotundiventris* 83.

**Cohors 4.** Nervus alarum long. 4:us subfurcatus, infra angulum subrectum saltem apparenter continuatus; ab angulo tamen ramus alter sursum leviter arcuatim flectitur versus costam, ibique cum nervo costali & interdum etiam cum longitudinali 3:tio paullo ante apicem alæ connectitur.

---

\*\*). *Alarum cellula occlusa* (*h. e. nervulus transversus apicalis intra apicem alæ cum nervo longitud. 3:tio conjunctus*).

**Gymnosoma** &c. *vide nostrum genus* 116 &c.

**Peteina:** *Erinaceus* 75.

**Clista?:** *lugubrina* 78.

b.) *Oculi hirti.* (*Facies non vibrissata*).

\*) *Alarum cellula media aperta.*

**Chrysocoma:** *viridis* 193. *aurata* 194.

**Micropalpus:** *vulpinus* 84. *comitus* (*nec comptus*) 91. *haemorrhoidalis* 92. *fulgens* 93.

**Nemorea:** *grandis?* 85. *truncata* 86. *Nemorum* 87. *Puparum* 95. *pellucida* 96. *rudis* 97. *strenua* 98. *vivida* 99. *consobrina* 100. *4-pustulata* 101. *rubricornis* 102. *Radicum* 109. *intermedia* 110. *cæsia* 111. *connivens* 112. *protuberans* 113. *fumata* 114. *diligens?* (*an Exorista?*) 120. *strigifrons* 134. *breviseta* 135. *floralis* 148.

**Erebia:** *tremula* 152.

**Macquartia:** *dispar* 136. *rotundicornis* 156. *lucida* 179. *cru-cigera* 180. *ciliaris* 181. *chalconata* 182. *uitida* 183. *atrata* 184. *chalybeata* 185. *nigrita* 186. *grisea* 187. *prolixa* 188. *angulicornis* 189.

\*\*) *Alarum cellula media occlusa.*

**Panzeria:** *lateralis* 192.

**II.** *Antennarum articulus ultimus* 2:do duplo & ultra longior.

A. Palpi, saltem apice, flavi, l. testacei, l. ferruginei, l. fusi.

a.) Carinæ faciales vibrissis distinctis saltem ad dimidium epistomatis assurgentibus instructæ.

---

a.) *Oculi nudi*.

\*) *Alarum cellula media aperta*.

†) *Facies absque vibrissis lateralibus*.

**Miltogramma: agrestis** 11. (*Reliquæ Meigenianæ species Miltogrammæ etiam apud nos sub proprio genere militant*).

**Myobia: aurea** 170. *inanis* 171. *nigritarsis?* 172.

**Hypostenia: cylindracea** 61.

**Masicera: elegantula?** 13. *silvatica* 23. *geniculata* 30. *furi-bunda* 31. *scutellata* 32. *flavo-scutellata* 33. *vali-dicornis* 34. *cinerea* 35. *usta* 36. *pallipes* 49. *festi-nans?* (*rectius ad Exoristam*) 129.

**Thryptocera: pilipennis** 37. *crassicornis* 38. *Infantula* 39. *versicolor* 40. *rufina* 41. *zonella* 63. *minutis-sima* 64.

**Illigeria: goniæoides** 60.

++) *Facies vibrissis lateralibus instructa*.

**Metopia: leucocephala** 16. *argyrocephala* 17. *campestris* 18. *amabilis* 19. *tinctoria* 20.

**Degereria: letabilis** 42. *muscaria* 45. *hystrix* 46. *albo-cingu-lata* 47. *laticornis* 66. *ornata* 67. *collaris* 68. *blan-da* 69. *convexifrons* 70. *albicincta* 71. *semicincta* 72.

**Fabricia: fasciata?** 1. *flavescens?* 2. *pacta* 29.

\*\*) *Alarum cellula media occlusa*. (*Facies vibrissata*).

**Baumhaueria: vertiginosa** 43. *scutellaris* 44.

*1 fasciata. 2 flavescens.*

b.) Carinæ faciales aut nudæ, aut vibrissis tantum paucis l. spuriis inferne instructæ. (*T. imber-*

---

*Scopolia: spathulata?* 21. *ocypterata* 48. *morio?* 73. *ocyp-terina?* 74.

\*\*\*) *Alarum nervus transversus apicalis deest.*

*Roeselia: antiqua* 50. *nigrina* 65. *Lamia* 80.

b.) *Oculi hirti.*

\*) *Cellula media aperta.*

†) *Facies vibrissis nullis.*

*Exorista: Pavoniae?* 88. *maculipennis* 89. *affinis* 103. *Bohemanni* 104. *demens* 105. *stulta* 106. *ruficauda* 107. *dubia* 108. *linearicornis* 115. *fimbriata* 116. *Wester-manni* 117. *cornuta* 118. *spernenda* 119. *præter-visa* 120. *excisa* 127. *excavata* 128. *festinans?* 129. *argentifera* 130. *bicingulata* 131. *albicans* 132. *perturbans* 133. *vulgaris* 137. *confinis* 138. *magni-cornis* 139. *genarum* 140. *rotundaticornis* 141. *straminifrons* 142. *duplinervis* 143. *hyalipeennis* 144. *tricingulata* 145. *vittata* 161. *ambulans* 162. *fulva* 163. *libatrix* 164. *aretica* 190. *hyalinata* 191.

*Harrisia: ænea* 153. *crassitarsis* 154. *simplicitarsis* 155.

††) *Facies vibrissis instructa.*

*Phorocera: obliquata?* 94. *assimilis* 122. *obscura* 123. *lata* 124. *inepta* 125. *pumicata* 126. *confinis?* (potius *Exorista*) 138. *pantherina* 159. *mundula* 160. *squamosa* 166. *unicolor* 169.

*Doria: mobilis* 167. *trizonata* 168.

\*\*) *Cellula media ocelusa.*

*Tryphera: umbrinervis* 146. *interruptella* 149. *grossicornis* 150. *amplicornis* 151.

*Fallenia: longicornis* 157. *pectinata?* 158. *vibrissata* 165.

*bis* Zett. Ins. Lapp. 636. 9. ♀. antenuis brevibus, seta breviuscula; seta mystacina utrinque unica, ad *Miltogrammæ* genus relata).

- 3 *Larvarum*. 4 *ruralis*. 5 *ambigua*. 6 *curvinervis*.  
7 *ruficornis*. 8 *interrupta*. 9 *sannio*. 10 *pilitarsis*.

B.) Palpi nigri (in *T. elegantula* 13, & *muscaria* 45, obscure flavi).

\* Facies vibrissis nullis aut spuriis.

†. Alarum nervi inermes (in *T. devia* 12, nervus longitudinalis 3:tius basi setulosus). Frons ante oculos longe porrecta. — Species quasdam *Tachinæ* olim subjectas mystacibus paucis, & antennis setaque breviusculis instructas jam ad *Miltogrammam* ob magnam affinitatem retuli.

- 11 *agrestis*. 12 *devia*. 13 *elegantula*.

††. Alarum nervus longitud. 3:tius ultra medium setulosus. *Plagia* Meig.

- 14 *trepida*. 15 *subcincta*.

\*\* Facies vibrissis distinctis. Frons plerumque porrecta. Alarum nervus longitudinalis 3:tius basi setulosus. *Metopia* Meig.

- 16 *leucocephala*. 17 *argyrocephala*. 18 *campestris*.

- 19 *amabilis*. 20 *tincta*. 21 *spathulata*. 22 *vilis*.

Cohors 2. Nervus alar. longitud. 4:tius infra angulum obtusum non continuatus, in costa propius ad apicem plerumque exurrit. (*T. ambigua* & *interrupta* nervo 4:to vix 1. parum infra angulum continuato in Cohorte 1:ma sub n:o 5 & 8 quærendæ).

*Tribus* 1:ma. Antennæ longitudine epistomatis aut illo paullo breviores. Abdomen oblongum, cylindricum aut conicum.

A. Palpi flavi (*T. cylindracea* 61, *setipennis* 79, & *Lamia* 80, palpis luteis aut obscuris infra inveniendæ).

*Manipulus 1:mus.* Vibrissæ nullæ aut spuriæ.

a. pedibus aut totis aut maxima ex parte nigris.

23 *silvatica*. 24 *plebeja*. 25 *Soror*. 26 *futilis*. 27 *albisquama*. 28 *sordidisquama*. 29 *pacta*. 30 *geniculata*. 31 *furibunda*. 32 *scutellata*. 33 *flavo-scutellata*. 34 *validicornis*. 35 *cinerea*. 36 *usta*. 37 *pilipennis*. 38 *crassicornis*. 39 *Infantula*.

β. pedibus rufo-flavis. *Thryptocera* Meig.

10 *versicolor*. 41 *rufina*.

*Manipulus 2:dus.* Vibrissæ distinctæ (interdum vero tantum in medium epistomatis adscendentibus).

\*). Pedes nigri. *Degeeria* & *Baumhaueria* Meig.

12 *lætabilis*. 43 *vertiginosa*. 44 *scutellaris*. 45 *muscaria*. 46 *hystrix*. 47 *albo-cingulata*. 48 *ocypterata*.

\*\*). Pedes flavi.

a.) Nervus transversus apicalis adest. *Masicera* Meig.

19 *pallipes*.

b.) Nervus transversus apicalis deest. *Roeselia* Meig.

50 *antiqua*.

B. Palpi nigri l. nigricantes (in individuis quibusdam *T. setipennis* 79, obscure lutei).

*Decas 1:ma.* Alarum nervi inermes. (Nervus tantum longitudinalis 3:tius basi setulis 2—4).

†. Facies vibrissis nullis 1. spuriis.

\*) alarum nervo transverso apicali præsentem.

- 51 *tibialis*. 52 *nigripes*. 53 *mutabilis*. 54 *discolor*.  
 55 *incana*. 56 *incurva*. 57 *scutelligera*. 58 *albinervis*.  
 59 *spathulæcornis*. 60 *Goniæoides*. 61 *cylindracea*.  
 62 *nigrisquama*. 63 *zonella*. 64 *minutissima*.

\*\*) alarum nervo transv. apicali deficiente. *Rœselia*. Meig.

65 *nigrina*.

††. Facies vibrissis distinctis. *Degeeria* Meig.

- 66 *laticornis*. 67 *ornata*. 68 *collaris*. 69 *blanda*. 70  
*convexifrons*. 71 *albicincta*. 72 *semicincta*. 73 *morio*.  
 74 *ocypterina*.

*Decas 2:da.* Alarum nervi longitudinales: aut solum 3:tius,  
 aut 1:mus 3:tiusque, aut denique 1:mus, 3:tius 5:tusque,  
 setulosi.

a. Alæ nervis longitudinalibus: 3:tiio, aut 1:mo  
 3:lioque, setulosis. *Peteina*, & *Plagiæ* spe-  
 cies Meig.

- 75 *Erinaceus*. 76 *marginata*. 77 *cuneicornis*. 78 *lu-  
 gubrina*.

b. Alæ nervis longitudinalibus 1, 3, 5 setulosis.

\*) Nervus transversus apicalis completus. *Thryp-  
 tocera* Meig.

79 *setipennis*.

\*\*) Nervus transversns apicalis deficiens. *Ræselia* Meig.

80 *Lamia*.

*Tribus 2:da.* Antennæ epistomate fere dimidio breviores. Abdomen rotundatum. Vibrissæ nullæ. Alæ inermes. Area plerumque aperta in apice alæ terminata. Minores. *Clytia* Meig.

81 *pellucens*. 82 *continua*. 83 *rotundiventris*.

*Phalanx 2:da.* Oculi hirti (in *T. festinante* 129, *bisignata* 117, & *rotundicorni* 156, fere nudi).

*Cohors. 1.* Alarum nervi: longitudinalis 4:tus angulatim flexus & infra angulum saltem apparerter plus minus longe continuatus; ab angulo vero ramus alter sursum ad costam curvatim fleetitur; transversus ordinarius paullo curvatus. Alæ inermes præter nervum longitudinalem 3:tium basi setulis 3—6 instructum. Area apicalis aperta ante apicem alæ in costa educta. Frons prominens. Corpus ovatum plerumque sat magnum. (*T. pellucida* & *intermedia* nervo long. 4:to infra angulum subcontinuato in *Cohorte 2:da* sub no 96 & 110 quærendæ).

A. femoribus rufis. *Micropalpus* Meig.

84 *vulpina*.

B. femoribus nigris.

a.) Facies vibrissis nullis.

\* Palpi flavi (in individuis quibusdam *T. truncatæ* 86, obscuri). *Nemoreæ* & *Exoristæ* species Meig.

85 *grandis*. 86 *truncata*. 87 *Nemorum*. 88 *Pavoniæ*.  
89 *maculipennis*. 90 *ruricola*.

\*\* Palpi nigri, parvi l. minuti, retracti. Nervus transversus ordinar. prope ad angulum nervi long. 4:ti insertus. Antennarum seta 3-articulata. *Micropalpus* Meig.

91 *comta*. 92 *haemorrhoidalis*. 93 *fulgens*.

β.) Facies vibrissata.

94 *obliquata*.

*Cohors 2.* Alarum nervi longitudinales; 4:tus angulatior aut raro arcuatim flexus, infra angulum non continuatus (in *T. pellucida* 96, & *intermedia* 110, brevissime subcontinuatus); 3:tius basi setulis 3—6 (in *T. grossicorni* 150, & *amplicorni* 151, setulis circiter 8).

*Trib. 1:ma.* Nervus long. 4:tus angulatus & ab angulo ad costam curvatus seu sursum plus minus fexus \*) (in *T. fumata* 114, subrectus). Majores pleræque. Ovatae.

A. Vibrissæ nullæ (in *T. stulta* 106, *dubia* 108, &c., inferne spuriæ).

†. Palpi flavi (in individuis quibusdam *T. dubiæ*, nigri).

\* Antennarum articulus ultimus 2:do ad summum duplo longior. *Nemorea* Meig.

95 *Puparum*. 96 *pellucida*. 97 *rudis*. 98 *strenua*. 99 *vivida*. 100 *consobrina*. 101 *4-pustata*. 102 *rubricornis*.

\*\* Antennarum articulus ultimus 2:do saltem duplo, saepè triplo & ultra longior. *Exorista* Meig.

\*) curvatura hæc a Clar. Meigen "nervus transversus apicalis" dicitur.

**103 affinis.** **104 Bohemanni.** **105 demens.** **106 stulta.**  
**107 ruficauda.** **108 dubia.**

††. Palpi nigri (individua *T. dubiae* palpis flavis  
 vide sub n:o 108).

a. Antennæ breviusculæ, articulo ultimo 2:do  
 vix duplo longiore. Magnæ. *Nemorea* Meig.

**109 Radicum.** **110 intermedia.** **111 cæsia.** **112 con-**  
**nivens.** **113 protuberans.** **114 fumata.**

b. Antennæ elongatæ, articulo ultimo 2:do triplo  
 & ultra longiore. Nervus transversus apica-  
 lis parum curvus. Mediae l. minores. *Exo-*  
*rista* Meig.

**115 linearicornis.** **116 fimbriata.** **117 Westermanni.**  
**118 cornuta.** **119 spernenda.** **120 diligens.** **121 præ-**  
**tervisa.**

B. Vibrissæ distinctæ. Alarum area media aperta,  
 mox ante apicem (in *T. inepta* 125, in ipso  
 apice) alæ terminata. *Phorocera* Meig.

\*.) Palpi flavi.

**122 assimilis.** **123 obscura.** **124 lata.** **125 inepta.**

\*\*) Palpi nigri.

**126 pumicata.**

*Trib. 2:da.* Nervus 4:tus angulatim flexus & ab  
 angulo ad costam rectus (in *T. umbrinervi* 116, & *lu-*  
*cida* 179, subcurvus).

α.) Vibrissæ nullæ aut tantum spuriae (in *T. vulgari* 137, tenuibus interdum fere ad medium  
 epistomatis assurgentibus).

*Decas 1:ma.* Palpi flavi (in *T. bicinctata* 131, nigri, summo apice flavi).

†. Antennæ elongatae. *Exorista* Meig.

127 *excisa*. 128 *excavata*. 129 *festinans*. 130 *argentifera*. 131 *bicinctata*. 132 *albicans*. 133 *perturbans*.

†‡. Antennæ breviusculæ. *Nemoreæ & Macquartiae* species Meig.

134 *strigifrons*. 135 *breviseta*. 136 *dispar*.

*Decas 2:da.* Palpi nigri (in ♀ *T. floralis* 118, flavi).

\*) Antennæ elongatae; validæ aut angustæ.

a. Scutellum l. totum l. apice rufum. Color corporis saepe cinerascens. *Exorista* Meig.

137 *vulgaris*. 138 *confinis*. 139 *magnicornis*. 140 *genarum*. 141 *rotundaticornis*. 142 *straminifrons*.

b. Scutellum concolor (totum nigrum aut cinerascens).

143 *duplinervis*. 144 *hyalipennis*. 145 *tricinctata*.

146 *umbrinervis*. 147 *bisignata*. 148 *floralis*. 149 *interruptella*. 150 *grossicornis*. 151 *amplicornis*. 152 *tremula*. 153 *aenea*. 154 *crassitarsis*. 155 *simplicitarsis*.

\*\*) Antennæ breves. *Macquartia* Meig.

156 *rotundicornis*.

β.) Vibrissæ distinctæ (in *T. villica* 161, *ambulante* 162, & *fulva* 163, abbreviatæ).

\*) Palpi flavi (in ♂ *T. longicornis* obseuri).

157 *longicornis*. 158 *pectinata*. 159 *pantherina*. 160 *muudula*. 161 *villica*. 162 *ambulans*. 163 *fulva*. 164 *libatrix*.

\*\* Palpi nigri.

165 *vibrissata*. 166 *squamosa*. 167 *nobilis*. 168 *trizonata*. 169 *unicolor*.

*Sub d. II.* Seta antennarum breviter, saepe tantum microscopice, pubescens.

*Cohors 1:ma.* Oculi nudi. Vibrissæ nullæ & tantum inferne paucæ, spuriæ.

A. Palpi flavi (in *T. inani* 171, apice obscuri).

\* Pedes flavi. *Myobia* Meig.

170 *aurea*. 171 *inanis*. 172 *nigritarsis*.

\*\*) Pedes nigri.

173 *circumflexa*. 174 *pubicornis*. 175 *hirticornis*. 176 *pullula*.

B. Palpi nigri (in *T. cingulata* fusci).

177 *cingulata*. 178 *funesta*.

*Cohors. 2:da.* Oculi hirti (in semiuis *T. atrata* 181, *chalybeata* 185, & *nigrata* 186, subnudi).

*Tribus 1:ma.* Palpi flavi. *Macquartia* Meig.

179 *lucida*. 180 *crucigera*. 181 *ciliaris*. 182 *chalconata*.

*Tribus 2:da.* Palpi nigri.

A. Alarum area ultima aperta.

a.) Area in summō apice l. mox ante apicem alae terminata.

†. Nigræ, nitidæ. *Macquartia* Meig.

183 *nitida*. 184 *atrata*. 185 *chalybeata*. 186 *nigrata*.

††. Cinerascentes, opacæ. *Macquartiae & Exoristæ* species Meig.

187 *grisea*. 188 *prolixa*. 189 *angulicornis* 190 *arctica*.

b.) Area paullo ante apicem alæ terminata.  
*Exorista* Meig.

191 *hyalinata*.

B. Alarum area ultima occlusa, subpetiolata  
*Panzeria* Meig.

192 *lateralis*.

*Sect. 2:da. Aureo-virides. Chrysocoma* Meig.

193 *viridis*. 194 *aurata*.

*Obs.* Reliquæ Fallenianæ *Tachinarum* species in hoc conspectu non allatæ, in generibus sequentibus apud nos inveniendæ; nempe:

*T. ruficeps* Fall. Musc. spec. 3, *capitata* 18, & *hebes* 19, in *Gonia*; *T. cylindrica* 13, *conica* 14, *minuta* 15, *astracea* 17, in *Miltogramma*; ♂

*T. curvicanda* 33, in *Phania*.

1. *T. fasciata*: nigra, capite, thoracis vittis 5 anticeis, abdominisque fasciis 3, albo-micantibus; scutello rufescente; antennis subtus subarcuatis. ♂♀. (Long. 4½—5 lin.).

*Mas*: frons modice lata, serie setarum utrinque simplici, per setas 5—6 infra antennarum basin descendente; tarsorum articulus ultimus longe setosus;

*Fem.*: frons paullo latior, serie setarum utrinque duplicei, per setas 4 infra antennarum basin descendente; tarsorum articulus ultimus antecedentibus non longius setosus.

Fall. Muscid. 5. 4. ♂♀. genuina. — Vix Meig. Dipt.

7. 191. 3 eadem, nam ea "frontem flavam & palpos nigros" habet. — Sub *Musca puparum* Fabr. Antl. 299, 80. forte latet.

Hab. in Suecia meridionali tempore vernali rarius; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd, Högestad &c.; in Ölandia, D. *Bohemann*. — E larva *Bombycis (Arctiæ) Cajæ* 6 larvas *T. fasciata* virentes d. 12 April. 1823 egredientes vidi, quas statim in pupas mulatas & d. 20 Maj. ejusdem anni ut imagines utriusque sexus declaratas observavi.

$\delta\varphi$ . Magna, ovata, nigra. Caput albo-canum, fronte vix l. parum pallidissime flavescente, vitta media nigra. Antennæ non omnino longitudine epistomatis, nigræ, articulo 2:do apice puncto rufo, ultimo præsertim infra subdilatato, seta articulis basalibus brevissimis. Vibrissæ tenues descendunt fere ad medium epistomatis, ubi setæ laterales descendunt. Palpi fusco-ferruginei, in uno specimine (cum reliquis e pupa excluso), fere nigricantes. Frons ante oculos sat magnos oblongos distincte porrecta. Occiput cinereo-villosum. Thorax cimereus, vittis 4 nigris, minus determinatis. Scutellum rufescens. Alæ hyalinæ. Nervus transv. ordinarius leviter flexus, apicahs leviter arcuatus. Area ultima ad costam anguste aperta. Spinula costæ ad exitum nervi auxiliaris parva. Squamæ albidae. Abdomen nigrum, fasciis 3 sat latis, canis, antieis lineola media nigra interdum interruptis. Segmenta: 1:um apice setis 2, 2:um apice setis 2, 3:um apice setis 8—12, 4:um postice setulis pluribus. Venter niger, segmentis basi macula cinerea. Pedes nigri, pilosi & spinulosi, pulvillis albis.

2. *T. flavescentis*: nigra, capite, thoraceis vittis 5 antieis, abdominisque fasciis 3, albido-micantibus; fronte flava; scutello rufescente; antennis linearibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 4—4½ lin.).

*Mas* & *Fem.* ut in priori differunt.

Meig. Dipt. 4. 294. 98?  $\delta\varphi$ . (exclus. Syn. Fall). — Macq. Bufl. 2. 141. 7.  $\delta\varphi$ .

Hab. in Scandinavia meridionali & media, rarius; scilicet in Scania ad Abusa rarissime; in Ostrogothia ad Lärketorp; in Dania ad Hafniam rar., D. *Dahlbom*. (E Glogavia uterque sexus a D. *Zeller* communicatus).

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed plerumque paullo minor, & anten-  
nis forte magis linearibus, fronte in  $\delta$  nonnihil angustiore,  
magis flavida, abdominisque conici lateribus in  $\delta$  sæpe ma-  
cula rufa, differt. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—4 ut  
in priori.

3. *T. Larvarum*: nigra, capite, thoracis vittis 5,  
abdominisque conici fasciis 3 subinterruptis, albo-mican-  
tibus; fronte porrecta flavida, vitta nigra; antennarum ar-  
ticulo ultimo 2:do vix dimidium longiore; vibrissis spuriis;  
alarum nervis subinermibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 2 fere 4 lin.).

Mas & Fem. ut in *T. fasciata*, n:o 1, differunt.

Meig. Dipt. 4. 295. 100.  $\delta\varphi$ . (exclus. syn. Fall. *T. ruralis*) & 7. 190. 19. — Macq. Buff. 2. 141. 8.  $\delta\varphi$ . Tab.  
11. fig. 15. non bona. — Zett. Ins. Lapp. 634. 2.  $\delta\varphi$ . —  
*Musca* Linn. Fn. 1839. Fabr. Antl. 300. 81. (sed scutelli  
apex in nostra numquam rufus). *Tach. rustica* Fall.  
Musc. 5. 5.  $\delta\varphi$ . certe.

Hab. larva in larvis Lepidopterorum, imago in flo-  
ribus Umbellatarum &c., per Scandinaviam, 29 Jun. —  
tota æstate — 14 Sept., ubique vulgatissima, multoties  
in copula capta; scilicet in Scania, Smolandia, Ostro-  
gothia, Ölandia, Gotllandia, Nericia, ubique frequentis-  
sima; in Dalecarliæ ad St. Tuna &c., passim; in provinciis  
magis borealibus rarius; in Dania frequens. (E Finlandia,  
D. *Sahlberg*; e Rixdorf & Moabite &c., prope Beroli-

num D. *Dahlbom*; e Glogavia, Reinerzi & Vienna D. *Zeller*).

$\delta\varphi$ . *Muscae domesticæ* habitu similis, plerumque longior, magnitudine mire varians. Valde similis priori, sed differt magnitudine minore, antennarum articulo ultimo paullo breviore quam 2:do vix dimidio longiore vibrissis paucioribus & abdominis setis aliter dispositis. Frons ante oculos distincte porrecta, in  $\delta$  præsertim flava, vitta media nigra. Palpi flavi. Vibrissæ spuriæ. Scutellum cinereum. Abdomen præsertim in  $\delta$  conicum in utroque sexu sparse setosum. Alæ hyalinæ. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—4. Spinula eostæ ad apieem nervi auxiliaris parva. Squamæ albidae. Pedes ut in prioribus.

Var. b.  $\delta$ . paullo major, abdominis lateribus in segmentis 2 & 3 ferrugineis. Ad Wadstena Ostr. eum v. a.

*Obs.* Individua pygmæa *T. Larvarum* sub nomine *Tach. extensa* olim inter Amicos meos entomologicos divulgavi.

4. *T. ruralis*: nigra, capite, thoracis vittis 3, abdominisque coniei fasciis 3 indeterminatis, albo-micantibus; fronte lata ante oculos parum porrecta, cinerea, vitta fusca; antennarum articulis 2 & 3 subæque longis; vibrissis spuriis; palpis apice flavis; alarum nervis longitudin. 1 & 3 setulosis, 4:to subrectangulatim flexo.  $\delta\varphi$ . (Long. 2 $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Mas.*: fronte lata; tarsorum articulo ultimo longe piloso;

*Fem.*: fronte adhuc paullo latiore; tarsorum articulo ultimo subnudo; in copula.

Fall. Act. Holm. 1810. p. 265. 6.  $\delta\varphi$ . genuina. Ejusdem Dipt. Suec. Muscid. 5. 6.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 631. 3.  $\delta\varphi$ . *Tach. verticalis* Meig. 4. 299. 105.  $\delta\varphi$ . Macq. Buff. 2. 143. 14.  $\delta$ . *Plagia verticalis* Meig. Dipt. 7. 201. 2. Tab. 68. f. 37.

*Hab.* in floribus & foliis fruticum, per Scandinaviam temperatam, 17 Jun.—30 Sept., vulgaris, saepe in copula

deprehensa; scilicet in Scania frequentissima; in Smolandia, Ostro- & Westrogothia, haud rara; in Ölandia 1835, D. *Bohemian*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania, D. *Staeger*. (Ad Zirkow in insula Rügen 6 Jun. 1842, D. *Dahlbom*. E Glogavia a D. *Zeller* missa).

♂♀. Subsimilis priori, sed fronte ante oculos parum porrecta, cana, nec flavida, paullo latiore, in utroque sexu serie dupli setarum rigidarum utrinque ornata, vitta media fusca l. rufescente, nec nigra, vibrissis spuriis adhuc tenuioribus, abdominis fasciis albomicantibus minus perspicuis, alarum nervis longitudinalibus 1 toto & 3 usque ad nervulum transversum medium setulosis, nt & nervo transverso ordinario magis obliquo, abunde differt. Oculi magni. Palpi apice flavi. Antennæ longitudine vix epistomatis argentei, articulo 2:do cinerascente, ultimo subcuneato, nigro, seta 3-articulata, artieulis basalibus brevissimis. Abdomen conicum, segmento 1 brevi, inermi, 2 apice plerumque bisetoso, 3 apice setis 8—12, & 4 multisetoso. Thorax cinerascens, lineis 4 nigris, vix nisi antice determinandis. Alæ hyalinæ absque spinula costæ. Nervulus transv. medius paullo ante apicem nervi long. 1:mi ductus. Squamæ albæ. — Series setarum frontalium per tantum 31.4 setas infra antennarum basin in utroque sexu descendunt. Supra antennarum radicem lunula albida. Antennarum articulus ultimus in ♂ paullo longior, quam in ♀.

5. *T. ambigua*: nigra, capite, thoracis vittis 5, abdominisque conici fasciis 3 indeterminatis, albo-micantibus; fronte lata ante oculos parum porrecta, cinerea, vitta fusca; antennarum articulis 2 & 3 subæque longis; vibrissis spuriis; palpis flavis; alarum nervis longitudinalib. 1 & 3 setulosis, 4:to obtusangulatim flexo. ♀. (Long. 2 lin.).

Fall. Act. Holm. 1810 p. 275. 26. ♀. Ejusdem Dipt. Suec. Muscid. 7. 10. ♀. ipsissima secundum specimen originarium.

Hab. in Suecia rarissime; in Scania ad Lund specimen unicum inveni.

♀. Simillima *T. rurali*, sed tamen magnitudine duplo minore, palpis totis flavis, & nervo longitudinali 4:to per angulum obtusum, nec rectum, flexo, haud furcato h. e. infra angulum vix continuato, at per ramulum alterum rectum in costam dueto, certe differt. Reliqua omnia, exaeque ut in priori. — A *T. ruricola* n:o 87, cui valde similis, oculis nudis mox differt.

*Obs.* *T. ambigua* Meig. Dipt. 4. 298. 103. serie setarum frontalium in epistomate fere ad antennarum apicem descendente & nervo tantum longitudinali 3:tio (nec quoque 1:mo) setuloso, instructa, alia est species, ad sequentem forte referenda.

6. *T. curvinervis*: nigricans, capite albo, fronte lata, ante oculos parum prominente cinerea, vitta fusca; thoracis vittis 5 indeterminatis, scutello, abdominalisque conici fasciis 3 latioribus, albidis; antennis nigris, articulo ultimo 2:do fusco duplo longiore; vibrissis vix ullis; palpis flavescensibus; alarum nervo longitud. 3:tio setuloso, transverso ordinario obliquo, recto, mox pone medium areæ inserto. ♂♀. (Long. circuit.  $2\frac{3}{4}$  lin.).

*T. ambigua*: Meig. Dipt. 4. 298. 103? ♂♀ (exclus. syn. Fall.). *Plagia* Meig. Dipt. 7. 201. 1?

Hab. in Suecia rarius; in Scania ad Lund 15 Jun. 1843, D. von Borck; in Gotlandia & ad Holmiam. D. Wahlberg; in Dalecarlia 1836, D. Boheman; mibi viva semel tantum in Ostrogothia obvia. (E Glogavia a D. Zeller sine synon. inissa).

$\delta\varphi$ . *T. rurali* affinis & similis, sed plerumque paullo minor, & antennarum articulo ultimo saltem in  $\delta$  longiore, vibrissis nullis, ut & alarum tantum nervo long. 3:io (nec simul 1:mo) ultra nervulum transvers. medium setuloso, distincta. Frons lata, cinerea, vitta media lata, grisea, opaca, antice puncto supra antennas albido. Setae frontales validæ superne quadrifariam dispositæ, in medium epistomatis utrinque per simplicem seriem descendunt. Antennarum articulus 2:dus subcinerascens l. piceus, duplo brevior ( $\delta$ ) ultimo nigro, linearis. Seta vix ad medium incrassata, apice sat longe capillari, articulis basalibus 2? brevissimis (ant. tantum uno?). Thorax cinerascens, lineolis 4 nigris, parum determinatis. Abdomen cinereum, segmento 1:mo toto, reliquis margine apicali, nigris. Segmentum 1:um breve, inerne; 2:dum in medio & apice setis 5—6 nigris; 3:tium setis 2 in medio & circiter 8 in margine apicali; 4:tum postice multisetosum. Alæ hyalinæ, basi parum fuscae. Nervus long. 1:mus inermis, cuius apici opponitur nervulus transvers. medius; 4:ns subrectangulatim flexus, infra angulum paullo continuatus, flexura inter angulum & costam levissime arenata; transversus ordinarius ab angulo longe remotus, distincte oblique ductus, subrectus. Spinula costæ nulla.

*Obs.* *T. ambigua* Meig. "setis frontalibus fere ad apicem antennarum descendantibus" a nostra differt. — Forte tamen nostra cum Meigeni identica, nam in ceteris bene quadrat.

7. *T. ruficornis*: nigricans, capite albo, fronte lata ante oculos parum prominente, cinerea, vitta fusca; thoracis vittis 5 indeterminatis, scutello, abdominalisque conici fasciis 3 latioribus, albidis; antennarum articulo 2:do ferrugineo quam ultimo nigro duplo breviore; vibrissis nullis; palpis flavis; alarum nervo long. 3:io setuloso, transverso ordinario obliquo, subrecto.  $\delta\varphi$ . (Long. 2—3 lin.).

Hab. in Suecia rarissime, 2 tantum individua inveni.

unum ( $\delta$ ) ad Wadstena Ostrogothiaæ, & alterum ( $\varphi$ ) ad littus maris ad Lomma Scaniae 20 Jul. 1830, lectum. (Similem omnino sub nomine "*T. ambigua*" e Glogavia a D. Zeller obtinui).

$\delta\varphi$ . Simillima iterum *T. curvinervi*, a qua vero antennarum articulo 2:do ferrugineo & nervo transverso ordinario non tam longe, sed modice, ab angulo nervi long. 4:ti remoto, vere differt. In uno specimine nervum transvers. ordinarium flexum vidi. — Vix varietas *T. ambiguæ* Meig.

8. *T. interrupta*: nigra, capite, thoracis vittis 5, abdominisque conici fasciis 3, albo-micantibus; fronte lata ante oculos parum porrecta, cinerea, vitta fusea; antennarum articulis 2 & 3 subæque longis; vibrissis nullis; palpis flavis; alarum nervis long. 1 & 3 setulosis, 4:to obtusangulatim flexo, in medio interrupto.  $\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime; in Scania specimen descriptum inveni.

$\varphi$ . Simillima *T. ambiguæ* (n:o 5), & fere ejusdem monstrassam varietatem crederem; sed praeter magnitudinem paullo majorem differt etiam nervorum directione abnormi in utraque ala simili, & nostra *interrupta* ab *ambigua* fere ut *T. antiqua* (50) a *pallipede* dignoseitur. Nervus longitudinalis 4:tus mox pone nervulum transv. medium interruptus iterum a nervo transverso ordinario ad angulum breviter dueitur, spatio inter ambos nervos transversos vacuo relicto. Reliqua omnia ut in *T. ambiguæ*.

9. *T. sannio*: cinerea, capite argenteo, vitta frontali latissima grisea; thorace dilute brunneo-lineato; abdome ovato nigro-fuscoque maculato, incisuris albis; fronte ante oculos longe porrecta; antennis articulo ultimo 2:do

triplo longiore totis, pedibusque, nigris; vibrissis nullis; palpis flavis; alis subinermibus. ♀. (Long. fere 3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 636. 11. ♀.

Hab. in Lapponia meridionali Umensi rarissime; ad Åsele 28 Jul. 1832 semel inventa.

♀. Statura *Muscæ domesticæ*. Habitu & pictura abdominis *Miltogrammæ* fere similis, sed antennis setaque longioribus & mystacibus distinctioribus diversa. Antennæ longitudine epistomatis, nigræ, levissime cinereo-micantes, articulo 2:do apice rufescente; seta longitudine articuli antennarum 3:ti, biarticulata? tota fere æque crassa, apice tantum capillari. Frons cæna, utrinque serie dupli setarum tenuiarum, nec rigidarum, ad radicem antennarum cessante, nec infra antennas descendente; vitta latissima postice subochracea. Palpi toti flavi. Thorax & scutellum disco lœte brunneo-tineta, ille lineolis 2 fuscis obsoletis. Abdomen subdepressum, ovatum, griseum, maculis trifariam dispositis anque, nigris, nitidis, segmentis 3 posticis basi anguste, maculisque lateralibus, albis. Segmentum 1 & 2 subæqualia; horum singulum apice in medio setis 2 & ad latera 1, gaudet; segmentum 3:tium apice setis 12 ornatum; anus 10-setosus. Venter niger. Alæ hyalinæ, nervis omnino ut in *T. Larvarum* (3). Squamæ niveæ. Halteres fusi.

10. *T. pilatarsis*: nigra, cinereo-micans, capite cano, vitta frontali lata, grisescente; abdome ovato, nigro, maculis triplici serie albis; fronte ante oculos longe porrecta; antennis articulo ultimo 2:do quadruplo longiore pedibusque nigris, antecorū articulo tarsorum 2:do subtus longe piloso; vibrissis nullis; palpis flavis; alis subinermibus; nervo transverso ord. inflexo. ♂? (Long. fere 3 lin.).

Hab. in Norvegia rarissime; ad Oestre Næs Værdalæ 10 Jul. 1840 specimen descriptum legi.

♂? Similis priori, a qua vero, antennarum articulo ultimo paullo longiore, fronte minus lata, corpore obscuriore, alarum nervo transverso ordinario circumflexo, nec recto, ut & pedum anticorum articulo tarsorum 2:do subtus dilatato sat longe piloso, differt. An ♂ praecedentis? Antennarum articulus 2:dus brevis, superne rufescens; seta apice capillari. Frons modice lata, setis tenuioribus utrinque duplii serie tantum ad antennas continuata; vitta media lata fusco-cinerea. Thorax & scutellum obscure cinerascentia, parum (in specimine forte paullo detrito) maculata. Abdomen nigrum, nitidum, segmentis 3 posticis basi anguste, maculis 3 albis. Alarum nervus longitudinalis 3:tius basi setulis 5—6; transversus ordinarius distincte flexus. Pedes nigri; anticorum tarsi breves, articulo 2:do subtus dilatato apice fasciculo pilorum nigrorum, longitudine fere reliquorum articulorum simul sumtorum & (in mortua) incurvatorum. Ungues & pulvilli tarsorum omnium minuti. Reliqua ut in priori.

11. *T. agrestis*: cinerea, capite argenteo-micante; thoracis lineis 3, abdominis subovati vittis totidem, pedibusque, nigris; fronte modice lata, ante oculos longe porrecta, vitta media atra; antennis breviusculis, nigricantibus, articulo ultimo 2:do triplo longiore; mystacibus paucis. ♂ (♀?). (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Fall. Museid. 6. 7. genuina. Meig. Dipt. 4. 302. 110.  
♂. Macq. Buff. 2. 113. 16. ♂. *Miltogramma* Meig. Dipt. 7. 233. 21.

Hab. in floribus Umbellatarum, per Sueciam meridionalem & medium, Jul. Aug., passim frequens; scilicet in Scania haud raro; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia, D. B. *Fries*; in pratis Gotlandiae ad Färön &c., sat frequens. (E Glogavia, Zeller).

♂. Cinerea, opaca. Antennæ epistomate breviores, articulo 2:do superne distincte setoso. Seta elongata, biarticulata,

vix ad medium incrassata. Frons angustata, setis medio-cribus (non magnis) utrinque dupli serie, tantum ad basin antennarum continuata; vitta media atra. Occiput parum pubescens. Vibrissæ nullæ. Seta mystacina utrinque unica distincta, at setæ plures minores ad os. Thoracis lineæ nigræ, media subtriplicata, laterales simplices. Scutellum immaculatum. Abdomen vittis 3 nigro-brunneis. Segmenta subæqualia, 1:mum in medio apicis setis 2, 2:dum setis 4, 3:tum setis 8—10; 4:tum postice multisetosum. Alæ hyalinæ. Nervi transversi: ordinarius subrectus, parum obliquus, pone medium areæ insertus; medius medio segmenti costalis 2:di breviusculi oppositus; curvatura nervi 4:ti inflexa, area apice aperta. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Puvilli magni, albidi.

♀? fronte nonnihil minus porrecta, paullo latiore, thoracis vitta media perspicue triplicata; alias mari descripto etiam quoad pulvillos magnos similis.

12. *T. devia*: nigra, capite argenteo-micante; thoracis vittis 4 abdominisque maculis 3 fasciformibus albo-micantibus; fronte modice lata, ante oculos distinete porrecta, vitta media atra; antennis breviusculis, articulo ultimo lato 2:do duplo longiore; mystacibus pluribus. ♂♀. (Long. 3—3 $\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Musc. 6. 8. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 301. 108. ♂♀. Macq Buff. 2. 144. 22. Zett Ins. Lapp. 634. 4. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 190. 29.

Hab. cum priori, 3 Jul.—15 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Lund, utrumque Esperöd nempe in Tranås & Mellby (ad littus maris), rarius; in Gotlandia ad Westö in Hall, & ad Ruthe &c., passim; in Laponia Umensi ad Stensele rarissime.

♂♀. Similis priori, a qua tamen, corpore subnitido subærulecenti nigro, maculatim albo-micante, antennarum

articulo ultimo paullo breviore & latiore, 2:do superne parum setoso, fronte nonnihil minus porrecta, setis mystacinis pluribus, nervis transversis: ordinario magis flexo & nonnihil magis ad angulum approximato, medio paullo ante apicem nervi long. 1:mi ducto, atque spinula costæ minuta præsente, abunde differt. Antennarum seta 3-articulata, capillaris, fere ad medium incrassata ibique annulo albido. Epistoma apice reflexo albido. Series setarum frontalium paullo longius, quam in priori, proceedit, sed vix infra antennarum basin descendit, & in ♂ utrinque vix nisi simplex. Vittæ thoracis 4 cinereæ antice tantum perspicuæ. Abdomen fasciis 3 albo-micantibus, interruptis. Frons in ♀ paullo latior, quam in ♂. De cetero ut in priori.

**13. *T. elegantula:*** cana; capite argenteo, fronte ante oculos distinete porrecta, concolor; antennis longitudine fere epistomialis, thoracis vittis 3, abdominis fasciis 4 latis, pedibusque, nigris; alarum nervo transv. ordinario longe a margine remoto, area apicali apice ocellussa. ♀? (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; e Dania a D. Staege sub nomine: "*T. imberbis* Zett. Ins. Lapp. ? l. nov. sp.?" nuper missa. (Ad Jungfern-Heyde & Moabite prope Berolinum d. 7—12 Jul. 1842 specimina quedam a D. Dahlbom lecta mihi bene communicata).

♀? Parva. Pulchra. Albo-cana. Angusta, cylindrica. Caput totum argenteum, nitidum. Antennæ elongatæ, lineares, nigræ, apice superne angulo subacute. Articulus ultimus 2:do triplo & ultra longior. Seta anteana paullo longior, capillaris, bi?-articulata, fere ad medium leviter incrassata. Frons lata, argenteo-alba, stria media angusta, rufescens cana, posticè furcata; serie setarum medioiocerum utrinque subduplici ad antennarum basin continuata. Seta mystacina utrinque unica. Setulæ sub ore panicæ, parvæ. Palpi flavi, apice nigri. Thoracis lineæ 3 fusæ. Abdomen co-

nico-cylindricum, atrum subnitidum, segmentis 3 postieis basi ad latera macula triangulari alba, opaca, quæ in dorsum assurgit & cum opposita fasciolam tenuem ad basin segmenti format. Segmentum 1 sequenti subæquale, inerme; 2 & 3 in medio apicis setis 2; ultimum subacuteum nitidum, apice 6-setosum. Venter niger, ineisuris anguste albis. Alæ hyalinæ. Nervi transversi: ordinarius levissime flexus, in medio areæ insertus; medius apici nervi long. 1:mi præcise oppositus; area apicalis oclusa, brevissime subpetiolata. Nervi inermes, at spinula costæ distincta. Squamæ niveæ. Pedes nigri, parum setulosi, pulvillis & ungibus minutis. — **Habitus Miltogrammæ**, sed antennæ longæ & seta elongata, tenuis *Tachinæ*. — In dispositione Meigeniana hæc species vix ullum idoneum habet locum, *Masiceræ* approximans, sed per aream oclusam &c. diversa.

**14. *T. trepida*:** cineraceens; capite albido, fronte lata, ante oculos parum prominentे grisea, vitta fusca; antennis longitudine fere epistomatis, seta mediocri, palpis, thoracis lineolis 4, abdominis fasciis 4, pedibusque, nigris; alarum nervo long. 3:lo setuloso, transverso ordinario obliquo, recto, areæ medio inserto. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Meig. Dipt. I. 300. 106. ♀. *Plagia* ejusdem 7. 201. 3.

Hab. in Suecia meridionali & media, 25 Jun.—26 Jul., minus frequens; scilicet in Scania ex. gr. in fruticibus Horti Academicus Lundensis, passim; in Ostrogothia ad Waldstena, & Gusum (D. *Wahlberg*); in Ölandia rar.

♂♀. Valde affinis & similis *T. curvinerri* (6) & *ruficorni* (7); sed ab illa nervo transverso ordinario præcise in medio areæ apicalis, nec paullo pone medium, inserto; ab hac antennis basi nigro-fuscis 1. piecis, nec ferrugineis, & ab utraque palpis nigris, nec flavis, dignoscitur. — Antennæ lineares, non usque ad os extenduntur, haud latæ, seta capillari fere ad medium incrassata, articulis basalibus 2?

parvis. — Sub nomine: "T. curvinervis" hanc speciem olim divulgavi.

15. *T. subcincta*: nigro-cinerascens, capite albido, fronte lata, ante oculos parum prominente, cinerea, vitta obscura; antennis longitudine fere epistomatis, seta valida, palpis, thoracis lineolis 4, abdomine pedibusque, nigris; abdominis cingulis 3 albidis; alarum nervo long. 3:to setuloso, transverso ordinario valde obliquo, subrecto, fere areæ medio inserto. ♂♀. (Long. 2 $\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Hab. in Scandinavia, 19 Jun.—20 Jul., passim; scilicet in Scania rarissime; in Ostrogothia semel lecta; ad radicem Åreskutan ut & ad diversoria Grimüäs & Fanbyn Jemtlandiae 3 individua a D. Dahlbom 1810 inventa; in Norvegia ad Thynæs, Næs & Suul Værdaliæ passim. (E Glogavia a D. Zeller communicata).

♂♀. Simillima priori, differt vero corpore paullo obscuriore, antennis nonnihil validioribus, seta distinete crassiore, 3-articulata, abdominis cingulis albis paullo magis perspicuis, ut & nervo transverso ordinario magis oblique ducto. Abdomen nigrum subnitidum, segmentis 2, 3 & 4 basi late cinerascentibus, singulo cingulo pone incisuram angusto, albo. Antennarum seta ultra medium incrassata. Frons in ♂ nonnihil magis prominens, quam in ♀. Reliqua ut in priori. Affinis *T. marginatæ* n:o 76, sed nervo long. 4:to infra angulum continuato &c. distineta.

16. *T. leucocephala*: cinerascente, epistomate albo; fronte longe prominente, antice in ♂ argentea tota nitidissima, in ♀ argentea, vitta media lata, verticeque in utroque sexu, nigricantibus; antennis, palpis, thoracis lineis 4, abdominis maculis trigonis trifariam positis, pedibusque, nigris; vibrissis continuis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Muscid. 8. 11. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 371. 229.  
♂♀. Zett. Ins. Lapp. 635. 5. ♂♀. *Musca* Panz. Fn. 51.

14. *Metopia* Macq. Buff. 2. 126. 13. T. 14. f. 13. ♂.  
Meig. Dipt. 7. 248. 2. *Musca labiata* Fabr. Antl. 304.  
100. ♂. *Tach. argyrocephala* Zett. Ins. Lapp. 635. 6. ♂.  
var. (exclus. synonym.).

Hab. in plantis & soliis fruticum, locis aridis sabulosis, soli expositis, & vallis ab Hymenopteris perforatis, per Scandinaviam, 20 Maj.—17 Aug., passim frequens, in copula; scilicet in Scania vulgaris; in Ostrogothia frequens; in Ölandia & Gotllandia (ad Fardhem, Wanlingbo, Gothem, Olle Hau in Färön, &c.), passim; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Medelpadia ad Kjällsta; in Helsingia ad Glösbo & Löfvik; in Botnia; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Stensele, non raro; in Nordlandia Norvegica ad Björkvik, raro. Ad Hafniam passim. Valde agilis & inquieta, sere perpetuo in motu.

♂♀. Oblonga, cinerascens. Frons præsertim in ♂ longe porrecta, in ♂ antice argentea nitidissima, plerumque subintegra, interdum per rimam angustam nigrum interrupta, ut in *T. argyrocephala* Ins. Lapp.; in ♀ antice nigra, utrinque argenteo-micans; postice in utroque sexu nigra, opaca, setis haud validis utrinque bifariam positis, in ♂ antice subabbreviatis, in ♀ usque ad antennas ductis. Series vibrissarum usque ad antennarum radicem continuata. Antennæ lineares, incumbentes in ♂ longissimæ, os attingentes, in ♀ paullo breviores. Seta biarticulata, capillaris, vix ad medium incrassata. Abdomen conicum cinereum, segmentis 1:mo toto, singuloque reliquorum maculis 3 trigonis, nigris. Segmenta apice: 1 & 2 setis in singulo 2 1. 4; 3 & 4 setis in singulo circiter 8—10. Alæ hyalinæ. Nervi transversi: ordinarius subperpendicularis, rectus pone medium areæ insertus; medius apici nervi auxiliaris oppositus. Area apice aperta, curvatura paullo flexa. Spinula costæ nulla. Nervus long. 3:tius setulis 8—10 vix ad nervum transversum medium continuatis. Squamæ albæ, margine pallide flavicante. Hal-

teres testacei. Pedes parce spinulosi, tarsis in utroque sexu subundis, ungibus pulvillisque minutis. In illæsis individuis masculorum abdomen lateribus ex maculis albis mictat.

17. *T. argyrocephala*: cinerascens, epistomate albo; fronte distinete prominente, antice argentea, postice cinerea, vitta media continua alra; antennis, palpis, thoracis lineis 4, abdominis maculis trigonis trifariam positis, pedibusque, nigris; vibrissis continuis. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 372. 230. ♂♀. *Metopia* Macq. Buff. 2. 127. 14. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 218. 3.

Hab. in Suecia, Jun. Jul., minus frequens; in Scania ad Abusa & Esperöd, & in Ostrogothia ad Wadstena, pauca specimina inveni. (E Sedino 8 Jun. 1812, D. Dahlbom).

♂♀. Valde similis & affinis priori, nec differt ab illa nisi magnitudine paullo minore, fronte nonnihil minus prominente, in utroque sexu similiter constructa, ut & antennis in ♂ paullo minoribus. Mas hujus a femina prioris (qui valde similes sunt) ægre dignoscitur, nisi frontem in ♂ *argyrocephala* antice serie setarum simplici, at in ♀ *leucocephala* eandem totam etiam antice serie setarum duplici, instructam probe observes; ad structuram ani diversam quoque attendas. ♀ vero *argyrocephala* præter magnitudinem minorem, vitta frontali angustiore & fronte postice utrinque cinerascente, nec obseura, a ♀ *leucocephala* parum discrepat. Frons ♂♀ setis tenuioribus & validioribus immixtis ornata.

18. *T. campestris*: cinerascens, epistomate albo; fronte modice prominente, vitta media lata alra; antennis, palpis, thoracis lineis 4, abdominis fasciis sinuatis lineaque dorsali media angusta, pedibusque, nigris; vibrissis continuis. ♂♀. (Long. 2—1½ lin.).

Fall. Muscid. 8. 12. ♀. specimina typica. — Meig.  
Dipt. 4. 373. 231. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 635. 7. ♂♀.  
*Metopia* eadem Macq. Buff. 2. 124. 5. Meig. Dipt. 7. p.  
249. 5.

Hab. in terra locis aridis, etiam in soliis fruticum & Umbellatis, per Scandinaviam, 20 Jun.—24 Aug., vulgaris; scilicet in Scania copiose; in Smolandia, Ostro- & Westrogothia, frequens; in Ölandia, D. *Bohemian*; in Gotllandia ad Wamblingbo, Rohne &c.; in Helsingia ad Arbrå, Jerfsö &c., passim; in Lapponia Umensi ad Stensele, raro; in Norvegia ad Næs Værdaliæ, ut & ad Björkvik Nordlandiæ pupæ inventæ, e quibus imagines d. 15 Jul. egressæ; in Dania. (E Finlandia a D. *Sahlberg* communicata).

♂♀. Similis præcedenti, a qua magnitudine paullo majore, fronte minus porrecta, vitta media latiore, & abdominis pictura nigra magis fasciata quam maculata, præcipue dif fert. Scutellum cinereum. Abdomen eanum 1. griseo-canum, 1:mo segmento toto, reliquis margine apicali sinuatim, & linea dorsali, nigris. Squamæ sub alis albæ. Reliqua ut in priori. *Mas a femina* ægre dignoscitur, nisi per comparationem sexus in femina frontem perparnum latorem, abdomen paullo magis depresso & latum, ut & anum acutiorum, tuberculo nullo inflexo præditum, attente observes. Setæ frontales in utroque sexu quadrifariam dispositæ, at antice in fronte maris series setarum utrinque subsimplex.

19. *T. amabilis*: cinerascens, epistomate albo; fronte modice prominente, vitta media lata atra; antennis, palpis, thoracis lineis 4, abdominis fasciis subrectis lineaque dosali media angusta, pedibusque, nigris; vibrissis continuis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 371. 232. ♂♀ (nostræ simillima vide-

tur præter magnitudinem majorem). — Zett. Ins. Lapp. 636. 10. ♀. *Metopia* Meig. Dipt. 7. 248. 4.

Hab. in graminosis, mibi in littore maris præsertim obvia, in Suecia, 22 Jun., 7 Sept., minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd in littore maris Balthici mense Jun. 3 specimina inveni; in Ölandia, D. *Bohemann*; in Bottnia occidentali d. 7 Sept. semel; in Lapponia Tornensi rarissime. E Gusum Ostrogothiae a D. *Wahlberg* sub nomine "*T. campestris*" ♀ missa.

♂♀. Priori iterum simillima, sed magnitudine constanter duplo & ultra minore, abdominisque pictura paullo diversa, distincta videtur. Alarum nervus transversus ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Abdomen oblongo-ovatum, nigrum, subnitidum, segmentis 3 ultimis basi fasciat lata, determinata, alba, per lineam nigram interrupta. Cetera ut in *T. campestri*.

20. *T. tincta*: cinerascens, epistomate albo; fronte parum prominente, grisea, vitta media obscura; antennis, palpis, thoracis lineis 4, abdominis fasciis inæqualibus lineaque dorsali media, pedibusque, nigris; vibrissis subabbreviatis. ♂♀. (Long. circiter 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 378. 239. ♀. *Masicera* eadem Macq. Buff. 2. 122. ♀. *Metopia* Meig. Dipt. 7. 249. 7.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; specimina 2 lustravi, masculum nempe e pupa cylindrica, nuda, brunnea (in larva Lepidopteri ad Lund Scaniæ inventa) d. 18 Sept. egressum, & semineum ex Hafnia 24 Oct. 1842 pro comparatione a D. *Stæger* benigne communicatum.

♂♀. Similis *T. amabili*, major. A proxime præcedentibus fronte parum porrecta, grisea, nec cinerea, vibrissis rario-ribus, parum infra medium epistomatis adscendentibus, ab-

dominis fasciis flavidantibus, nec canis, ut & nervo transv. ordinario subperpendiculari, recto, in medio, nec pone medium, areæ ultimæ inserto, abnnde distineta. Antennæ in ♂ multo longiores quam in ♀. Frons in ♂ nonnihil angustior quam in ♀, in utroque sexu grisea, vitta media latiuscula nigra, serie setarum in ♂ subbifariam, in ♀ quadrifariam posita, in utroque sexu nonnihil infra antennarum basin simpliciter continuata. Abdomen ovatum, convexum, nigrum, subnitidum, fasciis in basi segmentorum 2, 3 & 4 cinereo-flavidantibus, opacis, per lineolam medianam tenuem interruptis; harum 1:ma valde angusta, 2:da medioeris, ultima latior. Alæ hyalinæ. Nervi: longitudinalis 3:tius basi fere ad nervum transv. medium parce setulosus; transversus ordinar. minutus paullo ante apicem nervi long. 1:mi ductus; long. 4:tus minus perspicue infra angulum continuatus. Squamæ sordide albæ. Pulvilli & ungues maris nonnihil maiores feminæ. Reliqua ut in priori.

21. *T. spathulata*: nigra, subnitida, fronte parum prominente, albo-micante; epistomate, thoracis vittis subquinis obsoletis, abdominisque fasciis 3 angustis, albis; antennarum articulo ultimo caneiformi, vibrissis continuis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{3}{4}$  lin.).

Fall. Muscid. 7. 9. ♀. (erit ♂) ipsissima. Meig. Dipt. 4. 369. 225. (secundum Fall. transscripta).

Hab. in Suecia rarissime; a me non nisi in Scania ad prædium Abusa prope Lund mense Aug. ante plures annos semel capta; e Westrogothia a D. *Gyllenhal* missa; at in Ostrogothia ad Gusum & in Uplandia ad Holmiam recentiori tempore quoque inventa erit, teste D. Prof. *Wahlberg*.

♂♀. Oblonga, subeylindrica, subcærulescenti nigra, nitida.

Frons modice lata, parum albo-micans, vitta media obscura, opaca, serie setarum superne utrinque in ♂ dupli, in

♀ quadruplici, infra antennas per setas 2 l. 3 continuata. Epistoma albo-micans, vibrissis continua, magnis, rigidis. Antennæ maris longitudine fere epistomatis, feminæ paullo breviores, artieulis in utroque sexu 1 brevissimo, 2 brevi, setoso, 3 magno & præsertim in ♂ versus apicem distincte dilatato, apice truncale, seta, ni fallor, 3-articulata, articulis 1:mo brevissimo, 2:do brevi, 3:tio capillari, fere ad medium incrassato. *Mystaces* validi. Setæ sub ore plures. Thorax levissime albo-micans, lineolis antieis 4 obscuris, minus perspicuis. Scutellum immaculatum. Abdomen cylindrico-conicum, ænescenti nigrum, segmentis 2, 3 & 4 basi cingulo angusto albo. Segmentum 1:mum breve, inerme, 2 & 3 in medio & apiee setis parce sparsis, 4:tum setis majoribus & minoribus erubrè vestitum. Venter pilosus niger. Nervi: transversus medius mediocris, apici nervi long. 1:mi oppositus; ordinarius subperpendicularis, rectus, paullulum pone medium areæ apicalis insertus; apicalis distincte incurvatus; longitudinales 3:tius basi usque ad transversum medium setulosus, 4:tus infra angulum acutum brevissime l. parum continuatus. Area apicalis occlusa, breviter petiolata, mox ante apicem in costam educta. Spinula costalis adest. Squamæ albæ. Pedes nigri, setosi, pulvillis & ungribus minusculis, non autem minutis. — In dispositione generum Meigeniana nullum aptum locum habet hæc species, *Scopoliae* affinis, sed antennarum forma &c. diversa.

*Obs.* In annotationibus meis allatani lego speciem hoc nomine & indicio: "*Tach. seticeps* mihi ♀: simillima *T. spatulatae* ejusque omnino diagnosis & discriptio; & differt solummodo antennis angustioribus, linearibus, nec extrorsum dilatatis. In Ostrogothiæ monte Omberg a D. Bohe-man 1834 capta." Sed eum specimen ad manum mihi hodie non est, nihil amplius de illo jam dicere possum.

22. *T. vilis*: nigra, subnitida, fronte subprominente obscura, epistomate, thoracis vittis subquinis, scutello,

abdominisque maculis albo-micantibus; antennis mediocribus, linearibus; vibrissis abbreviatis. ♂. (Long.  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; in prato paludosum ad Rohne Gotlandiae 9 Jul. 1811 semel capta.

♂? Subsimilis *T. deviae* (12), sed magnitudine minore & variis aliis notis diversa. Nigra. Frons sub prominula, levissime l. parum cinereo-micans, inter oculos sat magnos rufos modice angusta, vitta media parum lata obscura nigra; series setarum superne quadruplex, parum infra antennas continuata, & juxta illas simplex. Antennae epistomate nonnihil breviores, articulo 2:do brevi superne setoso, ultimo medioeri, seta longe capillari, 3-articulata, articulis basalibus brevissimis, 3:tio non ad medium incrassato. Epistoma retusum, vibrissis haud distinctis, vix ad medium sensim deerescendo assurgentibus; apice subreflexum, margine albo. Thoracis vittae albidae latae haud perspicuae. Abdominis maculæ albicantes haud determinatae, in basi segmentorum 2, 3 & 4 fascias interruptas formant. Segmenta subæqualia, 1:mum inerme, reliqua apice setosa, nempe segmentum 2:dum setis 2, 3:tium circiter 10, & 4:tum fere totidem. Alæ subfuscato-hyalinæ, nervis ut in *T. deviae* directis. Nervus long. 3:tius basi setulis 7 l. 8. Squamæ albæ. Putilli & ungues parvi.

23. *T. silvatica*: oblongo-ovata, nigra, epistomate subargenteo; fronte sub prominula, lata, cinerea, vitta alba; thoracis vittis abdominisque tessellis, albidis; scutello ferrugineo; alis inermibus; antennis longissimis, seta valida, 2-articulata; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 4 lin. & ultra).

Fall. Muscid. 12. 20. ♂♀. typica. — Meig. Dipt. 4. 380. 243. ♂♀. *Masicera* Macq. Buff. 2. 119. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 241. 17. t. 71. f. 6. ♂.

Hab. in Sueciæ meridionalis & mediae pascuis & sylvaticis, interdum in Umbellatis in mense Julio & Aug.,

arius; scilicet in Scania ad Esperöd prope montem Stens-husvud; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*. (E Glogavia a D. *Zeller* sine synomynia communicata).

$\delta\varphi$ . Inter majores generis. Robusta. Frons subpromineus, lata, cinerea, vitta media atra, macula supra antennas rufa; in  $\delta$  parum angustior, serie setarum validarum utrinque subsimplici, in  $\varphi$  utrinque duplii, in utroque sexu per setas 5 l. 6 infra antennas simpliciter descendente. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis, articulo 1 brevi, 2 parum longiore, superne setoso, 3 longissimo linearis, seta valida, ultra medium incrassata, 2-articulata, articulo 1:mo brevissimo. Epistoma subperpendiculare, vibrissis inferne paucis. Seta mystacina valida. Setæ sub ore plures. Palpi flavi. Thoracis vittæ 5 latæ, albidae, abruptæ, antice evidentiores. Scutellum rufo-testaceum. Abdomen nigrum, segmentis 1:mo brevi, immaculato, 2, 3 & 4 basi late maculis albo-mieantibus. Singulum segmentorum 1 & 2 apice setis 2; segmentum 3:tium apice setis pluribus, & 4:tum undique sparse setosum. Alæ hyalinæ, basi subfuscæ. Nervi transversi: medius inter apices nervi auxiliaris & longitudinalis 1:mi ductus; ordinarius parum obliquus, sub-infexus, paullo pene medium areæ insertus; apicalis rectus. Area apice aperta, paullo ante apicem alæ in costam excurrens. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—6 approximatis. Spinula costæ vix ulla. Squamæ albæ. Pedes setosi, ungibus & pulvillis in  $\delta$  sat magnis. —  $\delta$  abdominis lateribus macula rufa obsoleta.

24. *T. plebeja*: oblonga, cylindrica, cana, capite argenteo; fronte sub prominula, lata, vitta rufescente; ab domine nigro-mieante, lateribus tibiisque ferrugineis; antennis pedibusque nigris; alis inermibus; costa spinula distincta; antennis elongatis, extrosum latioribus, seta valida, 3-articulata; vibrissis nullis.  $\delta\varphi$ . (Long. 3 lin.).

Fall. Muscid. 13. 22.  $\delta\varphi$ . Meig. 4. 343. 180.  $\delta\varphi$ . 7.  
191. 71. Macq. Buff. 2. 143. 17.  $\delta\varphi$ .

Hab. in floribus Umbellatarum, in hortis & pratis, per Scandinaviam meridionalem & medium, 29 Jun.—20 Aug., passim frequens; scilicet in Scania vulgaris; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Lummelund, Ruthe, Nähr, Gothem, Furillen, Kyllej, Hafshem &c., mihi copiose obvia; ad Hafniam, D. *Staeger*. (E Glogavia & Reinerzi Silesiae a D. *Zeller* quoque missa).

$\delta\varphi$ . *Angusta*, cana. Caput argenteum, nitidum. Frons in utroque sexu subæque lata, vitta media ferruginea; superne serie quadruplici setarum, infra antennas per setas utrinque 2 descendente. Antennæ epistomate nonnihil breviores liberæ, nigræ, articulo 1 brevissimo subnudo, 2 duplo longiore unisetoso (in  $\varphi$  rufis); 3 antecedente fere triplo longiore, versus apicem (præcipue in  $\delta$ ) subdilatato, seta valida 3-articulata, articulo 1 brevissimo, 2 fere triplo longiore (præsertim in  $\delta$ ). Epistoma subperpendiculare, inferne vibrissis 2 1. 3. Abdomen nigrum, segmento 1:mo brevi, immaculato, reliquis basi late indeterminate canescens; tribus primis in  $\delta$  lateribus late, duobusque in  $\varphi$  lateribus anguste, rufo-testaceis; sed variat quoque  $\varphi$  abdomine macula laterali rufa deficiente. Segmentum 1 inerme; 2:dum setis 2 in disco & 2 in apice; 3:tium setis 2 in disco & 8—10 in apice; & 4:tum sparse setosum. Alæ hyalinæ, basi pallidæ, nervis ut in priori directis, sed angulus nervi 4:ti magis arcuatus, areæ apex plerumque subocclusus & parum ab apice alæ remotus, ut & spinula costæ subgemina distineta. Setulæ ad basin nervi 3:tii ut in priore. Squamæ albissimæ. Tibiæ in medio late fuscotestaceæ, ungibus & pulvillis parvis.

25. *T. Soror*: oblonga, cylindrica, cinerea, capite argenteo; fronte sub prominula, modice lata, vitta lutea; abdomine nigro-micante, lateribus ferrugineis; alarum nervo long. 3:to basi setuloso; costa spinula; antennis

parum elongatis, nigris, extrosum sublationibus, seta valida, 3-articulata; vibrissis nullis; pedibus nigris. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia rarissime; semina in Pinetis ad Lackalänga prope Lund Scaniæ 26 Jul. 1837 a D. Dahlbom semel lecta; & mas in Scania ad Esperöd a me inventus.

♂♀. Habitus *T. lateralis*, sed oculis nudis &c. dignota. A *T. nigripede* palpis flavis &c. differt. A priori, eni adhuc similior, antennis paullo brevioribus, fronte angustiore, tibiis nigris &c., mox dignoscitur. Frons in ♂ angustata, serie setarum utrinque simplici, in ♀ latior, serie setarum utrinque duplice; in utroque sexu hæc series per setas tres infra antennas simpliciter descendit. Antennarum articulus ultimus 2:do vix duplo longior. Thorax cinereus, nec canus, lineolis 4 nigris obsoletis. Abdomen ut in precedente, sed maculæ laterales rufæ distinctiores & in utroque sexu subæquales. Alæ omnino ut in priori, sed setulæ basales in nervo 3:tio plures, 7—8—14, magisque remotæ. Pedes toti nigri. Reliqua ut in *T. plebeja*. — *Tach. argreatæ* Meig. Dipt. 4. 316. 133 etiam valde similis videtur, sed illa a nostra differt: "vitta frontali atra", nec fulva. Dubium quoque de identitate remanet, cum Cl. Auctor nihil de setularum numero & distantia in nervo 3:tio commemorat. — Specimen antennarum articulis 1 & 2 basalibus rufis, alias *T. Soror* simillimum e Glogavia sine nomine obtinui.

26. *T. futilis*: oblonga, nigra, capite argenteocano; fronte sub prominente, angustata (♂), cinerea, villa atra; thoracis vittis subquinis, abdominisque fasciis 3, albicantibus; alis subinermibus; costa spinula; antennis elongatis, linearibus, seta mediocre, biarticulata?; vibrissis spuriis. ♂. (Long. 3 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime; duo tantum individua vi-

di, unum in Gotllandia ad Garde 29 Jun. 1819 a me inventum, & alterum ad radicem alp. Åreskutan Jemtlandiae 4 Aug. 1810 a D. *Dahlbom* lectum.

♂. A *T. silvatica* magnitudine minore, a *tibiali* (51) tibiis nigris, & a *nigripede* (52) palpis flavis, facile dignoscitur, his alias haud dissimilis. Frons angustata, cinerascens, vitta atra, setis utrinque tenuioribus superne simplici serie ornata. Setæ vero 6—7 utrinque serie duplii sitæ paullo infra antennas descendunt. Antennæ longitudine fere epistomatis perpendicularis, articulo 2:do breviusculo, setoso, ultimo saltem triplo longiore, linearis, seta (an triarticulata?) vix ad medium incrassata. Vibrissæ inferne paucæ. Abdomen subconicum, dense pilosum, nigrum, subnitidum, segmentis 2, 3 & 4 basi fascia subinterrupta albida. Segmenta: 1:mum apice setis 2; 2:dum setis in disco 2, in apice circiter 10; 3:tium setis ut in 2:do; 4:tum undique setosum. Alæ ut in *T. silvatica* (23), sed nervus transversus ordinarius magis rectus & fere in medio, nec pone medium, areæ insertus, ut & spinula costæ distinctior. Squamæ albæ. Pedes ut in *T. silvatica*. Specimen Jemtlandieum a Gotlandico differt: corpore magis cœrulecenti nigro & nervo transverso ordinario subflexo, fere pone medium areæ inserto; vix vero specie distincta.

27. *T. albisquama*: oblonga, nigra, capite argenteo; fronte subprominente, lata, cana, vitta atra; thoracis vittis 5 latis, abdominisque fasciis 3, albidis; alis subinernibus; costa spinula nulla'; antennis elongatis, linearibus, seta biarticulata, longe capillari, basi incrassata; vibrissis spuriis. ♀? (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in littore maris Baltici ad Esperöd in paroecia Mellby d. 30 Jul. 1818 semel a me deprehensa.

♂? A priori, eui in ceteris similis, differt: fronte latiore, setis validioribus, utrinque duplii, nec simplici, serie

dispositis, antennarum seta longiore, apice longius capillari, corpore distinctius albo-micante, alarum nervo transverso ordinario, paullo pone medium, nec in medio, areæ inserto, spinula costæ deficiente l. minuta ut & pulvillis & ungibus parvis. Squamæ sub alis totæ niveæ. Abdomen conicum, segmento 1:mo brevi, apice setis 2. Reliqua ut in *T. futili*.

*Obs.* Sub nomine: "Tach. inflexa Boucheo", specimem e Glogavia a D. Zeller obtinui, a nostra *albisquama* vix per aliud dignoseendum, quam quod setæ tantum 3 (nec 6) infra antennas descendant. Talem etiam in Gotlandia ad Ejsta 2 Jul. 1841, invenit D. Dahlbom. An ♂ *T. albisquamæ*? Sed ungvæ & pulvilli minuti feminam indicant.

28. *T. sordidisquama*: oblonga, nigra, capile argenteo; fronte subprominente, lata, cana, vitta atra; thoracis vittis 5 latis, abdominisque cingulis 3, albidis; alis subinermibus, basi squamisque flavidis; costa spinula nulla; antennis subelongatis, linearibus, seta biarticulata, basi incrassata; vibrissis nullis. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Lindholmei 10 Jul. a D. Dahlbom in uno specimine inventa.

♀. Præcedenti iterum simillima, sed antennis setaque non nihil brevioribus, setis frontalibus 3 l. 4 infra antennas utrinque simplici tantum serie descendentibus, alis basi flavescentibus, nee fuscis, squamis albo-flavis, nec niveis, ut & area ultima fere in apice alæ, nec paullo ante apicem, terminata, certe distineta. Nervus transvers. ordinarius fere in medio areæ insertus. Similis *T. muscariæ* n:o 45.

29. *T. pacta*: oblonga, cinerea, opaca; fronte subprominente, angusta (♂), grisea, vitta atra; thoracis lineis 4 nigricantibus; alis inermibus, basi squamisque fusco-flavis; costa spinula minuta; antennis epistomate paullo brevioribus linearibus, seta biarticulata, basi in-

erassata, pedibusque, nigris; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 324. 146? ♂. *Fabricia* Meig. Dipt. 7. 251. I. t. 71. 36. 38. ♂♀.

Hab. in Scandinavia rarissime; ad Lund & Abusa Scaniae 2 individua inveni; plura vero specimina mascula nuper e pupa exlusa, palpis flavis, sub nomine: "*T. pecta* Meig." obtinui a D. Staeger, qui simul testatur "larvam in *Carabo violaceo* vivere". (E Glogavia semina mare paullo minor & oculis magis remotis, forte hujus? mihi missa).

♂♀. Griseo-cinerea. Series setarum tenuiorum frontalis utrinque in ♂ simplex, in ♀ duplex. Infra antennas setae utrinque tantum 2 l. 3 in utroque sexu descendunt. Antennae & seta ut in priori, sed illae paullo breviores, angustae, articulo ultimo 2:do triplo longiori. Epistoma subperpendiculare, vibrissis infernis, decrescentibus. Os non prominens. Thoracis lineae anticae 4 nigræ. Abdomen conico-subcylindricum, totum griseo-cinereum, vestigio lineolæ dorsalis fuscæ in segmentis 2 & 3; pubescens, sed parum setulosum, nisi ad latera & in apice. Segmentum 1:mum breve, reliqua ima basi cingulo angusto albido. Alarum nervi transversi; medius apici longitudinalis 1:mi suboppositus; ordinarius paullo inflexus, fere in medio areæ insertus; apicalis rectus parum ante apicem alæ in costam excurrens. Area subocclusa. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—4 approximatis. Spinula costæ minuta. Squamæ flavidæ. Pedes nigri, ungibus & pulvillis in ♂ paullo majoribus, quam in ♀. — Valde similis & affinis *T. cinereæ* N:o 35.

*Obs.* Palpi in specie Meigeniana "nigri," in nostra semper flavi.

30. *T. geniculata*: oblonga, cinerea opaca; fronte subprominente, lata (♀), grisea, vitta brunnea; episto-

mate albo, ore prominulo; thoracis lineolis 4 fuscis; antennis elongatis, validis, nigris, basi rufis, seta biarticulata, basi incrassata; alis inermibus, spinula costæ parva; pedibus nigris, genubus tibiisque flavis; vibrissis nullis. ♀ (Long. 3 lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Abusa in floribus Achilleæ *Millesolium* 9 Sept. 1816 semel lecta.

♀. Statura & color corporis flavo-einereus prioris. Frons lata, serie setarum mediocrium utrinque duplii. Setæ 3—4 utrinque infra antennas descendunt. Antennæ longitudine fere epistomatis, articulo 2:do brevi, rufo-piceo, ultimo 2:do triplo longiore, valido, atro. Epistoma perpendicularre, margine oris antieo reflexo. Palpi sat magni, flavi. Thoracis lineolæ antieæ 4, abruptæ, nigræ, 2 mediæ tenuissimæ. Abdomen convexum, immaculatum, basi macula laterali in segmentis 1 & 2 flava, certo situ conspi- cienda. Segmenta subæqualia, 1:mum in apice setis 2; 2:dum setis in disco 2 & in apice 2; 3:tum setis in disco 2—3, in apice pluribus; 4:tum sparse setosum. Præterea setulæ aliquot ad latera abdominis, ut communiter, obser- vantur. Alæ einereæ, basi præsertim nervis flavicantes. Nervi transversi: medius ante apicem longitud. 1:mi ductus; ordinarius subplexus, paullo pone medium areæ insertus; apicalis elongatus, rectus. Area mox ante apicem alæ educta, aperta. Curvatura nervi 4:ti anguo obtusissimo. Nervus 3:tius basi setulis 3—4. Squamæ non magnæ, fla- vido-albæ. Halteres subnudi, pallidi. Pedes nigri, femo- rum apice tibiisque testaceis. Pulvilli & ungues parvi. — Affinis *T. pallipedi* infra. Forte generis *Masiceræ*.

31. *T. furibunda*: ovata, flavidio-einerea, opaca, capite concolore; fronte subprominula, latissima (♀), vitta brunnea; antennis elongatis, linearibus, nigris, basi rufis, seta biarticulata, ad medium subincrassata; scutello apice

rufescens; alis inermibus, spinula costæ minuta; pedibus nigris; vibrissis spuriis. ♀. (Long. fere 3 lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Abusa semel capta.

♀. Setæ frontales validæ, superne dupli serie dispositæ, infra antennæ setæ 3 l. 4 descendunt. Antennæ longitudine fere epistomatis perpendicularis, articulo ultimo linearis, nigro, quam 2:do rufo triplo longiore; seta elongata. Vibrissæ inferne paucissimæ. Palpi exserti flavo. Thoracis lineolæ 4 antice tenues, valde obsoletæ. Abdomen convexum. Segmentum 1 breve, apice bisetosum; 2 apice 4-setosum; 3 apice circiter 10—12-setosum; ultimum sparse setulosum. Alæ ut in priori, sed curvatura nervi long. 4:ti minus obtusa (angulus fere rectus), area paullo longius ante apicem alæ terminata, & nervus long. 5:tus mox infra nervum transv. ordinarium abbreviatus. Spinula vix ulla. Squamæ flavo-albæ.

32. *T. scutellata*: ovala, obscure cinerascens, capite argenteo-micante; fronte minus prominula, modice lata, cinerea, vitta obscurè ferruginea; antennis elongatis, nigris, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; scutelli apice rufescens; thoracis lineolis 2, abdominis fasciis pedibusque nigris; alis inermibus; spinula costæ nulla; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. fere 3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 640. 27. ♀. (Sub nomine *T. nigripes* & *clypeata* olim vendita).

Hab. in Suecia valde rara; scilicet in Ölandia rarissime; e Westrogothia utriusque sexus specimina nuper exclusa 1828 a D. *Gyllenhal* missa; in Betula ad Muonioniska Lapponiae Tornensis 17 Aug. 1821 semenam unicam inveni.

♂♀. Priori similis, differt vero colore obscuriore, nec flavidio, fronte nonnihil minus prominula, antennis totis nigris, alarum areæ ultimæ apice propius ad apicem alæ educto,

nervo long. 5:to fere ad marginem interiorem continuato, & squamis albis, nec flavidis. Frons in ♂ angustior, serie setarum haud validarum utrinque simplici; in ♀ latior, serie setarum utrinque duplici. Thorax obscure cinereus, lineolis 2 anticeis nigris. Scutelli sumpus apex rufescit. Abdomen ovatum: 1:mo segmento brevi; totum nigrum, pilosum, in disco & margine segmentorum parce setosum; basi segmentorum 2, 3 & 4 late cinerea, fascias 3 subinterruptas cinereas formante. Tarsi in ♂ apice pilosi, ungibus pulvillisque majusculis; in ♀ nudi ungibus pulvillisque parvis. Reliqua ut in priori. — Affinis *T. scutellari*, vibrissis paucis, & tantum infernis distincta.

33. *T. flavo-scutellata*: ovata, obscure cinerea, capite argenteo micante; fronte subprominente, modice lata, griseo-cinerascente, vitta obscure ferruginea; antennis elongatis, nigris, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; scutello toto rufo-testaceo; thoracis lineolis 4, abdominis subinermis fasciis pedibusque nigris; alis inermibus; spinula costae nulla; nervo transverso apicali subcurvo; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 3—3½ lin.).

Hab. in Suecia media rarins; plura specimina utriusque sexus nuper e pupis, quæ iterum e *Lophyri* pupis proventæ fuerunt, egressa mecum communicavit D. *Marklin*.

♂♀. Similis & affinis *T. scutellatæ*, a qua vero scutello fere toto flavo-rufo, abdome, præter segmentum ultimum setulosum, absque setis, fasciis cinereis angustioribus, ut & nervo transverso apicali subincurvo, paullo longius ab apice alæ in costam excurrente, differt. Thorax cinereus, lineolis 4 abbreviatis, angustis, nigris, lateralibus interruptis. Abdomen nigrum, subnitidum, segmento 1:mo vix breviore, atro, nudo, reliquis basi fascia cana, per lineolam nigram interdum vix conspicuam, subinterrupta. Segmenta 2 basalia inermia, 3:tum apice setis paucis, 4:tum sparse setosum. Alæ hyalinæ, nervis basi fuscis. Area ultima apice anguste

aperta. Femina mare saepius major. Cetera ut in praecedente.

*Obs.* Sub nomine *T. imberbis* olim cognita. *T. imberbis* vero mihi Ins. Lapp. longe alia est species, jam ad *Miltogramma* genus relata.

34. *T. validicornis*: ovata, obscure cinerea, capite argenteo-micante; fronte sub prominente, modice lata, cinerea, vitta fusea; antennis longitudine epistomatis, validis, seta biarticulata, ad medium incrassata, thoracis lineolis 4, abdominis segmento 1:mo, pedibusque, nigris; scutello apice rufo; alis inermibus, basi squamisque flavidis; spinula costae minuta; nervo apicali subrecto; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 640. 29. ♂♀.

Hab. in Lapponiis Suecicis, 13—17 Aug., in Betuletis juxta rivulos mihi raro obvia; scilicet in Lapponia Umensi ad Lycksele, & in Tornensi ad Muonioniska parce inventa.

♂♀. Priori iterum similis, sed antennis, præcipue in ♂, paullo longioribus & validioribus, scutello tantum apice rufescente, abdome opaco magis setoso & præter 1:um segmentum sub breve atrum totu cinerascente, alis basi pallidis, angulo nervi 4:ti magis obtuso, nervo transverso apicali parum incurvo, ut & squamis in primis margine flavidis, nec albis, vere distincta. Abdomen convexum, segmentis 2 & 3 disco & apice setosis, 4:to sparse setoso. Anus maris rotundatus, ater, nitidus.

35. *T. cinerea*: ovato-oblonga, cinerea, capite argenteo-micante; fronte sub prominente, modice lata, grisea, vitta nigra; antennis elongatis, angustis linearibus, seta biarticulata, basi incrassata, thoracis lineis 4, abdominis lineola dorsali interrupta, pedibusque, nigris; alis iner-

mibus; spinula costæ minuta; squamis albis; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Fall. Muscid. 20. 39. ♂♀. vera & originaria. Meig.  
Dipt. 4. 417. 309. ♂♀. *Masicera* Meig. 7. 210. 9.

Hab. in graminosis, in hortis & arvis, saepe etiam locis arenosis, per Sueciam meridionalem & medium, 24 Jun.—26 Jul., passim; in copula; scilicet in Scania ad Lund, Kjellby, Lindholmen, Esperöd &c., sat frequens; in Ostrogothia ad Wadstena, Lärketorp, Gusum? &c., haud raro; in Ölandia, D. Boheman; in Gotllandia ad Slitö & in gramine horti Nähr &c. (E Glogavia a D. Zeller communicata).

♂♀. Simillima *T. pactæ* (29), a qua vix nisi magnitudine minore & squamis sub alis albis, nec flavidis, dignoscitur. Tota cinerea. Frons in ♂ angusta, serie setarum tenuiorum utrinque simplici; in ♀ modice lata, serie setarum duplii, in utroque sexu per setas 2—3 infra antennas descendente. Antennæ longitudine fere epistomatis subperpendiculares, articulo ultimo 2:do triplo longiore. Seta tantum basi incrassata. Thoracis linea 4 nigra, subæquales. Abdomen oblongo-ovatum, totum flavidocinereum, segmentis: 1:mo brevi, nermi, ante scutellum excavato; 2:do & 3:to apice parce setosis, linea media fusea, interdum obsoleta; 4:to sparse setuloso. Alæ hyaline, nervis basi fuscis. Nervi transversi: ordinarius inflexus, paulo pone medium areæ insertus; apicalis rectus, mox ante apicem alæ excurrens. Area ultima apice parum aperta. Nervus 3:ti basi setulis 3—4. Angulus nervi 4:ti subobtusus. Tarsi in ♂ apie pilosi, ungvibus pulvillisque medioribus, in ♀ subnudi, ungvibus pulvillisque minoribus. — Var. ♀ antennis basi rufis.

36. *T. usta*: oblongo-ovata, nigra, capite obscuro; fronte sub prominente, modice lata, vitta nigra; antennis elongatis, angustis, linearibus, seta biarticulata, basi in-

erassata; thoracis lineolis 4 atris; alis inermibus; spinula costæ minuta; squamis flavis; vibrissis spuriis. ♀. (Long. circiter  $2\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; ad Sanda Gottlandiæ d. 1 Jul. 1811 specimen descriptum inveni. (E. Glogavia a D. Zeller sine synonymia communicata individua subsimilia).

♀. *Masiceræ* forte generis Meig. — A *T. cinerea*, cui structura partium similis, colore mox differt. Tota nigra, opaca, capite fusecente, genis in nostro specimine ferruginantibus. Frons non lata, serie setarom tenuiorum utrinque subduplici. Antennæ, seta, epistoma & oculi ut in priori. Palpi flavi, retracti. Alæ omnino ut in præcedente, etiam quoad nervorum directionem. Squamæ pallidæ. Abdomen ovale, subdepressum, vix nisi postice setosum. Pedes ut in priori.

*Obs.* Specimina Glogaviensia, inter quæ etiam mascula (fronte angustiore, serie setarum simplici, thorace fusecente & pulvillis majoribus) sunt, abdomine etiam antice paree setoso & spinula costæ majore, a Gottlandico differunt.

37. *T. pilipennis*: ovata, cinerea, capite margaritaceo; fronte vix prominente, lata, grisea, vitta ferruginea; antennis longitudine fere epistomatis perpendicularis, modice latis, nigris, basi rufis, seta triarticulata, articulis basalibus brevibus; abdomine atro, cingulis 3 niveis sub-interruptis; pedibus nigris; alarum nervis alternis setulosis; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

Fall. Museid. 18. 35. ♂♀. var. "antennis basi flavis." Meig. Dipt. 4. 352. 196. ♂♀. *Senometopia* Macq. Buff. 2. 113. 31. *Thryptocera* Meig. 7. 243. 8.

Hab. in floribus Umbellatarum & soliis fruticum, per Sueciam meridionalem & medium, 20 Maj.—24 Jul., passim; scilicet in Scania ad Björnstorps, Abusa, Esperöd,

&c. sat frequens; in Ostrogothia ad Wadstena raro, ipse, & ad Gusum, D. *Wahlberg*; ex Upsalia a D. *Marklin* missa; in Dalecarlia, D. *Bohemus*. (E Glogavia a D. *Zeller* communicata).

$\delta\varnothing$ . Alarum nervis setosis a prioribus mox dignota. Frons sat lata, serie setarum utrinque duplo, vix infra antennas descendente. Antennæ incumbentes, validæ, articulo ultimo 2:do triplo longiore. Seta medioeris, articulo 1:mo brevi, ultimo apice capillari. Palpi dilute flavi. Thorax cinereus, immaculatus. Scutellum cinereum apice summo rufescente. Abdomen ovale, atrum, nitidum, cingulis 3 angustis, niveis, subinterruptis, ad basin segmentorum 2, 3, 4 sitis. Segmenta subæqualia, 1 inermie, 2 & 3 apice parce setosa, 4:tum sparse setulosum. Alæ latiusculæ. Nervi longitudinales: 1 totus, 3 ultra transversum ordinarium, & 5 ad transversum medium, concinne setulosi; 4:tus arenatim flexus in summo apice alæ excurrens; transversus ordinarius subperpendicularis, rectus, medio areæ insertus; area ultima apice parum aperta; spinula costæ minuta. Squamæ flavo-albæ. Pedes nigri, ungibus & pulvillis parvis. Specimina abdomine subcylindrico-conico & ano crassiore, ut mascula, & abdomine magis ovali & depresso ut feminea considero, in ceteris vix discrepantia. — Variat  $\varnothing$  antennis totis flavis.

*Obs.* Si antennarum seta vere est 3-articulata, articulus 1:mus tam brevis existit, ut etiam bene armato oculo vix observandus.

38. *T. crassicornis*: ovala, cinerea, capite margaritaceo; fronte vix prominente, lata, grisea, vitta ferruginea; antennis longitudine fere epistomatis perpendicularis, latissimis, nigris, seta triarticulata, articulis basilibus brevibus; abdomine atro, cingulis 3 niveis subinterruptis; pedibus nigris; alarum nervis alternis setulosis; vibrissis spuriis.  $\delta\varnothing$ . (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 351. 195. ♂♀. *Thryptocera* Meig. 7. 243. 6. Macq. Buff. 2. 114. 35. *Tach. pilipennis* Fall. Muscid. 18. 35. var. "antennis nigricantibus," certe. Nec *Tach. spinipennis* Meig. 4. 350. 192. seu *Thryptocera* eadem Meig. Dipt. 7. 243. 7. multum ab hac abludere videtur.

Hab. in Scania cum priore, mense Julio, frequentius; at supra Seaniām hanc non nisi rarissime legi, ex. gr. in prato Gotlandiæ ad Lärbro 26 Jul. 1811 semel.

♂♀. Simillima præcedenti, cum qua a Cel. *Fallén* permixta fuit; ut ex collectione ejus vidi. Differt a priore antennis multo magis dilatatis, & plerumque totis brunneo-nigris, raro basi obscure piceis. In ceteris convenient.

39. *T. infantula*: ovata, cinerea, capite margaritaceo; fronte vix prominente, lata, grisea, vitta ferruginea; antennis longitudine sere epistomatis perpendicularis, latis, nigris, basi fuscis l. luteis, seta triarticulata, articulis basalibus brevibus; abdomine, atro, cingulis 3 niveis subinterruptis; alarum nervo long. 3:to nonnihil ultra transversum medium setuloso; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 1—1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali, mense Julio, rarius, in copula deprehensa; scilicet in Seania ad Esperöd & Abusa 6 individua inveni.

♂♀. *T. pilipenni* (37) simillima, magnitudine vero constanter duplo minore, antennis proportione nonnihil latioribus, abdominis cingulis angustioribus, ut & nervo tantum longit. 3:to nec nervis alternis, paullo ultra transversum medium setuloso, vere distincta.

40. *T. versicolor*: ovata, cinerea, capite margaritaceo; fronte parum prominente, lata, grisea, vitta

ferruginea; antennis longitudine fere epistomatis subperpendiculares, validis, brunneo-nigris, basi rufis, seta triarticulata, articulis basalibus brevibus; abdominis cingulis 3 albidis; pedibus flavis; alarum nervo long. 3:to usque ad transversum medium setuloso; vibrissis nullis. ♂♀. (Long. circuit. 2 lin.).

Fa 19. 36. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 354. 198.  
*Thrypiocera* 148, 13.

Hab. in Suecia media & boreali rarius; 1 Jun.—2 Jul., rarius; scilicet in Scania. aliis vernalibus, circa Lund &c., parec capta.

♂♀. Similis iterum *T. crassicornis*, sed longitudine paullo majore, antennis basi rufis, tarsis nigro-rufo-griseo, abdome convexo concolore, alarum nervo long. 3:to a basi ad nervum transversum medium setuloso, ut & pedibus rufo-flavis, abunde distincta. Abdominis segmentum 1:um totum, reliqua apice, femora antica latere postico, tarsique omnes, fuseescentia. Palpi exserti, flavi.

11. *T. rufina*: oblongo-ovata, cinerea, capite flavido; fronte parum prominente, lata, vitta fulva; antennis longitudine fere epistomatis validis, brunneo-nigris, basi rufis, seta breviuseula, crassa; sentello, abdome pedibusque rufo-ferrugineis, tarsis nigris; alarum nervo long. 3:to basi setuloso, vibrissis spuriis. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 644. 33. ♀. Au *Tach. bicolor* Meig. Dipt. 4. 354. 199? *Thrypiocera* Meig. 7. 243. 10?

Hab. in Suecia media & boreali rarissime; in Dalecarlia a D. *Bohemani* detecta; in Ostrogothia ad Gusum a D. *Wahlbergi* lecta; mihi non obvia.

♀. Similis priori, colore alio mox dignota. Antennae epistomate paullo breviores, valde dilatatae, nigrae, articulis 1

& 2 totis, & 3 basi, rufis; seta articulata, nigra. Thorax totus cinereus, scapulis rufo-testaceis, scutello rufescente. Abdomen ovale, rufum, segmentorum margine basali albido. Squama sub alis pallida. Alae hyalinæ, nervis longitudinibus: 3:tio basi multisetoso, 4:to areuatim flexo in summo apice alæ excurrente.

42. *T. lœtabilis*: oblonga, flavo-cinerea, opaca, capite flavo; fronte subprominente, lata, vitta brunnea; antennis longissimis, linearibus, ferrugineis, apice setaque triarticulata, fere ad apicem incrassata, nigris; thoracis lineis 4, abdominis testaceo-pellucidi vitta dorsali & apice, pedibusque, nigris; alic subinermibus; vibrissis continuis. ♂♀. (Long. fere 4 lin.).

Hab. in Suecia rarissime; in Ölandia semel inveni (E Glogavia sine synonymia a D. Zeller missa).

-♂♀. Magna, pulchra. Caput totum pallide flavum. Frons porrecta, lata, vitta lata, ferruginea; series setarum utrinque 8 (♂) 1. 10 (♀) validarum infra antenas parum descendit. Antennæ longitudine epistomatis declivi, articulis basalibus brevissimis, rufis, ultimo 2:do 6-duplo longiori, angusto, linearis, rufo, versus apicem indeterminate brunneonigro, seta longitudine antennæ, articulis basalibus brevissimis, ultimo ultra medium incrassata, tota nigra. Epistoma setis vibrissinis 8—10 fere usque ad antennarum radicem utrinque ornatum. Thorax flavo cinereus, antice lineolis 2 mediis angustis, & striga laterali interrupta, nigris. Scutellum flavidum. Abdomen oblongum, cinereum, lateribus segmentorum 1, 2 & basi 3:tii late flavo-pellucidis; vitta dorsali in segmentis 1 & 2, apieque segmentorum 3 & 4, nigris. Segmentum 1 breve. In tota nigredine abdominis setæ sparsæ, nigre observantur. Alae hyalinæ, eosta fusca. Nervi transversi: ordinarius inflexus, paullo pone medium areæ insertus, apicalis subrectus, mox ante apicem alæ excurrens. Angulus nervi 4:ti obtusus. Area apice aperta. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—4. Spinnula costæ nulla.

Squamæ albidæ. Pedes nigri, tibiis obscure testaceis.  
Ungues pulvillique parvi.

*Obs.* Forte *Degeriae* aut *Metopia* generis Meig. Affinis & similis videtur *Tach. latæ* Meig. 4. 381. 245 seu *Frontinæ latæ* Ejusdem 7. 248. 1., sed in illa epistoma "perpendiculare" nec declivum, vibrissæ "ad medium epistomatis", nec fere ad basin antennarum continuatae, ut & antennæ "dilute ferrugineæ", nec rufæ, apice nigræ, dicuntur, quæ notæ in *Tach. latabilem* non quadrant. — Valde affinis quoque *(Tachinæ) goniæformi* Meig., quam in plur. s. t. *Physema* *vertiginosa* Bouch., *Tach. vertiginosa* Bouch., & *Glogavia* a D. *lutea* *aterrima* colore alio, capite magis buccato, & alarum atro- cie different.

43. *T. vertiginosa*: oblonga, genteo; fronte parum prominente, latissima, ferruginea; antennis longissimis, linearibus, nigris, basi rufescens, seta triarticulata, fere ad apicem rotunda; thoracis lineis 4, pedibusque nigris; scutelli apice testacea; abdominis maculis fuscis; alis subinermibus; vibrissis continuis. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Muscid. 12. 21. ♀. Meig. Dipt. 4. 379. 242. ♂♀.  
*Masicera* Macq. Buff. 2. 120. 3? *Musca marmorata* Fabr.  
 Antl. 300. 84.

Hab. in floribus & foliis fruticum, in hortis & pratris Sueciæ meridionalis, 10 Jun.—30 Aug. passim; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Björnstorps, (D. Dahlbom), Esperöd in parœcia Tranås, &c., sat frequens; in Suecia superiori semel a D. Wahlberg lecta. (E Glogavia a D. Zeller quoque communicata).

♂♀. Valde similis *Baumhaueriae* (Tachinæ) *goniaformis* Meig., sed magnitudine fere duplo minore & fronte minus porrecta mox dignota. A *T. latabili*, cui etiam similis & affinis,

magnitudine duplo minore; oculis minoribus; capite argenteo, nec flavo; fronte minus prominente, multo latiore, setis utrinque subtriplici serie dispositis; antennarum articulo ultimo toto nigro; thorace & scutello canis, nec flavidis; abdomine conico fusco- & cano-tessellato; alarum nervis transversis: ordinario parum flexo, apicali nonnihil longius ab apice alae in costa excurrente, costa non infuscata; squamis niveis; ut & pedibus totis nigris, nec tibiis obscure testaceis, abunde differt. Scutellum rufescit. Palpi flavi. In illæsis individuis oculi oculoscopicis parcissime vestiti.

*Obs.* In museo meo adhuc non vidi speciem Scandinavica individuum unicum (cap. 1051).

*10. T. remmieriæ goniaformis* Meig.: oblongo-ovata, cinerea; fronte minus longissimis, linearibus, seta 3-articulata, id apicem incrassata, thoracis vittis 4, abdominalis 5; pedibus totidem, pedibusque, nigris; capite brachio, argenteo; fronte latissima; vitta latissima, nigricante; palpis flavis; scutelli apice rufo; alis inermibus, basi subalbidis, nervis transversis: ordinario infexo, apicali subrecto ante apicem alae excurrente; area occlusa, breviter petiolata; vibrissis subcontinuis;

sed cum nullus locus specialis patriæ annotatus est, & dubius ideo sim, an vere ut incola Scandinaviae existimetur, hanc speciem seriei nostrarum inserere non audeo.

**41. *T. scutellaris*:** oblongo-ovata, cinerea, capite albicante; fronte parum prominente, latissima, vitta lata, ferruginea; antennis longissimis, validis, nigris, seta tri-articulata, breviuscula, fere ad apicem incrassata; thoracis lineis 4, abdominalis fasciis totidem, pedibusque, nigris; scutelli apice testaceo; alis subinermibus; vibrissis subcontinuis. ♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

Fall. Muscid. 19. 38. ♀. Meig. Dipt. 4. 386. 255.  
(secundum *Fallén* transcripta).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; specimina typica e pupa nuper exclusa in Scania ad Esperöd 6—9 Sept. 1818 inveni. — In Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, (a me non comparata). — Ad Holmiam, D. *Haefner*, teste Cel. *Fallén*.

♀. Similis iterum priori, a qua vero magnitudine paullo minore, corpore magis ovato magisque obscuro, capite minus argenteo, antennis validioribus, totis nigris, seta paullo breviore, oculis majoribus, abdomine nigro, segmentis 2, 3 & 4 basi late cinereis, sed vix tessellatis, nervo transverso apicali nonnihil longius ab apice alicet in costa extenso, ut & squamis albidis, nec niveis, satis superque distincta. Palpi flavi. Margo anticus oris pallidus.

15. *T. muscaria*: oblonga, nigra, capite subargenteo; fronte sub prominente, modice lata, cana, vitta obscura; antennis longissimis, validiuseulis, seta triarticulata, fere ad medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, cinereis; alis subinermibus; vibrissis abbreviatis. ♂♀. (Long. 2—2 $\frac{1}{2}$  lin.).

Fall. Muscid. 14. 26. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 402. 281.  
♀. *Degeeria* Meig. 7. 249. 2. *Metopia* Macq. Buff. 2. 132. 34. ♀. *Tach. infuscata* Fall. Muscid. 14. 25. certe secundum Ejus collectionem.

Hab. in Suecia meridionali, Jun. Jul., passim, in copula saepe capta; scilicet in Scania ad Lund, Beckaskog, Esperöd, Räften, Abusa, &c., frequens; in Gotllandia ad Kjellunge rar.; in Ostrog. rar. E Dania a D. *Staeger* missa.

♂♀. Oblonga, subangusta. Frons ♂ non lata, serie setarum utrinque simplici, in ♀ perparum latior, serie setar. utrin-

46. *T. hystrix*: oblongo-ovata, nigra, capite albo-ante; fronte prominente, lata, grisea, vitta ferruginea; antennis longissimis, validis, seta triareculata, ultra medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque cingulis 3, griseo-albidis, alis subinermibus; vibrissis dimidiatis. ♀.  
(Long. 2 lin.).

Wahlb. in litteris, 1812.

Hab. in Suecia media rarissime; in Uplandia ad Holmiam a D. Prof. *Wahlberg* detecta, mihiique in uno specimine benevole communicata.

♀. A *T. muscaria*, cui affinis, differt: setis validioribus, anten-  
tis longioribus, seta fere ad apicem incrassata, fronte  
magis porrecta, multo latiore, capite cano, abdominis cin-

gulis flavo-cinereis, alis leviter fumatis, nec subflavidis, spinula costæ sat distincta, nervis transversis ordinario præcise in medio areæ inserto, apicali sat procul ab apice alæ excurrente, ut & setulis 2—3 basi nervi long. 3:tii longioribus. Opaca. Frons lata, serie setarum utrinque dupli ornata, vitta media lata, obscure ferruginea. Vibrissæ in medium epistomatis declivi adscendunt. Thorax obscure flavo-cinereus, lineis 4 indeterminatis, nigris. Scutellum griseum. Abdomen ovatum, nitidum, nigrum, cingulis 3 cinereo-flavis. Segmenta subæqualia, 1:mum apice setis 2, 2:dum setis in disco 2 & in apice 2, 3:tium setis in disco 2 & in apice pluribus, 4:tum multisetosum. Setæ laterales præterea adsuæt. Squamæ slavido-albæ. Pedes nigri, ungibus & pulvillis minutis.

**47. *T. albo-cingulata*:** oblonga, nigra capite argenteo-micante; fronte parum prominente, tiuscula, nigro-micante, vitta lata obscure ferruginea nigra; antennis longissimis, validis, seta brava senti triarticulata, fere ad apicem incrassata; thoraci cinereis, obsoletis; abdominis cingulis 3 albis; alarum nervo long. 3:tio basi seluloso; vibrissis subcontinuis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere 2 lin.).

Fall. Museid. 16. 30. ♂♀. genuina. Meig. 4. 376. 236. ♀. *Degeeria* Meig. 7. 249. 10.

Hab. in Scandinavia, mense Julio, minus frequens; scilicet in Scania rarer; in Ostrogoth. ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Wadstena, ipse; in Ölandia; in Gotllandia in pratis ad Färön, &c.; in Norvegia ad Thynäs rar. (E Glogavia a D. *Zeller*.).

♂♀. Similis *T. muscariae*, a qua magnitudine paullo minore, fronte nonnihil minus prominente, antennarum seta breviore, recta, apice tantum capillari, vibrissis fere ad radicem antennarum assurgentibus, alarum nervo transverso ordinario

recto in medio areae inserto, apicali mox ante apicem alæ in costa excurrente, ibique cum 3:to long. intime conjuncto, nervis longitudinalibus 5:to fere usque ad marginem interiorem extenso, ut & 3:to a basi ad nervulum transv. medium tenuiter setuloso, distincta. — Palpi in nostris specimini-  
bus flavi sunt, in *Meigeni* specie "nigri" dicuntur.

48. *T. ocyptera*: oblongo-ovata, nigra, nitida, capite albo-micante; fronte parum prominente, latiuscula, nigro-micante, vitta angusta, fusca; antennis longis, medioeribus, seta triarticulata? fere ad medium incrassata; alis subinermibus; squamis albis; vibrissis abbreviatis. ♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Muscid. 17. 32. ♀. Meig. Dipt. 4. 416. 308.

Hab. in Suecia rarissime; in Silva Esperöd Scaniae semel, D. *Fallén*; e Westrog. a D. *Gyllenhal* missa.

♀. Similis priori, sed brevior, antennis brevioribus, minus validis, seta longiori, vitta frontali angustiori, abdomine ovato, immaculato, alarum area apicali subpetiolata, nervo long. 3:to basi setulis 2—3, spinula costæ perspicuore, ut & squamis albis, dignota. Thorax humeris albo-micat. Palpi flavi. Vibrissæ vix ad medium epistomatis adscen-  
dentes.

49. *T. pallipes*: oblonga, cinerea, opaca, capite albicante; fronte parum prominula, lata, grisea, vitta lata subferruginea; antennis elongatis, linearibus, nigris, basi rufis, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; scutelli apice pedibusque flavis, thoracis lineolis 2 tarsisque nigris; alis subinermibus, nervo transverso apicali recto; vibrissis abbreviatis. ♀. (Long.  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Fall. Muscid. 22. 11. var. α. ♀. vera. — Meig. Dipt. 4. 411. 299? ♀. *Masicera* Meig. 7. 210. 14. *Eurigaster agilis* Macq. Buff. 2. 116. 2? ♂? Tab. 14. f. 11? nimis lata.

Hab. in Suecia rarissime, tria tantum individua vidi: unum in Scania ad Lund d. 4 Jul. 1822, & alterum in Gotlandia in folio fruticis prati sylvatici ad Gothem 6 Jul. 1819 inveni, tertiumque e Glogavia a D. Zeller missum.

♀. Flavido-cinerea. Frons latior, utrinque bifariam setosa. Setæ 3 utrinque infra antennas descendunt. Antennæ in-cumbentes, lineares, nigrae fere usque ad os descendunt, artieulis 2 basalibus brevibus rufis. Vibrissæ ad l. fere ultra medium epistomatis parum declivi adseendent. Os minime prominens. Oculi eerte nudi. Thoracis lineolæ anticeæ 4, angustæ, harum laterales parum perspicuae. Abdomen ob-longum convexum immaculatum, segmentis: 4:o brevi, in medio excavato, apice setis 2; 2:do in disco setis 2 & in apice setis 2; 3:tio in disco setis 4 & in apice pluribus; 4:to setis sparsis haud validis. Alæ cinereo-hyalinæ, basi subflavescentes, nervis transversis: ordinario recto in medio areæ inserto, apicali recto in apice alæ excurrente; area apicalis aperta; angulus nervi 4:ti obtusus; spinula costæ parva, gemina; nervus long. 3:tius basi setis 3—4 perspicuis. Squamæ flavo-albæ. Pedes cum coxis flavi, tarsis totis nigris. Oculi in viva rufi. In altero specimine nervus trans-versus apicalis in medio subinterruptus seu obliteratus, unde transitus ad sequentem ostenditur.

50. *T. antiqua*: oblonga, cinerea, opaca, capite albiente; fronte parum prominula, lata, grisea, vitta lata ferruginea; antennis elongatis, linearibus, nigris, basi rufis, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; scutelli apice pedibusque flavis; thoracis lineolis 2 tarsisque nigris; alis subinermibus, nervo transverso apicali deficiente; vibrissis abbreviatis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Meig. Dipt. I. 412. 300. ♀. *Eurigaster* Macq. Buff. 2. 117. 5. ♂♀. *Ræselia* Meig. 7. 253. 1. Tab. 72. f. 6. ♀. *Tach. pallipes* Fall. Muscid. 22. 44. var. β. ♀.

Hab. in foliis fruticum, floribus Umbellatarum, etiam in graminosis, saepe locis aridis, per Scandinaviam meridionalem & medium, 7 Jun.—20 Aug., passim; scilicet in Scania ubique vulgaris; in Blekingia passim; in Ostrogothia rarius, ex. gr. ad Gusum; in Ölandia, D. D. *Wahlberg* & *Boheman*; ad Hafniam Daniae Sept. semel capta a B. *Staeger*. (Sub nomine *T. antiqua* quoque a D. *Zeller* e Glogavia missa).

$\delta\varphi$ . Praecedenti ut ovum ovo similis, excepto nervo transverso apicali, qui *antiquae* deest, at in *pallipede* adest. Auctoritate D. *Meigeni* ut distinctam hanc propono speciem, cum Cel. *Fallén* suspicans eam tantum prioris esse varietatem, & id eo potius, quoniam in quibusdam individuis *T. antiquae* nervus transversus apicalis rudimentarius l. inchoans saltem juxta apicem alae observatur. Vibrissae fere ad medium epistomatis continuantur. Ungues & pulvilli minuti. Individua ab domine paullo angustiore, magis cylindrico, antennis paullulum majoribus & interstitio frontali, ni fallor, non nihil angustiore, ut mascula consideravi. — Variat femoribus anticis basi fuscis. Abdomen in ♀ apice saepe nigrum, nitidum (detritum).

51. *T. tibialis*: oblonga, obscure cinerea, capite albidente; fronte sub prominula, subangustata, nigro-micante, vitta nigra l. picea; antennis breviuseulis, linearibus, seta biarticulata vix ad medium incrassata, thoracis lineis 3, abdominis segmentis subaequalibus 1:mo toto, reliquisque apice, pedibusque, nigris; tibiis testaceis; alis cinereis, basi fusco-flavescentibus, area subaperta fere in apice alae exente; vibrissis nullis.  $\delta\varphi$ . (Long. circit. 3 lin.).

Fall. Musc. 13. 23.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 278. 67. Zett. Ins. Lapp. 637. 14.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7. 191. 17. *T. aestiva* Meig. 4. 278. 68.  $\delta\varphi$ . *T. aestivalis* Macq. Buff. 2. 115. 24.  $\delta\varphi$ .

Hab. in floribus Salicium, Umbellatarum &c., 15 Maj.—2 Jul., passim; scilicet in Scania ad Grönby (*Kinberg*), Börringe &c.; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum; in Westrog. ad Höberg, D. *Gyllenhal*; ad Gothoburgum, D. *Sundewall*; in Ölandia & Gotlandia, raro; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Lapponia Tornensi ad Juckasjervi rar.; in Dania, D. D. *Westermann* & *Staeger*.

$\delta\varphi$ .  $\delta$  subcylindricus,  $\varphi$  paullo latior, robustior. Antennæ epistomate subdeelivo paullo breviores, sublineares, valdinsculæ, nigrae, artieulo ultimo 2:do duplo longiore. Frons in  $\delta$  angustata, serie utrinque simplici setarum hand validarum, erectarum, in  $\varphi$  serie utrinque subduplici setarum validarum, subcurvatarum; infra antennas, in utroque sexu vix descendente. Margo oris anticus non reflexus. Palpi nigri. Thoracis lineolæ antieæ nigrae 3, harum media lata certo situ ostendens lineolas 2 tenues interstitio ob-scuro. Scutellum cinereum. Abdomen opacum nigrum, segmentis 3 posticis basi sat late cinereis; in medio & apice setis pluribus sparsis vestitum, segmentis 2 & 3 lateribus in  $\delta$  plerumque macula rufa. Alæ basi distinete, costa leviter, dilute fusco-flavescentes. Nervus transv. ordinarius inflexus paullo pone medium areæ insertus. Angulus nervi 4:ti subobtusus. Nervus long. 3:tius basi setis 1—2. Spinula costæ medioris. Squamae albidae, flavo-marginatæ. Pedes nigri, tibiis fere totis testaceis. Tarsi in  $\delta$  apice pilosi, ungibus pulvillisque magnis.

52. *T. nigripes*: oblonga, obscure cinerascens, capite albicante; fronte sub prominula, subangustata, nigromicante, vitta nigra; antennis breviusculis, linearibus, seta biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis lineis 4, abdominis segmentis 1:mo brevi, toto, reliquisque apice, pedibusque totis, nigris; alis cinereo-hyalinis, squa-

mis albis, area subaperta, paullo ante apicem alae in costa terminata; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Musc. 13. 21. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 357. 205. & 7. 191. 55. Zett. Ins. Lapp. 636. 12. ♂♀.

Hab. in Scandinavia, 12 Jul.—18 Sept., passim, in copula; scilicet in Scania in graminosis ad Esperöd in parœc. Mellby, &c. haud raro; in Ölandia, D. *Bohemian*; in Gotllandia in pratis ad Färön &c.; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Botnia occidentali ad Kemi rar.; in Norvegia inter Dovre & Lerdalsæren; D. *Bohemian*. (Sub nomine *Tach. vulgaris* a D. *Zeller* e Glogavia cōmmunicata).

♂♀. Priore raro major, plerumque paullo minor, eique valde similis, sed differt, fronte nonnihil minus prominula, alarum nervo long. 4:to magis exacte angulato, paullo remotius ab apice alae in costam excurrente, 3:to basi setulis plerumque 3—4 (nec 1—2), spinula castæ vix ulla, alis basi parum, & costa non, fuscō-flavidis, squamis albis, ut & tibiis nigris. Vibrissæ inferne paucissimæ. Thorax antice lineis 4. Abdominis latera in ♂ raro rufo-maculata. Abdomen certo situ linea dorsali nigra ut in priore. Setæ frontales paullo infra antennas descendunt. Reliqua ut in *T. tibiali*.

53. *T. mutabilis*: oblongo-ovata, corpore in ♂ nigricante, oculis appropinquantibus, in ♀ cinerascente, oculis remotioribus; fronte in utroque sexu subprominula, vitta atra; antennis subelongatis, linearibus, seta biarticulata, fere ad medium incrassata, pedibusque, nigris; alis subhyalinis, area subaperta fere in apice alae terminata, squamis subfuscans; vibrissis nullis. ♂♀ minor. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — fere 2 lin.).

*Mas*: nigricans, epistomate albo-micante. Frons angusta, serie setarum haud validarum utrinque simplici. Thorax

vittis 4, & abdomen maculis, certo situ cinereo-micantibus. Alæ & squamæ leviter subfuscaneæ. Ungues & pulvilli mediores;

*Fem.*: minor, tota cinerea, capite albicante. Frons modice lata, vitta atra, serie setarum utrinque subduplici. Thorax antice lineis 4 nigris tenuibus. Alæ & squamæ flavo-albidæ, vix infuscatae. Ungues & pulvilli parvi. In copula.

Fall. Musc. 16. 31. ♂♀. Meig. Dipt. I. 403. 285. (secund. Fall. transcripta). — Zett. Ins. Lapp. 638. 19. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum Coryli &c., per Scandinaviam meridionalem & medium, 10 Jul.—16 Sept., sat vulgaris, sole sereno frequenter obvia, in copula; scilicet in Scania ad Rästen, Björnstorps, Esperöd &c., copiose; in Smolandia, D. *Bohemus*; in Ostrogothia ad Wadstena &c. frequens; in Gotlandia rar.; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Botnia boreali ad Torneå, D. *Deutsch*. (Ad Rixdorf prope Berolinum 1812, D. *Dahlbom*, & e Glogavia a D. *Zeller*, missa).

♂♀. Similis priori, sed multo minor, magis ovata, ♂ obscurior, ♀ magis cinerea. Antennæ non ad os descendunt, lineares, articulo ultimo 2:do fere triplo longiore. Vibrisse nullæ. Setæ frontales 2—3 infra antennarum radicem descendunt. Alarum area apice parum aperta. Nervus long. 3:tus basi setulis 3—4 minutissimis. Spinula costæ nulla. Nervi præterea ut in priori directi. Similis *T. florati* infra 148, sed oculis nudis &c. dignota.

Var. b. ♀. saepe paullo minor ( $1\frac{1}{4}$  lin. long.), abdome cinereo, segmento 1:mo toto, 2 & 3 margine apicali sinuatim nigris; alarum nervo transverso ordinario jam recto, jam inflexo; de cetero feminæ var. a. similima. *Tach. pygmæa* Zett. Ins. Lapp. 641. 32. ♀. Hab. in Suecia cum priore mense Julio, passim; in Scania ad

Esperöd; in Smolandia, D. *Bohemus*; in Ostrog. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Kjellunge 26 Jul. 1819 freq.; in Norvegia, D. *Bohemus*.

51. *T. discolor*: oblongo-ovata, corpore in ♂ nigricante, oculis appropinquantibus, in ♀ cinerascente, oculis remotioribus; fronte in utroque sexu sub prominula, vitta atra; antennis subelongatis, linearibus, seta biarticulata, fere ad medium incrassata, pedibusque, nigris; alis basi & costa nigricantibus (♂), aut leviter subfuscans (♀); squamis flavo-albidis; area subaperta fere in apice alae terminata; vibrissis nullis. Major. (Long. 2½ lin.).

*Mas* & *femina* fere ut in priori differunt.

Zett. Ins. Lapp. 638. 20. ♂♀. *Tach. mutabilis* var. β. Fall. Muse. 17. 31. ♂. *T. bipunctata* Wiedem. in litt. *Tach. aprica* Zett. Ins. Lapp. 640. 28. ♀.

Hab. in foliis fruticum & floribus Umbellatarum, Salicu[m] &c., 1 Jul.—7 Sept., cum priori sat vulgaris, in copula deprehensa; scilicet in Scania ad Åbusa, Björnstorpe, Esperöd &c., frequens; in Ostrogothia ad Wadstena; in Lapponia Umensi ad Lycksele, Wilhelmina, Åsele, Almsele &c., copiose, & mares præsertim frequenter obvii. (E Kilia a D. *Wiedemann*, & e Glogavia a D. *Zeller* communicata).

♂♀. Simillima priori, sed præter magnitudinem constanter duplo majorem differt etiam ab illa, *mas*: colore nigriore, alis præsertim basi magis nigricantibus, abdominis lateribus griseis & macula in segmento 2:do utrinque rufescens, subpellucida; *femina* corpore aut cinereo, aut griseo-flavescente, alis hyalinis, squama flavescente, abdomine subunicolore; & ex utroque ambo occurunt sexus, similis tantum cum simili in copula junctus. Frons nonnihil magis prominens, quam in priore, & series setarum frontalium paullo longius infra antennas descendit, e pluribus setis (4

—6) in primis in ♂ constans. Abdomen ovatum, in ♂ cinereum, segmento 1:mo toto, reliquis linea dorsali nigra & præterea in 2:do & 3:tio mænæ 4 irregulares nigræ, atque in 2:do utrinque macula rufa; in ♀ griseum, segmento 1:mo obscuro, 2:do & 3:tio lineola dorsali & margine apicali angustissime, nigris obsoletis. Reliqua ut in *T. mutabilis*.

55. *T. incana*: oblonga, corpore in ♂ obscure cinereo, oculis appropinquantibus, in ♀ grisescente, oculis remotioribus; fronte in utroque sexu prominula, vitta atra; antennis elongatis, linearibus, seta triarticulata, non ad medium incrassata, thoracis lineis 4, abdominis lineola dorsali obsoleta, pedibusque, nigris; alis basi squamisque subflavidis, area subaperta fere in apice alæ terminata; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: cinereus. Frons angusta, serie setarum haud validarum, erectorum utrinque simplici. Thoracis lineæ 4 nigræ mediocres. Abdominis linea dorsalis in segmentis 2 & 3 brunnea. Genitale nigrum inflexum. Ungues & pulvilli majusculi;

*Fem.*: grisea. Frons latior, serie setarum utrinque duplo. Thoracis lineæ 4 nigræ tenues, obsoletæ. Abdominis linea dorsalis vix ulla. Ungues & pulvilli parvi.

Fall. Musc. 20. 40. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 385. 253. ♂♀. & 7. 191. 51. *T. cinerea* Fall. Musc. 20. 39. Descript. var. "palpis nigris."

Hab. in Seania rarissime; in Ölandia? D. Boheman; in Lapponia Umensi ad Åsele d. 26 Jul. 1832 specimen femineum inveni, in Insectis Lappon. cum *T. discolor* commixta.

♂♀. *Femina* præter magnitudinem majorem & abdomen immænlatum feminæ prioris valde similis; *mas* vero alis subhyalinis, nec nigrieantibus, abdome subimmænlatu &c., a mare præcedentis abunde dignotus. Antennæ elongatæ,

lineares, angustæ. Seta longa, capillaris, ad tertiam partem incrassata, articulis 2 basalibus brevissimis. Vibrissæ inferne inchoandæ. Abdomen subconicum, unicolor, fere undique sparse setosum, segmento 1:mo brevi, in medio excavato. Nervi inermes fere ut in priori directi; transversus ordin. inflexus, apicalis subrectus. Angulus nervi 4:ti subobtusus. Spinula costæ nulla. Epistoma albidum.

56. *T. incurva*: oblonga, cylindrica, griseo-cinerea; fronte sub prominula, lata, vitta altra; antennis elongatis, linearibus, seta triarticulata, ultra medium incrassata, thoracis lineolis 2, abdominis subcurvi apice, pedibusque, nigris; alarum area occlusa, in apice alæ terminata; vibrissis spuriis. ♂. (Long. 2--2½ lin.).

Hab. in Suecia rarissime; 2 tantum individua vidi, unum in folio fruticis in prato ad Esperöd in parœc. Tranås 8 Jul. 1820 inventum, alterum in Ölandia captum. E Suecia superiori olim etiam specimen missum.

♂. Griseo-cinerea, opaca. Frons lata, vitta media lata atra, serie setarum utrinque dupli, infra antennas per setas 3—4 utrinque simpliciter descendente. Antennæ liberae (non incombentes), articulo ultimo 2:do fere triplo longiore; seta distincte triarticulata, valida, apice capillari. Oculi parvi. Epistoma parum deelivum, flavidо-cinereum, vibrissis deflexis, vix ad medium adscendentibus. Oris margo anticus non reflexus. Palpi nigri. Thoracis lineolæ anticæ 2, approximatæ, angustæ, nigræ, postice abbreviatæ. Abdomen cylindricum, subinecurvum, segmentis subæqualibus; griseo-cinereum, segmentis 2 posticis nigris nitidis; setæ in medio dorsi paucæ, in apice plures. Alæ brevifusculæ, cinereæ, basi vix l. parum fuscanæ. Nervi obscuri; transversi: medius apici nervi long. 1:mi oppositus; ordinarius rectus præcise in medio areæ insertus; apicalis rectus in apice alæ cum long. 3:to intime conjunctus. Curvatura

nervi 4:ti arcuatim angulata. Setulæ ad basin nervi long. 3:tii 1—2 parvæ, sed spina eostæ distincta. Squamæ sor-dide albæ. Pedes nigri, ungibus & pulvillis non magnis.

**57.** *T. scutelligera*: ovata, obscure grisea, opaca; fronte parum prominula, modice lata, vitta altra; anten-nis elongatis, validiusculis, sela triarticulata fere ad medium incrassata, thoracis lineis 1, abdominis fasciis 1, pedibusque, nigris; scutello apice flavido; alarum area aperta, fere in apice alæ terminata; vibrissis nullis. ♂♀.  
(Long. 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Seania ad Lund, ubi tria specimina inveni.

♂♀. Frons grisea, vitta modice lata, nigra; series setarum per 3—4 setas infra antennas continuata. Antennæ longitu-dine epistomatis, articulis basalibus brevibus, ultimo vali-do, seta sat longa capillari, non usque ad medium incrassata. Oculi sat magni. Epistoma subperpendiculare, cine-reum, vibrissis nullis. Palpi nigri. Thorax obscure cine-rens, antice lineis 4 nigris. Scutellum apice indeterminate testaceum. Abdomen ovatum, nigrum, segmentis subæqua-libus, horum 2, 3 & 4 basi late cinerascentibus; totum pubescens, sed parum setulosum, nisi postice sparse; apie nitidum. Alæ cinereo-hyalinæ, radice albidae. Nervi trans-versi: medius fere apici auxiliaris oppositus; ordinarius subrectus fere in medio areæ insertus; apicalis subrectus fere in apice alæ excurrentis. Curvatura nervi 4:ti obtuse angulata. Basis nervi long. 3:tii setulis 1—2. Spina eostæ minuta. Squamæ albidae. Ungues & pulvilli parvi. Individuum antennis nonnihil validioribus & fronte ut videtur paullo latiore tamquam masculum considero.

**58.** *T. albinervis*: oblongo-ovata, obscure cinerea, opaca, capite argenteo; fronte haud prominula, angusta (♂), vitta altra; antennis breviusculis, non validis, seta biarticulata, fere ad medium incrassata, pedibusque,

nigris; alis hyalinis, area subocelusa, fere in apice alæ terminata, nervo apicali albo; vibrissis nullis. ♂. (Long.  $2\frac{1}{8}$  lin.).

Hab. in Suecia rarius; mihi a D. *Marklin* communicata; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia, D. *Boheman*.

♂. Oculis magnis, approximatis, antennis subbrevibus, setis frontalibus tenuibus, & nervo transverso apicali subincerto, obsoleto, albo, mox ante apicem alæ in costa exurrente, ab affinis dignoscitur. Cinerascens. Series setarum frontalium utrinque simplex vix infraantennas continuata. Frons & epistoma ante oculos parum prominentia. Antennæ epistomate paullo breviores, nigrae, articulo ultimo apice superne acuto quam 2:do duplo longiore; 1:mo brevi. Palpi nigri. Abdomen totum obscure cinereum, apice segmentorum setosum; segmento 1:mo subbrevi, reliquis basi angustissime canis. Nervus transv. ordin. rectus, fere in medio areæ insertus. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Ungues & pulvilli mediocre. — Variat oculis omnium tenuissime hirtulis.

59. *T. spathulecornis*: oblonga, subnitida, nigra, antice maculatim albicans; capite argenteo-nicante; fronte sub prominula, lata, vitta alba; antennis elongatis, apice distinete dilatatis, seta mediocri; alarum area fere in apice alæ terminata, squamis albis; vibrissis nullis. ♂. (Longit. inter 2—3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 637. 14. ♂. (per lapsum calamis: "spathuleformis").

Hab. in Lapponia Norvegica rarissime; in alpe Dovre a D. *Boheman* detecta.

♂. Afinis *T. nigripedi* (52), paullo angustior, antennarum forma & ab haec & ab aliis confinis mox dignota. Tota nigra. Epistoma argenteo-nicans. Antennæ longitudine episto-

matis, apice dilatatae spathulam formant. Frons utrinque albida. Thorax subvittatus. Abdomen subeylindricum, subincurvum, nigrum, nitidum immaculatum (au in specimine paullo detrito?). Alæ totæ subfuscō-hyalinæ. Nervus 4:tus rectangulatim flexus fere in summo apice alæ excurrit. Nervus transv. ordinarius subrectus. Squamæ albæ.

60. *T. Goniœoides*: oblonga, nigra, capite argenteo-micante; fronte ample prominentia, vitta nigra; antennis elongatis, validis, seta triarticulata, crassa, apice capillari; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, albido-cinereis; alis cinereis, basi squamisque flavo-albis, area aperta, in apice alæ terminata; vibrissis spuriis. ♀. (Long. 4 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 639: 22. ♀.

Hab. in Suecia, 26 Jul.—8 Aug. mibi obvia, rarius; scilicet e villa Höberg Westrogothiae a D. *Gyllenhal* comunicata; in Ostrogothia ad Gusum, in floribus Angelicæ a D. *Wahlberg* lecta; in Jemtlandiæ ad diversorium Berge in Alsen 1810, D. *Dahlbom*; in Lapponia Suecica Umen-si ad Åsele 1832, ipse.

♀. Major. Frons & epistoma ample prominentia, nigra, argenteo-micantia. Frons lata, vitta sat lata nigra, opaca, longitudinaliter strigilata. Series setarum postice utrinque duplex, antice simplex, per setas 2 infra antennas continua. Vibrissæ inferne panceissimæ, sed setulæ plures ad latera epistomatis. Antennæ longitudine fere epistomatis, latæ, articulis hasalibus brevibus; seta ultra medium crassa, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo duplo l. triplo longiore. Margo oris anticus haud reflexus, albidus. Genæ rufo-piceæ. Palpi nigri. Thorax glauco-albidus, lineis 4 nigris. Abdomen oblongum, convexum, segmentis subæqualibus; totum nigrum, subnitidum, segmentis 3 posticis basi indeterminate, glauco-albis; longitudinaliter in medio, & postice, setis sparse vestitum. Alæ albido-cinereæ, basi

subflavidæ. Nervi transversi: medius apiei nervi long. 1:mi oppositus; ordinarius leviter flexus pone medium areæ insertus; apicalis levissime incurvus in apice alæ excurrentis. Curvatura nervi 4:ti angulata. Nervus long. 3:tius basi setulæ 3—4. Spinula costæ nulla. Tarsorum ungues pulvillique parvi.

*Obs.* Affinis *T. deriae* n:o 42. Inter *Thryptoceram* & *Illigeram* hæc species media, notas eum ambabus communis habens, *Illigeræ* forsitan propius accedens.

61. *T. cylindracea*: cylindrica, atra, nitida, capite argenteo-micante; fronte haud prominula, lata, vitta atra; antennæ elongatis, seta biarticulata ad medium incrassata; alis hyalinis ad costam subfuscans, area subaperta, in apice alæ terminata; squamis albidis; vibrissis nullis. ♀. (Long.  $2\frac{1}{8}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; in Ostrogothia ad villam Lärketorp in parœcia Mjölbyp d. 17 Jul. specimen unicum inveni. (E Glogavia a D. Zeller etiam missa).

♀. Caput argenteo-micans. Oculi oblongi. Vitta frontalis medioeris, atra, opaca. Series setarum utrinque duplex, infra antennas per setas 2—3 descendens. Antennæ longitudine epistomatis perpendicularis, lineares, nigræ, articulis basalibus brevibus. Seta elongata, capillaris, nuda, fere ad medium incrassata, articulo basali brevissimo. Margo oris anticus minime reflexus. Palpi obscure flavi, in exemplis Glogaviensibus nigri. Humeri & pleuræ leviter albo-micant. Abdomen elongatum, angustum, cylindricum, atrum, nitidum segmentis 2 & 3 basi ad latera fasciis inchoandis leviter albo-micantibus. Segmenta omnia subæqualia, 1:mum apice setis 2; 2:dum setis in medio 2, in apice 4; 3:tum 4:tumque undique sparse setosa. Alæ ad costam levissime fuscans. Nervus transv. ordinari. rectus in medio 1. mox pone medium

areæ insertus. Area anguste aperta. Nervi longitudinales: 4:tus subareuatim flexus, 3:tius basi setulis 2—3. Spinula costæ nulla. Squamæ mediocres, albidæ. Ungues & pulvilli tarsorum parvi. — Affinis *Hypostenæ* generi Meig., sed per setam nudam &c. diversa.

62. *T. nigrisquama*: oblonga, atra; fronte minime prominula; oculis cohærentibus ( $\delta$ ); antennis subelongatis, angustis, seta biarticulata, basi subincrassata; alis squamisque fuscaneis, area aperta, in apice alæ terminata; vibrissis nullis.  $\delta$ . (Long. 1½ lin.).

Zett. Ins. Lapp. 639. 24.  $\delta$ .

Hab. in Norvegia raro; in alpe insigni Dovre a D. Boheman mens. Julio detecta.

$\delta$ . Subcylindrica, tota aterrima, subopaca. Caput nigrum. Oculis magnis, cohærentibus, fronte & epistomate minime prominulis, alis, squamisque parvis, nigricantibus, nervo transverso ord. rectissimo fere ante medium areæ inserto, ab domine oblongo, atro, nitido, immaculato, parum setoso, nisi ad latera & apice tenuiter setuloso, ab affinibus mox dignota; generibus *Phaniae* & *Uromyiae* Meig. appropinquans. Antennæ epistomate brevi nonnihil breviores, articulis basalibus brevibus, seta elongata, capillari, basi parum incrassata. Alarum area apice anguste aperta. Nervus transv. ordin. in medio l. mox ante medium areæ situs. Nervi longitudinales: 4:tus areuatim flexus, 3:tius basi setulis 2—3. Spinula costæ nulla. Squamæ parvæ. Ungues & pulvilli parvi.

63. *T. zonella*: ovata, cinerea, opaca; fronte haud prominula, lata, concolore, vitta fusca; antennis subelongatis, dilatatis, seta triarticulata, fere ad apicem incrassata, thoracis lineolis 2, pedibusque, nigris; abdome atro, nitido, incisuris tenuiter albis; alis hyalinis, basi albidis, squamis pallescentibus, area aperta, in apice alæ terminata; vibrissis nullis.  $\delta\varphi$ . (Long. fere 2 lin.).

Hab. in Suecia rarius; in Smolandia a D. *Bohemani* in copula capta; etiam in Suecia superiore a D. *Wahlberg* inventa, loco speciali non indicato.

$\delta\varphi$ . Statura ovata & magnitudo parva *T. scutelligeræ* (57). Cinerea. Frons lata, vitta griseo-fusca. Series setarum vix infra antennas continuata. Antennæ epistomate fere breviores, latæ, nigrae, artieulis basalibus brevibus. Seta antenna parum longior, crassa, nigra, in medio subfracta, apice capillaris, artieulis basalibus: 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore. Epistoma breve, subperpendiculare, haud prominens, vibrissis inferne vix ulla. Margo oris anticus non reflexus, anguste flavus. Palpi nigri. Thoracis lineolæ anticæ binæ nigrae. Abdomen ovatum, nigrum, subnitidum, in medio & postice parce setosum, segmentis subæqualibus. Fasciæ 3 angustæ in basi segmentorum 2, 3 & 4. Alarum nervus transversus ordinarius in medio 1. mox ante medium areæ situs. Area apice anguste aperta. Nervus long. 4:tus subarcuatim flexus, 3:tius basi setulis 1—2. Spinula costæ nulla. Mas femina paullo minor, aro subinflexo. Mas hodie mihi deest.

64. *T. minutissima*: ovata, cinerea, opaca: fronte haud prominula, subangustata ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), vitta in utroque sexu nigra; antennis subelongatis, versus apicem dilatatis, seta triarticulata, fere ad apicem incrassata, pedibusque, nigris; abdome atro, nitido, incisuris tenuiter albis; alis hyalinis, squamis albidis, area aperta in apice alæ terminata; vibrissis nullis.  $\delta\varphi$ . (Long. vix 1 lin.).

Hab. in Scandinavia media & boreali rarissime, tria tantum specimina 2 Jul.—21 Aug. inveni; scilicet 2 mascula in graminosis ad Laforsen Helsingiæ atque in Norvegia ad Thynæs; & unicum semiueum ad Lärketorp Ostrogothiæ.

$\delta\varphi$ . Simillima *T. zonellæ*, a qua vero magnitudine triplo & ultra minore, antennis tantum versus apicem, nec per to-

tam longitudinem, dilatatis, thorace immaculato, vix ante bilineato, alis basi vix albido, ut & nervo transverso apicali obsoleto, interdum fere evanescente, dignoscitur. Tarsorum ungues & pulvilli in omnibus meis exemplis minutus sunt, sed fronte angustiore ut mares, & fronte latiore praedita, ut feminam consideravi. — Reliqua omnia ut in praecedente.

65. *T. nigrina*: ovata, obscure cinerea, opaca; fronte haud prominula, lata, vitta lutea; antennis subelon-gatis, dilatatis; seta breviuseula, triarticulata, ultra medium incrassata, pedibusque, nigris; abdomine ovato, nigro, nitido; alis albo-hyalinis, nervulis transversis praeter medium nullis; vibrissis spuriis. ♀. (Long. fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 355. 202? Zett. Ins. Lapp. 640. 30. ♀.  
*Roeselia* Meig. 7. 253. 2?

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; ad Kengis 22 Aug. 1821. semel capta.

♀. Similis *T. ocyptera*, sed nervorum ratione ab hac & affinibus dignota. Parva. Caput ut in priori. Vitta frontalis haud lata, rufa, serie setarum utrinque duplo. Antennae vix longitudine epistomatis brevis, latæ, nigrae, articulis basalibus brevibus. Seta antenna parum longior, ultra medium modice crassa, 3-articulata, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore. Thorax immaculatus. Abdomen rotundatum, subdepressum, nigrum, nitidum, immaculatum, in medio & postice setulosum. Nervi transversi ordinarius & apicalis deficientes. Nervus long. 3:tius basi setulis 2. Spinula costæ valde minuta. Squamæ albæ. Pedes nigri, ungibus & pulvillis minutissimis. Media inter *Roeseliam* & *Actiam* Meig.

66. *T. laticornis*: oblonga, nigra, subnitida, capite argenteo-micante; fronte parum prominente, lata, vitta alba; antennis longissimis, magnis, seta triarticulata ultra

medium incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdominisque cingulis 3 angustis, albis; alis hyalinis, area subaperta in apice aëe terminata, nervo transv. ordinario subinfuso mox pone medium areæ inserto; vibrissis ultra medium epistomatis adscendentibus. ♀.? (Long. 2½ lin.).

Zett. Ins. Lapp. 637. 15. ♀.

Hab. in Scandinavia boreali rarissime. Duo tantum exempla vidi, unum in Norvegia ad Bossekop Finmarkiæ occidentalis non longe a NordCap d. 4 Aug. 1821, lectum, & alterum e Glogavia a D. Zeller mecum communicatum. In Dalecarlia quoque deprehensa fuerit.

♀? A sequente, cui similis, differt præcipue: nervo transverso ordinario leviter flexo, nec recto, nervo long. 4:to angulatum, nec subarcuatim, flexo, ut et abdominis fasciis angustioribus, albidioribus. Frons modice lata, vitta media lata, brunnneo-nigra, serie setarum utrinque duplii per setas 3 infra antennas descendente. Antennæ longitudine epistomatis subdeclivi, latæ, articulis basalibus brevibus. Seta elongata, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore, ultimo ultra medium incrassato. Os non reflexum. Thorax, præsertim antice albo-micans, lineolis 4 nigris. Abdomen conicum, ut in priori setosum; atrum, cingulis 3 angustatis, niveis. Segmentum 1:mum singulo reliquorum parum brevius. Alarum area anguste aperta. Nervi longitudinales: 3:tius basi setulis 3—4, 4:tus exacte angulatum flexus, 5:tus non usque in summum marginem interioreum aëe extensus. Spinula costæ parva. Squamæ albidae. Ungues & pulvilli tarsorum minusculi.

67. *T. ornata*: oblonga, nigra, subnitida, capite argenteo-micante; fronte parum prominente, lata, vitta atra; antennis longissimis, magnis, seta triarticulata ultra medium incrassata, thoracis vittis anticis 5, abdominisque fasciis 3 latioribus, cinereis; alis hyalinis, area subaperta

in apice alæ terminata, nervis: transverso ordinario recto, mox pone medium areæ inserto, longitudinali 5:to in marginem alæ extenso; vibrissis continuis. ♀? (Long. 2½ lin.).

*Degeeria ornata* Meig. Dipt. 7. 249. 37. (♂♀).

Hab. in Suecia boreali rarissime; in Jemtlandia ad radicem alpis insignis Åreskutan 1 Aug. 1840 individuum unicum inveni.

♀? Simillima priori, sed serie vibrissarum fere ad antennarum radicem continuata, abdominis fasciis 3 latioribus, minus determinatis, cinereis, nec albis, curvatura nervi 4:ti subarcuata saltem non exakte angulata, nervo transverso ord. recto, ut & nervo long. 5:to usque ad summum marginem interiorem ducto, vere differt.

68. *T. collaris*: oblonga, nigra, parum nitida, capite argenteo-micante; fronte subprominente, angustata (♂), aut modice lata (♀); vitta atra; antennis elongatis, angustatis, linearibus, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis vittis anticus 5, abdominisque fasciis 3 interruptis, albis; alis hyalinis, area subaperta in apice alæ terminata, nervo transverso ordinario subrecto; vibrissis ultra medium epistomatis adscendentibus. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Fall. Muse. 15. 27. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 403. 286. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 637. 16. ♂♀. *Metopia* Macq. Buff. 2. 130. 26. ♂♀. *Degeeria* Meig. Dipt. 7. 249. 7. t. 71. f. 31. ♂.

Hab. in soliis fruticum & floribus Umbellatarum, per prata Scandinaviae, 21 Jun.—18 Aug., passim; scilicet in Scania ad Räften, Esperöd &c.; in Smolandia, D. Boheman; in Ostrog. ad Lärketorp, Medhamra prope Wadstena, Gusum &c.; in Ölandia freq.; in Gotllandia, D. Wahlberg; in Norvegia ex. gr. in alpe Dovre & ad Næs Værdalæ.

$\delta\varnothing$ . Similis iterum priori, sed antennis multo angustioribus, fronte magis angustata, abdominis fasciis albis subinterruptis, ut & nervo long. 5:to non usque ad marginem interiorem produento, distineta. — Oculi magni. Vitta frontalis aterrima. Seta antennarum longa. Vibrissae fere ad antennarum basin continuatæ. Curvatura nervi 4:ti subangustatim arenata. Spinula costæ nulla.  $\delta$ : fronte angusta, serie setarum tenuium utrinque simplici, ungvibus pulvillisque majusculis;  $\varnothing$ : fronte modice lata, serie setarum medio-erum postice duplicei, ungvibus pulvillisque paullo minoribus. — Seta antennarum microscope pubescens.

*Obs.* Individuum masculum vidi nervo transv. apicali interrupto, & aliud feminineum antennis brevibus vix dimidium epistomatis attingentibus, ambo in ceteris varietati genuinæ simillima, in Scania ad Esperöd deprehensa.

69. *T. blanda*: subcylindrica, nigra, subnitida, capite argenteo; fronte sub prominente, lata, vitta atra; antennis longitudine epistomatis, subangustatis, linearibus, seta triarticulata, ad medium incrassata; thoracis vittis 3, abdominisque fasciis totidem subintegris, albis; alis cinereis, area subaperta, in apice ake terminata, nervo transverso ordinario subrecto, curvatura nervi long. 4:ti arcuata; vibrissis ultra medium epistomatis adscendentibus; tarsis anticis in  $\varnothing$  subdilatatis.  $\delta\varnothing$ . (Long. 2 $\frac{1}{4}$ —3 lin.).

Fall. Muse. 15. 29.  $\delta\varnothing$ . Meig. Dipt. 4. 404. 287.  $\varnothing$ . *Metopia* Macq. Buff. 2. 130. 27.  $\delta$  (potius  $\varnothing$ ?). *Degeeria* Meig. Dipt. 7. 249. 16. (Sub *T. infuscata* Fall. Muse. 14. 25. etiam latet).

Hab. in Suecia, 10 Jul.—5 Sept., passim, non frequens; scilicet in Scania raro; in Ostrogothia ad Lärketorp & Gusum; in Westrogoth., D. *Gyllenhal*; in Ölandia, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Nähr, Kjellunge &c.; in Dalecarlia, D. *Bohemau*; in Jenitlandia ad diversoria

Rälän & Faxelfven, atque ad radicem alpium Mullfjell-en, passim.

$\delta\varphi$ . *T. collaris* affinis & similis, sed in  $\delta$  fronte latiore, setis validioribus, utrinque dupli serie dispositis, ungibus pulvillisque minoribus, in  $\varphi$  tarsis antice magis dilatatis, & in utroque sexu seta antennarum circiter usque ad medium incrassata, fronte nonnihil minus prominula, oculis majoribus &c., præcipue dignoscitur. Thoracis vittæ laterales albæ integræ. Abdominis fasciæ albæ angustæ. Antennæ in  $\varphi$  angustatæ, ut in priori, sed in  $\delta$  majores latiores.

70. *T. convexifrons*: subovata, nigra, nitida, capite argenteo; fronte parum prominente, lata, vitta alba; antennis elongatis, modice latis, sela biarticulata, fere ad medium incrassata; thorace leviter albicante, lineolis 4 antice nigris; abdomine atro, cingulis 3 niveis; alis hyalinis, area subaperta fere in apice alae terminata, nervo transverso ordinario in medio areæ inserto, curvatura nervi long. 4:ti angulata; vibrissis ultra medium epistomatis adscendentibus; tarsis simplicibus.  $\varphi$ . (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

Hab. in pratis Sueciæ mediæ, mense Julio, minus frequens; in Gotlandia ad Lärbro, D. *Dahlbom*; in Ostrogothia ad Gusum capta, a D. *Wahlberg* sub nomine *T. albicincta* missa; ad Wadstena, ipse.

$\varphi$ . A *T. collaris*, 68, cui similis, differt: magnitudine paullo minore, magis ovata, fronte parum porrecta, antennis paullo latioribus, thoracis albedine antica minus determinata, alarum area non in summo apice, sed mox ante apicem alae educta, nervo long. 4:to angulatum, nec arcuatim, flexo, transverso ordinario in medio, nec pone medium, areæ inserto, ideoque longius a margine interiore remoto, ut & segmento costæ 2:do (cfr. *Nephrocerus* gen. 100) paullo breviori. Frons sat lata postice obscura. Oculi majusculi. Thorax & scutellum levissime albescentia, lineolis antice

nigris parum perspicuis. Abdominis segmentum 4:um sub breve. Cingula abdominis 3 nivea anguste interrupta. Alarum nerv. long. 3:tius basi setulis 2. Squamae albæ.

**71.** *T. albicincta*: cylindrica, nigra, subnitida, capite subargenteo; fronte minus prominente, modice lata, vitta atra; antennis longitudine epistomatis, magnis, seta triarticulata, ad medium incrassata; thoracis vittis antieis subquinis obsoletis, abdominalisque cingulis 3 angustis sub-integris, albis; alis hyalinis, area subaperta in apice alæ terminata, nervo transverso ordinario subrecto mox pone medium areæ inserto, curvatura nervi long. 4:ti subarcuata; vibrissis ultra medium epistomatis adscendentibus, tarsis simplicibus. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 638. 17. ♀.

Hab. in Scandinavia boreali rarissime; marem in Norvegia ad Thynæs in parœc. Skogn 1 Jul. 1810, & seminam in silva Stensele Lapponiae Umensis 1 Jul. 1832, inveni. In Dalecarlia etiam lecta erit.

♂♀. Similis *T. blanda* (69), sed minor, angustior, antennis multo majoribus, latioribus & præsertim in ♂ amplis, ut & tarsis antieis in utroque sexu simplicibus, certe distincta. Nervus long. 4:tius subarcuatim seu obtuse angulatim flexus. Thoracis vittæ antice albide parum determinatæ. Nervus long. 3:tius basi setulis 2–3. Spinaula costæ minuta. A *T. albo-cingulata* n:o 47, cui etiam valde similis, seta antennarum longiori, vix ultra medium incrassata, palpis nigris, nec flavidis, & nervo long. 4:to in apice, nec paullo ante apicem, alæ excurrente, facile dignota.

**72.** *T. semicincta*: oblonga, nigra, capite argenteo; fronte minus prominente, modice lata, vitta atra; antennis longitudine epistomatis, magnis, seta triarticulata, ad medium incrassata; thoracee antice lateribus albicante;

abdominis cingulis 3 angustis, interruptis, albis; alis hyalinis, area aperta in apice alae terminata, nervo transverso ordinario recto, in medio areæ inserto, curvatura nervi long. 4:ti subangulata; vibrissis abbreviatis; tarsis simplibus. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 638. 18. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime, a D. Doct. *Deutsch* in uno specimine communicata.

♀. Simillima priori, a qua vero statura paullo latiore, oculis in fronte non tam late remotis, corpore parum albo-micante, abdominis cingulis albis subinterruptis, alis cinereis, nec pure hyalinis, area apice nonnihil magis aperta, ut & serie vibrissarum vix ad medium epistomatis continuata, differre videtur. Pleuræ cineren-micantes. Nervus long. 4:tus subangulatim flexus. Spinula costæ nulla. Squamæ subflavido-albæ. Abdomen ovatum.

73. *T. morio*: ovata, atra, immaculata, nitida, epistomate leviter albo-micante; fronte sub prominente, modice lata, nigra, vitta atra; antennis elongatis, validis, seta triarticulata, ad medium incrassata; alis cinereis, nervis pallidis, transverso ordinario recto in medio areæ inserto, area subocclusa in apice alae terminata, curvatura nervi 4:ti arcuatim angulata, squamis flavido-albis; vibrissis abbreviatis. ♂♀. (Long. 2—2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Dipt. Musc. 18. 34. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 639. 26. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali & media rarius, in Alnetis & floribus 30 Maii—1 Sept. obvia, in copula 21 Aug. capta; scilicet in Scania ad Abusa & in fruticibus juxta littus maris ad Esperöd; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Wadstena, ipse; in Dalecarlia ad

divisor. Smedby, D. *Dahlbom*; in alpe Dovre Norvegiae, D. *Bohemus*.

♂♀. Statura corporis ovali, subdepressa, & colore atro, a proxime antedentibus primo intuitu dignota. Series setarum frontalium utrinque duplex, per 3 setas infra antennas continua. Antennae longitudine epistomatis subdeclivi, articulis basalibus brevibus. Seta antenna nonnihil longior, 3-articulata, capillaris, fere ad medium incrassata, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo duplo longiori. Vibrissae vix ad medium epistomatis adscendentur. Oculi medioeres rufescentes. Abdomen ovatum, ut in proxime antecedentibus setosum, segmento 1:mo brevi. Alae basi pallescentes. Spinula costae parva. Nervus long. 3:tius basi bisetulosus. Halterum clava nigra. Tarsi simplices, ungvibus pulvillisque parvis. Frons in utroque sexu fere æque lata, sed abdomen in ♂ paullo angustius, & apice crassius, quam in ♀. Habitus *Lonchææ*. In speciminibus bene conservatis humeri & pleuræ leviter cinereo-micant.

74. *T. ocyptera*: ovata, nitida, atra, subimmaculata, capite cinereo-micante; fronte subprominente, modice lata, vitta lata, atra; antennis elongatis, validis, seta triarticulata, fere ad medium incrassata; alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto in medio areæ inserto, area occlusa, apice breviter petiolata, curvatura nervi long. 4:ti angulata, squamis albidis; vibrissis ad medium epistomatis adscendentibus. ♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 639. 25. ♀.

Hab. in Scandinavia valde rara, 12--16 Jul. mihi obvia; scilicet in Scania in Pinetis ad Kjeflinge in vicinitate maris & in littore maris ad Lomma; in Norvegia inter Dovre & Lerdalsören a D. *Bohemus* etiam deprehensa.

♀. Simillima priori, differt tamen: magnitudine paullo minore (præsertim in exemplo Norvegio), vitta frontali atra

nonnihi latiore, serie vibrissarum paullo altius adscendente, thorace anterius levissime cinerascente, alis hyalinis, nec pallidis, area apice distinete occlusa, breviter petiolata, nervo long. 4:to obtuse angulatim flexo, ut & squamis albidis. A *T. cypterata* (48) capite vibrissato, antennis longioribus, palpis nigris, nec flavis, vitta frontali atra latiore, &c., mox dignoscitur.

**75. *T. Erinaceus*:** cylindrica, atra, nitida, capite glauco-micante; fronte porrecta, lata, vitta lata, atra; antennis elongatis, articulo 3:do ultimoque subaeque longis, seta breviuscula, 3-articulata, crassa; alis hyalinis, costa fusca, area subaperta mox ante apicem alee terminata, nervo transverso ordinario subrecto, paullo pone medium areæ inserto, curvatura nervi long. 4:ti angulata, nervo long. 3:to ultra transversum medium setuloso; vibrissis nullis; epistomate ad latera parce setoso. ♂♀. (Long. 3 ln.).

Fabr. Antl. 311. 10. Fall. Muse. 15. 28. ♂♀. Meig. Dipt. 1. 315. 183. *Sericocera erinacea* Maeq. Buff. 2. 166. 2. *Peteia erinacea* Meig. Dipt. 7. 211. 1. Tab. 69. f. 56.

Hab. in soliis fruticum, sed etiam in graminosis, saepe locis humidis, per Scandinaviam praesertim meridionalem & medium, 20 Jun.—29 Jul., passim; scilicet in Scania circa Lund (D. von Borch), Esperöd (D. C. Are-schoug) &c., sat frequens; in Ostrogothia ad Wadstena &c. passim; in Ölandia rar.; in Dania ad Hafniam Aug. rarius, D. D. Fabricius & Staeger. In *Tephritis* pupa parasita e fructu Rosæ exclusa Lund 22 Jun. 1837, teste D. Dahlbom.

♂♀. Cylindrica, atra. Caput glauco. Vitta frontalis lata, atra (raro ferruginea), opaca, serie setarum validarum utrinque duplii. Series simplex setarum 4—6 per latera

epistomatis declivi usque ad os descendit. Vibrissæ nullæ. Antennæ liberæ, haud validæ, nigræ; seta ultra medium crassa, articulis 2 basalibus brevibus. Palpi nigri. Abdomen elongatum, segmentis æqualibus, margine apicali valde setosis (in singulo setis 4—6); atrum, segmentis 2 & 3 basi angustissime albo-micantibus. Alæ breves, hyalinæ, costa fusca l. nigrante. Segmentum costæ 2:dum (cfr. *Nephrocerus* gen. 100) brevissimum. Nervi transversi: medius paullo pone apicem nervi long. 1:mi ductus; ordinarius rectus, interdum inlexus, semper mox pone medium areæ insertus. Nervi longitudinales: 4:tus distincte angulatim flexus, nonnihil ante apicem alæ in costa excurrens; 3:tius a basi & ultra transversum medium setulosus. Spinula costæ distincta. Squamæ mediocres, albæ. Halteres testacei. Pedes simplices, ungvibus & pulvillis in utroque sexu parvis. ♂ & ♀ simillimi & externe vix differunt, nisi vitam frontalem in ♀ paullo latiore dicere velles.

76. *T. marginata*: oblonga, atra, nitida, capite argenteo-micante; fronte sub prominente, lata, vitta lata, atra; antennis epistomate brevioribus, latissculis, articulo ultimo 2:do dimidium longiore, seta biarticulata, ad medium incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdominisque fasciis 3, albidis, obsoletis; alis hyalinis, costa fuscana, area aperta sere in apice alæ terminata, nervo transv. ordinario obliquo mox pone medium areæ inserto, curvatura nervi long. 1:ti geniculata, nervo long. 3:ti setuloso; vibrissis nullis; epistomate ad latera seloso. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 301. 107. ♀. Tab. 11. f. 31. ala. —  
*Plagia* Meig. Dipt. 7. 201. 4.

Hab. in Norvegia rarius; ad divisorium Thynæs in parœcia Skogn, & ad Næs Værdaliæ, 1—8 Jul. 1840 individua 5, quorum unum masculum & 4 feminea inveni.

$\delta\varnothing$ . Similis priori, sed corpore minus cylindrico, fronte paullo minus porrecta, antennarum articulo ultimo paullo longiore & latiore, seta biarticulata? vix ad medium inerassata, setis ad latera epistomatis pluribus (5–6), thorace leviter albescente, lineis anticis 4 nigris, abdominis fasciis 3 certo situ perspicuis, alarum costa minus infuseata, nervo transv. ordinario obliquo, nec subperpendiculari, nervo 4:to magis geniculatum flexo, abunde distincta. Spina costæ adest. Color corporis cœrulecenti ater. Abdominis 1:mum segmentum breve. *Mas:* antennarum articulo ultimo nonnihil latiore, abdome paullo angustiore, genitale in apertura segmenti ultimi convexo recondito, a *femina:* vagina retracta in segmento anali hiante immersa, dignoscitur. — A *T. trepida* (14), & *subcineta* (15), quibus valde affinis, nervo long. 4:to infra angulum non continuato &c., dignota.

77. *T. cuneicornis*: oblonga, atra, nitida, capite argenteo; fronte subproninente, lata, vitta lata, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, extrosum dilatatis, articulo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, basi inerassata; thoracis vittis anticis 5, abdominisque fasciis 3, albidis, obsoletis; alis hyalinis, costa fuscana, area aperta fere in apice alæ terminata, nervo transv. ordinario obliquo in medio areæ inserito, curvatura nervi long. 1:ti geniculata, nervo 3:ti setuloso; vibrissis nullis; epistomate ad latera setoso.  $\delta\varnothing$ . (Long. 3 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali & Norvegia rarissime; in Scania ad Kjellby prope Lund mense Junio 1830 semel ab oculatiss. D. Dahlbom deprehensa; ad Næs Norvegia etiam capta. (E Glogavia a D. Zeller sine synonymia missa).

$\delta\varnothing$ . Priori ut ovum ovo similis, sed magnitudine nonnihil majore, antennarum articulo ultimo 2:do triplo, nec dimi-

dium l. duplo, longiore, extus (præsertim in ♂) paullulum magis dilatato & seta non ad medium incrassata, præcipue differre videtur.

**78. *T. lugubrina*:** oblonga, atra, nitida, capite cinereo; fronte parum prominente, lata, nigro-nicante, vitta lata sanguinea; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo lato 2:do duplo longiore, seta brevi, triarticulata, crassa, in medio geniculata; thoracis vittis antieis 5, abdominisque cingulis 3, glauco-albis, obsoletis; alis hyalinis, area ocelusa ante apicem alæ in costa terminata, nervo transverso ordinario recto, subperpendiculare, pone medium areæ inserto, curvatura nervi 4:ti geniculata, nervis long. 1 & 3 setulosis; vibrissis spuriis. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad littus maris individua 2 inveni, unum masculum ad Lomma 12 Jul., & alterum femineum ad Esperöd in parœc. Mellby 12 Aug. lectum.

♂♀. Similis *T. morioni* (73), & *ocypterinæ* (74), sed alarum nervis longitudinalibus 1:mo ad medium sui ipsius & 3:to ad nervulum transversum medium, setulosis, ut & aliis notis vere diversa. Antennarum articulus ultimus in ♂ latissimus, in ♀ modice latus. Frons lata, nigricans, vitta lata, ferruginea, serie setarum mediocrinum (♂), aut validarum (♀), utrinque dupli per setas 3 infra antennas descendente. Epistoma declivum. Vibrissæ inferne spuriæ. Genæ rufescentes. Palpi nigri. Oculi mediocre, subexserti. Thorax levissime albidus, lineis anticis 4 nigris. Abdomen ovale, subdepressum, parum pubescens, nitidum, glaucum, segmento 1:mo brevi, inermi, toto, reliquisque apice late, nigris, margineque apicali parce setosis. Anus aut subcrassus, breviter inflexus (♂), aut subattenuatus (♀). Alæ subalbido-hyalinæ, nervo costali atro. Nervi trans-

versi: medius apici nervi long. 1:ni oppositus; ordinarius aperte pone medium areæ insertus; apicalis subincurvus. Area oclusa, apice brevissime petiolata. Segmenta costæ: 1:mum elongatum æquale 3:to, & 2:dum breve æquale 4:to; spinula nulla. Squamæ albæ. Halteres fusi. Pedes non valide spinulosi, tarsis simplicibus, ungibus pulvillisque in ♂♀ parvis.

79. *T. setipennis*: ovata, obscure cinerea, opaca, capite griseo; fronte parum prominente, lata, vitta lata subferruginea; antennis elongatis, validis, seta brevi, tri-articulata, crassa, articulis subæqualibus, thoracis lineolis anticus 2, abdominis fasciis 4, pedibusque, nigris; alis hyalinis, area aperta in apice alæ terminata, nervo transv. ordinario recto in medio areæ inserto, nervis longit. 1, 3, 5 setulosis; vibrissis nullis; epistomate ad latera setuloso. ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin.).

Fall. Musc. 19. 37. ♂♀. vera. — Meig. Dipt. 4. 349.  
191. ♀. *Thryptocera* Meig. Dipt. 7. 242. 1. Tab. 71. f. 12.

Hab. in floribus & foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem & medianam, 20 Maj.—20 Aug., passim; nempe ad Lund, Esperöd &c., haud raro; in Blekingia, D. *Aspegren*; in Ostrogothia ad Wadstena, Gusum &c.; in Calmaria, D. *Wahlberg*; in Ölandia, D. *Bohemus*; in Gotllandia ad Öja, Westerby (*B. F. Fries*), Ejsta, Lummelund &c., frequens; in Bahusia ad Marstrand, Idem D. *Wahlberg*; in Dania ad Hafniam rar., D. *Stægger*. (Sub nomine: "Tach. spinipennis" Meig. don. Bouchè exemplum femineum omnino hujus e Silesia mihi misit D. Zeller).

♂♀. Similis *T. pilipenni* (37) & *crassicorni* (38), sed per varia dignota. Cinerea. Series setarum frontalium utrinque duplex vix 1. parum infra antennas descendit. Antennæ

longitudine epistomatis, nigrae, articulis basalibus brevibus, ultimo longo, sublineari, lato, apice intus rotundato. Seta distincte triarticulata, valida, articulis subaeque longis. Epistoma subdeclinatum. Vibrissae omnino nullae, sed ad latera epistomatis series setarum inaequalium fere per totam longitudinem adest. Palpi jam nigricantes, jam fuscii, jam denique (saepe in feminis) lutescentes. Thoracis lineolae antice nigrae 4 brevissimae, laterales parum perspiciendae. Abdomen in ♂ subcylindricum, in ♀ subdepressum, ovatum, in utroque sexu cinereum, segmento primo inermi, toto, reliquisque apice haud late, nigris, atque & in medio & in margine apicali parce setosis. Alae subalbido-hyalinae, nervo costali obscurio. Nervi transversi: ordinarius subrectus, subperpendicularis mox ante medium areae insertus; apicalis leviter incurvus. Nervi longitudinales: 1:mus totus, 3:tius ultra nervulum transv. medium, & 5:tus basi, setulosi, 4:tus angulatim flexus. Spina costae medioris. Squamae albæ. Pedes nigri, tarsis simplicibus, ungibus pulvillisque in ♂♀ parvis. — Oculi in bene conservatis exemplis feminarum tenuissime puberuli.

*Obs.* Pupæ hujus speciei in Scania ad Lund sub Museis arborum 30 Martii captæ d. 25 Maii ejusdem anni exclusæ; & altera vice quædam supra aquam stagnantem fluitantes d. 2 Maj. inventæ, 22—24 ejusdem mensis exclusæ.

80. *T. Lamia*: ovala, griseo-cinerea, opaca; fronte parum prominente, lata, vitta modice lata, subferruginea; antennis epistomate paullo brevioribus, latis, nigris, basi luteis, seta triarticulata, valida; abdome nigro, nitido, cingulis 3 angustis, albis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario recto, apicali nullo; longitudinalibus: 1, 3 & 5 setulosis; vibrissis nullis. ♀. (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Ræselia Lamia* Meig. Dipt. 7. 253. 4.

Hab. in Dania; ex Hafnia a Nobiliss. D. a Conciliis Justitiae *Stæger* in uno specimine pro comparatione communicata, mihi in Suecia non obvia.

♀. Similis priori, paullo minor & absentia nervi transversi apicalis mox dignota. Differt præterea ab illa: antennis paullo brevioribus & latioribus, basi luteis, articulis setæ inæqualibus, nempe 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore, ultimo longo, apice capillari, epistomate ad latera non setoso, thorace immaculato, ut & abdomine ovato, subdepresso, nigro, nitido, cingulis 3 albis angustis, determinatis, leviter interruptis. Palpi flavi, apice nigricantes. Margo oris anticus non reflexus.

81. *T. pellucens*: oblonga ovata, flavo-fulva, opaca; antennis paullo ultra epistomatis medium extensis, seta biauriculata, ultra medium incrassata, pedibusque, atris; fronte parum prominente, modice lata, tenuiter setosa; thorace fusco-lineato; abdominis basi lateribus fulvo-pellucida, vitta media nigra; alis cinereo-hyalinis, basi pallescentibus, nervo transverso ordinario inflexo, longit. 4:to angulato in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 2 lin.).

*Mas*: frons modice lata, aureo-flava, nitida, antice linea media angusta nigra, serie setarum utrinque simplici. Epistema flavum, genis albis. Thorax fusco-bilineatus & scutellum, fulvo-flava. Abdomen fulvum, segmentis 1, 2, & 3:to basi, lateribus ferrugineo-flavo-pellucidis, vitta media in segmenti 1:mi basi dilatata, nigra. Tarsorum pulvilli mediocres, albi;

*Fem*: frons perparum latior, flava, opaca, vitta latiore, atra, postice bifida serie setarum utrinque duplice. Epistema albida. Thorax obscure 4-lineatus & scutellum, flavo-cinerea. Abdomen flavo-cinereum, segmentis: 1:mo, & 2:do ima basi, lateribus ferrugineo-flavo-pellucidis, vitta media in segmenti 1:mi basi dilatata, nigra. Pulvilli parvi.

Fall. Musc. 22. 45. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 275. 64. ♂♀.  
*Clytia* Macq. Buff. 2. 151. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 205. 1.  
 Tab. 69. f. 14.

Hab. in floribus Achilleæ *Millefolium*, *Umbellatarum*

&c., nec non in graminosis locis aridis, 2 Jun.--29 Jul.; per Scandinaviam meridionalem & medium, certis annis haud rara; scilicet in Scania ad Lund & præsertim in Paradislyckan, frequens; in Smolandia; in Ostrogothia ad Gusum &c.; in Calmaria; in Ölandia passim; in Gotlandia ad Lummelund, Ruthe, Gothem &c.; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania circa Hafniam, D. *Staeger*. (Ad Sedinum 8 Jun. 1842 a D. *Dahlbom* lecta. E Finlandia a D. *Sahlberg* & e Glogavia a D. *Zeller* missa).

$\delta\varphi$ . Species pulchra. Setæ frontales tenues. Oculi sat magni, in viva ferruginei. Antennæ epistomate distinete breviores, sublineares, apice subrotundatae, articulo ultimo 2:do fere triplo longiore. Epistoma perpendicularare, inferne in medio convexiusculum, margine antico oris non reflexo. Palpi fusco-flavi. Mystaces & setæ sub mento, non valida. Barba occipitis alba. Abdomen ovato-rotundatum, subdepresso, segmentis 4 subæquis præter anale parvum retractum. Segmenta omnia margine apicali setis haud validis ornata, in 1:mo segmento tantum paucis. Alarum nervus transversus ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Area aperta. Nervus long. 4:tus angulatim flexus; 3:tius omnino inermis. Squamæ flavidæ ( $\delta$ ), aut albidae ( $\varphi$ ).

Var. b.  $\varphi$ . duplo minor; abdome immaculato; alarum area apice subocelusa; in ceteris var. a simillima.

82. *T. continua*: obtuse ovata, flava ( $\delta$ ), aut nigricans ( $\varphi$ ), opaca; capite flavo ( $\delta$ ), aut albido ( $\varphi$ ); antennis vix ad medium epistomatis extensis, seta biarticulata, basi incrassata, pedibusque, nigris; fronte parum prominente, modice lata, tenuiter setosa; thorace fusco-lineato; abdome basi lateribus flavo-pellucido ( $\delta$ ), aut immaculato ( $\varphi$ ); alis cinereo-hyalinis, basi pallidis, nervo transverso ordinario inflexo, longitudinali 4:to angulato in apice aë excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{2}$  ( $\delta$ ),  $1\frac{3}{4}$  ( $\varphi$ ) lin.).

*Mas.*: frons flava, linea subimmersa obscura, serie setarum utrinque simplici. Epistoma album. Thorax fusco-bilineatus & scutellum, cinereo-flava. Abdomen obscurè flavum, segmentis 3 anticus lateribus flavo-pellucidis. Pedes fusi, tarsorum pulvillis mediocribus;

*Fem.*: tota nigricans, flavidо-submieans. Caput albicans. Frons serie setarum utrinque simplici, vitta media latiuscula nigra l. ferruginea. Pedes nigri, pulvillis parvis.

Meig. Dipt. 4. 276. 65. ♂. *Musca* Panz. Fn. 60. 19.  
♂. *Clytia* Macq. Buff. 2. 151. 2. Meig. Dipt. 7. 205. 2.

Hab. in floribus ad Gothem Gotlandiae, ubi specimina plura d. 5 Jul. 1819 legi, nec alibi inveni.

♂♀. Simillima priori, sed magnitudine paullo minore, setis frontalibus & mystacinis tenuioribus, antennis multo brevioribus, seta basi tantum incrassata, palpis flavis, corpore & præsertim capite minus intense flavis, abdominis lateribus in ♂ magis flavo- (nec fulvo-) pellucidis, & in ♀ immaculatis, abunde distincta.

83. *T. rotundiventris*: obtuse ovala, thorace glauco; antennis brevibus, scutello, abdome nigro-punctato, pedibusque flavis; capite albo, fronte parum prominente obscura; alis flavidis, nervo transverso ordinario recto, longitudinali 4:to curvatim flexo in apice alae excurrente; tarsis nigris. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{2}$ —1 $\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas.*: fronte posterius angustata, thorace glaneo, abdome levissime albo-mieante, puncto in medio singuli segmenti nigro-fusco; ano infexo;

*Fem.*: fronte latiore, vitta media atra, thorace nigricante, abdominis segmentis margine apicali angustissime inæquilatero nigro.

Fall. Musc. 23. 46. ♀. Meig. Dipt. 4. 356. 201. ♂♀.  
& *Clytia* eadem 7. 205. 4. Tab. 69. f. 22. ♂. 23. ♀.

Hab. in Suecia media, locis sylvaticis, versus finem mensis Junii & initio Julii, rarissime; scilicet in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Lärketorp, ipse; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*.

$\delta\varphi$ . Similis *T. pellucenti*, a qua vero magnitudine paullo minore, setis corporis gracilioribus, antennis, scutello, abdomine pedibusque, in utroque sexu flavis, alarum nervo transv. ordinario recto, longit. 4:to curvato, nec angulato, &c., satis superque distincta. Epistoma albo-corneum, linea utrinque fusca. Frons obscura, vitta nigra angusta ( $\delta$ ), aut latiuscula ( $\varphi$ ). Segmenta abdominis æqualiter longa. Alarum nervi transversi: medius apici longitudinalis 4:mi oppositus; ordinarius fere in medio l. mox pone medium areæ apice apertæ insertus, & ad marginem interiorem alæ sat prope retractus. Nervi omnes inermes. Spinaula costæ nulla. Squamæ albidae. Pedes flavi, tibiis apice tarsisque totis nigris. Pulvilli in  $\delta$  mediocriter magni, albi. — Antennæ parum ultra dimidium epistomatis extenduntur.

84. *T. vulpina*: cinerea, capite albo; antennis elongatis, latis, seta crassa, thoracis lineis 4, abdominis rufi vitta dorsali, tarsisque, nigris; thoracis limbo laterali scutelloque albidis; vitta frontali pedibusque testaceis.  
 $\delta\varphi$ . (Long. 3½—4½ lin.).

Fall. Musc. 23. 47.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 260. 35.  $\delta\varphi$ . *Micropalpus vulpinus* Macq. Buff. 2. 81. 2.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7. 217. 2. Tab. 70. f. 18.

Hab. in floribus Umbellatarum, ut Heraclei, Pimpinellæ, Pastinacæ &c., quoque in paludibus sylvaticis, per Scandinaviam meridionalem & medium, 12 Jul.—16 Aug., passim haud raro; scilicet in Scania ad Esperöd; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrogothia: in palu-

de sylvatica ad Fylla prope Wadstena certis annis copiose, ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Ruthe frequens; in Dania ad Hafniam non raro, D. *Staeger*. (E Glogavia a D. *Zeller* etiam benigne communicata).

$\delta\varphi$ . Colore corporis partiumque ab affinibus facillime dignoscenda. Caput margaritaceo-album. Frons porrecta, flavida 1. fusca; vitta fulvescente; in  $\delta$  paullo angustior, serie setarum utrinque simplici infra antennas per setas 4 descendente; in  $\varphi$  modice lata, serie setarum postice utrinque subduplici, infra antennas per setas 3 continuata. Antennae longitudine fere epistomatis, liberae, oblique porrectae, articulo 1 brevi, 2:do 1:mo duplo longiori, setoso, 3:tiō 2:do iterum fere 1. vix duplo longiori, extrorsum (præcipue in  $\delta$ ) dilatato, oblongo-subquadrato; totæ nigræ; seta elongata, crassa, nigra, 3-articulata, articulo 1:mo brevissimo 2:do 1:mo triplo fere longiore. Epistoma declivum, nudum, vibrissis nullis. Margo oris anticus reflexus. Palpi brevissimi, nigri. Abdomen rufo-testaceo-subpellucidum, vitta media nigra subinterrupta & in segmento ultimo sœpe abbreviata; incisuris tenuissime albidis; totum certo situ albo-tessellatum. Segmenta: 1:mum breve, inerme; 2:dum setis in medio 2 & in apice 2 (præter utrinque unam lateralem); 3:tiūm setis in medio 2 & in apice 8; 4:tum sparse setosum. Tuberculum anale  $\delta$  rufum. Alæ hyalinæ, basi fuscescentes. Nervi transversi; medius apiei nervi auxiliaris fere oppositus; ordinarius obliquus, leviter flexus, prope angulum areæ insertus. Nervi longitudinales: 4:tus distinete infra angulum continuatus, 3:tiūs basi 6—7 setosus. Spinula costæ nulla. Squamæ magnæ, albæ. Pedes rufi, nigro-spinosi, coxis posterioribus, trochanteribus, femorumi annulo apicali angustissimo, tarsisque subinermibus omnibus & totis, nigris. Pulvilli albi, in  $\delta$  paullo longiores quam in  $\varphi$ .

85. *T. grandis*: nigra, opaca, capite albido; fronte prominente, modice lata, griseo-cinerea, vitta altra; an-

tennis epistomate nonnihil brevioribus, linearibus, articulo ultimo 2:do triplo longiori, seta ad medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, albidis; scutello rufescente; alarum nervo transv. ordinario flexo, spinula costæ nulla. ♂. (Long. 4½ lin.).

Hab. in Scania ad Lund rarissime. Larvæ e larva *Bombycis Cajæ* egressæ & deinde in pupas mutatæ, d. 20 Maj exclusas. E larva *Saturniæ pavonulæ* provenit hanc etiam ad Gusum Ostrogothiæ observavit Cel. Prof. *Wahlberg*.

♂. Valde similis & affinis ♂ *T. fasciatæ* n:o 1, & *flavescens* n:o 2, sed fronte nonnihil angustiore, oculis distincte biratis, nervo alarum 4:to infra angulum tantum apparenter continuato, &c., vere differt. Antennæ incumbentes, lineares. Series setarum frontalium utrinque simplex infra medium epistomatis per setas 6—7 descendit. Vibrissæ inferne paucæ. Palpi flavi. Alarum area anguste aperta. Setulæ basi nervi longitudinalis 3:tii 6—8. Squamæ albæ. Reliqua ut in *T. fasciatæ* aut *flavescens*.

86. *T. truncata*: nigra, capite argenteo; fronte distincte prominente, vitta atra l. pieca; antennis longitudine sere epistomatis, liberis, articulo ultimo 2:do parum longiore, lato, subquadrato, seta 3-articulata, ultra medium incrassata, thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, albido-cinereis; scutelli apice ferrugineo; alarum nervo transverso ordinario flexo, spinula costæ parva; squamis albis. ♂♀. (Long. 3—3½ lin.).

*Mas*: paullo minor, palpis summo apice flavis; fronte modice angustata, serie setarum utrinque simplici; antennarum articulo ultimo subquadrato; alarum nervis parum infuscatis; abdominis lateribus in segmento 2:do sæpe macula parva rufa; tuberculo anali atro; pulvillis sat magnis;

*Fem.*: paullo major, palpis apice sere ad medium flavis;

fronte latiore, serie setarum postice utrinque duplice; antennarum articulo ultimo oblongo-quadrato; alarum nervis subinfuscatis; abdominis macula laterali rufa nulla; ano simplici; pulvillis mediocribus; in copula.

Gyllenb. in litteris. Zett. Ins. Lapp. 612. 34. ♂♀.

Hab. in truncis arborum viventium ut & in campis, per Scandinaviam medium præsentimque borealem, 10—30 Jun., passim; in copula; scilicet in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrogothia ad Gusum capta, a D. *Wahlberg* mihi missa; in Uplandia ad Holmiam; in Dalecarlia, D. *Bohemian*; in Jemtlandia usque ad radicem alpium Åreskutan & Mullsjellen, frequens; in Lapponiis Suecicis: Umensi ad Lycksele & Badstuträsk, & Tornensi ad Kengis & Wittargi, rarius; in Norvegia ad Garnæs Værdalæ, D. *Dahlbom*.

♂♀. Similis videtur *T. conspersæ* Meig. 4. 263. 41., sed ab domine fasciato, parum "nigro-tessellato" &c. distineta. Affinis quoque *T. haemorrhoidali*, differt vero: antennarum articulo ultimo breviori, fere exakte quadrato, seta apice capillari, nec tota fere æque crassa, ut & alarum nervis transversis ordinario & apicali magis curvatis. Setæ frontales 3—5 infra antenas descendunt. Epistoma nudum & os album reflexum ut in priori. Palpi exserti, lutei s. lividi, interdum nigricantes. Antennæ apice recta truncatæ, seta modice longa, 3-articulata, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore. Thorax antice obscure cinereus, lineis 4 nigris. Scutellum nitidum, apice plus minus late rufum. Abdomen subnitidum, nigrum, segmentis 2, 3, 4 basi sat late albo-cinereis; setis ut in priori locatis. Segmentum 1:mum breve. Alarum nervi transversi: medius fere apiei nervi long. 1:mi oppositus; ordinarius haud obliquus, sed paullo flexus & paullo magis ab angulo remotus quam in priori; apicalis nonnihil propius ad apicem alæ in costa excurrente quam in präcedente. Nervus long. 3:tius basi setulis 3—5; 4:tus infra angulum breviter, sed perspicue

& determinate continuatur. Abdominis fasciæ cinereæ certo luminis situ in margine inferiore e maculis nigris micant præsertim in ♀.

*Obs.* A Nobil. D. Staeger ex Hafnia specimen feminineum sub nomine "Tach. vagans Meig." nuper accepi, quod feminæ nostræ speciei in omnibus simillimum est, excepta antenarum seta, quæ in exemplo Hafniensi tantum biarticulata videtur.

**87. *T. Nemorum*:** nigra, capite argenteo; fronte distinete prominente, vitta atra; antennis epistomate paullo brevioribus, liberis, articulo ultimo nigro 2:do rufo parum longiore, oblongo-subquadrato, seta biarticulata, ad medium tenuiter incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, albido-cinereis; scutello obscure cinerascente; alarum nervo transverso ordinario subrecto; spinula costæ nulla; squamis niveis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 251. 20. ♂♀. *Nemoreæa* Macq. Bull. 2. 103. 18. *Nemoreæa* Meig. Dipt. 7. 221. 21.

Hab. in Dania rariss.; ex Hafnia sub nomine allato specimen descriptum D. Staeger misit; mihi in Suecia non obvia.

♀. Simillima priori, a qua tamen differt: antennis basi rufo-fuscis, articulo ultimo paullo angustiore apice subrotundato, seta biarticulata, tenuis & vix ultra medium incrassata, fronte nonnihil latiore, serie setarum frontalium per setas plures (5—6) infra antennas descendente, scutello immaculato, alarum nervo transv. ordinario magis recto, spinula costæ nulla (an mutilata?), ut & squamis albidiорibus. Palpi exserti flavi. Frons subobscura. Thorax obscure cinerea, lineis 3 nigris, media lata, vittiformi, subgemina. *Mas* fronte angustata a D. Meigen l. c. describitur, mihi ignotus.

**88. *T. Pavonieæ*:** nigra, capite griseo, epistomate in medio argenteo; fronte parum prominente, serie seta-

rum infra antennas longe descendente, antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do triplo longiore, valido, seta biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5, scutello, abdominisque fasciis 3, obscure cinereis; alarum nervo transverso inflexo; spinula costæ nulla; squamis albis. ♀. (Long. 3—5 lin.).

**Wahlb. in litteris 1812.**

Hab. in Ostrogothia, ad Gusum detecta a Cel. Profess. *Wahlberg*, qui testatur "specimina magnitudine variantia e larvis *Saturniæ* exclusa" fuisse.

♀. A priori, cui alias similis, differt: capite flavo-cinereo, epistomatis cavitate sub antennis intra carinas tantum argentea, ore antice vix reflexo, fronte multo minus prominente, latiore, vitta obscura, serie setarum frontalium longius & fere infra medium epistomatis descendente, antennis totis nigris, articulo ultimo longiore, seta longa capillari, vix ad medium incrassata, abdominis fasciis 3 cinereo-griseis, nec cinereo-albis, alarum nervo transv. ordinario magis flexo, apicali remotius ab apice aëre in costam excurrente, longitudinali 4:to longius, sed tantum apparerter, nec determinate, infra angulum continuato, abdominis segmentis 1 & 2 tantum in apice (nec in disco) bisetosis, ut & tarsorum pulvillis parvis atris, nec albis.— Generibus Meig. *Nemoreæ* & *Exoristæ* affinis.

89. *T. maculipennis*: nigra, capite cinereo; fronte subprominente, angustata ( $\delta$ ), vitta atra, serie setarum in medium epistomatis descendente; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do fere 4-drupto longiore, valido, seta biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5, abdomineque, cinereis, hoc maculis fusco-micantibus, macula laterali, ano scutellique apice ferrugineis; alarum nervis transversis fuscedine cinctis,

ordinario infexo; spinula costæ nulla; squamis albis. ♂.  
(Long. 2½ lin.).

Hab. in Norvegia rarissime; ad diversorium Thynæs  
prope urbem Levanger in parœcia Skogn d. 4 Jul. 1840,  
specimen descriptum inveni.

♂. Similis *T. 4-pustulatæ* (101), sed duplo minor, abdominis la-  
teribus parum rufis, nervis transversis præsertimque medio  
magis infuscatis, apicali distincte incurvo, fere in apice  
alæ, nec ante apicem, in costa excurrente, ut & nervo  
long. 4:to breviter quidem sed vere & determinate infra an-  
gulum continuato, distincta. Anteunæ ut in priori, sed ar-  
ticulo ultimo paullo longiori. Seta ut in præcedente. Episto-  
ma subperpendiculare, vibrissis inferne inchoandis, tenuis-  
simis. Os non-reflexum. Palpi flavi. Thorax cinereus,  
lineis 4 distinctis nigris. Abdomen ovatum, cinereum, ma-  
culis olivaceis. In segmento secundo macula lateralis rufa.  
Canda inflexa, rufa. Setæ abdominis ut in priori. Area  
alarum apicalis aperta in apice alæ terminatur. Nervus  
long. 3:tius basi setulis 4, una remota. Pedes nigri, tarsu-  
rum pulvillis medioeribus, albis.

90. *T. ruricola*: nigra, epistomate argenteo, per  
totam longitudinem ad latera setoso; fronte non promi-  
nente, lata, cinerea, vitta lata, fusco-nigra; antennis  
epistomate paullo brevioribus sublinearibus, artieulis 2  
& 3 subæque longis, seta breviusecula, 3-articulata, fere  
ultra medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque  
fasciis 3, cinereis; alarum nervis: transverso ordinario  
valde obliquo, longitudinali 3:tio a basi ad nervulum  
transv. medium setuloso, spinula costæ nulla; squamis  
albidis. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 299. 104. ♂♀. Macq. Buff. 2. 142. 13.  
♂♀. *Plagia* Meig. Dipt. 7. 201. 5.

Hab. in Scandinavia, 8 Jul.—10 Aug., rarius; sci-

lieet in Scania in fruticibus ad Esperöd in parœc. Tranås rarissime; in Ostrogoth. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia, ♀ a D. *Bohemani* lecta; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*. — (Sub nomine: *T. spinigera* hæc species olim divulgata fuit).

$\delta\varphi$ . Similis *T. ambiguæ* (5), sed oculis hirtis & nervo tantum long. 3:to, nec simul 1:mo setuloso, distincta. Oculi magni. Frons utrinque bifariam rigide setosa. Antennæ articulo 2:do fusco-cinereæ, in  $\delta$  breviore. Palpi obscure flavi. Os non reflexum. Thorax obscure cinereus, antice lineis 4 nigris. Abdomen conicum, nigrum, segmentis 2, 3, 4 basi late indeterminate cinereis. Segmenta: 1:mum breve, inerme, 2 & 3 margine apicali setis pluribus, validis, 4:to toto valide multisetoso. Alæ subfuscane-hyalinæ. Nervi transversi: medius apici longitudinalis 1:mi oppositus; ordinarius valde obliquus, in medio areæ insertus; apicalis longe ante apicem alæ in costa excurrentis. Area apice oclusa 1, parum aperta. Nervus long. 4:tus infra angulum obtusum longe, sed tantum apparerter, continuatus. — Antennarum seta breviuscula, 3-articulata, articulis 2 basali his brevibus perspicuis, 3:to paullo ultra medium graciliter incrassata.

91. *T. comta*: nigra, capite albo; fronte distinete prominente, lata, vitta lata, rufo-flava; antennis longitudo fere epistomatis, articulo ultimo 2:do vix dimidio longiore, valido, seta 3-articulata, fere ad apicem incrassata; thoracis vittis 5, abdominalisque cingulis 3, cinereis; abdominalis lateribus in  $\delta$ , scutello tibiisque in utroque sexu rufis.  $\delta\varphi$ . (Long. 4 lin.).

Fall. Musc. 24. 48.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 267. 39. Forte etiam *T. marmorata* Meig. l. c. 261. 36. seu *Micropalpus marmoratus* Meig. Dipt. 7. 217. 3 est ♀ hujus?

Hab. in Suecia, 5 Jun., 17 Jul., 10 Sept., minus frequens; nempe in Scania ad Abusa & Esperöd; in

Blekingia ad Bruatorp; in Ostrogothia in littore arenoso ad lacum Wettern prope Wadstena, ularque sexus; in Dalecarlia australi ad diversorium Uppbo, ♀ 2 Sept. (E Reinerzi Silesiae ♀ a D. Zeller quoque communicata).

♂♀. Caput album, nitidum, genis & ore reflexo saepe pallide flavis. Frons modice lata, nigro-micans, in ♀ latior, vitta in utroque sexu ferruginea l. fulva, serie setarum validarum utrinque duplice per setas 3—4 infra radicem antennarum descendente. Antennae liberae, articulis: 2:do nigro-fusco, ultimo oblongo-quadrato, versus apicem sublatiore, toto nigro, seta modice longa, distincte 3articulata, valida, apice subapillari, articulo 1:mo brevissimo, 2:do 1:mo triplo longiore. Epistoma declivum, nudum. Thorax cinereus, lineis 4 abbreviatis, nigris. Humeri saepe praesertim in ♂ ferruginei. Scutellum rufo-testaceum. Abdomen ovatum subnitidum, nigrum, fasciis 3 (ad basin segmentorum 2, 3, 4) albidis, eerto situ nigro-marmoratis. Segmenta 2, 3 & 4, ad latera in ♂ macula magna, in ♀ striga basali, ferrugineis. Aous in ♂ inflexus, apice rufus. Segmenta utriusque sexus: 1:mum breve, inerme; 2:dum setis 2 in disco & 2 in apice (præter unicam lateralem); 3:tium 2 in disco & circiter 10 in margine apicali; 4:tum setis pluribus; omnibus validis. Venter niger, incisuris albis. Alæ hyalinæ, basi subfuscæ. Nervus transv. medius inter apicem nervi auxiliaris & longitudinalis 1:mi ductus. Area aperta, procul ab apice alæ excurrens. Nervi longitudinales: 3:tius basi setulosis 3—5; 4:tus infra angulum subacutum initio certe, deinde apparenter continuatus. Spinula costæ nulla. Squamæ albidae. Pedes nigri, valide spinosi, tibiis obscure rufis. Pulvilli albi, in ♂ magni, in ♀ parvi.

92. *T. haemorrhoidalis*: nigra, capite albo; fronte distincte prominente, lata, vitta, lata nigricante; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do vix dimidio longiore, valido, seta 3-articulata, vix ultra

medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, cinereis; scutello rufescente; in ♂ abdominis lateribus anoque inflexo ferrugineis. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Fall. Musc. 25. 50. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 258. 33. ♂♀.  
*Micropalpus* Macq. Buff. 2. 83. 8. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 217. 6.

Hab. in floribus Umbelliferis, raro in truncis arborum Ulmi, Salicis &c., per Sueciam meridionalem & medium, 10 Jul.—20 Aug., passim; in copula; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Björnstorps (B. F. Fries), Tygelsjö (D. Dahlbom); in Ostrogothia ad Lärketorp; in Westrogothia, D. Gyllenhal; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg, ad Upsaliam, D. Prof. Thunberg.

♂♀. Simillima priori, a qua non differt nisi antennarum seta minus distinete 3-articulata, tantum circiter ad medium indeterminate incrassata, vitta frontali fusca l. picea, nec fulva, tibiis nigris, & in ♂ ano toto rufo. Seta antennarum revera est triarticulata, sed artieulus 1:us brevissimus, subimmersus, & 2:dus brevior quam in priore. Abdominis fasciae cinereae in ♀ præsertim perspicue nigro-marmoratæ. Tibiae raro piceæ. Cetera ut in *T. comta*.

93. *T. fulgens*: nigra, capite albo; fronte distincte prominente, lata, vitta lata, fulva; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do dimidio longiore, valido, seta 3-articulata fere ad apicem incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, cinereis; scutello rufo; pedibus nigris. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Meig. Dipt. 4. 259. 31. ♂♀. Tab. 11. f. 23. ♀. Macq. Buff. 2. 83. 10. Meig. Dipt. 7. 217. 1. T. 7. f. 12—14. ♂♀.

Hab. in Suecia rarissime; ♂ in Ostrogothia inventus, & ♀ in Bahusia ad Marstrand a D. Wahlberg lecta,

mihi sub nomine "*T. lupina* n. sp." communicata. (♂ ad Jungfern-Heyde & Moabite prope Berolinum 7—12 Jul. 1812 a D. *Dahlbom* captus; & uterque sexus e Glogavia a D. *Zeller* sub nomine *T. fulgens* missus).

♂♀. *T. comtæ* iterum in omnibus simillima, & differt solummodo abdominis lateribus in ♂ vix l. parum rufo-maculatis, ut & tibiis in utroque sexu nigris. Abdominis fasciæ cinereæ distincte nigro marmoratæ. — An specie diversa?

94. *T. obliquata*: nigra, capite albo; palpis flavis; fronte prominente, lata, vitta lata (♀), nigra; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do dimidio longiore, valido, apice intus rotundato, seta 3-articulata, ad medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, cinereis; scutello rufo; pedibus nigris; vibrissis distinctis. ♀. (Long. 3½ lin.).

Fall. Muse. 24. 49. ♀. verissima secundum specimen originarium. — Meig. Dipt. 4. 263. 40. *Micropalpus obliquatus* Meig. Dipt. 7. 218. 8. (sed immerito ad *Micropalpi* genus relata ob palpos exsertos, ut & vibrissas perspicuas, quæ notæ *Metopiæ* aut *Phoroceræ* potius competunt).

Hab. in Scania rarissime, ad Esperöd in parœcia Mellby semel lecta.

♀. In multis proxime præcedentibus similis, sed in aliis diversa. Caput albo-cinereum. Series setarum frontalium validarum utrinque duplex per setas 4 infra antennas descendit. Antennarum articulus ultimus 2:do duplo longior, validus, latus, angulo inferiore apicis rotundato, nec "apice intus truncatus," nam in exemplo Falléniano angulus apicalis inferior casu tantum involutus, unde antennæ e late-

re visæ subtus "oblique truncatæ" apparent, quod seduxit oculatissimum alias Auctorem antennarum apicem "sensim attenuatum" describere. Epistoma subperpendiculare. Vibrissæ ultra medium epistomatis adscendunt. Palpi exserti, flavi. Thorax cinereus, vittis 4 nigris. Scutellum totum & callus utrinque inter scutellum & alas, pallide rufa. Abdomen oblongo-ovatum, nigrum, segmentis 2, 3 & 4, fascia albo-cinerea, postice evidenter nigro-marmorata. Segmenta quoque: 1:mum breve setis in medio apicis 2; 2:dum setis in medio 2, in apice totidem (præter laterales); 3:tium setis in medio 2, in apice pluribus; 4:tum setis multis; omnibus validis. Alæ ut in *T. comta* (91), sed nervus transversus ordinarius magis rectus & mox pone medium areæ, nec prope angulum, insertus, nervus long. 4:tus tantum apparenter infra angulum continuatus, ut & spinula costæ parva quidem, tamen adest. Squamæ albæ. Pedes toti nigri.

95. *T. Puparum*: nigra, opaca, capite cinereo; fronte distinete prominente, angusta ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ); vitta striata, fusca; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo 2:do rufo parum longiore, valido, prismatico, seta 3-articulata, ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3, albidis; scutello ferrugineo; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario valde inflexo, longitudinalis 4:ti angulo subdescendente.  $\delta\varphi$ . (Long. 4 lin.).

Meig. Dipt. 4. 251. 21. T. 41. f. 22.  $\delta$ . *Musca* Fabr. Antl. 299. 80. *Nenoræa* Macq. Buff. 2. 101. 11.  $\delta$ . t. 14. f. 9. *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 6. *Tachin. tricincta* Fall. Musc. 26. 53.  $\delta\varphi$ . *Pauzeria lateralis* Rob. Desv. n:o 1.

Hab. in truncis arborum viventium, foliis fruticum, muris &c. tempore vernali, per Scandinaviam meridio-

nalem, 3 Maj.—2 Jul., passim rarius; scilicet in Seania ad Lund præcipue in horto botanico & Paradislyckan certis annis verno tempore frequens, alibi rarius; in copula; in vicinatu Hafniæ Danorum D. Staeger. (E Kilia a D. Wiedemann olim communicata. E Glogavia specimen hujus palpis nigris obtinui).

$\delta\varphi$ . Lata, ovata. Antennæ breviusculæ, rufæ, articulo ultimo æque lato (prismatico), nigro, apice rotundato. Seta elongata, revera 3-articulata, licet articulis basalibus & præsertim 1:mo brevissimo, ægre observando. Series setarum frontalium haud validarum utrinque simplex ( $\delta$ ), aut postice duplex ( $\varphi$ ), per setas 4—5 infra antennas descendit. Frons flavo-cinerea. Epistoma declivum, albido, nitidum, ore antice subreflexo. Oculi dense hirti, in  $\delta$  majores, longiores quam in  $\varphi$ . Thorax cinereus, vittis 3 nigris. Abdomen latum, nigrum, fasciis 3 determinatis, albidis, per lineolam medium nigram certo situ perspicuam interruptis. Segmenta: 1:mum breve, subinerme, 2:dum & 3:tum setis aliquot in disco & medio apicis, 4:tum undique, setosum. Latera abdominis in  $\delta$  plerumque rufo-maculata. Alæ inermes. Spinula costæ nulla. Nervi transversi: medius apici auxiliaris fere oppositus; ordinarius valde inflexus, paullo pone medium areæ apertæ insertus; apicalis distincte incurvus, paullo ante apicem alæ in costa excurrentis. Angulus nervi 4:ti descendens, subacute. Squamæ albidae. Tarsi: in  $\delta$  apice pilosi, unguibus, pulvillisque albis, magnis, in  $\varphi$  parvis. — A genere *Trixia*, cui affinis, oculis nudis &c. mox dignoscitur.

96. *T. pellucida*: nigra, opaca, capite<sup>1</sup> cinereo; fronte sub prominente, angusta ( $\delta$ ), vitta striata, fusca; antennis epistomale paullo brevioribus, articulo ultimo 2:do rufo fere duplo longiore, prismatico, seta 3-articulata, vix ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis

vittis 5 cinerascentibus; scutello rufo; abdomine pellucido-ferrugineo ( $\delta$ ), vitta media apiceque nigris, maculis albo-micantibus; alis subcinereis, nervis flavidis, transverso ordinario valde inflexo, longitudinalis 4:ti angulo acuto.  $\delta$ . (Long. 5 lin.).

Meig. Dipt. 4. 254. 26.  $\delta$ . *Nemoræa* Macq. Buff. 2.

**103. 15.  $\delta\varphi$ . *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 1.**

Hab. in Dania minus frequens; ad Hafniam Aug. capta, a D. *Stæger* mihi benevole missa.

$\delta$ . Similis priori, a qua vero magnitudine majore, fronte minus porrecta, antennarum articulo ultimo nūnihil longiore & angustiore, seta non usque ad medium incrassata, abdominis lateribus late rufis, fasciis tribus non determinatis, cinereis, sed tantum in maculis albo-micantibus certo situ conspiciendis, nervis ferrugineis, & longitudinali 4:to infra angulum acutum brevissime subcontinuato, abunde distineta. Thorax glauco-albidus, lineis 4 nigris. Scutellum totum ferrugineum. Abdomen flavo-pellucidum, vitta media nigra, basi apiceque dilatata. Segmenta: 1:mum inerme; 2:dum setis apice 2 (præter unam lateralem); 3:ti:um setis apice circiter 12; 4:tum apice multisetosum. Alæ longæ, area apieali late aperta. Squamæ flavidæ. Reliqua ut in præcedente. — *Femina* a D. *Stæger* quoque inventa erit, a me non visa.

**97. *T. rufis*:** cæsia, subnitida, capite cinerascente; fronte prominente, angusta ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\varphi$ ); vitta striata, nigro-fusca; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo 2:do rufo parum longiore, valido, subprismatico, seta 3-articulata fere ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis vittis 5 antice perspicuis abdominalisque tessellis obsoletis, albo-micantibus; abdominis maculis lateralibus in  $\delta$ , & scutello in utroque sexu,

ferrugineis; alis hyalinis, basi fuscis, nervo transv. ordinario valde inflexo, longitudinalis 4:lo angulo acuto. ♂♀. (Long. 3 $\frac{1}{2}$ —4 $\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Musc. 27. 56. ♂♀. genuina. Meig. Dipt. 4. 246.  
13. ♂. (antennis totis nigris). *Nemorea* Meig. 7. 221. 3.

Hab. in Suecia meridionali tempore verno, passim; in Scania & præsertim in fruticibus horti botanici Lundensis, 20 Maj.—18 Jun., haud infrequenter lecta; e Westrogothia etiam missa.

♂♀. Simillima *T. Puparum* (95), sed colore corporis cænlescente l. cæsio, subnitido, (ne fuscoc-nigro, opaco), scutelli basi saepius nigricante, abdominis albedine non fascias determinatas, sed tantum tessellas obsoletas formante, ut & alis basi magis fuscoc-flavis, facile dignoscenda. — Nervus transv. medius infuscatus. Anus in ♂ ater.

98. *T. strenua*: cæsia, subnitida, capite cimerascente; fronte prominente angusta (♂), aut lata (♀); vitta nigra; antennis epistomate paullo brevioribus, rufescens, articulo ultimo 2:do parum longiore, valido, prismatico, seta biarticulata fere ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis vittis 5 antice perspicuis, abdominisque tessellis obsoletis, albo-micantibus; abdominis maculis lateralibus in ♂, & scutello in utroque sexu, ferrugineis; alis hyalinis, basi fuscis, nervo transverso ordinario valde inflexo, longitudinalis 4:ti angulo subacuto, descendente. ♂♀. (Long. 4—4 $\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 249. 17. ♂. *Nemorea* Maeq. Buff. 2. 102. 14.? ♂♀. — *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 12.

Hab. rarissime in Scania ad Lund, ubi 3 specimina tempore vernali inveni. (E Glogavia a D. Zeller missa).

$\delta\varphi$ . *T. rudi* simillima, sed antennis fere totis rufo-testaceis, articulo ultimo tantum parum infuscato, angulo nervi 4:ti magis descendente, non exaepte acuto, sed ut in *T. Pu-*  
*párum* subrotundato, ut & fronte in  $\varphi$  nonnihil latiore, di-  
stincta, nec prioris varietas juvenilis videtur. Epistoma  
inferne rufescens, intra carinas flavidо-albidum.

99. - *T. vivida*: cæsia, nitida, capite albo-cinereo;  
fronte prominente, angustata ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), vitta  
fusca, postice angustiore ( $\delta$ ); antennis epistomate pauлlo  
brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do parum longiore,  
subquadrato, extrorsum paullo latiore, seta biarticulata  
fere ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis vittis  
5 anticis, abdominisque cingulis 2, albidis, obsoletis; scu-  
tello apice rufo; alis hyalinis, basi subfuscis, nervo transv.  
ordinario leviter flexo, angulo nervi 4:ti subrecto; squa-  
mis albis.  $\delta\varphi$ . (Long. 3½—4 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 612. 36.  $\delta\varphi$ . *Tach. lurida* var.  $\beta$ .  
 $\delta\varphi$ . Fall. Musc. p. 27. An *T. vagans* Meig. 4. 248. 16?  $\delta$ .

Hab. in graminosis sylvaticis, frulicibus, floribus  
Umbellatarum &c., per Sueciam præsertim medium &  
borealem, 20 Jun.—30 Aug., vulgaris; scilicet in Scania  
ad Lund, Abusa, Esperöd &c., passim; in Ostrog. ad Gu-  
sum; in Ölandia & Gotllandia, rarius; ad Gothoburgum,  
& in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia  
ad Berge in Alsen, in monte Hofverberget, & in parœcia  
Undersåker, frequens; in Lapponiis Umensi ad Lycksele  
& Åsele, freq., in Tornensi ad Kengis & Muonionjska.  
(E Reinerzi Silesiæ, D. *Zeller*).

$\delta\varphi$ . Similis *T. rudi*, sæpe nonnihil minor, antennis totis  
nigris articulo ultimo multo latiori, extrorsum præcipue di-  
latato, thorace cærulescenti nigro, vittis cinereis vix per-

abdomine fere toto cærulescenti atro, nitido, segmentis tantum 2 & 3 basi certo luminis situ leviter albo-micantibus, distincta. Scutellum saltem apice rufum. Nervi transversi leviter fusi. Squamæ albæ. Abdominis latera in ♂ raro leviter rufo-maculata.

100. *T. consobrina*: cæsia, nitida, capite flavo-cinereo; fronte prominente, angustata (♂), aut lata (♀), vitta fusca l. nigricante; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do parum longiore, sub-quadrato, extrorsum paullo latiore, seta biarticulata sere ad medium incrassata; palpis flavis; thoracis vittis 5 anticus, abdominisque cingulis 2, albidis, obsoletis; alis hyalinis, basi subfuscis, nervo transv. ordinario leviter flexo, angulo nervi 4:ti subrecto; squamis albis. ♂♀. (Long. 3½—4 lin.).

Meig. Dipt. 4. 248. 15. ♂♀. *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 5.

Hab. cum priore Jul. Aug. passim; in Scania ad Abusa rar.; in Ostrogothia ad Lärketorp; ad Gothoburgum in floribus Angelicæ, D. *Wahlberg*, (qui eam sub nomine *T. tricincta* Fall. misit); in Jemtlandia ad Faxelfven, Berge & Åreskutan, freq.; in Lapponia Umensi ad Lycksele rar.; ex Hafnia a D. *Stæger* sub nomine *T. consobrina* Meig. communicata. (E. Glogavia etiam a D. *Zeller* obtinui).

♂♀. A priori, cui alias simillima, differt tantum capite flavo aut flavido-cinereo, ut & scutello cærulescenti nigro, immaculato.

101. *T. 4-pustulata*: nigra, opaca, capite cinereo; fronte sub prominente, angustata (♂), aut lata (♀); antennis epistomate paullo brevioribus, sublinearibus, arti-

culo ultimo 2:do duplo longiore angustato ( $\delta$ ), aut latiore ( $\varphi$ ), seta biarticulata, vix ad medium incrassata; thorace vittis 5 albidis; scutello rufo; abdomine albido-maculato, lateribus anoque rufo-testaceis; nervo transverso ordinario inflexo, angulo nervi 4:ti subrecto.  $\delta\varphi$ . (Long. 3—3  $\frac{1}{2}$  lin.).

Var. a.  $\delta\varphi$ . abdominis limbo lateralí præsertim in  $\delta$  & ano rufis.

Fabr. Antl. 309. 4. teste D. *Meigen*. — Meig. Dipt. 4. 255. 38.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Ins. Lapp. 643. 40. var. a.  $\delta\varphi$ . *Nemoræa*. Macq. Buff. 2. 103. 16.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7. 221. 24. *Tach. æstuans* Fall. Musc. 30. 61 certe  $\delta\varphi$ . var. a. & b.

Var. b.  $\delta\varphi$ . in copula cum var. a. sæpe minor, abdome præter anum ferrugineum vix rufo-maculato.

Zett. Ins. Lapp. var. b.  $\delta\varphi$ . Fall. l. c. var. c.

Var. c.  $\delta$ . magnitudo var. a. fronte nonnihil latiore, abdominis lateribus leviter rufo-maculatis.

Hab. in soliis fruticum & plantarum, per hortos, prata & silvas Scandinavie in primis meridionalis & mediæ, 30 Maj. — tota æstate — 3 Sept., ubique vulgatissima, præsertim var. a. frequentissima; in copula; prope terram sæpe circulatim inquiete & valde agiliter volans, pipiens; scilicet in Scania tota, copiose; in Smolandia & Ostrogothia passim, in Ölandia ad Gärdslösa &c.; & in Gotllandia ad Garde, Gothem &c. freq.; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Lapponia Umensi rarissima; in Norvegia ad Dovre, D. *Bohemian*, ad Thynæs, ipse; in Dania ad Hafniam, D. *Stæger*. (Ad Moabite & Rixdorf prope Berolinum 7--11 Jul. 1812 plura specimina legit D. *Dahlbom*; sub nomine *Exorista* (*Tachina*) api-

*calis* Meig.? etiam e Glogavia a D. Zeller communica-ta). Larvæ in pupis *Saturniæ Carpini* & aliorum Lepi-dopterorum vivunt. Sæpe feliciter exclusæ.

♂♀. Ovata. Antennæ liberæ, angustæ (♂), aut latiores (♀), apice rotundatae. Seta elongata. Frons non longe pro-minens, serie setarum hand validarum simplici (♀), aut du-plici (♀), per setas 5-7 infra antennas descendente. Vertex niger. Epistoma sub breve, in medio carinatum, ad latera (sub serie setarum frontalium) serie pilorum tenuium. Vi-brissæ inferne paucæ. Palpi flavi. Os vix reflexum. Thoracis vittæ 5 glauco-albæ cum vittis 4 nigris alternantes. Abdomen ovatum, segmento 1:o parum brevi, atro, apice bisetoso; 2:do & 3:to nigris, albido-maculatis, apice setosis, lateri-bus præsertim in ♂ plus minus late ferrugineis, in ♀ ma-culis 2 rufis; linea dorsali nigra; 4:to basi ut in segmen-tis 2, 3 pieto, limbo postico in ♂, & apice in ♀, ferrugi-neis; toto setoso. Alarum nervi ut in *T. consobrina*, sed transversus apicalis paullo minus curvatus. Squamæ albæ. Tibiæ posticæ extus ciliatæ. Tarsorum ungues nigri & pulvilli albidi, in ♂ mediocriter longi. Tarsi in ♀ sim-plices.

*Obs.* A *Nemorea erythrura*. Meig. Dipt. 7. 223. 22. ♀. vix ni-si scutello ruso, nec cinereo, differt. Valde quoque affinis videtur *Tachinæ* (Exoristæ) *apicali* Meig. Dipt. 4. 333. 163. Cfr. tandem *T. ruficauda* infra N:o 107, quæ a *T. 4-pustulata* Fabr. genuina parum abludit.

102. *T. rubricornis*: cæsia, subnitida, capite al-bido; fronte haud prominenti, lata (♀), vitta obscure ferruginea; antennis epistomate paullo brevioribus, rufes-centibus, articulo ultimo 2:do parum longiore, oblongo, superne nigro, seta biarticulata, basi incrassata; palpis flavis; thoracis vittis 4 albidis; abdome nigro cinereo-

marmorato; alis hyalinis, nervo transverso ordinario leviter flexo, anguli nervi 4:ti subrecto. ♀. (Long. 2  $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Svecia rarissime; in monte präalto Hofverberget Jemtlandiæ 14 Aug. 1840 individuum unicum inveni. (E Finlandia specimen etiam a D. Sahlberg accipi.)

♀ In hac subdivisione parva; ovata. Caput album. Frons cinerea, serie setarum mediocrium utrinque dupli per setas 4:5 infra antennas continuata. Antennæ elevatæ, liberae, rubræ, articulo ultimo paullo dilatato, apice rotundato, & superne late, nigro, levissime cinereo-pollinoso. Epistoma perpendicularare, nudum, ore non reflexo. Seta mystacina utrinque unica, at setulæ sub mento plures. Thorax cæsius, lineis 4 nigris, interstitio inter 2 medias cæsius. Vittæ 4 albidae. Scutellum cæsium. Abdomen atrum, segmentis 2, 3, 4 cinereo-marmoratis. Segmenta: 1:mum breve, in medio apicis setis 2; 2:dum & 3:tiū setis aliquot in disco & apice; 4:tum undique setosum. Alæ hyalinæ, haud infuscatae. Nervi transversi: ordinarius inflexus mox pone medium areæ angustæ apertæ insertus, apicalis leviter incurvus mox ante apicem alæ in costa excurrens. Spinula costæ nulla. Squamæ albidae. Pedes nigri, unguibus concoloribus, pulvillisque albis, minutis. Tarsi antici simplices, qui in ♀ specierum proxime präcedentium paullo dilatati.

103. *T. affinis*: nigra, subnitida, capite albido; fronte parum prominente, nonnihil angustata (♂), aut lata (♀), vitta atra; antennis longitudine fere epistomatidis, articulo ultimo 2:do fere triplo longiore, linearis, seta biarticulata, non ad medium incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdominisque fasciis 3 albidis; scutello ferrugineo; alis hyalinis, basi subfuscis, nervo transv. ordina-

rio leviter flexo, angulo nervi 4:ti subobtuso; squamis albis. ♂♀. (Long. 3½ lin. & ultra.)

Fall. Musc. 28. 57. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 327. 153.  
*Senometopia* Macq. Bull. 106. 5. ♂♀.

*Exorista* Meig. Dip!. 7. 255. 5. Tab. 72. f. 17. ♂.

Hab. in floribus Umbellatarum, Jun.—Aug., minus frequens; in Scania passim; in Smolandia, D. *Bohemian*. Larvæ in larvis Lepidopterorum vivunt, & in pupis *Saturniæ Carpini*, *Arctiæ Cajæ* &c. sæpe inventæ. (E Finlandia a D. *Sahlberg*, & e Glogavia a D. *Zeller* communicata).

♂♀. Affinis *T. rudi* (97), sed paullo minor, fronte minus porrecta, antennis longioribus angustioribus, nigris, alis minus infuscatis, nervis transversis: ordinario minus infexo, apicali minus incurvato, angulo nervi 4:ti magis obtuso, squamis albis, nec flavidis, abdominis lateribus in ♂ haud rufo-maculatis, fronte in ♂ multo latiore, &c., abunde distincta. Vibrissæ inferne spuriæ, paucæ. Os subreflexum. Thoracis vittæ albidae parum perspicue. Abdomen ut in priore setosum, & fere similiter ac in illa pictum. Nervus transv. apicalis levissime incurvus.

104. *T. Bohemanni*: flavido-pruinosa, capite albidō; fronte prominente, pallide aurea, vitta lata, bruno-velutina; antennis epistomate brevioribus, fusco-rufescēntibus, articulo ultimo 2:o triplo longiore, magno, seta longa; thoracis lineis 5 tarsisque nigris; scutello ferrugineo; abdomine fulvo, linea dorsali nigra; pedibus fuscis, tibiis ferrugineis; alarum nervo transverso ordinario flexo; squamis albidis. ♀. (Long. circiter 1 lin. l. ultra.). Wahlb. in litteris 1843.

Hab. in foliis Populæ tremulæ d. 22 Aug. 1811 a D. Prof. *Wahlberg* ad Gusum Ostrogothiæ invenia.

♀. Cum speciem hanc ipse non vidi, descriptionem ejus intactam, qualem a Celeb. Detectore per litteras accepi, affere lobet. "*Tach. Bohemanni*: magnitudine, statura brevi & colore *Dexiae rusticæ* simillima, abunde tamen distineta. Vertex longe setosus, pallide aureus, medio linea lata, brunneo-velutina, circa ocellos macula albida. Frons prominens. Epistoma parum impressum, medio carina longitudinali. Seta mystacina utrinque unica longa, setulæ oris plures. Vibrissæ nullæ vel tantum spuriæ. Barba densa, albida. Antennæ clypeo breviores, fusco-rufescentes, articulo ultimo ceteris triplo fere longiori, magno, oblongo-truncato; seta longe capillari nuda, fusco-rufescente. Palpi testacei. Thorax longe setosus, flavidio-pruinosus, lineis 5 nigris, quarum exterior utrinque lata, maculis velut 2 composita, proxime adjacentes angustæ, antice propiores postice abbreviatæ, media quoque angusta antice abbreviata. Pectus cinereum. Scutellum ferrugineum apice fulvo, subaureo-micans. Abdomen ovatum, fulvum, aureo-tessellatim micans, pro receptione scutelli profunde excavatum ibique nigrum, linea media longitudinali angusta nigra, setosum, apicibus segmentorum fortiter spinosis. Venter fulvus. Pedes breviores, spinulosi, femoribus fuscis cinereo-pruinosis, tibiis ferrugineis, tarsis nigris. Alæ basi parum infuscatae, nervo 4:to longitudinali angulatim flexo, paullo ante apicem alæ, a 3:to separato, excurrente, infra angulum non descendente, curvatura sursum flexa, nervo transverso ordinario curvato. Squama albida." *Wahlb.*

105. *T. demens*: nigra, capite argenteo; fronte prominente, latissima (♀), vitta lata, atra; antennis longitudine fere epistomatis, angustis linearibus, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, ultra medium incrassata; thoracis antico vittis 5, abdominisque

fasciis, 3, cinereis; scutello rufo; alarum nervo transv. ordinario leviter flexo, angulo nervi 4:to subobtuso. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Lund & Esperöd duo specimina inveni.

♀. Frons & vitta, latæ, antennæ elongatæ, seta fere ultra medium incrassata, epistoma argenteum, subperpendiculare, & os non reflexum, speciem ab affinibus præcipue distinguunt. Series setarum frontalium validarum utrinque duplex per setas 3-4 simplices infra antennas descendit. Palpi flavi. Thorax niger leviter cinerascens, antice vittis 5 albidis per lineas 4 migras sejunctis. Scutellum pallide ferrugineum. Abdomen ut in *T. affini* (103) pictum & setosum. Alæ etiam ut in illa, sed basi non infuseatae & area apice paullo magis aperta. Spinula costæ minuta. Squamae albæ. Pedes nigri. Tarsi simplices.

106. *T. stulta*: oblonga, cinerascens, opaca, capite argenteo; fronte prominente, modice lata, vitta atra; antennis longitudine fere epistomatis, validiusculis, articulo ultimo 2:do fusco fere triplo longiore, nigricante, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis lineis 4, abdominis segmentis 1:mo toto reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; scutello rufescente; alarum nervo transv. ordinario infexo, angulo nervi 4:ti subobtuso. ♂♀. (Long. 3  $\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Svecia media rarissime; marem in prato insulæ Färön Gotlandiae 12 Jul. 1819, & seminam ad Nähr Gotlandiae 12 Jul. 1841, inveni; utrumque etiam sexum e Westrogothia mihi misit D. *Gyllenhal*.

♂♀. A priori, cui in variis convenit, corpore tamen longiore, subcylindrico, obscure cinerascente, fronte præsertim in ♂ multo angustiore, antennarum articulo 2:do fusco-rufo 1.

cinereo ultimo nonnihil validiore, sed paullo breviore, seta longa non ad medium inerassata, scutello basi obseuro, alis forte paullo longioribus, & nervo transv. ordinario distinctius flexo, differt. Frous in ♂ paullo angustior, quam in ♀, serie setarum in ♂ simplici, in ♀ duplici. Vibrissæ inferne inchoandæ. Thorax nigrieans leviter cinerascens, antice cinereus, lineis 4 nigris. Pectus cinereum. Abdomen cinereum, certo situ lineola dorsali obsoletissima fusca, segmento 1:mo subbrevi toto, 2 & 3 margine apicali anguste, 4:toque apice nitido, nigris; ut in priori setosum. Segmenta 2 & 3 lateribns in ♂ obsolete rufescientia. Alæ cinereo-hyalinæ, area perspicue aperta. Nervus transv. apicalis leviter incurvus. Tarsorum unguis in ♂ basi, pulvillique toti, albi, modice longi. Reliqua ut in præcedente.

**107. *T. ruficauda:*** ovata, nigra, opaca, capite cinereo; fronte prominente, angusta (♂), aut lata (♀); vitta atra; antennis longitudine fere epistomatis, validis, articulo ultimo 2:do triplo & ultra longiore, seta 3-articulata, ad medium incrassata; thoracis vittis 5 albidis; scutello rufo; abdominis fasciis 3 cinereis olivaceo-maculatis; ano ferrugineo; alarum nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto, apicali distinetè incurvo. ♂♀.  
(Long. 2  $\frac{1}{2}$  lin.).

Var. a ♂♀. Abdominis latera vix rufo-maculata.

Zett. Ins. Lapp. 613. 38. ♂♀.

Var. b. ♂. Abdominis latera in segmento 2 & 3 macula rufa.

*Musca 4-pustulata* Fabr. Ent. Syst. 4. 324. 50?

Hab. in foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem & borealem, 20 Jun.—26 Jul.—24 Aug., minus frequens; in Suecia media hactenus non deprehensa, quan-

tum noverim; nempe in Scania ad prædium amoenissimum Björnstorps, hodie a generosissimo D. Libero Barone *G. Gyllenkrok* possessum, a D. *Dahlbom* inventa, & in horto Esperöd in parœc. Tranås a me capta; in Helsingia ad Arbrå; in Jemtlandia ad radicem alp. Åreskutan; in Lapponia Umensi ad Åsele; in Norvegia ad Dovre, D. *Bohemani*, & ad Næs Værdalæ, ipse.

$\delta\varphi$ . Affinis *T. 4-pustulatæ* N:o 101., & præsertim ejus var. b. similis, sed magnitudine minore, antennis præsertim in  $\delta$  longioribus & multo latioribus, angulo apicali superne recto, nec rotundato, seta forte paullo breviori, 3-articulata, articulo 2:do quam 1:mo brevissimo duplo longiore, setis frontalibus longius infra antennas descendantibus, \*) epistomate in medio non carinato, ad latera nudo, nec pilosulo, abdominis lateribus non nisi in var. b. rufo-maculatis, segmentis, excepto 1:mo brevi inermi, in disco & apice setosis, alarum nervis transversis medio late infuscato, ordinario subrecto fuscedine subcincto, apicali perspicue incurvo, ut & tibiis spinosis, sed extus non ciliatis, aperte distincta. Alarum area fere in apice alæ educta. Squamæ albæ. Segmentum abdominis ultimum margine apicali plus minus late ferrugineo. Tuberculum anale in  $\delta$  inflexum, ferrugineum, nitidum. Ungues nigri & pulvilli albi, in  $\delta$  mediocres, in  $\varphi$  parvi. Tarsi antici in  $\varphi$  dilatati.

108. *T. dubia*: nigra, opaca, capite cinereo; fronte sub prominente, angusta ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\varphi$ ),

\*) brevitatis caussa setæ frontales *infra antennas descendentes* sæpe dicuntur; hoc vero semper ita intellectum volui ut hæ setæ *infra antennarum basin* l. radicem nec *infra earum apicem*, *descendant*.

vitta altra; antennis epistomate subbrevioribus, articulo ultimo 2:do fere triplo longiore, linearis, seta 3-articulata, vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5, scutello, abdominisque segmentis 3 ultimis, cinerascentibus, his olivaceo-maculatis; alarum nervis infuscatis, transverso ordinario recto, apicali incurvato, angulo nervi 4:ti subacute. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Musc. 29. 60. ♂♀. certissime. Meig. Dipt. I. 360. 210. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 613. 39. ♂♀. *Evorista* Meig. Dipt. 7. 256. 22. *Lydella* Macq. Buff. 2. 138. 23.?

Hab. in foliis fruticum, truncis arborum &c., per Scandinaviae hortos & prata, 8 Maj.—4 Sept., vulgaris, in copula saepe capta; scilicet in Scania ubique frequens; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostro- & Westrogothia, passim; in Ölandia ad Gärdslösa; in Gotlandia ad Sproge &c.; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad radicem Åreskutan rar.; in Lapponia Umensi ad Lycksele rarius; in Dania ad Hafniam, D. *Stæger*. (E Glogavia a D. Zeller.)

♂♀. Inter minores. Ovata, obscure cineraseens. Oculi in ♂ valde approximati, in ♀ paullo remotiores. Series setarum frontalium haud validarum utrinque in ♂ simplex, in ♀ duplex, per setas 8 (♂), aut 6 (♀) infra antennarum basi fere ad medium epistomatis parum declivi descendit. Antennae mediocres, nigrae. Seta mediocris 3-articulata, articulis basalibus brevissimis, basi incrassata. Vibrissæ tenues, non ad medium faciei assurgentess. Palpi flavi, interdum fusi l. nigricantes. Os non reflexum. Abdomen ovatum, subnitidum, cinereum, maculis olivaceo-micantibus, segmento 1:mo brevi, inermi in utroque sexu, anque inflexo in ♂, nigris. Segmenta 2 & 3 in disco & margine apicali, 4:tum totum, setosa. Aleæ hyalinæ, basi & nervis,

præsertim transv. medio, subinfuscatis, ordinario plerumque recto fere in medio l. mox pone medium areæ inserto; apicali distinete incurvato. Area subocclusa l. tautum angustissime aperta fere in apice alæ educta. Squamæ sordide albæ. Pedes nigri, pulvillis albis & unguibus in ♂ modice longis. Tarsi in ♀ simplices. Cum *T. umbrinervi* N:o 146 hæc species non confundenda.

109. *T. Radicum*: cæsia, nitida, capite albido; fronte prominente, angustata (♂), aut lata (♀), flavida, vitta lata brunneo-nigra; antennis breviusculis, nigris, articulo ultimo prismatico, quam 2:do parum longiore, seta 3-articulata vix ad medium incrassata, thoracis vittis 5 antieis, abdominisque cingulis 2, albidis; scutello rufo; alarum nervi 4:ti angulo subdescendente. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Meig. Dipt. 4. 249. 18. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 642. 35. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 300. 82. (exclus. syn. Linn. *Musca Radicum*, quæ est *Anthomyza Radicum* nobis). *Nemoreæ* Maeq. Buff. 2. 100. 7. ♂. *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 7. *Tachina turida* Fall. Musc. 26. 51. var. a. ♂♀. (exclus. syn. Fabr., quod ad *Tach. turidam* Meig. 4. 211. 8. referendum; sed hæc in Suecia vix obvia).

Hab. in floribus Umbellatarum &c., præsertim per Sueciam meridionalem, 24 Jul.--21 Aug., passim copiose; in copula sæpe capta; scilicet in Scania ubique vulgaris; in Ostrogothia ad Lärketorp, Gusum &c., frequens; in Westrog., D. *Gyllenhal*; in Bahusia ad Marstrand & in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Norvegiæ Finmarkicæ alpe Skaaddavaara rarissime; circa Hafniam Daniæ, D. *Stæger*. (Ad Rixdorf prope Berolinum a D. *Dahlbom* etiam lecta; & e Glogavia a D. *Zeller* mihi missa).

$\delta\varphi$ . Magna. Similis *T. rudi* (97), & *vividæ* (99), sed palpis nigris &c. dignota. Frons grisea. Series setarum utrinque simplex ( $\delta$ ), aut duplex ( $\varphi$ ), per setas 3-4 infra antennas continuata. Antennæ epistomate nudo paullo breviores, articulo 1:mo brevi elevato, 2:do duplo longiore, cenerascente, ultimo antecedente paullo longiore, multo latiore, præsertim versus apicem dilatato, toto nigro. Seta longa, articulis 2 basalibus brevissimis at in  $\varphi$  vix nisi unico perspicuo. Oculi  $\delta$  remotiores quam in *T. rudi* & *vivida*. Os antice distincte reflexum. Palpi nigri, summo apice interdum flavi. Barba occipitis flava. Thorax cæsius, antice cinereus, lineis 4 nigris. Scutellum sæpius apice saltim rufo-testaceum. Abdomen ovatum, cæsium, nitidum, segmentis 2 & 3 basi leviter albo-micantibus; in  $\delta$  ad latera rufo-maculatis. Segmenta: 1:mum breve, inerme, atrum; 2:dum & 3:tium setis in disco 4 ( $\delta$ ), aut 6 ( $\varphi$ ), (præter setas plures in margine apicali segmenti 3:tii in utroque sexu); 4:tum multisetosum. Alæ, squamæ & pedes omnino ut in *T. vivida*. Anus in  $\delta$  inflexus, ater.

110. *T. intermedia*: cæsia, nitida, capite argenteo-micante; fronte prominente, angustata ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), albida, vitta lata nigra; antennis breviusculis, nigris, articulo ultimo prismatico quam 2:do parum longiore, seta 3-articulata vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5 anticis, abdominisque cingulis 2 albidis, obsoletis; scutello rufo; alarum nervo long. 4:to infra angulum acutum brevissime continuato.  $\delta\varphi$ . (Long. fere 4 lin.).

\* Hab. in Suecia meridionali Jul. Aug. frequens, in copula multoties deprehensa; scilicet in Scania ad Abusa, Björnstorcp, Esperöd &c., vulgaris; in Blekingia ad Carls-crona, D. von Borck; e Westrogothia a D. Gyllenhal missa.

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed capite albidiore, nec flavido, fronte magis porrecta, oculis in  $\delta$  paullulum remotioribus, nervo transverso ord. nonnihil proprius ad angulum areæ inserto, ut & nervo long. 4:to infra angulum brevissime quidem, sed tamen vere præsertim in individuis masculis continuato, certe distineta. Os albo-rufescens. Corpus cærulescens, nitidissimum, abdominis segmentis 2, 3, 4 basi in individuis illæsis leviter albidis.

111. *T. caesia*: cæsia, nitida, capite argenteo-micante; fronte prominente, angusta ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), vitta lata atra; antennis breviusculis, nigris, articulo ultimo subquadrato quam 2:do paullo breviore, seta 3-articulata ad medium incrassata; thoracis vittis 5 anticus, abdominisque fasciis 3, albidis, obsoletis; alarum nervi longitudinalis 4:li angulo subobtuso.  $\delta\varphi$ . (Long. 4 lin.).

Fall. Muse. 27. 55.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 217. 11.  $\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 643. 37.  $\delta\varphi$ . *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 221. 4.

Hab. in floribus Umbellatarum, præsertim in Scandinavia meridionali, 29 Jun.—15 Jul., passim; scilicet in Scaniæ hortis ad Lund, Abusa, Esperöd &c. frequens, in lapidibus soli expositis haud raro quoque obvia; in Lapponia Umensi ad Lycksele rarissime; in Norvegia ad Næs Værdalæ semel quoque a D. Dahlbom inventa. In Suecia media hactenus non deprehensa quantum noverim, nisi semel in Gotlandia ad Garde lecta.

$\delta\varphi$ . Simillima iterum *T. Radicum*, sed antennarum articulo ultimo breviore subquadrato, 2:do longiore, oculis in  $\delta$  paullo magis approximatis, scutello, aut immaculato, aut tantum summo apice rufescente, abdominis fasciis albidis latioribus subtessellatis, segmento 4:to etiam albo-macula-

to, alarum angulo nervi 4:ti nonnihil magis obtuso, nec descendente, ut & alis vix infuscatis, mox dignoscenda.

112. *T. connivens*: cæsia, nitida, capite argenteo-micante, fronte prominente, angusta ( $\delta$ ), vitta angustata nigra; antennis breviusculis, nigris, articulo ultimo prismatico 2:doque æque longis, seta biarticulata vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5 anticis, abdominisque fasciis 3, albidis, obsoletis; alarum nervi long. 4:ti angulo subacuto.  $\delta$ . (Long.  $3\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel inventa.

$\delta$ . Priori simillima, sed differt: magnitudine paullo minore, antennarum articulis 2 & 3 æque longis, oculis magis approximatis, vitta frontali in medio angustissima, anterius tantum nonnihil dilatata, ut & angulo nervi 4:ti subacuto l. recto, nec subobtuso. Antennarum articulus ultimus ut in *T. Radicum* (109) formatus. Reliqua ut in *T. cæsia*.

113. *T. protuberans*: obscure griseo-cinerea, opaca, capite argenteo-micante; fronte prominente, subangustata ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\varphi$ ), vitta lata, striata, atra; antennis breviusculis, nigris, articulo ultimo lato 2:do paullo longiore, seta biarticulata vix ad medium incrassata; thoracis lineis 4, pedibusque, nigris; alis cinereis, basi flavescentibus, nervi long. 4:ti angulo subarcuato.  $\delta\varphi$ . (Long. 3 lin.).

Hab. in Populi Tremulæ junioris foliis, per Sueciam medianam & borealem, Jun. Jul., passim; scilicet in Ostrogothia ad Gusum; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Gotlandia & Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia 1836, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad diversoria Grimmäs & Fanbyn 19—21 Jun. 1840, ipse. (E)

*Reinerzi Silesiae* individuum masculum a D. *Zeller* communicatum).

♂♀. Colore corporis obscure flavidо-cinereo, opaco, magnitudine minore, vitta frontali in utroque sexo lata, ut & alis basi flavescentibus, & nervi 4:ti angulo subarcuatim flexo, a proxime praeecedentibus facile dignoscitur. Frons distincte porrecta, argentea, nigro-micans, serie setarum haud validarum utriusque simplici (♂), aut duplici (♀), haud infra antennas continuata. Antennae liberae, elevatae, epistomate paullo breviores, articulo ultimo subquadrato 2:do vix dimidio longiore. Seta basi (♂), aut fere ad medium (♀), incrassata. Epistoma breve, declivum, nudum, vibrissis inferne paucissimis. Os subreflexum. Palpi atri. Thoracis lineae antice 4, quarum 2 mediae approximatæ, tenuissimæ, & 2 laterales paullo latiores minus determinatae. Abdomen oblongum, convexum, totum flavidо-cinereum vix vestigio lineolæ dorsalis fuscae. Segmenta: 1:mum vix brevius, setis in disco subquatuor; 2:dom setis in disco 6; 3:tium 4:tumque multisetosa. Alarum area apicalis distincte aperta fere in apice alae terminata. Nervus transv. ordinarius inflexus. Spinula costæ parva. Pedes nigri, unguibus nigris & pulvillis albis, in ♂ modice longis. Tarsi ♀ simplices. Anus maris inflexus nigricans, genitale ferrugineo.

114. *T. fumata*: cæsia, subnitida, capite obscure cinereo; fronte paullo prominente, inter oculos angustissima (♂); antennis parvis, nigris, articulo ultimo 2:do parum longiore, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdominalisque fasciis 3 latis, albidis, obsoletissimis; alis subfumatis, angulo nervi 4:ti subobtuso. ♂. (Long. fere 3 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Lund 2 specimina iuveni.

♂. Magnitudine minore, corpore oblongo, antennis parvis, oculis cohaerentibus, fronte minus prominente & nervo transv. apicali subrecto l. levissime tantum curvo, a proxime præcedentibus differt. Statura & color corporis ut in *T. connivente*. Similis *T. dispari* infra n:o 136, sed palpis tibiisque nigris, nec flavis &c., mox dignota. Setæ frontales non validæ, una serie utrinque dispositæ, infra antenarum basin parum descendunt. Antennæ epistomate brevi adhuc breviores, non latæ, subincumbentes, articulo ultimo 2:do vix longiore, seta elongata capillari, basi incrassata, omnium subtilissime microscopiee puberula. Epistoma breve ad latera subpubescens; canum. Vibrissæ paucissimæ. Os leviter subreflexum. Genæ magnæ infra oculos descendantes. Barba menti & occipitis nigra. Thorax, scutellum & abdomen cæsia, pictura alba obsoleta. Segmentum 1:mum parum breve, bisetosum; reliqua segmenta ut in priori setosa. Anus inflexus, nigricans. Alæ subfuscaneæ, nervis transversis: medio fere apiei nervi long. 1:mi opposito; ordinario inflexo, mox pone medium areæ inserto; apicali subrecto fere in apice alæ excurrente; area non late aperta; spinula costæ parva. Squamæ flavidæ. Pedes ut in priori. — Affinis generi *Macquartiae* Meig., *Nemoreæ* tamen ob antennar. setam nudiusculam magis propinqua.

115. *T. linearicornis*: nigra, subnitida, capite argenteo; fronte minus prominente, lata (♀), vitta atra; antennis longissimis, linearibus, angustis, articulo ultimo 2:do fere quadruplo longiore, seta elongata, biarticulata, capillari, vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5 obscure cinereis; abdominis fasciis 3 albidis; alis cinereis, nervis subferrugineis, transversis: ordinario inflexo, apicali leviter incurvo. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; specimen descriptum e Suecia superiori a D. *Marklin* olim missum.

♀. Antennæ lineares, angustæ, incumbentes speciem ab affinibus determinant. Oblongo-ovata. Frons cana, vitta linearis, modice lata, striata, nigro-brunnea; serie setarum utrinque dupliei per setas 2 infra antennas descendente. Epistoma sat longum, subperpendiculare, margaritaceum, nudum, vibrissis inferne paucissimis. Os non reflexum. Palpi nigri. Barba menti & occipitis brevis, nigricans. Thorax obscurè cinereus, lineis 4 nigris. Scutellum cinerascens. Abdomen nigrum, segmentis 2, 3, 4 basi fascia latiuscula, albida, certo situ maculis fuscis leviter micante, & linea media nigra subinterrupta. Segmentum 1:imum breve, bisetosum, reliqua disco & margine apicale setosa. Nervus transv. ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Angulus nervi 4:ti subaeutus. Area anguste aperta mox ante apice alæ terminata. Spinula costæ nulla. Squamae albidae. Tarsi simplices.

**116. *T. fimbriata*:** nigra, capite argenteo; fronte parum prominente, subangustata (♂), aut modice lata (♀), obscure cinerea, vitta alba; antennis epistomate paullo brevioribus, validiusculis, articulo ultimo 2:do vix triplo longiore, seta biarticulata fere ad medium incrassata; thoracis vittis 5 obscure cinereis; abdominis fasciis albidis; alis cinereis, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali subrecto paullo ante apicem alæ excurrente. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 337. 168. ♂♀. *Exorista* Meig. 7. 255. 8.

Hab. in Scandinavia rarissime; in Scania semel capta; e Westrogothia a D. *Gyllenhal* missa; ex Hafnia a D. *Staeger* communicata. (Ad Sedinum 8 Jun. 1842 a D. *Dahlbom* lectam, & e Glogavia utrumque sexum a D. *Zeller*, obtinui).

$\delta\varphi$ . *Parva*, ovata. Frons parum porrecta, oculi magni, nervus tranty, ordinarius leviter flexus paullo pone medium areæ insertus, & area modice aperta nonnihil ante apicem alæ in costa terminata, speciem distinguunt. Antennæ in-cumbentes. Frons in  $\delta$  &  $\varphi$  modice & fere æque lata. Series setarum utrinque subsimplex ( $\delta$ ), aut duplex ( $\varphi$ ), per setas 4—5 infra antennarum radicem descendens. Epistoma perpendicularare, nudum. Os non reflexum. Pili menti & occipitis breves, nigri. Thorax obscurè cinereus, lineis 4 nigris. Scutellum obscure cinereum. Abdomen atrum, nitidum, segmentis 2, 3, 4 basi fascia albida, linea dorsali nigra. Segmenta: 1:imum breve, subinerme, reliqua in disco & apice paree setosa. Alæ basi subfuscatae, angulo nervi 4:ti subrecto. Spinula costæ nulla. Squamæ sordide albidæ. Ungues & pulvilli in  $\delta$  medios. Tarsi  $\varphi$  simplices.

117. *T. Westermannii*: oblonga, obscure cinerea, opaca, epistomale argenteo-nicante; fronte subprominente, subangustata ( $\delta$ ), grisea, vitta brunneo-nigra; antennis longitudine epistomialis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do sextuplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium inerasata; thoracis lineis 4, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali & linea dorsali, pedibusque, nigris; alarum nervis transversis: ordinario inflexo, apicali incurvo paullulum ante apicem alæ ex-currente; squamis albidis.  $\delta$ . (Long. 2½—3 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*. (Ad Neuenkirchen in Megalopoli (Meklenburg Strelitz), 15—20 Maj. 1842 legerunt D. D. Prof. *Hornschatz* & *Dahlbom*; e Glogavia quoque a D. *Zeller* communicata).

$\delta$ . Antennis longissimis, validis a ceteris affinibus mox dignoscitur. Frons modice angusta, vitta modice lata, linearis.

Series setarum hanc validarum utrinque simplex per setas 3—4 infra antennarum basin continuata. Epistoma longum, parum declivum, nudum, vibrissis inferne spuriis. Os vix reflexum. Palpi atri. Thorax obscurè cinerascens, antice cinereus, lineis 4 nigris, minus perspicuis. Scutellum obscurè cinerascens. Abdomen ovato-oblongum, flavidō-griseo-cinereum, segmento 1:mo toto, reliquisque margine apicali lineaque dorsali, nigris. Segmentum 1:mum breve, in medio apicis bisetosum, 2 & 3 in disco & margine apicali pauci-setosa, ultimum multisetosum. Alae hyaline, basi & costa leviter subfuscane, nervis transversis: medius in medio inter apicem nervorum auxiliaris & long. 1:mi opposite duetus; ordinarius nonnihil pone medium areæ insertus; apicalis paullo incurvus mox ante apicem alae excurrentis. Area non late aperta. Angulus nervi 4:ti subrectus. Spinaula costæ nulla. Squamæ albidae. Pedes nigri, unguibus basi albidis pulvillisque totis albis, sat longis.

*Obs.* Specimen femineum sine synonymia a D. Staeger missum, mari descripto simile, sed antennis paullo brevioribus, serie setarum frontalium duplici, fronte nonnihil latiore, alis subhyalinis, ut & unguibus pulvillisque minoribus dignatum, ut *feminam* hujus speciei considerandum esse puto.

118. *T. cornuta*: ovato-oblonga, nigra, subnitida, capite cano; fronte sub prominente, subangustata ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\varphi$ ), vitta atra; antennis longitudine epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do quintuplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata, thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3 interruptis, albidis; alarum nervis transversis: ordinario inflexo, apicali incurvo paullulum ante apicem alae excurrente; squamis albidis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; e Westrogothia sub nomine allato specimina utriusque sexus a D. Gyllenhal

olim obtinui; in Lappouia Lulensi ad Quickjock 1843 ♀ a D. Andersson lecta.

♂♀. Priori simillima, sed differt: magnitudine paullo minore, antennis paullulum brevioribus, corpore nonnihil nitidiore, & in primis pictura abdominis albida, nec grisecente l. flavescente. Antennarum articulus ultimus in ♀ 2:do vix triplo longior.

119. *T. sphenenda*: oblonga, nigra, capite grisecente; fronte sub prominente, subangustata (♂), vitta atra; antennis longitudine epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do quintuplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; thoracis vittis anticis 5 obsoletis, abdominalisque fasciis 3 interruptis, cinereo-flavidis; alarum nervis transversis: ordinario subflexo, apicali subcurvo; paullulum ante apieem alae excurrente; squamis flavo-albidis. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Dania circa Hafniam, D. Staeger, qui specimen pro describendo benigne communicavit.

♂. Duabus proxime præcedentibus valde similis & affinis, sed a *T. Westermanni* antennis, ut videtur, nonnihil minoribus, a *T. cornuta* pictura capitis corporisque flava, nec albida, & ab utraque magnitudine minore, statura minus ovata, alarum nervis transversis ordinario & apicali minus flexis, ut & squamis subflavidis, differt.

120. *T. diligens*: ovata, cæsia, capite argenteo-micaute; fronte sub prominente, lata (♀), cana, vitta atra; antennis epistomate paullo brevioribus, validiusculis, nigris, articulo ultimo 2:do vix triplo longiore, seta longa, biarticulata, basi incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdominalisque fasciis 3 interruptis, albidis; scutello rufo; alarum nervis transversis: ordinario leviter inflexo,

apicali subcurvo paullulum ante apicem alæ excurrente; squamis albis. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali; 8 Jul., 8 Aug., duo specimina mibi obvia; scilicet unum in Jemtlandia ad diversorum Berge in Alsen. & alterum in Norvegia ad Næs Værdalæ lectum.

♀. Corpore ovato, antennis breviusculis, seta longa, basi tantum incrassata, scutello apice rufo &c., ab affinibus dignoscitur. Frons modice lata, serie setarum sat validarum utrinque dupli, per setas 4—5 simpliciter infra antennas continuata. Antennarum articulus 1:mus brevissimus, 2:dus 1:mo fere triplo longior, ultimus 2:do iterum vix triplo longior (in ♂ sine dubio adhuc longior). Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis inferne paneis. Os leviter reflexum. Thoracis vittæ albidæ præsertim in medio haud distinetæ. Abdominis fasciæ albæ margine externo maculis fuscis micantes. Abdomen ut in *T. Westermanni* (117) setosum. Alæ hyalinæ, area modice aperta.

121. *T. prætervisa*: ovata, nigricans, subopaca, capite argenteo-micante; fronte minus prominente, latissima, cinerea, vitta lata, nigro-picæa; antennis epistomate paullo brevioribus, validis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta 3-articulata, ultra medium incrassata; thoracis vittis 5, abdominisque fasciis 3 interruptis, albidis; scutello apice rufo; alarum nervis transversis ordinario inflexo, apicali leviter curvo paullulum ante apicem alæ excurrente. ♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Hab. in hortis & campis Scaniæ, 9 Aug.—16 Sept., rarius; scilicet ad Lund & Abusa inventa; etiam ad Lomma in littore maris a D. Dahlbom 9 Aug. 1813 capta. E Glogavia sine synonymia a D. Zeller communicata).

♀. *T. diligenti* valde similis & affinis, sed antennis paullo

validioribus, seta non ita longa, 3-articulata, articulo 1:mo brevissimo, 2:do saltem duplo longiore, ultimo ultra medium sat valide incrassato, fronte paulo latiore, vitta distinete latiore, fusca, præcipue dignoscenda. Fasciae abdominis flavido albidae, fuscotessellatae. Reliqua ut in priori.

122. *T. assimilis*: oblonga, nigra, opaca, capite albido; fronte prominente, subangustata ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), cinerea, vitta latiuscula atra; antennis longitudine fere epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta longa, biarticulata \*), vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5 anticus cinereis; abdominis fasciis 3 albidis, olivaceo-tessellatis; nervis transversis: ordinario infexo, apicali paulo incurvo.  $\delta\varphi$ . (Long. 2— $1\frac{1}{2}$  lin. & ultra).

Var. a.  $\delta\varphi$ . major, scutello toto I. apice rufescente.

Fall. Muscid. 28. 58.  $\delta\varphi$  var. "scutello ferrugineo".

Var. b.  $\delta\varphi$ . media aut minor, scutello cinerascente. (Interdum in copula cum var. a).

Fall. I. c. var. "scutello nigro" --- Meig. Dipt. 388. 258.  $\delta\varphi$ . *Phorocera* Meig. 7. 261. 7.

Var. c.  $\delta$ . monstrosa, magnitudine media; alarum nervis transversis: ordinario & apicali intus nervulo appendiceo. Ad Lund Scaniae mense junio semel capta.

Hab. in foliis fruticum & floribus Umbellatarum, per hortos & prata Scandinaviae meridionalis & mediae, 2 Maj.—20 Jul., vulgatissima, in copula multoties de-

---

\* ) seta revera triarticulata est, sed articolus basalis tam parvus deprehenditur & antennæ fere immersus, ut aegre observetur.

prehensa; scilicet per totam Seaniam var. a & b. copiose; in Ostrogothia ad Lärketorp &c. frequens; in Ölandia, D. *Bohemian*; in Gotllandia ad Ruthe, Wamblingbo &c. haud raro; in Westrogothia ad Gothoburgum & in Upplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania circa Hafniam, Aug., D. *Staeger*. — E larva Bombycis Pavonellæ ad Lund exclusa jam d. 25 Martii. (E Glogavia a D. *Zeller* utrumque sexum utriusque varietatis accepi. — Individuum masculum parvum hujus speciei nomine: *Tachin. leucuria* Bouchei\* insignitum ab eodem *Zeller* quoque obtinui).

$\delta\varphi$ . Magnitudine valde variat. Variat etiam sœpe detrita, & tunc corporis præsertim abdominis color alienus, jam niger, jam glaucus e. s. p., unde *T. dolorosa*, *stolidu* e. s. p. in collectionibus exstant, quæ non nisi hujus speciei varietates. Series setarum frontalium haud validarum (saltem in  $\delta$ ), utrinque simplex ( $\delta$ ), aut duplex ( $\varphi$ ), per setas 3—5 infra antennarum incumbentium radicem continuatur. Epistoma modice longum, declivum, nudum, argenteo-micans, vibrissis tenuibus paullo supra medium ascendentibus. Margo oris non nihil reflexus. Palpi flavi. Thorax obscure cinereus, lineis 4 nigris, postice ut vulgariter abbreviatis. Abdomen conico-cylindricum ( $\delta$ ), aut subovale ( $\varphi$ ), albidum, segmento 1:mo brevi, toto nigro, reliquis maculis lineaque dorsali olivaceo-micantibus; totum ut in *T. Westermanni*, 117, setosum. Anus  $\delta$  inflexus, nigricans, genitale atro, nitido. Alæ & squamæ omnino ut in *T. Westermanni*, sed area in majoribus individuis magis aperta, & nervus apicalis paullo magis curvus. Pedes nigri, femoribus antieis subtus dense nigro-villosis. Variat  $\delta$  raro abdominis lateribus mæula rufa.

123. *T. obscura*: oblonga, nigra, opaca, capite cinereo; fronte prominente, angustata ( $\delta$ ), aut modice la-

ta (♀), vitta atra; antennis longitudine fere epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta longa, biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis vittis 5 anticis cinereis; abdominis fasciis 3 albidis, olivaceo-tessellatis; nervis transversis: ordinario inflexo, apicali incurvo; tibiis obscure testaceis. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

Fall. Musc. 29. 59. certe. ♂♀. — Meig. Dipt. 4. 396.  
**273.** (secund. Fall. transcript.) — *Masicera* Macq. Buff.  
**2. 120.** 6? Forte etiam *Tach. schistacea* Meig. 4. 411.  
**305.** ♀. seu *Phorocera* eadem Meig. **7.** 261. 11?

Hab. in Suecia rarius, in copula capta; in Scania ad Esperöd, D. *Fallen*; in Ölandia, D. *Bohemian*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*.

♂♀. Minoribus individualis *T. assimilis* æqualis & de cetero simillima, differt tantum tibiis obscure testaceis. Antennæ quoque forte paullo breviores quam in illa. Variat scutello nigro & rufessente. Specimen unum alterumve in collectione Falleniana tibias vix testaceas, fere nigricantes, habet. — An tantum varietas juvenilis præcedentis? — A *T. albivante*, eni similis, nervo apicali incurvo, nec recto, & vibrissis saltem ad medium epistomatis assurgentibus, differt.

**124.** *T. lata*: late ovata, cinerea, opaca, capite albido; fronte sub prominente, latissima (♀), grisea, vitta angusta, alra; antennis longitudine fere epistomatis, validis, nigricantibus, articulo ultimo 2:do vix triplo longiore, seta biarticulata ad medium incrassata; thoracis lineis 2, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; scutelli apice testaceo; nervis transversis: ordinario recto, apicali incurvo. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; specimen de scriptum e larva *Lophyri Pini*, d. 29 Aug. 1838 a D. *Dahlbom* ad Silfakra prope Lund Scaniæ capta, exclusum 27 Jul. 1839.

♀. Corpore brevi lato, colore cinereo, thorace bilineato, fronte latissima, vitta frontali angusta, ab affinibus præcipue distinguitur. Frons parum prominens, lète flavidocana, serie setarum validarum utrinque duplice, per setas 3 infra antennas simpliciter descendente. Antennæ incumbentes, articulo 2:do fusco, superne distincte setoso, apice rufescente. Epistoma margaritaceum, subperpendiculare, nudum, vibrissis ad medium assurgentibus. Os non prominens. Seta mystacina utrinque unica. Barba occipitis alba. Thoracis lineæ 4 glaucæ, quarum 2 mediæ, tenues, perspicuae, & 2 laterales abbreviatæ, interruptæ & parum conspiciendæ. Abdomen cinereum, certo situ leviter oliveo-maculatum, lineola dorsali tenui fusca. Segmenta: 1:mum breve, inermæ, totum atrum; 2 & 3 margine apicali nitido nigro, in disco & apice setosa; 4:tum margine apicali nigro, nitido, undique setosum. Venter cinereus, linea media nigra. Alæ cinereo-hyalinæ, basi pasum fuscanæ. Nervus long. 4:tus certo situ apparet sub angulo subrecto breviter continuatus. Area anguste aperta, paullo ante apicem alæ educta. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ, pallide flavo-marginatæ. Tarsi simplices.

125. *T. inepta*: oblonga, subcylindrica (♂), cinerea, epistomate argenteo; fronte minus prominente, angustata (♂), grisea, vitta lata concolore; antennis longitudine fere epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; alarum nervis transversis: ordinario

recto, ante medium areæ inserto, apicali subrecto fere in apice alæ excurrente. ♂. (Long. 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 361. 212. ♀. hujus speciei videtur.  
*Phorocera* Meig. 3. 261. 15.

Hab. in Norvegia rarissime; ad Oestre-Næs Værdalæ 8 Jul. 1810 exemplum unicum inveni.

♂. Corpore subcylindrico, thorace subimmaculato, setis frontalibus paucis, vitta frontali lata grisea, alarum nervo transv. ordinario paullo ante medium areæ inserto, &c., ab affinibus statim dignoscitur. Frons modice angusta per vittam latam fere tota impleta, serie setarum paucarum (5—6) utrinque simplici vix infra antennarum radieem continua. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis paullo ultra medium adscendentibus. Os non reflexum. Seta mystacea utrinque unica. Palpi flavi. Barba menti & occipitis alba. Thorax griseo-cinerens, antice vix vestigio linearum 4 nigrarum. Abdomen cylindricum, cinereum, segmentis: 1:mo brevi, toto atro, inermi; 2:do & 3:ti marginè apicali nigro, nitido, in disco & apice (in singulo segmento) setis 4; ultimo seriebus 2 transversis setoso, apice late nigro, nitido. Anus longe inflexus, genitale hamato atro, nitido. Alæ hyalinæ, ad costam subfuscaneæ Nervus 4:tus ad angulum obtusum puncto nigro. Nervus transv. ordinarius extus nervulo brevi appendiceo (an in monstrosa?). Area anguste aperta. Segmentum costæ 2:dum brevissimum; spinula minuta. Squamæ ut in priori. Pedes nigri, pilosi, sed non fortiter spinosi, unguibus nigris pullisque albis, elongatis.

*Obs.* ♀ a D. Meigen 1 c. describitur, mari similis, antennis paullo brevioribus & abdome ovato; a me non visa.

126. *T. pumicata*: ovata, alba nitida, capite glauco-argenteo; fronte prominente, modice lata, nigricante, vitta lata, alba; antennis longitudine epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:do subquadruplo longiore, seta

longa, biarticulata, sere ad medium incrassata; scutello rufo-marginato; abdominis incisuris tenuissime glaeis; alarum nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali incurvo; pedibus nigris, tibiis obscure testaceis. ♂♀.  
(Long.  $2\frac{1}{2}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 397. 276. ♂♀. *Senometopia* Macq.  
Buff. 2. 111. 23. *Phorocera* Meig. Dipt. 7. 261. 9.

Hab. in foliis fruticum, per Sueciam meridionalem & medium, 28 Maj.—20 Sept., vulgaris; scilicet in Scania ad Lindholmen, Tranås, Esperöd &c., passim; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c., frequens; in Westrogothia ad Höberg, D. *Gyllenhal*; in Ölandia; in Gotllandia ad Spiroge, Malms, Kyllej &c., non raro; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*. (E Glogavia specimina minora misit D. Zeller).

♂♀. Statura corporis ovata, color cærulecenti ater, nitidus, scutellum testaceo-marginatum, abdominis incisuræ tenuissime & leviter albæ, frons obscura, ut & tibiæ in primis posticæ testaceæ, sunt præcipue notæ, quibus hæc species facile ab affinibus diagnoseitur. Frons in ♂ paullo angustior quam in ♀. Series setarum frontalium paucarum, in ♂ simplex, in ♀ duplex; per setas 4—5 infra antennarum basin descendit. Antennæ incumbentes, in ♂ nonnihil longiores quam in ♀. Epistoma parum declivum nudum, vibrissis supra medium adscendentibus. Os vix reflexum; albidum. Palpi atri. Oculi magni. Thorax antice in illæsis exemplis vestigio vittarum albarum. Abdomen ut in *T. assimili* (122) setosum, segmento 1:mo brevi. Alæ quoque omnino ut in *T. assimili*, nervo transverso ordinario plus minus infexo, interdum subrecto. Omnia nostra specimina Suecia tibiis obscure testaceis gaudent; sed inter Glogavia unicum tibiis nigris præditum invenio, & hoc forte ad

*Meigeni* genuinam speciem pertinet. Præterea individua patriæ extraneis plerumque majora sunt.

*Obs.* Sub nomine: *T. velox*, hanc inter Anicos Entomologicos olim divulgavi, nomen Meigenianum jam restituens. Cum *Lydella veloci* Macq., quæ longe alia est species, Scandinaviae peregrina, non confundenda.

127. *T. excisa*: late ovata, griseo-cinerea, opaca, capite albo; fronte minus prominente, modice lata, vitta atra; antennis longitudine fere epistomatis, linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata non ad medium incrassata; thoracis lineis 4, pedibusque nigris, tibiis scutelloque testaceis; alis cinereo-hyalinis, basi subflavidis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Fall. Musc. 32. 67. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 395. 272. *Exorista* Meig. Dipt. 7. 256. 43.

Hab. in Svecia media rarius; in Ostrogothia ad Lärketorp 1—15 Aug. 1813 utrumque sexum inveni; ad Gusum, teste D. *Wahlberg*.

♂♀. Corpus latum, ovatum, griseo-cinereum, antennæ lineares, haud valide, seta longa vix ad medium tenuiter & indeterminate incrassata, oculi magni distincte hirti, alæ basi flavidæ, scutellum tibiæque testacea, speciem præcipue designant. Frons in ♂ paullo angustior, quam in ♀. Series setarum in ♂ simplex, in ♀ duplex; per setas 3 infra antennas incumbentes descendens. Epistoma perpendiculare, nudum, vibrissis inferne vix inchoandis. Os non reflexum. Palpi flavi. Barba occipitis alba. Thoracis lineæ 4 angustæ, nigræ, postice abbreviatæ. Abdomen breve, ovatum, griseum (in ♂ cinereo-tessellatum), 1:mo segmento certo situ toto, lineolaque dorsali interrupta, fuscis. Segmentum 1:mum breve, pro receptione scutelli excisum, apice bisetosum; 2:dum setis apicalibus 4; 3:tium setis apica-

libus 10—12; 4: tum multisetosum. Anus ♂ parum inflexus. Alarum area aperta, mox ante apicem alae terminata. Nervus transv. ordinarius pone medium areæ insertus. Angulus nervi 4:ti subrectus 1. leviter obtusus. Nervi 3:ti basi setuliferi 2. Spinula costæ nulla. Squamæ albidae, flavidomarginatae. Pulvilli in ♂ magnæ, albæ. Tarsi in ♀ simplices.

**128. *T. excavata*:** late ovata, cinerea, opaca, capite albido, fronte sub prominente, subangustata (♂), aut lata (♀); vitta atra; antennis longitudine fere epistomatis, sub linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata non ad medium incrassata; thoracis lineis 4, pedibusque nigris; tibiis, thoracis postico linea laterali, scutelloque testaceis; alis hyalinis, nervo transverso ordinario leviter flexo, apicali recto. ♂♀. (Long. 3 lin.).

***T. excisa* Fall. Musc. 32. 67. descript. var. "mas: abdomine maculis fuscis".**

Hab. in Suecia præsertim meridionali, 1 Jun.—10 Jul., passim, sæpe e nympha nuper declarata mihi obvia; scilicet ad Lund (educata jam d. 27 Febr. e pupa exclusa), Esperöd in parœ. Tranås &c., haud raro; in Ölandia 1835, D. Boheman; e Suecia superiore a D. Marklin missa; in Dania, D. Westermann.

♂♀. Simillima priori, a qua vero statura vix ita lata, colore obscure cinereo, fronte forte nonnihil magis prominente, antennis paullulum validioribus, vitta inter alas & scutellum pallida perspicuiore, abdominis tessellis dilute olivaceis, alis hyalinis, basi levissime fuscis, nec vero flavis, squamis totis albis, nec flavidomarginatis, ut & segmentis abdominis 1, 2 & 3 in ♂ lateribus macula rufa, vere differt.

*Obs.* Individuum unicum inveni fronte solito latiore; sed vix diversa. — Specimina hujus speciei sub nomine jam *T. excavata*, jam *T. curta* vendita fuerunt.

129. *T. festinans*: ovata, griseo-cinerea, opaca, capite albido; fronte parum prominente, latissima (♀), grisea, vitta lata, fusca; antennis longitudine fere epistomatis, sublinearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, non ad medium incrassata; thoracis lineolis 2, pedibusque nigris; scutelli apice rufo; alis cinereo-hyalinis, basi subflavidis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali recto. ♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 384. 251. ♀. *Masicera* Meig. Dipt. 7.

241. 19. (sed rectius ad *Exorista* genus referenda).

Hab. in Gotlandia, ubi in Pimpinella magna ad Ruthe 15—17 Jul. 1819 quinque specimina inveni.

♀. *T. excisæ*, 127, valde affinis & similis, sed corpore minus lato, fronte paullo minus prominente multo vero latiore, vitta frontali griseo-fusca, nec atra, serie setarum infra antenas longius descendente, thoracis lineolis anticis binis tenuissimis, scutello tantum apice testaceo, abdomine subflavido-cinereo, imutaculato, alis hyalinis, basi vix flavescentibus, nervo transverso apicali exacte recto, squamis albis, non flavo-marginatis, femoribus cinerascentibus, ut & tibiis nigris, nec testaceis, satis superque dignota. — Similis quoque *T. fulvæ* infra (163), sed haec alarum basi squamisque flavescentibus, & vibrissis fere ad medium epistomatis assurgentibus, ab illa facile dignoscitur. — Masi mihi ignotus.

*Obs.* E Gotlandia 1819 Lundæ reversus, huic speciei nomen "T. festinans" proposui, & specimina aliquot eo nomine insignita collectioni amici mei *Falleni* tradidi. Haec autem individua celeberrimus Professor, obiter tantum intuens, non nisi varietatem *T. fulvæ* considerans, speciei sub *T. fulva* in museo suo posuit, & inde mentionem speciei in ope-

re suo omittens. Hoc afferre volui, ut id intelligatur quod Cel. Meigen in nota sub *T. festinante* l. c. attulit.

130. *T. argentigera*: oblongo-ovata, cinerascens, opaca, capite argenteo; fronte prominente, lata (♀), vitta lata atra; antennis longitudine fere epistomatis, linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, ultra medium incrassata; thoracis lineis 4, abdominis segmento 1:mo toto, reliquorumque margine apicali subnitido anguste, lineaque dorsali, pedibusque, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali subrecto. ♀. (Long.  $2\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarius; in Scania ad Lund & Esperöd, 15 Jul.—2 Aug., 4 individua inveni; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*.

♀. Similis iterum priori, sed differt: capite magis argenteo, fronte distinctius porrecta, vitta atra latiore, serie setarum infra antenas non ita longe continuata (per setas tantum 2—3 descendente), colore corporis obscuriore, pictura abdominis in fundo griseo nigra, nervo transv. apicali non exactissime recto, ut & pedibus atris, nec femoribus cinerascentibus. A *T. vulgari*, cui etiam subsimilis, palpis flavis, nec nigris, &c., mox dignoscitur. — Sub nomine *T. albiceps* olim divulgata, sed nomen *albiceps* heic rejiciendum, utpote jam pro alia specie a D. Meigen usurpatum.

131. *T. bicingulata*: oblonga, cinerascens, opaca, capite albido; fronte haud prominente, modice lata, cana, vitta subangustata, atra; serie setarum longe descendente; antennis fere longitudine epistomatis, linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; thoracis vittis 4 nigris; scutello rufescente; abdome atro, nitido, cingulis 2 al-

bo-cinereis; pedibus nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali recto. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Esperöd 12 Aug. semel inveni.

♀. Priori in multis similis, sed magnitudine nonnihil minore, capite albo minus argenteo-micante, fronte convexa non prominente, vitta nigra angustiore, serie setarum infra antennas longius continuata, nempe per setas 5 remotas paullo infra medium epistomatis descendente, seta antennarum vix ad medium inerassata, abdominis segmentis 2 & 3 margine apicali latius 4:toque fere toto, nigris, præcipue differt. Antennæ liberae? Palpi nigri, apice flavi. Alæ hyalinæ, immaculatæ. Area anguste aperta, ante apicem alæ sat procul terminata. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ, subflavido-marginatæ. Abdomen segmento 1:mo brevi; ut in priori setosum. Tarsi simplices.

132. *T. albicans*: ovata, cana, opaca, epistomate albo; fronte subprominente, lata, vitta atro-brunnea; antennis longitudine fere epistomatis, linearibus, nigris, basi ferrugineis, seta biarticulata, ad medium inerassata; thoracis lineolis 4, abdominis segmentis 1:mo toto, 2 & 3 margine apicali anguste, pedibusque, nigris, tibiis testaceis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto in apice alæ excurrente. ♀. (Long. 2 lin.).

Fall. Musc. 35. 71. vera, secundum specimina typica.  
— Meig. Dipt. I. 115. 306. *Exorista* Meig. Dipt. 7. 256. 37. — Vix *T. schistacea* Meig. I. 114. 305. ♀ seu Ejusdem *Phorocera* 7. 261. 14?

Hab. in Suecia præsertim meridionali, 4 Jun.—27 Jul., passim; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c.,

haud infrequens; in Gotllandia ad Källunge; rarius. (E Glogavia, D. Zeller).

♀. Parva, ovata, convexa, cana l. albida. Vitta frontalis modice lata, atro-brunnea, interdum ferruginea. Series setarum utrinque duplex tantum per setas 2—3 infra radicem antennarum simpliciter continuata. Antennæ incumbentes, agustatæ, nigræ, articulis basalibus brevibus, rufis. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis infernis, spuriis, minime ad medium adscendentibus. Os non reflexum. Seta mystacina utrinque unica. Setulæ sub ore tenues, nigræ. Pubescentia gulæ & occipitis brevis, tenuis, alba. Palpi flavi. Oeuli parvi. Thoracis lineæ 4, nigræ, quarum 2 mediæ tenues, & 2 laterales interruptæ & abruptæ. Scutelli apex puncto testaceo. Abdomen ut in *T. Westermanni*, 117, setosum, segmento 1:mo brevi, toto, 2 & 3 margine apicali anguste & sat determinate, nigro-brunneis. Alæ cinereæ, radice flavidæ, nervis leviter infuseatis. Area apice aguste aperta. Nervi longitudinales: 4:tus obtuse angulatus, 3:tius basi setulis 2—3. Spinula costæ nulla. Squamæ albidæ, subflavido-marginatæ. Pedes nigri l. pieei, tibiis non dense setulosis, obscure testaceis. Tarsi simplices atri.

133. *T. perturbans*: ovata, griseo-cinerea, opaca, capite cano; fronte subprominente, modice lata (♂), aut lata (♀); vitta atra; antennis longitudine fere epistomatidis, nigris, validis (♂), aut angustatis (♀), seta biarticulata, ad medium incrassata; thoracis lineis 4, abdominis segmentis 1:mo toto, 2 & 3 margine apicali anguste, lineola dorsali obsoleta, pedibusque, nigris, tibiis testaceis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia tempore vernali rarius; scilicet in Scania ad Lund & Räfsten pauca exempla inveni; ex

Holmia ♂ a D. *Wahlberg* sub nomine *T. albicans* communicatus; & e Dania ut non rara incola circa Hafniam ♀ etiam sub nomine *T. albicans* a D. *Staeger* nuper missa. (Specimina mascula e Glogavia sine synonymia quoque obtinui).

♂♀. Magna similitudo & affinitas cum priori, sed colore corporis paullo obscuriore, fere griseo-cinereo, nec cano, capite late cinereo, vix albido, antennis totis nigris, nec basi ferrugineis, scutelli apice puncto flavo nullo, abdominis lineola dorsali fusca plus minus perspicua, alarum nervis versus apicem vix fuscedine cinctis, ut & femoribus intensius nigris, numquam piccis, vere diversa. *Mas*, fronte nonnihil angustiore; serie setarum minus validarum postice subduplici; antennis multo majoribus, latioribus; pulvillis albis, brevibus, licet nonnihil majoribus, quam in ♀. — Reliqua ut in priori.

134. *T. strigifrons*: oblonga, nigra, nitida, vix albo-micans, capite argenteo-micante; fronte subprominente, subangustata (♂), transversim strigata, vitta angusta atra; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo prismatico 2:do duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; scutelli apice rufescente; alis cinereis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente; squamis niveis. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 645. 46. ♂.

Hab. in Lapponia Norvegica septentrionali rarissime; in foliis Betulae allae ad Alteidet non longe a NordCap Finmarkiae, d. 1 Aug. 1821 specimen descriptum inveni.

♂. Caput argenteo-micans, fronte obscuriore, serie setarum tenuium utrinque simplici per setas 3 infra antennas continua. Antennae subincumbentes nigricantes, articulo ultimo valido. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis

nullis. Os leviter reflexum, album. Palpi elongati, lividi. Genae rufescentes (an in juniore?). Oculi mediocres. Thorax antice levissime albo-micans, pleuris obscure cinerascentibus. Abdomen oblongum, nitidum, atrum, segmentis (1:mo brevi) margine apicali setosis, ad latera vestigio macularum albarum. Tuberculum anale inflexum, atrum, nitidum. Alæ albido-cinereæ, basi leviter fuscanæ. Nervus transversus ordinari. pone medium areæ apertæ insertus. Angulus nervi 4:ti subobtusus. Spinula costæ nulla. Squamæ magnæ. Pedes nigri, pulvillis sat magnis, albis.

**135. *T. breviseta:*** oblonga, obscure cinerascens, opaca, capite argenteo-micante; fronte distinete prominente, subangustata ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), vitta lata, altra; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo mediori, nigro, quam 2:do ferrugineo duplo longiore, seta brevissima, biarticulata, fere ad apicem incrassata; scutelli apice rufescente; thoracis vittis abdominisque maculis fuscis, obsoletissimis; alis subhyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto mox ante apicem alæ excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 615. 19.  $\delta\varphi$ .

Hab. in Scandinavia media & boreali, rarius; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrog. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in Norvegia? D. *Bohemian*.

$\delta\varphi$ . Similis priori, a qua tamen facile dignoscitur: thorace emerascente, abdome grisecente, fronte multo magis porrecta, transversum non strigata, antennis subliberis, basi rufescentibus, articulo ultimo minus lato, angulo apicali inferiore rotundato, seta brevissima, erecta, valida, palpis latus flavis, alarum nervo transv. ordinario minus flexo, area apice paullo angustius aperta, ut & squamis nonnihil minoribus & impure albidis.

136. *T. dispar*: oblonga, obscure cinerascens, opaca, capite cano; fronte sub prominente, angustissima ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\text{♀}$ ), vitta nigra; antennis brevibus, articulo ultimo mediocri nigro, quam 2:do ferrugineo parum longiore, seta elongata, biarticulata, basi incrassata; alis basi squamisque flavicantibus, nervis transversis: ordinario flexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente; pedibus in  $\delta$  nigris, tibiis flavis, in  $\text{♀}$  flavis, tarsis nigris.  $\delta\text{♀}$ . (Long. 3 lin.).

**Mas**: obscure cinerascens, pubescens & setosus; oculi postice cohærentes; frons antice obseura, setis utrinque simpliei serie hand validis; antennæ fere totæ nigræ; alæ fuscæ, squemis brunnescentibus, spinula costæ minutissima; pedes nigri, tibiis testaceis, pulvillis magnis, albidis;

**Fem**: cinerea, setosa, sed parum pubescens; oculi modice remoti; frons cinerea, setis utrinque duplicei serie validis; antennarum articuli 1 & 2 ferruginei; abdomen in fundo ænescenti nigrum, subnitidum, griseo cinereum; alæ basi & squamæ flava, spinula costæ distincta; pedes cum coxis lutei, tarsis nigris, pulvillis albis minutis; in copula.

Fall. Muse. 31. 64.  $\delta\text{♀}$ . secundum specimina originaria. — *T. rufipes* Fall. l. c. 33. 68.  $\text{♀}$ . — Meig. Dipt. 269. 51.  $\delta\text{♀}$ . *Zophomyia rufipes* Macq. Buff. 2. 160. 5.  $\delta$ . *Zophomyia rubripes* Macq. l. c. 160. 4.  $\text{♀}$ . *Macquartia rufipes* Meig. Dipt. 7. 229. 1. T. 70. f. 40—42.  $\delta\text{♀}$ .

Hab. in Suecia meridionali & media, tempore autunnali, rarius, d. 10 Aug. & 12 Oct. in copula deprehensa; scilicet in Scania in foliis Aceris Platanoides horti botanici Lundeusii mihi obvia; in Ölandia, teste D. Wahlberg. (In Germania tempore vernali non raro).

$\delta\text{♀}$ . Antennæ incumbentes, parvæ, seta nuda. Epistoma breve, ad latera pubescens, vibrissis nullis. Os subreflexum.

Palpi elongati, filiformes, toti flavi. Genæ descendentes. Setæ utrinque 2 infra antennarum basin e fronte descendunt. Thoracis lineaæ anticae nigrae 4, in ♂ parum distinguendæ. Abdominis segmenta: 1:mum haud breve, subinerme, reliqua in disco & margine apicali setosa. Alarum nervi ut in *T. strigifronti* 134. *Mas*: ano infexo; abdomine supra maculis nigro-mieantibus.

**137.** *T. vulgaris*: ovata, cinerea, opaca, capite albicante; fronte parum prominente, lata grisea, vitta lata, subnigricante; antennis longitudine sere epistomatis, validis, nigris, articulo ultimo 2:dō quadruplo longiore, seta triarticulata, paullo ultra medium incrassata; thoracis vittis 4, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali anguste, lineaque dorsali, pedibusque, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto paullo ante apicem alæ excurrente; vibrissis infernis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Fall. Muse. 30. 62. ♂♀. vera. — Meig. Dipt. 4. 391.  
**264.** ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 644. 41. ♂♀. *Eurigaster* Macq.  
 Buff. 2. 118. 7. ♂♀. *Exorista* Meig. Dipt. 7. 255. 15.

Hab. in Umbellatis, foliis fruticum &c., per hortos & prata præsertim Scandinaviæ meridionalis & mediæ, **10** Martii—**26** Sept., vulgatissima; in copula multoties capta & e larvis Lepidopterorum sæpe exclusa (educa-tam jam **26** Febr. exclusam obtinui); scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, copiosissime; in Ölandia; in Gotllandia ad Fårön, Ruthe, Thorsborg, Hoburg &c., frequentissime; in Nericia, Bahusia & Up-landia, passim; in Dalecarlia ad Stora Tuna, D. *Dahl-bom*; in Norvegia inter Dovre & Lerdalsören, D. *Bohe-man*; in Dania freq., D. *Staeger*. (E Glogavia ♂♀ a D. *Zeller* missi).

$\delta\varphi$ . Frons in utroque sexu subæque lata, vitta lata, nigrogrisea, aut rufo-picea. Series setarum sat validarum in  $\delta$  subsimplex per setas 4—5 infra antennas descendens; in  $\varphi$  postice duplex, antice per setas 3—4 infra antennas continua. Antennæ incumbentes, magnæ in  $\delta$  paullo longiores & validiores, quam in  $\varphi$ . Epistoma perpendicularare, argenteo-nicans, nudum, vibrissis infernis, in  $\varphi$  paucioribus, in  $\delta$  tenuibus interdum fere ad medium assurgentibus. Os haud reflexum. Palpi exserti, atri, extrorsum subineras sati. Abdomen 1:mo segmento brevi apice bisetoso, reliquis disco & margine apieali setosis. Alarum nervi transversi: medius mox pone apicem auxiliaris ductus; ordinarius paullo pone medium areæ apertæ insertus. Angulus nervi long. 4:ti subobtusus I. fere rectus. Nervus 3:tius basi setulis 2—3. Spinula costæ nulla. Squamæ albidae. Tarsi simplices, unguibus nigris pulvillisque albidis in utroque sexu parvis. — Abdomen certo situ fuscotessellatum, in  $\delta$  interdum maeulis lateralibus ferrugineis obsoletis. — Anus  $\delta\varphi$  niger, nitidus.

138. *T. confinis*: ovata, nigra, nitida, capite albido; fronte parum prominente, subangustata ( $\delta$ ), auctio-  
nem modice lata ( $\varphi$ ), vitta modice lata, atra I. ferruginea;  
antennis longitudine fere epistomatis, validiusculis, nigris,  
articulo ultimo 2:do quadruplo longiore, seta triarticula-  
ta, ad medium incrassata; thoracis vittis anticis 5, abdo-  
minisque cingulis 2 interruptis, cinereis; scutello rufo;  
alis subhyalinis, nervis transversis: ordinario leviter  
flexo, apicali subrecto paullo ante apicem alæ excurren-  
te; vibrissis inferne spuriis.  $\delta\varphi$ . (Long. 2  $\frac{1}{2}$ —2  $\frac{1}{2}$  lin.).

Fall. Muse. 32. 65.  $\delta\varphi$ . certe secundum exempla typica. — Meig. Dipt. 4. 396. 271.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 644. II.  $\delta\varphi$ . *Masicera* Maeq. Buff. 2. 121. II. an Ejusdem etiam *Masic. zonata*. 2. 121. 10? *Phorocera con-*

*Jinis* Meig. Dipt. 7. 261. 4. (sed ob faciem non vibrissatam potius ad *Exoristæ* genus referenda).

Hab. in Scandinaviae Umbellatis &c., 10 Jul.-22 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd rarissime; in Smolandia, D. *Bohemæ*; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Ruthe, Kjellunge, Wamblingbo &c., passim; in Helsingia ad Jerfsö; in alpe Dovre Norvegiæ, D. *Bohemæ*.

♂♀. Affinis & similis priori, sed differt: magnitudine paullo minore, corpore nigro, nitido, pictura cinerea parciore, fronte & vitta minus latis, antennis non ita latis, fere linearibus, seta tantum ad medium incrassata, vibrissis paucioribus, ut & scutello toto rufo. Abdomen nigrum, nitidum, segmento 2:do fascia basali lata, & 3:tiō cingulo basali angusto, interruptis, albido. Segmentum 1:mum breve, apice setis 2, 2:dum apice setis 4. 3:tiō apice setis circiter 10, 4:um multisetosum. — ♀ rarissima.

139. *T. magnicarnis*: ovata, cinerea, opaca, capite albiente; fronte parum prominente, lata, vitta lata, fusca aut rufo-picea; antennis longitudine epistomatis, in utroque sexu validissimis, nigris, articulo ultimo 2:do quadruplo longiore, seta triarticulata, paullo ultra medium incrassata; thoracis vittis 4, abdominis segmentis: I:mo toto, reliquisque margine apicali, lineaque dorsali, pedibusque, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente; vibrissis infernis. ♂♀. (Long. 2½-3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 614. 42. ♂♀.

Hab. in Scandinavia, Jul. Aug., rarius; scilicet in Scania ad Räften, D. *Dahlbom*, ad Esperöd, ipse; in Smolandia; in Ostrogothia ad Omberg, Lärketorp & Gu-

sum; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Norvegia ad Dovre specimen typicum a Cel. D. Prof. *Bohemian* inventum.

$\delta\varphi$ . *T. vulgari* (137) ut ovum ovo similis, & vix differt nisi antennarum articulo ultimo adhuc paullo validiori, latiori, & id in utroque sexu, unde diversam credo.

140. *T. genarum*: oblonga, obscure cinerascens, opaca, capite argenteo; fronte prominente, angustata ( $\delta$ ), vitta latiuscula, brunneo-atra; antennis epistomate paullo brevioribus, subangustatis, nigris, articulo ultimo 2:do vix triplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis lineis anticus 4, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; genis scutellique apice rufis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali recto paullo ante apicem alae excurrente; vibrissis subnullis.  $\delta$ . (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; in Gotlandia ad Hamra d. 3 Jun. 1823 specimen descriptum detegit Cel. D. Prof. *B. F. Fries*.

$\delta$ . Similis *T. assimili* (122), sed antennis brevioribus, palpis nigris, nec flavis, vibrissis vix ullis, genis juxta oculos luteo-sanguineis, & alarum nervo transverso apicali recto, nec incurvo, facile dignoscitur. A *T. vulgari*, 137, cui etiam subsimilis, magitudine paullo majore, fronte magis porrecta & angustiore, antennis multo minoribus, seta biarticulata, genarum colore rufo, vibrissis paucioribus, nervo alarum apicali exacte recto, ut & tarsorum pulvillis albis longioribus, aperte differt. Setae frontales utrinque 4 infra antennarum radicem descendunt. Epistoma declivum. Margo oris leviter reflexus, albus. Palpi sat longe exserti, nigri. Abdominis fasciae cinereae subinterruptae & leviter olivaceo-subtessellatae. Segmentum 1:mum breve, margine apicali setis 4; reliqua segmenta disco & apice setosa. Alae

basi leviter fuscane. Nervus transv. ordin. mox pone medium areæ apertæ insertus. Spinula costæ minuta.

111. *T. rotundaticornis*: ovata, cinerea, opaca, epistomate albido; fronte parum prominente, lata, vitta lata, pieca; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo magno, rotundato, seta triarticulata, paullo ultra medium incrassata; thoracis lineis 4, abdominis segmentis: 1:mo brevi, toto, reliquis margine apicali anguste, lineaque dorsali, pedibusque, nigris; scutelli apice rufo; alis albido-hyalinis, nervis transversis: ordinario recto, apicali subrecto paullo ante apicem alæ excurrente. ♂. (Long. 2  $\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Lund 10 Sept. 1837 semel inveni.

♂. *T. vulgari*, 137, in omnibus simillima, præter antennarum articulum ultimum paullo breviorem, sed multo latiorum, fere orbicularium, alas basi subalbidas, nervos transversos ordinarium rectum, nec flexum, apicalem levissime curvum. Reliqua ut in *T. vulgari*.

112. *T. straminifrons*: ovata, griseo-cinerea, opaca, epistomate albo; fronte parum prominente, lata, oehracea, vitta latiuscula, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, subangustatis, linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, ad medium incrassata; thoracis lineolis anticis 1, abdominis segmentis: 1:mo brevi, toto, reliquis margine apicali anguste, lineaque dorsali, pedibusque, nigris; scutelli apice rufo; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali subrecto; vibrissis nullis. ♂♀. (Long. 2  $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. ad littora maris, per Scandinaviam meridionalem, 20 Maj.—4 Aug., rarius; in Scania ad Malmogiam & Lomma sub Fucis rejectis pupas plures initio mensis junii inveni, e quibus versus medium Julii ejusdem anni imagines egressæ. Sub nomine: *\*T. hyalipennis* Zett. Ins. Lapp? a D. Staeger ex Hafnia specimen etiam obtinui. Ad Wadstena Ostrogothiæ prope lacum Wettern exemplum unicum quoque legi.

♂♀. Simillima iterum *T. vulgari*, sed antennis nonnihil minoribus, vitta frontali paullo angustiori, fronte distinete flava, ut & scutelli tantum summo margine apicali testaceo, differt.

**143. *T. duplinervis*:** oblonga, cylindrica, nigra, nitida, capite albicante; fronte parum prominente, modice lata, vitta lata, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, angustatis, linearibus, nigris, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta biarticulata, vix ad medium incrassata; alis cinereis, nervis transversis: medio gemino, ordinario subrecto, apicali recto in apice alae excurrente; vibrissis nullis; epistomatis lateribus serie setarum. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; ex Höberg Westrogothiae a D. *Gyllenhal* communicata.

♀. Habitus *T. tremula* n:o 152, sed multo minor. Tota atra, nitida, thorace levissime cinereo-pollinoso, lineolis anticis 4, tenuibus, nigris. Caput albidum. Vitta frontalis nigra, opaca, fere totum interstitium implet. Series setarum intrinque duplex, ad latera epistomatis subperpendicularis per setas circiter 8 simpliciter usque ad os descendit. Os non reflexum. Palpi nigri. Antennæ apice truncatæ. Abdominis cylindrico-conici segmentum 1:uum parum breve, bisetosum; reliqua in disco & margine apicali setosa. Alæ

basi albescentes. Nervi transversi: medius geminatus quadrilaterum format segmento costali 2:do oppositam; ordinarius rectus pone medium areæ apertæ insertus. Angulus nervi long. 4:ti obtusissimus. Basis nervi long. 3:iii setulis 4—5. Spinula costæ adest, sed parva. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, tarsis simplicibus.

144. *T. hyalipennis*: ovata, nigra, subnitida, capite albicante; fronte parum prominente, modice lata, vitta modice lata, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo haud dilatato, linearis, 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; thoracis vittis 5 obscure cinereis; abdominis cingulis 3 albis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subrecto longe a margine remoto, apicali levissime curvo ante apicem alæ excurrente; vibrissis nullis. ♂♀. (Long. 2—2  $\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 615. 48. ♂♀.

Hab. in Scandinavia boreali, rarius; scilicet in Ostrogothia ad Gusum; in Ölandia & ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in alpe Dovre Norvegiae, D. *Boheman*.

♂♀. Similis *T. vulgari*, 137, sed paullo minor & antennis multo minoribus, angustioribus, seta biarticulata, vix ad medium incrassata, oculis minus hirtis, fronte & vitta nigra paullo angustioribus, scutello non rufescente, abdominis cingulis 3 albidis angustioribus, ad basin segmentorum 2, 3 & 4 tantum perspicuis, ut & area alarum nonnihil angustius aperta, vere differt. Vibrissæ infernæ, spuriæ. — Mas paullo angustior femina.

145. *T. tricingulata*: ovata, nigra, subnitida, capite albicante; fronte parum prominente, modice lata, vitta modice lata, atra; antennis epistomate paullo brevi-

oribus, nigris, articulo ultimo sublineari 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata fere ad medium incrassata; thoracis vittis 5 obscure cinereis; abdominis cingulis 3 albis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subrecto, modice a margine remoto, apicali levissime curvo ante apicem alicet excurrente; vibrissis nullis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ —2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 616. 51. ♀.

Hab. in foliis fruticum & graminosis, per Scandinaviam, 8 Jun.—Jul.—10 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund, Björnstorps, Esperöd &c., haud raro; in Smolandia ad Annæberg, D. Boheman; in Ostrogothia ad Vadstena; in Westrogothia, D. D. Gyllenhal & B. Fries; in Ölandia; in Gotlandia ad Ruthe, Kjellunge, Ahlskog, Wamblingbo &c., sat frequeas; in Norvegia inter alpem Dovre & Lerdalsören, non raro, D. Boheman.

♂♀. Simillima praecedenti, sed saepe duplo interdum triplo & ultra minor, & præcipue differt nervo transverso ordinario modice, nec tam longe ac in *T. hyalipenni*, a margine interiori alicet remoto, quæ tamen nota vix nisi per comparationem utriusque sexus appetat. Nervi in *hyalipenni* plerumque sat tenues, in *triciungulata* saepe subvalidiores, obscuriores. Mares in utraque specie antennis nonnihil longioribus, serie setarum frontalium simplici, & pulvillis albis parvis, sed tamen paullo majoribus, quam in feminis, gaudent.

Sub nomine: *Tach. zonella*, individuum hujus speciei e Smolandia olim obtinui; sed diversa a n:o 63.

146. *T. umbrinervis*: oblonga, obscure cinerea, epistomate albido; fronte non prominente, modice lata, vitta latiuscula, brunnea; antennis epistomate paullo breoribus, nigris, articulo ultimo lineari 2:do duplo longiore, seta biarticulata, ad medium incrassata; abdome

atro, nitido, cingulis 3 albis, subinterruptis; pedibus nigris; alis cinereis, nervis fuscedine cinctis, transversis: ordinario recto, apicali incurvo in apice alae excurrente, area oclusa. ♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Norvegia rarissime; ad Garnäs Värdalæ 30 Jun. 1840 a D. Dahlbom detecta.

♀. Similis *T. dubia*, 108, sed magnitudine minore, fronte non porrecta, palpis nigris, abdomine non tessellato &c., differt. — A *T. tricingulata*, cui etiam similis, thorace obseure cinereo, lineolis antieis nigris parum perspicuis, alarum nervis distincte infuscatis, transversis: ordinario recto, apicali subcurvo in apice alæ excurrente, ibique cum nervo 3:tio intime conjuncto, hinc area oclusa, mox dignota. Setæ frontales 4 infra antennarum radicem utrinque descendunt. Vibrissæ infernæ, spuriæ. Scutellum cinerascens. Abdominis segmentum 1:mum breve, inerme; 2:dum in medio setis discoidalibus 4 & apicalibus 2; 3:tum setis in disco 2, in margine apicali pluribus; 4:tum multisetosum. Alarum costa fusea; macula in segmento costali 2:do fusca perspicua. Spinula costæ nulla. Pedes nigri, tarsis simplicibus.

**147. *T. bisignata*:** oblonga, griseo-cinerea, opaca, capite albicante; fronte sub prominente, angusta ( $\delta$ ), nigra, vitta modice lata, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, linearibus, angustis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, non ad medium incrassata; thoracis vittis 3, abdominis linea dorsali, segmento 1:mo toto, 2:do maculis 2, pedibusque, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario infexo, apicali recto mox ante apicem alæ excurrente.  $\delta$ . (Long. 2 $\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 322. 143.  $\delta\varphi$ . & 7. 190. 16. Macq. Buff. 2. 147. 34. *T. floralis* Fall. Musc. 36. 75. descript' "var. oculis birtis."

Hab. in Scania rarissime; e Dania sub nomine: "*T. bisignata* Meig." a D. Staeger benigne communicata. (E Glogavia sine synonymia a D. Zeller missa.).

♂. Similis sequenti, sed paullo major, & antennarum articulo ultimo longiore, subangustiore, seta vix ad medium incrassata, fronte magis porrecta & multo angustiore, abdominis elliptici, convexi (nec subdepressi) maculis nigris paucioribus, squamis sub alis brunnescensibus, ut & pulvillis longioribus, vere distincta. Cinereo-grisea. Series setarum frontalium per setas 3 infra antennarum basin descendit. Latera epistomatis nigro-micantia. Margo oris leviter reflexus. Palpi exserti, filiformes, nigri. Barba gulae alba. Oculi subundi. Thoracis vittæ 3 nigræ latæ, media latissima. Scutellum nigrum, margine cinereum. Abdomen griseum, linea dorsali, segmento 1:mo parum brevi, toto, 2:do macula utrinque longa subtrigona, 3:to sœpe etiam macula utrinque, nigra; ut in sequente setosum. Alæ basi fuscaneæ. Area modice aperta. Spinula costæ vix ulla.

♀: "fronte latiore, thoracis vittis 4 nigris, abdome ovato, cinereo; subimmaculato" a D. Meigen l. c. describitur, a me non visa. — *Tach. floralis* Meig. Dipt. 4. 304. 112. cum citatione Fall. haud multum a nostra *T. bisignata* abludere videtur.

148. *T. floralis*: ovata, obscure griseo-cinerea, epistomate albido; fronte parum prominente, obscura, angustata (♂), aut modice lata (♀), vitta frontali mediocri, nigra (♂), aut lata, ferruginea (♀); antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo linearis, angustato, nigro 2:do nigro (♂), aut rufo (♀) parum longiore, seta 3-articulata? fere ad medium tenuiter incrassata; thoracis vittis 3, abdominis segmento 1:mo toto, 2:do fascia ante dentata, 3:to maculis 3, 4:to apice, pedibusque, ni-

gris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali recto fere in apice alae excurrente. ♂♀. Long.  $1\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas.*: saepius obscurior; palpis antennisque nigris; fronte subangusta, serie setarum tenuium utriusque simplici; abdominis macula laterali in segmentis 2 & 3 plerumque rufa;

*Fem.*: magis cinerascens; palpis flavis; antennis subvalidioribus, basi & vitta frontali ferruginoantibus; fronte latiore, serie setarum subvalidarum utriusque duplice; abdominis macula laterali rufa nulla.

Var. a. ♂♀. major, 2— $2\frac{1}{2}$  lin. long.; mas: abdome macula laterali saepissime rufa.

Fall. Musc. 36. 71. var. β. ♂♀. genuina. Zett. Ins. Lapp. 616. 50. var. a. ♂♀. *Tach. notabilis* Meig. 4. 266. 45. ♂. *Nemorea notabilis* Meig. Dipt. 7. 222. 29. (*Tach. floralis* Meig. 4. 301. 112. ♂♀. hue non pertinet).

Var. b. ♂. duplo minor,  $1\frac{1}{2}$  lin. long.; mas: abdome macula laterali nulla.

Fall. l. e. var. γ. Zett. l. e. var. b. ♂. *Tachin. maculosa* Meig. Dipt. 4. 265. 44. *Nemorea* Meig. Dipt. 7. 222. 28. Macq. Buff. 2. 100. 5.

Hab. in Umbellatis, graminosis & foliis fruticum, 12 Jul.—Aug.—15 Sept., per Scandinaviam, vulgaris; scilicet in Sæania, Smolandia & Ostrogothia, frequens; in Ölandia & Gotlandia rarius; in Jemtlandia usque ad Östersund & radicem Åreskutan, passim; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; in Ångermannia haud raro. (E Glogavia sub nomine: partim *Tach. fimbriata* Meig., & partim *Tach. ornata* Bouch.) individua mascula a D. *Zeller* obtinui).

♂♀. Valde similis *T. mutabili*, 53, sed magnitudine plerumque majore, antennis paullo brevioribus, oculis distincte hirsutis, in ♂ remotioribus, &c., abunde dignota. — Setæ

frontales 4 infra antennarum radicem utrinque descendunt. Macula supra antennas s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e ferruginea. Seta antennarum saltem in ♂ triarticulata mihi videtur, licet articuli 2 basales brevissimi. Thoracis vittae 3 nigræ, media lata, subgeminata. Abdomen: segmentis 1:mo breviuscule, in medio apicis bisetoso, reliquis in disco & apice setosis. Segmentum 2:dum maculis interdum 3 discretis loco fasciæ nigræ, 3:tum 4:tumque s<sup>e</sup>p<sup>e</sup>e lineola dorsali & margine apicali nigris. Alæ basi subfuscanae. Nervi transversi: ordinarius perspicue inflexus mox pone medium areæ anguste apertæ insertus; apicalis mox ante apicem alæ excurrens. Nervi long. 4:ti angulus subrectus. Nervus 3:tius basi setulis 2. Spinula costæ nulla. Squamæ albide. Tarsi simplices. Pulvilli in ♂ mediocres, albi.

*Obs.* Individua quædam "oculis nudis" in Collectione Cel. *Falleni* ad *T. mutabilem*, 53, referenda; alia "squama brunnea" &c., ad priorem speciem pertinent. — Detrita, corpore nigro, nitido, pictura einerea plus minus remanente, interdum occurrit.

149. *T. interruptella*: ovata, nigra, epistomale albicante; fronte prominente, modice lata, obscure cinerea, vitta angusta, nigro-picea; antennis epistomale paullo brevioribus, articulo ultimo linearis, angustato, nigro, 2:do triplo longiore, seta biarticulata ad medium incrassata; abdominis cingulis 2 angustis albis; alis hyalinis, nervis: longitudinali 3:ti prope basin interrupto, transversis rectis, apicali in apice alæ excurrente. ♀. (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad villam Abusa specimen descriptum inveni.

♀. Parva, nigra, subnitida, thorace levissime cinereo-pollicino, absque pictura lineata. Series setarum frontalium superne utrinque duplex, per setas 4—5 infra antennas de-

scendens, Epistoma declivum, nudum, vibrissis infernis paucis. Alæ hyalinæ. Nervi: longitudinalis 3:tius inter nervos transversos basales & medium interruptus 1. valde obsoletus; transversus ordinarius subrectus in medio areæ oclausæ insertus, apicalis levissime flexus; spinula costæ nulla. Halteres albi. Segmentum abdominis 1:mum breve, inerme, reliqua in disco & margine apicali setosa. Tibiæ posticæ nigro-piceæ. Tarsi antici simplices. A *Tryphera succincta* Meig. Dipt. 7. 264. 6. ♀, cui valde similis videatur, vix nisi magnitudine minore, abdomine rotundato-ovato, nec conico, ut & spinala costæ nulla, differt.

150. *T. grossicornis*: oblonga, nigro-ænca, nitida, immaculata, epistomate schistaceo; fronte minus prominente, modice lata, villa modice lata, brunneo-atra; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo magno dilatato 2:do triplo longiore, seta breviuscula, biarticulata, ultra medium incrassata; alis cinereis, basi flavidis, nervis: longitudinali 3:tiio basi setuloso, transversis rectis, apicali in apice alæ excurrente. ♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ —2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 648. 59. ♀.

Hab. in Scandinavia rarissime; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrogothia ad Lärketorp, ipse; in Dovre Norvegiae, D. *Bohemian*.

♀. Similis *T. magnicorni* 139, sed magnitudine minore, antennis paullo brevioribus & latioribus, seta breviore, apice breviter capillari, epistomatis apice reflexo, corpore æneonigro, immaculato, ut & nervo long. 4:tu fere rectangulatim flexo, in summo apice excurrente, ibique cum nervis 3:tiio & costali intime connexo, distincta. A *Tachin. ænea*, 153, autennis latioribus, nec linearibus, tarsis anticis simplicibus, nec crassis, differt. Antennæ apice truncatæ.

Vibrissæ infernæ, paucissimæ. Setæ frontales utrinque 3 infra antennas descendunt. Abdomen ut in priori. Nervus transv. ordinar. rectus mox pone medium areæ insertus. Nervus 3:tius long. a nervis transversis basalibus fere ad transversum medium setulis 7—8 armatus. Spinula costæ minuta. Squamæ flavidæ. Antennarum seta biarticulata? videtur.

**151. *T. amplicornis*:** oblonga, nigra, subnitida, obscure cinerascens, epistomate argenteo-micante; fronte subprominente, parum angusta ( $\delta$ ), villa nigra; antennis epistomate paullo brevioribus nigris, articulo ultimo latissimo 2:do triplo longiore, seta triarticulata, ad medium incrassata; thoracis lineolis 4, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque apice, pedibusque nigris; alis subhyalinis, nervis: longitudinali 3:tio basi setuloso, transversis rectis, apicali fere in apice alæ excurrente.  $\delta$ . (Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Westrogothia rarissime; a D. *Gyllenhal* specimen descriptum communicatum.

$\delta$ . Subcylindrica. Frons obscure argentea, serie setarum haud validarum simpliei in epistomatis declivi albilateribus fere usque ad os per setas circiter 8 descendente. Antennæ valde dilatatae, apice subrotundatae. Os non reflexum. Palpi nigri. Thoracis lineolæ antice nigræ tenues. Abdominis fasciæ 3 latæ, obscure cinereæ. Segmentum 1:mum breve, bisetosum, reliqua segmenta disco & margine apicali setosa. Genitale inflexum, nigrum. Alæ subhyalinæ, basi subfuscæ. Nervi: longitudinalis 3:tius basi setulis circiter 6; transversi subrecti, ordinarius paullo pone medium areæ apertæ insertus. Spinula costæ parva. Squamæ albæ. Halteres testacei. Pulvilli tarsorum mediocres, sordide albi.

**152. *T. tremula*:** subcylindrica, atra, nitida, immaculata, capite argenteo-micante; fronte prominente,

lata, vitta lata atra; antennis longitudine fere epistomatidis, nigris, articulo ultimo modice lato, quam 2:do dimidio longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis subhyalinis, basi squamisque flavis, nervis transversis ordinario levissime flexo, apicali recto mox ante apicem ake excurrente. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Fabr. Anti. 310. 9. Fall. Muscid. 31. 70. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 272. 58. ♂♀. Ahrens. Fa. Ins. Eur. fasc. 13. t. 25. *Musca* Linn. Syst. Nat. 2. 991. 77. *Erebia* Meig. Dipt. 7. 227. 1. t. 70. f. 31. ♂. *Zophomyia (temula)* Macq. Buff. 2. 159. 1. *Musca grossa* Schrank Ins. Austr. 461. 936. (exclus. syn. Linu.).

Hab. in graminosis, floribus Umbellatarum, foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem & medium, 20 Jun.—Jul.—30 Aug., vulgaris; in copula; scilicet in Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia & Gottlandia (ad Nähr &c.), frequens; in Nericia passim; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania ad Hafniam non raro, D. *Staeger*.

♂♀. Cærulescenti atra, nitida, valide setosa, alarmi basi squamisque fulvescentibus. Frons lata, in ♂ nonnihil angustior. Vitta frontalis lata, nigra, opaca. Series setarum utrinque in ♂ duplex, in ♀ simplex, in utroque sexu per setas 2—3 infra antennas liberas descendens. Epistoma parum declivum. Os subreflexum. Vibrissæ nullæ. Oculi non magni, tenuiter birti. Thorax antice rudimento vittarum albarum. Abdominis segmenta: 1:uum breve, inerme, reliqua in disco & lateribus non dense, sed fortiter setosa. Alarum nervus transv. ordinarius pone medium areæ apertæ insertus. Spinula costæ distincta. Setulæ 3—5 in basi nervi long. 3:tii. Pulvilli ♂ magni, albi. Tarsi ♀ simplices.

153. *T. ænea*: oblongo-ovala, nigro-ænea, nitida, immaculata, epistomate albido, fronte parum prominente, lata (♀), vitta modice lata, brunnea; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo subvalido 2:do duplo longiore, sela 3-articulata ultra medium incrassata; alis cinereis, basi squamisque pallescentibus, nervis transversis rectis, apicali fere in apice alæ excurrente; tarsis anticus in ♀ incrassatis. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 273. 60. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 647. 55. ♂♀. *Zophomyia* Macq. Buff. 2. 161. 7. ♂♀. *Harrisia* Meig. Dipt. 7. 260. 3. l. 72. f. 22. ♀. Sub *Tach.* *atrata* Fall. Musc. 31. 71. latet.

Hab. in soliis fruticum &c. 20 Jun.—25 Aug., passim; scilicet in Scania ad Esperöd &c. passim; in Ostrogothia ad Gusum & Lärketorp, non raro; in Westrog., D. *Gyllenhal*; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in alpe Dovre Norvegiæ, D. *Boheman*.

♀. Parva, nigra, ab domine ænescente; non fortiter setosa. Series setarum frontalium utrinque duplex per setas 3 infra antennas descendit. Antennæ mediocres, incumbentes, seta breviuscula, nuda, l. vix visibiliter puberula, articulo 2:do 1:mo longiore. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis nullis. Os subreflexum, margine antico pallido. Oculi tenuiter hirti. Abdominis segmentum 1:mum breve, inerme, reliqua disco & margine apicali setosa. Alarum nervi pallidi: longitudinalis 3:tius basi setulis 6—8; transversi recti, ordinarius mox pone medium areæ angustæ apertæ (raro oclusæ) insertus. Spinula costæ minuta. Tarsi antici distincte incrassati.

*Obs. Mas*: articulis antennarum secundo & ultimo subæque longis & oculis superne conniventibus, a Cl. *Meigen* l. c. describitur, mihi ignotus.

154. *T. crassitarsis*: oblongo-ovata, nigra, nitida, immaculata, epistomate albido; fronte parum prominente, lata ( $\text{♀}$ ), vitta modice lata, brunnea; antennis epistomate paullo brevioribus, extrosum subdilatatis, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta 3-articulata ultra medium inerassata; alis hyalinis, nervis transversis rectis, apicali fere in apice alae excurrente, squamis albidis; tarsis antieis in  $\text{♀}$  inerassatis.  $\text{♀}$ . (Long. fere 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 647. 56.  $\text{♀}$ .

Hab. in alpe Dovre Norvegiæ, D. Boheman, qui specimen unicum ad describendum mecum communicavit; a me ipso numquam deprehensa.

$\text{♀}$ . Simillima priori, a qua vero colore abdominis magis nigro, nec ænescente, alis hyalinis, squamis albidis, ut & antennis apice nonnihil magis dilatatis, nec exacte linearibus, dignoscitur.

155. *T. simplicitarsis*: oblongo-ovata, ænescenti-nigra, nitida, immaculata, epistomate schistaceo; fronte parum prominente, modice lata ( $\text{♂}$ ), vitta modice lata, brunneo-atra; antennis epistomate parum brevioribus, articulo ultimo dilatato 2:do fere triplo longiore, seta 3-articulata, ultra medium dilatata; alis cinereis, basi squamisque subpallescentibus, nervis transversis rectis, apicali in apice alae excurrente; tarsis simplicibus.  $\text{♂}$ . (Long. fere 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 647. 57. (immorito  $\text{♀}$ ; certe  $\text{♂}$ ).

Hab. in Scandinaviæ fruticibus & graminosis, Jun. Jul., minus frequens; scilicet in Scania ad Lund, semel; in Westrogothia, D. Gyllenhal; in strogothia ad Gu-

sum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia rarissime, D. *Dahlbom*; in alpe Dovre Norvegiæ ad Drivstuen, D. *Bohemian*.

♂. Simillima duabus proxime antecedentibus, sed a *T. aenea*,  
statura angustiore, a *crassitarsi* colore abdominis magis  
ænescente, & ab utraque, serie setarum frontalium simpli-  
ciore per setas saltem 4, nec 3, infra antennas descendente,  
antennis nonnihil longioribus & aperte latioribus, ut &  
tarsis simplicibus, præcipue differt. — Area alarum occlusa  
in apice alæ terminata. Palvilli parvi, sed tamen nonnihil  
majores, quam in *T. aenea*, cuius marem crederem, nisi  
Cel. *Meigen*, ut dixi, marem *T. aenea* oculis cohærentibus  
descripsisset, quæ nota in nostram *simplicitarsem* minime  
quadrat.

156. *T. rotundicornis*: oblonga, griseo-cinerea,  
unicolor, capite albicante; fronte subprominente, modice  
lata, vitta lata, altra; antenñis epistomate dimidio brevio-  
ribus, nigris, articulo ultimo subquadrato 2:do parum  
longiore, seta biarticulata, basi inerassata; alis cincisis,  
basi subfuscatis, nervis transversis rectis, apicali in sum-  
mo apice alæ excurrente; pedibus nigris. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 641. 31. ♀.

Hab. in Scandinavia rarissime, mihi non obvia, in  
Smolandia & Westrogothia, ut fertur, inventa; in Ostro-  
gothia ad Gusum a D. *Wahlberg* lecta; in alpe Dovre  
Norvegiæ, D. *Bohemian*.

♀. Elliptica, tota grisea 1. flavido-cinerea. Caput sordide  
albo-micans. Antennæ brevissimæ, nigræ, apice obtusæ,  
seta mediocri, basi distinete incrassata. Frons porrecta,  
serie setarum haud validarum superne subduplici, vix in-  
fra antennarum basin continuata. Epistoma breve, decli-  
vum, nudum, vibrissis vix ulla. Os subreflexum. Palpi  
exserti, nigri, apice subcrassiores. Oculi parvi, rotundati,

tenuissime puberuli. Abdomen ovale, convexum, griseo-subnitens, segmentis subæque longis, in disco, lateribus & margine apicali setosis, setis haud validis. Anus in nostro specimine muticus. Alarum nervus 3:tius long. nudus. Nervi transversi: ordinarius rectus, paullo pone medium areæ ocellusæ insertus, apicalis levissime curvatus in summo apice alæ excurrentis, ibique cum nervo costali & longitudinali 3:tio in eodem puncto conjunctus. Spinula costæ parva. Squamæ sordide albidae. Pedes nigri.

**157.** *T. longicornis*: oblonga, cinerea, opaca, capite argenteo; fronte longe prominente, lata cana, vitta lata piceo-altra; antennis longissimis, linearibus, nigris, seta biarticulata, ultra medium incrassata; vibrissis continuis; thoracis lineis 4, pedibusque nigris; abdomine fusco-marmorato; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto mox ante apicem excurrente, area ocellusa. ♂♀. (Long. 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> lin.).

Fall. Musc. 31. 63. ♀. Meig. Dipt. 4. 417. 310. ♀. *Fallenia* Meig. Dipt. 7. 265. 1.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania bis capta, museis D. *Fallenii* & meo.

♂♀. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis, articulo ultimo 2:do quintuplo longiore, linearis, angusto, in ♂ nonnihil latiore. Frons, in ♀ lata, serie setarum utrinque dupli per setas 2 infra antennas descendente; in ♂ nonnihil angustior, serie setarum simplici per setas 3 infra antennas continuata. Epistoma declivum, vibrissis ab ore fere ad anteuniarum radicem assurgentibus. Palpi in ♂ fusco-testacei, in ♀ exserti, flavi. Oculi non magni. Thoracis lineæ antice nigræ. Abdomen in ♂ conicum, in ♀ oblongum, in utroque sexu canum, certo situ obscure marmoratum, segmento 1:mo in medio apicis bisetoso, reliquis disco & margine apicali parce setosis. Nervus transv.

ordinarius paullo pone medium areæ oclusæ insertus; longitudinalis 3:tius basi setulis 2—3. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pulvilli in ♂ sat magni.

158. *T. pectinata*: oblonga, subcylindrica, cinerascens, capite argenteo-micante; fronte longe prominente, modice lata, vitta flavescente; vibrissis distinctis; antennis longitudine fere epistomatis, nigris, articulo ultimo longissimo, linearis; seta vix ad medium incrassata; abdome nigro, nitido, cingulis 3 albis; pedibus nigris; alis hyalinis, nervis transversis rectis, apicali mox ante apicem alæ excurrente. ♂. (Long. circiter  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime, mihi non obvia; in Smolandia alque (typica) in monte insigni Omberg Ostrogothiæ 1835 a D. *Bohemani* detecta; deinde in Gotllandia a D. *Wahlberg* quoque inventa erit.

♂. Affinis & similis *T. longicorni*, sed multo minor. Frons distincte porrecta. Oculi perspicue hirti. Antennarum articuli 1 & 2 brevissimi, cinerascentes, ultimus longissimus, linearis, niger. Palpi flavi. Thorax obscure cinereus, nigro-setosus, vix lineatus. Abdomen nigrum, nitidum, segmentis 2, 3, 4 basi eingulo albido, ad latera in primis perspicuo. Anus longe inflexus. Alæ hyalinæ, ima basi pallidiores, nervo long. 4:to obtuse angulato. Nervi transversi subapproximati, ordinarius scilicet fere in medio alæ situs. Nervus long. 3:tius basi setulis 3. Squamæ albidæ. Halteres fuscæ.

159. *T. pantherina*: oblonga, obscure cinerea, opaca, capite cinereo, nitido; fronte prominente, modice lata, vitta lata, nigra; antennis longitudine fere epistomatis, haud dilatatis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, vix ad medium incrassata;

vibrissis continuis; thoracis vittis, abdominis tessellis pedibusque nigris, tibiis (in ♀) testaceis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto mox ante apicem alic excurrente, area anguste aperta. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; in plantatione Paradislyckan ad Lund Scaniæ 19 Maj. marem inveni, & specimen semineum ex Hafnia a D. *Staeger* obtinui. (E Glogavia etiam a D. *Zeller* missa).

♂♀. Similis & affinis *T. assimili* (n:o 122) minori, sed alarum nervi longitudinalis 4:ti angulo multo obtusiore, nervo transv. apicali magis recto, nec incurvo, area apice angustius aperta; nervo transv. medio fere apici nervi auxiliaris opposito, ut & transverso ordinario fere in medio areæ, nec pone medium, inserto, tandemque tibialis saltem in ♀ testaceis, differt.— Antennarum seta longa. Vibrissæ fere ad antennarum basin assurgentæ. Setæ frontales utrinque 2—3 infra antenas descendunt. Epistoma ad latera tenuiter pilosulum. Thoracis lineolæ 2 mediae tenues, & vittæ 2 laterales latæ, nigrae. Scutellum cinereum. Abdomen cinereum, fusco-olivaceo-marmoratum, segmento 1:mo brevi, inermi, 2 & 3 disco, & 4:to undique, setosis. Ales hyalinae, basi concolores, nervis validis, longitudinali 3:tio basi 3-setoso. Segmentum costæ 2:dum brevissimum, spinula parva. Squamae albæ. Tarsi in ♀ simplices. — Nomen *marmorata*, sub quo vendita fuit, rejiciendum, ne cum *Tach.* (Micropalpo) *marmorata* Meig., quæ longe alia est species, confundenda.

160. *T. mundula*: oblongo-ovata, griseo-cinerea, capite argenteo; fronte minus prominente, modice lata, grisea, vitta modice lata, atra; antennis longitudine fere epistomatis, nigris, articulo ultimo linearis, angusto 2:do

quadruplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; vibrissis subcontinuis; thoracis lineis 4, abdominis segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; scutello apice rufo; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente, area anguste aperta. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia rarissime; unicum marem in Scania ad Esperöd 12 Aug., unicamque feminam in Gotlandia mense Julio, inveni, forte ad eandem speciem pertinentes.

♂♀. *Tachinæ* (*Phoroceræ*) *mundæ* Meig. Dipt. 4. 395. 271. & Pars 7. t. 72. f. 28. sat similis videtur, sed magnitudine paullo minore, colore magis griseo, & fronte minus porrecta, differt. Frons in ♂ paullo angustior quam in ♀, serie setarum utrinque in ♂ simplici per setas 4 infra antennas descendente, in ♀ duplici per setas 3 infra antennas continuata. Antennæ in ♂ longiores quam in ♀. Vibrissæ in medium 1. paullo ultra medium adscendentibus. Palpi in ♂ subfiliformes, testacei, in ♀ flavi, apice subcrassiores. Abdomen subconicum (♂), 1. subovatum (♀), griseo-cineratum, segmento 1:mo toto, reliquisque lineola dorsali margineque apicali anguste, nigris, nitidis. Anus niger. Nervus transv. ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Nervi long. 4:ti angulus fere rectus. Spinula costæ vix nulla. Squamæ sordide albidæ. Pedes nigri, pulvillis in ♂ medioeribus, albis, tarsis in ♀ simplicibus.

161. *T. villica*: ovata, nigra, opaca, capite albidu-  
do; fronte subprominente, lata (♀), cinerea, vitta lata,  
atra; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ul-  
timo valido 2:do picco subtriplo longiore, seta longa,  
biarticulata, vix ad medium incrassata; vibrissis abbrevi-  
atis; thoracis vittis anticis 5, abdominalisque fasciis 3, ob-

scure cineraceentibus; scutello apice rufo; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente, area sat late aperla. ♀. (Long. 3½ lin.).

Zett. Ins. Lapp. 611. 45. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; ad Muonioniska  
17 Aug. 1821 semel inventa.

♀. Sat magna, valide setosa. Antennarum articulus ultimus apice subitus rotundatus. Setæ frontales 4 infra antennas ntrinque descendunt. Epistoma parum declivum, in medio argenteum, ad latera cinereum. Vibrissæ deercentes vix ad medium assurgunt. Os haud reflexum, margine antico pallido. Palpi clavati, flavi. Oculi magoi, distincte hirti. Thorax subcæsius, antice cinereus, lineolis 4 nigris. Scutellum summo apice rufescente. Abdomen ovatum, cinereum, segmentis: 1:mo toto, 2 & 3 linea dorsali marginaque apicali, & 4:to apice late, nigris subnitidis. Segmentum 1:mum breve, bisetosum, reliqua diseo & margine setosa. Alæ basi subfuscæ. Nervi: longitudinalis 3:tius basi 3-setulosus; transversus ordin. paullo pone medium areæ insertus. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Tarsi simplices.

162. *T. ambulans*: ovata, nigra, opaca, capite albidio; fronte prominente, lata (♀), cinerea, vitta lata, atra; antennis longitudine fere epistomatis, articulo ultimo valido 2:do rufo subtriplo longiore, seta longa, bi-articulata?, ad medium incrassata; vibrissis abbreviatis; thoracis vittis anticis 5, abdominisque maculis, griseis; scutello apice testaceo; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali recto mox ante apicem alae excurrente, area modice aperta. ♀. (Long. 2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 310. 171? ♂. *Exorista* Meig. Dipt.  
7. 256. 38?

Hab. in Dania; sub nomine descripto a Nobiliss. D. *Staeger* missa, mihi in Suecia non obvia.

♀. Valde similis & affinis priori, sed magnitudine duplo minore, antennarum articulo 2:do ferrugineo, nec piceo, fronte magis porrecta, epistomate ad latera tenuissime pilosulo, vibrissis tenuioribus, spuriis, vix ad medium assurgentibus, margine oris non pallido, palpis minus clavatis, scutelli apice latius testaceo, abdominis tessellis griseis, segmentis: anali toto griseo, 1:mo inermi, nigro, alis basi vix infuscatis, ut & area ultima minus late aperta, abunde dignata. Antennarum incumbentium seta forte 3-articulata, articulis basalibus brevissimis.

163. *T. fulva*: ovata, cinereo-flava, opaca, capite argenteo; fronte minus prominente, modice lata (♂), aut lata (♀), flavida, vitta modice lata, nigra; antennis longitudine epistomatis, nigris, articulo ultimo linearis 2:do fere quadruplo longiore, seta longa, biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis lineolis obsoletis pedibusque nigris; tibiis ferrugineis, scutello testaceo; alis cinereis, basi squamisque pallescentibus, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali recto mox ante apicem alae excurrente, area modice aperta. ♂♀. (Long. 3 $\frac{1}{4}$  lin.).

Fall. Musc. 32. 66. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 399. 280. ♂♀.  
*Exorista* Meig. Dipt. 7. 256. 45.

Hab. in Suecia media rarissime; in Westrogothia, D. *Gyltenhal*; ad Holmiam, D. *Haeffner*.

♂♀. Tota fulvo-cinerea, vix maculata, nisi vestigio lineolarum nigrarum in thoracis antico. Caput ut in *T. mundula*. Vibrissæ fere ad epistomatis nudi medium assurgent. Antennarum articulus ultimus apice subtus rotundatus. Scutellum totum testaceenm. Alarum nervi ut in priori directi. Abdomen ut in *T. villica* setosum.

**164.** *T. libatrix*: ovata, cinereo-flava, opaca, capite argenteo, fronte minus prominente, modice lata ( $\delta$ ), aut lata ( $\text{♀}$ ), flava, vitta modice lata, nigra; antennis longitudine epistomatis, nigris, articulo ultimo linearis 2:do fere quadruplo longiore, seta longa, biarticulata, vix ad medium incrassata; thoracis lineolis obsoletis pedibusque totis nigris; scutello testaceo; alis cinereis, basi squamisque fulvescentibus, nervis transversis: ordinario inflexo, apicali recto mox ante apicem alae excurrente, area modice aperta.  $\delta\text{♀}$ . (Long. 2 $\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 400. 281.  $\delta\text{♀}$ . *Musca* Panz. Fn. Germ. 54. 12.  $\text{♀}$ . *Eaorista* Meig. Dipt. 7. 256. 46. *Senometopia* Macq. Buff. 2. 112. 26.  $\delta\text{♀}$ .

Hab. in Suecia rarissime; in Helsingia ad diversorium Kårböle 2 specimina 19—20 Aug. 1810 inveni.

$\delta\text{♀}$ . Simillima priori, a qua non differt, nisi magnitudine non nihil minore, pedibus totis nigris, ut & alarum basi squamisque intensius fulvis.

**165.** *T. vibrissata*: ovata, nigricans, subnitida, capite argenteo; fronte parum prominente, lata, vitta modice lata, brunneo-atra; antennis longitudine epistomatis validiusculis nigris, articulo ultimo 2:do quadruplo longiore, seta biarticulata, ad medium incrassata; vibrissis subcontinuis; scutello apice testaceo; alis hyalinis, basi subalbidis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente, area oclusa.  $\delta$ . (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 644. 43.  $\delta$ .

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; ad Kengis 22 Aug. 1821 in unico specimine capta.

$\delta$ . Nigra, subnitida, thorace levissime, abdominalisque segmentorum 2, 3, 4 basi leviter, albo-micantibus. Frons lata, superne setis non validis una quidem serie dispositis, sed pilis pluribus tenuibus juxta positis. Tres setae infra antennas incombentes utrinque positæ. Vibrissæ decrecentes ultra medium epistomatis nudi, subperpendicularis assurgunt. Margo oris subreflexus, pallidus. Palpi nigri. Abdominis segmenta: 1:mum breve, inerme, 2 & 3 parcissime, 4 pluri-setosa. Alarum nervi longitudinales: 3:tus basi 3-setulosus, 5:tus usque ad marginem interiorem descendit. Spinula costæ nulla. Nervus transv. ordinarius mox pone medium areæ insertus. Squamæ albæ. Pedes nigri, pulvillis mediocribus, albis.

166. *T. squamosa*: ovata, nigra, nitida, capite albido; fronte parum prominente subangustata, vitta modice lata, brunneo-altra; antennis longitudine fere epistomatis, latiusculis ( $\delta$ ), aut linearibus ( $\varphi$ ), nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; vibrissis continuis; scutello testaceo-marginato; abdominalis cingulis 3 angustis, albis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis subrectis, apicali mox ante apicem alæ excurrente; area anguste aperta.  $\delta\varphi$ . (Long.  $\delta$   $1\frac{1}{2}$ ,  $\varphi$   $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; marem in folio Populi tremulæ ad Wadstena Ostrogothiaæ 1 Aug. 1825 semel legi; feminas 2 e Westrogothia a D. Gyllenhal communicatas possideo.

$\delta\varphi$ . Parva, nigra, omnium levissime albo-micans, eingulis abdominalis albis magis perspicuis. Similis priori, a qua magnitudine paullo minore, fronte nonnihil angustiore, vibrissis distinctioribus, altius assurgentibus, abdominali magis rotundato, alarum nervo transv. ordinario forte mi-

nus inflexo, ut & area ultima magis aperta, præcipue differt. — Antennæ in ♂ latiores, quam in ♀. Setæ frontales in ♂ haud validæ, una serie utrinque dispositæ, in ♀ validiores, superne utrinque bifariam locatæ. Abdominis segmenta: 1:um breve, bisetosum, reliqua in disco & apice parce setosa. Anus ♂ inflexus: alæ subpallide nervosæ, squamis niveis. Spinula costæ nulla. Pedes nigri, in speciminiibus femineis, forte juvenilibus, pieen-testacei. Pulvilli in ♂ mediocres. Abdomen ♂ mæula laterali rufa in segmento 2:do.

**167. *T. mobilis*:** ovata, nigra, opaca, capite cano; fronte minus prominente, lata, cinerea, vitta lata, picea; antennis longitudine fere epistomatis, atris, articulo ultimo 2:do quadruplo longiore, valido (♂), aut mediocri (♀), seta 3-articulata, paullo ultra medium incrassata; vibrissis dimidiatis; scutello rufescente; thoracis vittis 5 obsoletis, abdominisque fasciis 3, cinereis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto, paullo ante apicem alæ excurrente, area late aperta. ♂♀. (Long. 2½—2¾ lin.).

Hab. in pratis Gotlandiae, 5--20 Jul., rarius, ad Rhone, Wamblingbo & Kyllej pauca specimina inveni. (E Glogavia a D. Zeller sine synonymia communicata).

♂♀. Vitta frontalis lata, fusco-picea, serie setarum utrinque simplici (♂), aut superne duplici (♀), per setas 4 infra antennas continuata. Antennæ incumbentes, setæ articulo 2:do 1:mo duplo longiore. Epistoma subperpendiculare, vibrissis tenuissimis, ad medium assurgentibus. Palpi atri. Thorax niger, vittis 5 cineraceentibus postice subevanescentibus. Scutellum rufum, basi nigrum. Abdomen subconicum (♂), aut ovatum (♀), cinereo-marmoreum, 1:mo segmento toto, reliquis lineola dorsali apiceque anguste,

nigris. Segmentum 1:uum breve, bisetosum, cetera disco & margine apicali setosa. Segmentum 2:uum basi utrinque macula rufa in ♂. Alae totae hyalinæ. Nervi transversi: medios inter apices nervi auxiliaris & longit. 1:mi ductus, ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Nervi longitudinales: 3:tius basi 3:setosus, 5:tus non usque ad marginem descendens. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Pedes nigri, pulvillis albis in utroque sexu parvis, æqualibus.

**168. *T. trizonata:*** ovata, nigra, capite argenteo-micante; fronte minus prominente, lata, cinerea, vitta lata, altra; antennis longitudine fere epistomatis, atris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta 3-articulata, ad medium inerassata; vibrissis dimidiatis; thoracis vittis valde obsoletis, abdominisque fasciis 3 cinereis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto, prope apicem excurrente, area modice aperta. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia boreali rarissime; ad radicem alp. Åreskutan Jemtlandiæ d. 24 Jun. 1810 duo specimina inveni.

♂. Simillima priori, a qua vitta frontali forte nonnihil minus lata, atra, antennarum seta ad medium, nec ultra, inerassata, artieulis basalibus fere æque longis, thoracis vittis anticis cinereis minus perspicuis, scutello nigricante, nec apice ruso, abdominis fasciis cinereis obsoletioribus vix nisi in segmentorum cingulis basalibus perspicuis, alarum area modice tantum aperta, ut & nervo longit. 5:to non ad marginem descendente, differt. Reliqua ut in precedente.

**169. *T. unicolor:*** oblongo-ovata, atra, nitida, capite glaucescente; fronte subprominente, modice lata, nigra; antennis longitudine fere epistomatis, nigris, articulo ultimo 2:do subquadruplo longiore, subvalido, seta

biarticulata, ad medium incrassata; vibrissis subcoatinuis; thoracis vittis antieis levissime albidis; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordin. recto, longitudinali 1:to subareuatim flexo mox ante apicem alae excurrente, area anguste aperta. ♀. (Long. 2—2½ lin.).

Fall. Musc. 35. 73. ♀. Meig. Dipt. 4. 398. 277. ♀.  
Zett. Ins. Lapp. 617. 54. ♀. *Phorocera* Meig. Dipt. 7.  
261. 19. *Tachin. funebris* Zett. Ins. Lapp. 617. 58. ♀  
bus varietas.

Hab. in Scandinavia Jul. Aug. rarius; scilicet in Scania rarissime; in Smolandia, D. *Bohemus*; in Ostrogothia ad Lärketorp & Wadstena in floribus ad margines agrorum aliquoties capta; in Dalecarlia & in alpe Dovre atque ad diversorum Thynæs Norvegiae, lecta. (E. Glogavia a D. Zeller etiam missa).

♀. Affinis priori; differt vero ab illa præcipue: fronte nonnihil magis porrecta, antennarum seta ut videtur biarticulata, vibrissis altius assurgentibus, ore magis reflexo, thoracis albedine antiea obsoletiore, abdomine subcylindrico, atro, nitido, immaculato, toto & undique setoso, segmento 1:mo haud brevi, ut & alis cinerascentibus, nervo longitud. 4:to areuatim, nec distincte angulatim flexo.

170. *T. aurea*: oblonga, flava, thoracis dorso griseo; capite pallido; fronte sub prominente, angustata (♂), aut modice lata (♀), vitta subangusta, fulva; antennis epistomate nonnihil brevioribus, fulvis, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta biarticulata, vix ad medium incrassata; abdomine pellucido; alarum nervis transversis: ordinario flexo mox pone medium areæ apertæ ducto,

apicali recto in apice alae excurrente; tarsis obscuris.  
 $\delta\varphi$ . (Long. 3—3½ lin.).

Fall. Musc. 21. 42.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 341. 175.  $\delta\varphi$ .  
*Myobia* Macq. Buff. 2. 152. 2. Meig. Dipt. 7. 236. 1.  
 Tab. 70. f. 51.  $\delta$ .

Hab. in floribus Umbellatarum ut Laserpitii &c., 28  
 Jul.—20 Aug., rarius; scilicet in Smolandia, D. *Ljungh*;  
 in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Lärketorp,  
 ipse; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*.

$\delta\varphi$ . Series setarum frontalium untrinque simplex ( $\delta$ ), aut duplex  
 $(\varphi)$ , vix infra antennarum radicem continuata. Antennarum  
 incombentium seta subtiliter puberula. Epistoma subperpen-  
 diculare, nudum, ore subreflexo. Palpi exserti, subelavati,  
 fulvi. Setae corporis nigrae. Thorax opacus. Abdomen co-  
 nicum, pellucidum, nitidum, segmentis subaeque longis,  
 margine apicali parce setoso, incisuris levissime albo-mi-  
 canticibus. Alae flavidæ, nervis longitudinalibus: 3:to basi  
 setulis 4—5, 4:to angulatum flexo; area modice aperta, fere  
 in apice alae terminata. Spinula costæ nulla. Squamæ fla-  
 vidæ. Tarsi nigricantes, simplices; pulvilli in  $\delta$  majusculi.

171. *T. inanis*: oblonga, angusta, cinerea, opaca,  
 capite albido; fronte subprominente, angusta ( $\delta$ ), aut  
 modice lata ( $\varphi$ ), vitta angusta, obseura; antennis episto-  
 mate nonnihil brevioribus, rufis, articulo ultimo 2:do  
 vix duplo longiore, nigro, seta biarticulata, basi imeras-  
 sata; abdomine flavo pellucido, vitta media fusca, postice  
 dilatata; alarum nervis transversis: ordinario flexo, mox  
 pone medium areæ apertæ dueto, apicali recto in apice  
 alae excurrente; pedibus flavis, tarsis nigris.  $\delta\varphi$ . (Long.  
 2¾ lin.).

Var. a.  $\delta\varphi$ . abdomine flavo, vitta dorsali fusca posti-

ce (praesertim in ♀, ubi segmenta ultima tota obscura sunt) dilatata.

Fall. Musc. 21. 43. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 342. 177. ♂♀.  
*Myobia* Macq. Buff. 2. 157. 4. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 236. 2.

Var. b. ♂. abdomine toto testaceo, postice vestigio lineola dorsalis fuscæ.

*Tach. longipes* Meig. Dipt. 4. 341. 176. *Myobia* Ejusdem 7. 236. 5.

Var. c. ♀. abdomine toto obscuro, segmento tantum I:mo macula laterali parva, flava.

*Tach. pacifica* Meig. Dipt. 4. 342. 178? ♀. —  
*Myobia* Ejusdem 7. 236. 4?

Hab. in floribus Umbellatarum per prata & hortos Sueciæ meridionalis & mediæ, 2 Jul.—4 Aug., vulgaris & praesertim var. a. frequens; scilicet in Scania ubique; in Ostrogothia ad Lärketorp & Wadstena, passim; in Ölandia; in Gotllandia ad Nähr, Thorsborg, Lärbro, Öja, &c.; in Dania, D. Staeger. (Var. c. sub nomine *T. pacifica* a D. Zeller e Glogavia obtinui).

♂♀. Similis priori, a qua magnitudine minore, statura, angustiore, vitta frontali angustiore, obscura, antennarum articulo ultimo fere toto brunneo basi tantum anguste flavo, palpis sepe apice nigricantibus, thorace toto cinereo, lineolis anticis fuscis, scutello griseo, apice tantum flavidio, ut & vitta dorsali abdominis fuscæ postice plus minus dilatata, dignoscitur. — Caput & squamæ sub alis, albida. Oculi in viva rufo-brunnei. Frons in ♂ valde angusta. — Reliqua ut in priori. — Variat ♀ abdomine medio & postice nigro nitido, detrito.

172. *T. nigritarsis*: ovata, obscure cinerea, opaca; fronte subprominente, modice lata, vitta nigra; an-

tennis epistomate paullo brevioribus, ferrugineis, articulo ultimo 2:do paullo longiore, nigro, seta biarticulata, basi incrassata; sentelli apice testaceo; abdominis subnudi segmentis: I:mo toto, reliquisque margine apicali, atris, nitidis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario inflexo in medio areæ anguste apertæ inserto, apicali recto fere in apice alæ excurrente; palpis, ore pedibusque, flavis; femoribus anterioribus tarsisque omnibus, nigris. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in foliis fruticum, & in littoris marini graminosis, 10—24 Jul., per Sueciam meridionalem & medium, rarius; scilicet in Scania ad Esperöd in paroec. Mellby rarissime; in Ölandia, D. *Bohemian* (olim sub nomine *T. tarsalis* ab Illo cognita); in Ostrogothia ad Wadstena.

♀. Similis *Tach.* (*Thryptocerae*) *versicolori*, 40, sed alarum nervo long. 3:tio basi setulis tantum 2—3, nec pluribus armato, antennarum seta breviter puberula &c., dignata. Forte *Myobiæ* generis? Antennæ breviusculæ, minime validæ. Vitta frontalis modice lata, serie setarum dupliei per setas 2 infra antennas continuata. Epistoma breve, ad latera pilosulum. Os rufum, margine antico reflexo. Thorax cinereus, vestigio lineolarum 4 nigrarum. Abdomen ovatum, nigrum, nitidum, segmentis subæque longis, 2, 3 & 4 basi fascia cinerea opaca, linea media nigra; totum ut in *Medoria* Meig. inerme, uno tantum setulis paucis armato. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis ut in diagnosi directis. Nervus transv. medius apici nervi long. 1:mi præcise oppositus. Segmentum costale 2:dum (cfr. nota sub *Nephrocero* gen. 100) brevissimum. Spinula costæ parva. Squamæ parvæ, albæ. Halteres testacei. Pedes luteo-flavi, femoribus anticis fere totis, tarsisque omnibus simplicibus, nigris.

173. *T. circumflexa*: ovala, cinerea, opaca, capite cavo; fronte parum prominente, angustissima (♂), aut

lata ( $\text{♀}$ ), vitta brunnea; antennis longitudine dimidii epistomatis, rufis, articulo 2:do paullo longiore, angusto, nigro, seta 3-articulata, vix ad medium incrassata; thoracis lineolis 4 nigris; scutello testaceo; alis cinereis, nervis transversis: ordinario valde inflexo, paullo pone medium areæ anguste apertæ inserto, apicali recto mox ante apicem alæ excurrente; pedibus nigris; abdomine in ♂ lateribus flavo-subdiaphano. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca tachinoides* Fall. Musc. 44. 17. ♂♀. (*Dexia rustica* Meig. Dipt. 5. 46. 22, ubi *M. tachinoides* Fall. ut synonymon citatur, alia est species in genere *Dexia* n:o 2, infra quærenda).

Hab. mares in Umbellatis, & uterque sexus in parietibus argillaceis, per Sueciam meridionalem & medium, 2 Jul.—12 Aug., minus frequenter; scilicet in Ostrogothiæ urbe Wadstena rarius; in Westrogothia, D. D. *Dalman & Boheman*; in Nericia, D. *Dahlbom*.

♂♀. Sat magna, lata, ovata. Oculi magni oblongi in vertice maris fere cohærentes, in femina sat late remoti. Series setarum utrinque in ♂ simplex, in ♀ duplex, in utroque sexu per setas 3—4 infra antennas continuata. Antennæ breves, apice rotundatæ, seta longa capillari, subtiliter puberula, basi tenuiter incrassata, artieulis basalibus brevissimis, pallidis. Facies albida. Epistomatis medium elongatum, convexum, pallidissime flavum, inter setas oris nigras sat alte assurgentibus inclusum. Vibrissæ nullæ. Palpi flavi, filiformes. Thoracis lineæ 4 angustæ, nigræ, mediae abbreviatæ, laterales interruptæ. Abdomen late ovatum, in ♂ pellucido-testaceum, levissime albo-micans, vitta dorsali angusta, cinerea, in segmentis 1:mo & ultimo dilatata; in ♀ totum cinereum, certo situ maculis fusco-micantibus; in utroque sexu segmentis: 1:mo brevi inermi, reliquis disco

& margine apieati ad latera parce setosis. Alarum nervi subpallidi, longitudinales: 3:tus basi setulis 4—6, 4:tus angulatum flexus. Segmentum costale 2:dum mediocre. Spinula costæ nulla. Squamæ magnæ, albæ. Pedes nigri, femoribus anterioribus versus apicem interdum obseure lividis. Tarsi simplices. Pulvilli in ♂ magni, albi.

**174. *T. pubicornis*:** oblonga, cœrulescens nigra, levissime albo-inicans, capite argenteo; fronte modice prominente, angustissima (♂), linea brunnea; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do duplo longiore, angustato, seta biarticulata, fere ad medium incrassata; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis ordinario inflexo, paullo pone medium areæ anguste apertæ inserto, apicali recto mox ante summum apicem alæ excurrente. ♂. (Long. fere  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 639. 23. ♂.

Hab. in Lapponia septentrionali rarissime; ad lacum insignem Torneåträsk Lapponia Tornensis in regione subalpina unicum individuum 10 Jul. 1821 inveni.

♂. Affinis *T. nigripedi*, 52. Oculi postice fere cohaerentes, linea angusta remoti. Seta antennarum inenumbentium distincte pubescens seu ad medium breviter subplumata. Epistema breve, nudum, ore reflexo. Palpi fuso-flavi. Thorax antice vittis obsoletis albidis. Abdomen ovale, undique pilosum, sed vix nisi postice setosum, segmento 1:mo brevi, inermi. Alæ inermes, ima basi infuscatae. Nervus transversus obliquus fere apiei longitudinalis 1:mi oppositus. Segmentum costæ 2:dum breve, spinula minuta. Nervi longitudinales: 4:tus angulatum flexus, 5:tus non usque ad marginem descendens. Squamæ medioseres, albæ. Halteres fusi. Pedes nigri, pulvillis mediocribus, albis.

**175. *T. hirticornis*:** oblonga, obseure cinerea; fronte vix prominente, modice angusta, vitta brunnea;

antennis epistomate brevi paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, subquadrato, seta biauriculata, basi incrassata; thoracis lineolis 3, abdominis segmentis: 1:mo toto reliquisque margine apicali, pedibusque, nigris; scutelli apice tibiisque flavidis; alis hyalinis, nervis transversis rectis, ordinario in medio areæ subapertæ inserto, apicali in apice alæ excurrente. ♂. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarius; in Ölandia a D. *Bohemian* 1835 detecta; deinde etiam in Gotlandia, ad Gusum Ostrogothiæ, & ad Marstrand Bahusiæ, a D. *Wahlberg* lecta; in prato ad Martebo Gotlandiæ 31 Jul. 1811 quoque a D. *Dahlbom* capta.

♂♀ Parva, subcylindrica, griseo-cinera, opaca. Frons non lata, serie setarum superne subduplici, per setas 2 infra antemas descendente. Antennæ incumbentes breviusculæ, validissimæ, nigrae, articulo 2:do apice rufo. Seta fere tota distincte pubescens. Epistoma breve, subperpendiculare, ad latera juxta oculos serie setarum, sed vibrissis nullis. Os reflexum, genis rufis, palpis flavis. Abdomen nigrum, nitidum, puncto utrinque in segmento 1:mo, fasciisque 3 posticis, cinereis, opacis, per lineam dorsalem nigrum interrumpit. Segmenta subæque longa, inermia, lateribus & margine apicali in segmentis posticis parce setosis. Segmentum 2:duum macula lateralí rufescente. Aous subtus lamellis 2 rufo-fuscis. Alæ cinnereo-hyalinæ, ima basi subalbidæ. Nervus transv. medius apiei nervi long. 1:mo exaete oppositus. Nervi longitudinales: 3:tius basi uni- l. bisetosus, 4:tius obtusissime angulatus. Area ultima fere in apice alæ teratinata, subocclusa. Segmentum costæ 2:duum brevissimum, spinula parva. Squamæ parvæ, albide. Halteres testacei. Pedes nigri, femoribus apice anguste, tibiisque apice late, ferruginantibus.

**176.** *T. pullula*: oblongo-ovata, aterrima, capite albicante; fronte minime prominente, lata (♂), vitta lata, nigro-brunnea; antennis brevibus, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis hyalinis, nervis: transverso ordinario recto in medio areæ anguste apertæ inserto, longitudinali 4:to areuatim flexo in summo apice alæ excurrente; squamis albis. ♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Norvegia rarissime; ad divisorium Thynæs in parœc. Skogn 4 Jul. 1840 semel capta.

♀. Tota aterrima, subnitida. Setæ frontales vix infra antennas descendunt. Antennæ mediocres, incumbentes, seta tenuissime puberula. Epistoma breve, perpendiculare, nudum, glaucum, ore non reflexo. Palpi flavi. Abdomen ovale, pilosum, sed vix nisi pustice setulosum. Segmenta subæque longa. Alarum nervus long. 3:tius basi bisetosus. Segmentum costæ 2:duo brevissimum, spinula parva. Squamæ parvæ, niveæ. Pedes nigri, pilosi, sed non setulosi. Tarsi simplices. — Similis *T. nigritæ* infra n:o 186, fronte minime prominente differt.

*Obs.* Specimen masculum feminæ descriptæ simillimum, tantum oculis subcohaerentibus, alis fuscanis & squamis nigris, dignotum, e Glogavia obtinui; an *mas* hujus speciei?

**177.** *T. cingulata*: oblongo-ovata, cinerea, capite argenteo; fronte subprominente, valde angusta (♂), aut modice lata (♀), vitta atra; antennis epistomate brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, angustato, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis vittis 3, abdominis fasciis 4, pedibusque totis, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario infexo, mox pone medium areæ occlusæ inserto, apicali recto fere in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Dexia cingulata* Wahlberg in litt. 1842.

Hab. in Ostrogothia rarius; ad Gusum a D. *Wahlberg*, & ad Wadstena 4—15 Jul. a me, capta.

♂♀. Similis *T. pubicorni*, 174, sed palpis paullo obscurioribus, abdominis cingulis evidentioribus, ut & alarum area apicali oclusa, differt. Caput omnino ut in *T. pubicorni*, sed frons in ♀ latior, vitta modice lata, atra, & series setarum hand validarum utrinque subduplices, in nullo sexu infra antennas descendens. Thorax cinereus, vittis 3 nigris, parum determinatis. Scutellum cinereum. Abdomen conicum (♂), aut ovatum (♀), canum, segmentis 1, 2, 3 margine apicali nigris, nitidis; totum subinerme, setis tantum lateribus posticeque paucioribus & minime validis armatum. Segmenta omnia subaeque longa. Cauda maris nigra. Alæ ut in *T. pubicorni*, sed area ultima apice non aperta. Squamæ mediocres, albæ. Halteres testacei. Pedes nigri. Tarsi simplices. Pulvilli in ♂ mediocres, albidi.

178. *T. funesta*: oblonga, subcylindrica, nigra, nitida, capite argenteo; fronte subprominente, modice lata, nigro-micante, vitta angusta, atra; antennis epistomate brevioribus, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, angustato, seta biarticulata, basi incrassata; humeris albidis; alis hyalinis, nervis leviter infuscatis: transverso ordinario recto, in medio areæ angustæ apertæ inserto, longitudinali 4:to arcuatim flexo in apice alæ excurrente. ♀. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 316. 185. ♂ hujus. *Medoria* Meig. Dipt. 7. 203. 1.

Hab. in Dania; sub nomine allato specimen descriptum a D. *Staeger* obtinui.

♀. Parva, angusta. Series setarum frontalium subduplex non infra antennas incumbentes descendit. Antennarum seta breviter puberula. Epistoma breve, nudum, ore subreflexo. Palpi parvi, nigri. Thorax macula humerali alba. Abdomen tantum lateribus & postice parce setulosum, segmento 1:mo sequente fere longiore. Alarum nervi inermes: transversus ordinarius perpendicularis, medius apieci nervi long. 1:mi oppositus, longitudinalis 4:tus leviter areuatim (minime angulatim) flexus, 5:tus fere ad marginem alae extensus. Spinula costae nulla. Squamæ parvæ & halteres, albidae. Pedes nigri, tarsis simplicibus.

*Obs.* *Mas* fronte angusta, setis utrinque tenuibus, a D. Meigen l. c. deseribitur. Specimen maseulum capite similiiter construeto, sed abdome undique setuloso, segmentorum mediorum incisuris ad latera tenuiter albis, in Scania semel quoque inveni, de quo hæsito, an ad hanc speciem aut ad *T. nigritam* (186), ut varietatem minutam referendum.

179. *T. lucida*: ovata, thorace cinereo vittis 1 obseuris, scutello, abdome, pedibusque flavo-testaceis; capite cinereo; fronte subprominente, angustata (♂), vitta lata brunnea; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo valido, nigro 2:do rufo fere duplo longiore, seta biarticulata ad medium incrassata; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario subrecto mox pone medium areæ anguste apertæ inserto, apicali incurvo in apice alæ excurrente. ♂. (Long. fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 268. 50. ♂♀. *Nemorea* Macq. Buff. 2. 104. 20. ♂♀. *Macquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 19. *Tachin. diaphana* Fall. Musc. 33. 69. ♂.

Hab. in Sueciæ meridionalis Umbellatis rarissime, 10—25 Jul. obvia; scilicet in Scania ad Raften prope Lund, D. Dahlbom, in pratis ad Christinehof & Esperöd (Scaniæ australis), ipse.

♂. Series setarum frontalium simplex infra antennas per setas 2-3 continuata. Antennarum inaequibentium basis ferruginea, seta microscopice puberula. Epistoma parum declivum, nudum, ore subrellexo. Palpi filiformes, exserti flavi. Thorax opacus. Abdomen ovatum, nitidum, ferrugineo-flavum, vitta dorsali abbreviata atra, difformi, netepe in 1:mo segmento basi ita dilatata, ut totam latitudinem segmenti occupet, in 2:do ut vitta ovata obvia, & in 3:to tantum ut lineola utrinque abrupta visa. Segmenta: 1:mm breve, inerme, reliqua in medio & lateribus setosa. Anus rufus. Linea ventralis nigra. Alarum nervus long. 4:tus rotundato-flexus, nervo transverso apicali distinete inenrvo. Segmentum costae 2:dum modice longum, spinula nulla. Squamæ flavidæ. Pedes rufo-flavi, tarsis nigris, pulvillis sat longis, albidis.

Var. b. ♂. duplo minor, antennarum basi picea, femoribus obscure testaceis, l. nigricantibus; de cetero var. a. similis, vix specie diversa; in Scania ad Lund rarius capta.

180. *T. crucigera*: oblonga, subcylindrica, thorace cinerascente, lineolis 4 obscureis; scutello rufo; capite cinereo; fronte parum prominente, modice lata, vitta brunnea; antennis epistomate paullo brevioribus, articulo ultimo mediocri, nigro 2:do piceo vix duplo longiore, seta biarticulata, ad medium incrassata; abdomine flavo-subpellueido, linea dorsali incisurisque mediis nigris; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario recto mox pone medium areæ anguste apertæ inserto, apicali incurvo in apice alæ excurrente; tibiis testaceis. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 618. 61. ♀.

Hab. in Umbellatis & foliis fruticum, locis umbro-

sis, ad Wilhelmina Lapponiae Umensis, 15—19 Jul., rarius visa, usque in Dalecarliam descendens.

♀. Similis priori, a qua magnitudine minore, epistomate nonnihil minus prominente, scutelli ima basi obscura, abdominis linea dorsali nigra continua, incisuris praesertim mediis nigricantibus, ut & femoribus obscurioribus, dignoscitur. Series setarum frontalium postice duplex. Antennae medioeres nigræ, basi rufo-piceæ. Oculi subrotundati. Femora fusco-testacea. Reliqua ut in priori.

**181. *T. ciliaris*:** oblongo-ovata, cinerea, opaca, capite argenteo; fronte subprominente, modice lata, vitta angustata, altra; antennis epistomate brevioribus, mediocribus, nigris, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; thoracis lineis 4, abdominis fasciis totidem nitidis, pedibusque nigris; alis hyalinis, nervis transversis subrectis, ordinario mox pone medium areæ aperæ inserto, apicali fere in apice alæ excurrente, costa ciliata, spinula distincta. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad prædium Björnstorps prope Lund 20 Jun. a D. Dahlbom detecta, & ad Esperöd in parœc. Tranås 10 Aug. a me lecta.

♀. Affinis & similis videtur *T. prolixæ* Meig. Dipt. 4. 363. 214, & nobis 188, atque vix nisi palpis brevibus, retractis, flavis, nec elongatis nigris, ab illa diversa. Series setarum frontalium per setas 2—3 infra antennas continuata. Antennæ incumbentes, seta elongata, tenuissime puberula. Epistoma subperpendiculare, nudum, ore distincte porrecto, albido, genis ferrugineis. Oculi mediores tenuiter hirti. Alæ cinereo-hyalinæ, basi flavidæ-fuseæ. Nervi longitudinales: 3:ius basi bisetosus, 4:tus subobtuse angulatum flexo mox ante apicem alæ excurrente. Area modice aperta. Costa fere ad medium distincte nigro-ciliata, spinula sat

*crassa subelongata.* Squamæ sat magnæ, albæ. Abdomen ovatum, nigrum, nitidum, segmentis 2, 3, 4 basi einereis. Segmenta: 1:um breviuseulum, subinerme, reliqua disco & lateribus valide setosa. Pedes nigri, tarsis simplicibus.

182. *T. chalconota*: oblonga, nigro-aenea, nitida, capite argenteo, palpis flavis; fronte subprominente, nigro-micante, angustissima ( $\delta$ ), aut modice angusta, vitta latiuscula, atra ( $\varphi$ ); antennis epistomate brevi paullo brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis hyalinis, basi squamisque flavidis, nervis transversis subrectis, ordinario paullo pone medium areæ apertæ inserto, apicali mox ante apicem alæ excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$  fere  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 270. 53?  $\delta$ . — *Macquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 8?

Hab. in Suecia meridionali & media, minus frequens, Maj.—Jul. obvia; in copula; nempe in Scania ad Lund & Björnstorps; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; ad Wadstena, ipse; (Ad Neuenkirchen in Megalopoli 15—20 Maj. 1842, D. *Dahlbom*; e Glogavia, D. *Zeller*).

$\delta\varphi$ . Similis *T. nitidæ*, 183, & *atratæ*, 184, sed palpis flavis, nec nigris, statim dignota. Oculi in  $\delta$  postice cohærentes, linea angustissima atra disjuneti, fronte antice triangulari, nigra, puncto supra antenas albo, nitido, serie setarum simplici; frons in  $\varphi$  modice lata, argentea, nigro-micante, vitta latiuscula, atra, serie setarum postice dupli, antice simpliei, in utroque sexu per setas 2—3 infra antenas continuata. Antennarum seta elongata, in medio breviter puberula. Epistoma breve, nudum, ore leviter reflexo. Palpi filiformes, subexserti, flavi, summo apice interdum

nigricantes. Oculi hirti. Thorax niger, antice leviter albo-micans, lineis 4 nigris. Abdomen ovatum, nigro-aeneum, ad latera levissime albo-micans, segmentis subæque longis, anticus parœ, posticus densius, unilique setosis. Alæ hyaline, basi distincte, costa paullo ultra medium leviter, fuscoclavescentes. Nervus transversus ordin. leviter flexus. Area modice aperta. Nervi longitudinales: 3:tus basi setulæ 2—3, 4:tus obtuse angulatim flexus. Spinula costæ minuta. Squamæ & halteres, flava. Pedes nigri, tarsis simplicibus; pulvillis in ♂ sat magnis, albis.

183. *T. nitida*: oblonga, nigro-aenea, nitida, capite argenteo, palpis nigris; fronte subprominente, nigromicante, angustissima (♂), aut modice angusta, vitta latiuscula, atra (♀); antennis epistomate brevi paullo brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis hyalinis, basi squamisque subflavidis, nervis transversis subrectis, ordinario paullo pone medium areæ apertæ inserto, apicali mox ante apicem alæ excurrente. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  fere  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 646. 52. ♂♀. *T. atrata* Meig. Dipt. 270. 52. ♂♀. (exclus. syn. Fall. *Tach. atrata*, que eadem est ac *T. corrusca* Meig.). — *Macquartia atrata* Meig. Dipt. 7. 229. 3.

Hab. in foliis fruticum, per prata, pascua, nemora, saepè juxta paludes, interdum in campis arenosis, per totam Scandinaviam, 6 Jun.—28 Sept., vulgaris, in copula saepè deprehensa; scilicet in Scania, Smolandia, Ostrogothia, Gotlandia, Nericia, Jemtlandia usque ad Ristansfors, Lapponia Umensi usque ad Lycksele, frequens; ad Torneå, D. *Deutsch*; in Norvegia ad Thynæs & Garnæs

Værdalæ, passim; in Dania, D. Staeger. (E Glogavia a D. Zeller missa).

♂♀. Simillima priori, nec differt ab illa nisi palpis nigris l. nigricantibus, basi interdum fuscis. Corpus ænescens, nitidum, in illæsis leviter albo-submicens. — Individuum unicum masculum corpore nigro, nitido, vix æneo-micante, & palpis basi flavis ad Esperöd Scaniae cum var. genuina, cui de cetero simillimum semel inveni; forte *T. tristis* Meig. 4. 271. 55?

*Obs.* *Tach. Praefica* Meig. Dipt. 4. 271. 57. ♀. parum quoque a nostra *T. nitida* differre videtur.

184. *T. atrata*: oblonga, ænescenti atra, nitida, capite argenteo-micante; fronte sub prominente, angustissima (♂), aut modice angusta, vitta atra, opaca (♀); antennis epistomate brevi brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata, basi inerasata; alis cinereis, basi & costa tota fuseo-flavis, squamis flavis, nervis transversis: ordinario distincte infexo, apicali recto sere in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Fall. Muse. 31. 71. genuina. ♂♀. — Zett. Ins. Lapp. 646. 53. ♂♀. *T. corrusca* Meig. Dipt. 4. 273. 61. ♂♀.

Hab. in graminosis, foliis fruticum Betulæ albæ, Populi tremulæ, &c., per Sueciam meridionalem & medium, 16 Maj.—15 Sept., passim haud infrequenter; scilicet in Scania ad Lund, Rästen, Fogelsång, Tranås, Esperöd &c., vulgaris; in Smolandia; in Ostrogothia ad Wadstena; in Gotlandia ad Kjellunge; in Nericia, Upplandia & Dalecarlia, rarius; deinde non nisi rarissime obvia.

$\delta\varphi$ . Simillima iterum *T. chalconotæ*, 182, sed plerunque nonnihil minor, & corpore minus tenuescente, palpis nigris, alis basi squamisque intensius flavis, costa tota fusco-flava, ut & nervo transverso ordinario magis inflexo, certe distineta. — Autennarum articulus ultimus 2:do in  $\delta$  parum, in  $\varphi$  fere duplo, longior. — Nervus 3:tius longitudinalis basi setulis 2—3 parvis. Oculi in  $\delta$  perspicue, in  $\varphi$  tantum microscopice, hirti. — In uno specimine femineo palpos flavos vidi.

185. *T. chalybeata*: oblongo-ovata, altra, nitida, capite subargenteo-micante; fronte minus prominente, angustissima ( $\delta$ ), aut modice angusta ( $\varphi$ ), vitta altra opaca; antennis epistomate brevi brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis cinereis, basi subfuscō-flavidis, nervis transversis leviter flexis, longitudinalibus: 3:tiō basi 6—7-setuloso, 4:to subareuatim flexo fere in apice alae excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long. 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 271. 56.  $\delta\varphi$ . *Zophomyia* Macq. Buff. 2. 161. 8.  $\delta\varphi$ . *Hacquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 7.

Hab. in foliis fruticum Salicis, Betule &c., in pratī paludosīs sēpe obvia, per Sueciam meridionalem & medianam, 25 Jun.—10 Jul., passim; scilicet in Scania ad Lund, in prato Kungsmarken, ad Rästen &c., sat frequens; in Ölandia rarior. (E Glogavia a D Zeller sine synonymia communicata).

$\delta\varphi$ . Valde similis & affinis praecedenti, sed statura forte magis ovata, oculis (in  $\delta$ ) non intime cohærentibus, setis frontalibus pluribus (4—5) infra antennas descendentibus, colore corporis aterrimo, minime metallico-micante, alis basi minus flavicantibus, costa non infuscata, nerro trans-

verso apicali leviter flexo, nec recto, nervis longitudinalibus: 3:to basi setulis pluribus, 6—7, nec 2—3, armato, 4:to subarcuatim, nec exæcte angulatim, flexo, ut & squamis albidis, nec flavis, facile & vere dignota,

186. *T. nigrata*: ovalis, atra, nitida, capite subargenteo-micante; fronte minus prominente, angustissima ♂, aut modice angusta ♀, vitta atra, opaca; antennis epistomate brevi brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis hyalinis, basi subalbidis; nervis transversis leviter flexis, longitudinalibus: 3:to basi 6—7-setuloso, 4:to arcuatim flexo, in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

Fall. Musc. 35. 72. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 274. 62. (secund. Fall. transcripta). *Macquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 16.

Hab. in floribus & foliis fruticum, 20 Jun.—30 Jul., cum priori, sed vulgarius; scilicet in Scania ubique sat frequens; in Smolandia & Ölandia passim; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*.

♂♀. Simillima *T. chalybeatæ*, sed magnitudine sæpe duplo minore, oculis (in ♂) proprius cohærentibus, alis magis hyalinis, basi albescensibus, nec fusco-flavidis, ut & nervo longitudinali 4:to paullo perspiciebus arcuatim, nec subangulatim, flexo, distincta. Antennæ in ♂ paullo angustiores, quam in ♀, in utroque sexu apice subrotundatæ. Palpi atri, subelavati. Corpus cœrulecenti atrum, inmaculatum. Abdomen ovale. Alarum area ultima anguste aperta, in summo apice alæ terminata. Spinula costæ minuta. Squamæ albæ. Nervus transversus ordinarius plerumque rectus.

187. *T. grisea*: oblonga, subcylindrica, cineraseens, opaca, capite cano; fronte sub prominente, angustissima ♂, aut modice angusta ♀, vitta latiuscula, pieca; antennis epistomatae paullo brevioribus, subangustis, articulo ultimo 2:do fuso fere duplo longiore, nigro, seta bi-articulata, basi incrassata; palpis, thoracis lineolis 4, pedibusque, nigris; alis subflavido-cinereis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali subrecto in apice ake excurrente. ♂♀. (Long. 2½—2¾ lin.).

Fall. Tachin. Act. Holm. 1810. p. 269. 15. ♀. Museid. 20. 41. ♀. Meig. Dipt. 4. 279. 70. ♀. *T. dispar* var. β. Fall. Muse. p. 32. — *Tach. egens* Meig. Dipt. 1824. 275. 63. ♂♀. *Zophomyia* Maeq. Buff. 2. 160. 3. ♂♀. *Macquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 2

Hab. in graminosis & foliis fruticum etiam Pinetorum, per Sueciam meridionalem & medium, 1 Jun.—Aug.—16 Sept., passim, in copula deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Tranås & Esperöd; in Ostrogothia ad Wadstena & Omberg; in Ölandia, D. Boheman; in Gotlandia ad Ruthe, Hoburg, &c., ipse.

♂♀. Grisea. Caput ut in *T. atrata*, 184, constructum. Ocelli rufi in ♀ minores quam in ♂, & in ♀ tenuiter, in ♂ dense, hirti. Antennarum artieulus 2:dus & vitta frontalis, rufo-picea. Corpus in ♂ obscurè cineraseens, in ♀ griseum, thoracis antico in utroque sexu lineolis 4 nigris, in ♀ tamen tenuioribus. Abdomen ut in *T. chalcouota*, 182, setosum. Akae subfuscaneae ♂, aut cinereae ♀, nervis pallidis, longitudinalibus: 3:to basi 2—3-setoso, 4:to subarcuatim flexo. Area apicalis modice aperta. Spinae costae nulla. Squamae flavidofuscaneae ♂, aut sordide albidae ♀. Halteres testacei. Pedes nigri. Tarsi simplices. Polylli in ♂ sat magni, albi.

188. *T. prolixa*: oblonga, subcylindrica, cinerea, opaca, capite argenteo; fronte subprominente, angusta ( $\delta$ ), aut modice lata ( $\varphi$ ), vitta angusta, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, mediocriter lato, seta biarticulata, basi incrassata; palpis, thoracis lineis 4, abdominis fasciis subquatuor, pedibusque nigris; alis subhyalinis, nervis transversis: ordinario flexo, apicali subrecto mox ante apicem alae excurrente; spinula costæ distincta; abdominis lateribus in  $\delta$  rufescentibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 363. 214.  $\delta\varphi$ . *Macquartia* Meig. Dipt. 7. 229. 13. *Tach. spinosa* Zett. Ins. Lapp. 618. 62.  $\delta\varphi$ . Forte etiam *Tach. griseicollis* Meig. Dipt. 4. 365. 218.  $\varphi$ .

Hab. in graminosis, floribus, & foliis fruticum, per Scandinaviam, 2 Jul.—12 Sept., ubique vulgaris; scilicet in Scania, Smolandia, Ostrogothia, Westrogothia, Ölandia, Gotllandia (ad Garde, Malmö, Kjellunge, Färön &c.), frequentissima; in Nericia ad Öskevik; in Jemtlandia usque ad Faxelfven, Hofverberget & Alsen, passim; in Lapponia Tornensi ad Kengis, rar.; in Norvegia a Dovre, Næs & Thyges usque ad Bussekop Finmarkiae, haud rara; e Dania sub nomine: "T. griseicollis" Meig.?  $\varphi$  a D. Staeger communicata. (E Glogavia u'erde sexus a D. Zeller sine synonymia missus).

$\delta\varphi$ . Valde si nulis priori, sed plerumque paullo minor, multo fortius setosa, fere spinosa, antennis versus apicem sublatioribus, margine oris magis reflexo, albo, oculis (in  $\delta$ ) non arctissime coherentibus, sed anguste remotis, vitta frontali nigra, nec picea, abdomine cinereo, 1:mo segmento toto, reliquisque fascia apicali subinterrupta, nigra, nitida, nec abdomine cinereo immaculato, lateribus praesertim in  $\delta$

plus minus ferrugineis, alis magis hyalinis, basi parum infuscatis, costa basi ciliata, spinula subgemina distincta, nervo long. 4:to arruatim flexo nonnihil ante summum apicem alae excurrente, area paullo latius aperta, ut & squamis albidiioribus, abunde distineta. — Simillima quoque *T. citiari* (181), sed palpis nigris, nec flavis, ab illa mox dignota. — Palpi filiformes apice tenuiter incrassati. — Variat nervo long. 4:to subangulatim flexo. Affinis *T. laterali* 192.

*Obs.* Sub nomine: *T. subdiaphana* & *curtiseta* hæc species in collectionibus Suecicis etiam occurrit.

**189. *T. angulicornis*:** oblongo-ovata, nigricans, thoracis antico albo-maculato; abdomine griseo, mæculis nigro-micantibus; epistomate argenteo; fronte modice lata; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo elongato, angulo apicali superne acuto, seta biarticulata, basi incrassata; alis hyalinis, nervis transversis rectis, apicali fere in apice alæ excurrente. ♀ (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Ölandia rarissime; specimen descriptum a D. Boheman 1835 inventum & missum.

♀. Parva, magnitudine & affinitate *T. nigritæ*, 186. Caput argenteo-micans, vertice nigro (in specimine paullo detrito). Oculi medioeriter remoti. Antennæ atræ, articulo ultimo elongato, apice angulo supero distincte acuto, acumine sursum flexo. Genæ subpallescentes. Palpi tenues, nigri. Thorax niger, antice vestigio mæclarum albarum. Abdomen griseum, segmentis 1—3 apice mæculis nigris certo situ perspicuis. Alæ inermes, nervo long. 4:to angulatim flexo fere in apice alæ excurrente ibique cum nervo long. 3:to non intime conjuncto; inde area anguste aperta. Nervus transv. ordinarius rectissimus. Squamæ albæ. Halteres testacei. Pedes nigri. Tarsi simplices.

190. *T. arctica*: oblonga, nigricans, subnitida, thoracis lateribus abdominisque maculis albo-micantibus; capite albo-cinereo; fronte subprominente, modice angusta, vitta atra; antennis epistomate parum brevioribus, validis, nigris, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta biarticulata, basi incrassata; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis: ordinario subsflexo, apicali brevi fere in apice alae excurrente. ♂. (Long. fere  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 645. 47. ♂.

Hab. in Finmarkia occidentali Norvegiae rarissime; in monte subalpino Skaaddavaara, non longe a Nord-Cap distante 7 Aug. 1821 inveni.

♂. Caput argenteo-nigrescens, fronte obscuriore, vitta mediocri-  
ter lata, atro-brunnea. Series setarum haud validarum per  
setas 4-5 infra antennas continuata. Oculi perspicue hirti.  
Antennæ incumbentes, seta subtiliter puberula. Epistoma  
parum declivum, nudum, vibrissis inferne paucis, spuriis.  
Os haud reflexum. Palpi exserti, atri. Thorax niger, ante-  
cie obscurens, lineis 2 nigris, humeris atbidis. Abdomen  
ovale, convexum, nigrum, subnitidum; fasciis 3 cinerascen-  
tibus subinterruptis. Segmenta: 1:mum breve, inerme, re-  
liqua in disco & apice non valide setulosa. Alarum nervi  
pallidi, longitudinales: 3:tus basi bisetosus, 4:tus angula-  
tim flexus; area modice aperta. Spinula costæ nulla. Squa-  
mæ sordide albidae. Pedes nigri, pulvillis mediocribus,  
albis.

191. *T. hyalinata*: ovata, obscure cinerea, opaca,  
capite subargenteo-micante; fronte vix prominente, mo-  
dice lata, vitta mediocri, brunneo-atra; antennis episto-  
mate nonnihil brevioribus, nigris, articulo ultimo duplo  
& ultra longiore, seta biarticulata, fere ad medium in-  
crassata; thoracis lineolis 4, abdominalis fasciis totidem

subnitidis, pedibusque, nigris; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto, paullo ante apicem alae excurrente. ♂. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Ölandia rarissime; specimen descriptum a D. *Wahlberg* benigne missum.

♂♀. Antennæ incumbentes, medioeres, seta subtiliter puberula. Frons parum angusta, serie setarum intrinque subsimilis, per setas 5 infra antennas continua. Epistoma modice longum, perpendicularare, nudum, ore vix reflexo. Palpi clavati, atri. Oculi magni, hirti. Thoracis lineæ 4 nigrae in fundo obseuro parum perspicuae. Abdomen ovatum, nigrum, subnitidum, segmentis 2, 3, 4 basi fascia albocinerea, postice evanescente, per lineolam nigram interrupta. Segmenta subæque longa, 1:um bisetulosum, reliqua in disco & apice paree & tenuiter setosa. Alæ hyalinæ, basi leviter fuscatae. Nervi transversi: ordinarius leviter flexus, mox pone medium areæ anguste apertæ insertus, apicalis rectissimus perspicue ante apicem alæ excurrentis. Nervi longitudinales: 3:ius basi 4—5-setulosus, 4:tus rectangulatim flexus. Segmentum costæ 2:um breviusculum, spinula nulla. Squamæ albæ. Pedes nigri, pulvillis albis, non elongatis.

192. *T. lateralis*: oblonga, subcylindrica, nigricans, subnitida, thorace cinereo-vittata; capite argenteo; fronte sub prominente, angusta (♂), aut modice lata (♀), vitta medioeri, atra; antennis epistomate paullo brevioribus, nigris, articulo ultimo 2:do parum longiore, sela biarticulata, basi incrassata; abdominis lateribus rufis; alis hyalinis, nervis infuscatis; transversis: ordinario flexo, apicali recto intra apicem cum longitudinali tertio con juncto. ♂♀. (Long.  $2-2\frac{3}{4}$  lin.).

Fall. Act. Holm. 1810. p. 285. 41. ♂♀. Muscid. 36. not. — Meig. Dipt. I. 283. 78. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 648.

60. ♂♀. *Musca* Panz. Fn. 7. f. 22. *Ocyptera* Fabr. Antl. 314. 8. *Sericocera* Macq. Buff. 2. 168. 9. ♂♀. *Panzeria* Meig. Dipt. 7. 232. 1. t. 70. f. 15. ♂. — *Musca rufomaculata* Degeer Ins. 6. 28. 7. t. 1. f. 9. *Ocyptera tachinaria* Fall. Rhizomyz. 6. 4. ♂♀.

Hab. in graminosis & floribus, locis aridis, per Scandinaviam, 4 Jul.—2 Sept., ubique vulgatissima, 12 Jol. etiam ovipara visa; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Ölandia, Gotllandia (ad Stenkyrka, Martebo, Gothem, Färön, Lummelund, Westös &c.), Bahusia, Nericia, frequentissima; in Uplandia ad Holmiam; in Botnia boreali ad Johannis Ro & Kengis, haud rara; in Lapponiis Umensi ad Lycksele, & Tornensi ad Muonioniska, frequens; in Dania non raro, D. Staeger. (In Jungfern-Heyde & Moabite prope Borominum, ut & in Helgolandia, D. Dahlbom).

♂♀. Similis & affinis *T. prolixa* (188); sed abdominis lateribus ferrugineis, alarum nervis plus minus fuscedine cinctis, & area apicali paullo ante apicem alae oclusa, breviter petiolata, mox dignota. Fortiter setosa. Oculi tenuiter hirti. Setae frontales 3—4 infra antennarum radicem descendunt. Antennae liberae, articulo ultimo latiseculo, apice intus rotundato, seta subtiliter puberula. Epistoma subdeclivum, nudum, ore paullo reflexo. Palpi nigri. Thorax cinerascens, lineis 4 nigris. Abdomen nigrum, subnitidum, lateribus plus minus late rufum, segmentis 2, 3, 4 ima basi cingulo albo. Segmenta: 1:um breve, inerme, reliqua disco & apice paree, sed valide, spinosa. Alarum nervi: transversus ordinarius leviter flexus paullo pone medium areæ insertus; longitudinalis 3:ius basi 2—3-setulosus, 4:ius angulatim exakte flexus; spinula costæ distincta. Squamæ albæ. Pedes nigri, tarsis simplicibus, pulvillis in ♂ medioeribus, albis. — Variat area alarum apice non petiolata;

193. *T. viridis*: ovata, aureo-viridis, nitida, epistomate argenteo; antennis linearibus, palpis pedibusque nigris; alis hyalinis, nervo longitudinali 4:lo infra angulum acutum continuato. ♂♀. (Long. 2½ fere 4 lin.).

Fall. Musc. 25. 51. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 258. 32. *Chrysocoma* Macq. Buff. 2. 150. 1. ♂♀. T. 14. f. 16. — Meig. Dipt. 7. 217. 2. T. 70. f. 6. ♂.

Hab. in soliis fruticum & herbarum, etiam in floribus Umbellatarum, locis paludosis mihi præsertim obvia, per hortos & prata Sueciæ, 30 Maj.—15 Jun., minus frequens; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Maltesholm &c., passim; in templo Upsaliæ antiquæ semel a D. Prof. *Wahlberg* capta; e Dania a D. *Staeger* missa.

♂♀. *Muscæ cæsari* magnitudine, colore & habitu similis. Frons prominens, modice angusta (♂), aut latior (♀), argentea (♂), aut viridis (♀), vitta latiuscula, nigra. Series frontalis utrinque in ♂ simplex, in ♀ duplex, in utroque sexu per setas 4 infra antennarum basin descendens. Oculi hirti. Antennæ liberæ, validiuseulæ, sublineares, nigrae, epistomate paullo breviores, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, seta 3-articulata, artieulis basalibus brevibus, ad medium incrassata, tota subnuda. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis vix ullis. Os subreflexum. Genæ virides. Palpi nigri. Corpus aureo-viride, sœpe cœruleo-resplendens, scutello plerumque chalybeo. Abdominis segmenta: 1:mum breve, inerme; reliqua disco & lateribus setosa. Alæ cinerascentes; nervi: transversorum ordinarius inflexus pone medium areæ modice apertæ insertus, apicalis incurvus paullo ante apicem alæ excurrentis; longitudinalium 3:tius basi 3—4-setulosus, 4:tus non longe, sed determinate infra angulum acutum descendens. Spinula costæ minuta. Squamæ albæ. Halteres obscuri. Pedes nigri, femoribus metallice nitentibus, pulvillis albidis in ♂ longiusculis.

191. *T. aurata*: ovata, aureo-viridis, nitida, epistomate margaritaceo; antennis extus dilatatis, pedibusque nigris, tibiis obscure testaceis; palpis flavis; nervo longitudinali 4:to infra angulum acutum non continuato. ♂♀. (Long. circiter 3 lin.).

Fall. Musc. 25. 52. ♂. Meig. Dipt. 4. 257. 31. ♂♀.  
*Chrysocoma* Meig. Dipt. 7. 217. 1.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in horto villæ Esperöd Scaniæ specimen descriptum originarium masculum inventum.

♂♀. Simillima priori, a qua vero vitta frontali dilutius fusca, fronte nonnihil minus prominente, antennis versus apicem latioribus, epistomate albido-flavo, parum argenteo, palpis flavis, nervorum longitudinalium 3:to basi 8—10-setuloso, 4:to infra angulum non continuato, ut & tibiis fusco-testaceis, facile dignoscitur. Antennarum articulus ultimus in ♂ latissimus, nempe versus apicem sensim dilatatus, apice truncatus; in ♀ angustior, subtus scilicet parum dilatatus.

*Obs.* *Tach. delicata* Meig. Dipt. 4. 368. 223. ♀. seu *Thryphaera delicata* Ejusdem Dipt. 7. 264. 1. t. 72. f. 40—42. ♂♀. in Ostrogothia ad Gusum a D. Wahlberg lecta erit; mihi ignota. Neque *Tach. leucophæa* Meig. Dipt. 4. 414. 304. ♀. seu *Exorista leucophæa* Ejusd. Dipt. 7. 256. 35. "thorace cinereo, vittis 4 nigris; abdomine ovato, albido, fusco-micante; vibrissis nullis; palpis tibiarumque basi ferrugineis; oculis hirtis"; quæ in Dania ad Hafniam a D. Staeger Aug. semel inventa erit, & in vicinitate nostrarum specierum *T. affinis* (103) & *Bohemanni* (104) forsitan locum habuerit, a me in Scandinavia umquam deprehensa.

## 109. GONIA Meig.

*Corpus magnum aut medium, ovato-oblongum, convexum, fortiter setosum. Caput magnum, inflatum, vesiculosum, undique setulosum, facie raro vibrissata. Antennæ longitudine fere epistomatis, incumbentes, lineares, articulo ultimo longissimo, seta triarticulata, articulo 1:mo brevisimo, 2:do longitudine fere 3:tii aut illo interdum paullo breviore, tota valida, nuda, saepe in medio subgeniculata, apice subulata. Frons prominens, latissima, setis utrinque tri-aut quadrifariam dispositis, vitta latissima. Epistoma aut perpendiculare aut raro declivum, mystacibus distinctis. Oculi parvi, oblongi, nudi, in utroque sexu longe remoti; rufo-brunnei, unicolores. Thorax opacus. Abdomen subnitidum. Segmentum 1:mum breve. Alarum nervus longit. 4:tus angulatim flexus ante apicem alæ exurens. Nervi transversi: ordinarius pone medium areæ insertus, apicalis subineurus. Spinula costæ nulla. Color cinerascens. Motu agilissima, inquieta. Habitatio in floribus; in terra arida saepe moratur. Differentia sexus; mas: hamulis analibus 2 cornis inflexis, & antennis (articulo ultimo) paullo longioribus, a femina: vagina anali brevi, articulata, cylindrica, parum erumpente, ut & antennis (articulo ultimo) non-nihil brevioribus, dignoscitur. Præterea pulvilli breves in utroque sexu plerumque fere æque longi. — Typus generis: *Gonia capitata* n:o 1.*

A. Epistoma perpendiculare, setis lateralibus saepe perspicuis, sed vibrissis vix ullis nisi in *G. hebetæ* inferne spuriis. Alæ subinermes.

\*) abdomine rufo-picto.

L. *G. capitata*: thorace griseo, fusco-vittato, limbo laterali & postico, scutelloque, rufo-flavidis; capite flavo, antennarum articulo ultimo pedibusque nigris; abdome pellucido-testaceo, vitta dorsali angusta, anaque,

nigricantibus, incisuris albis; alis hyalinis, basi flavidis, nervo apicali incurvo. ♂♀. (Long.  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 3. I. Macq. Buff. 2. 85. I. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 632. I. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 211. I. *Musca* De Geer Ins. 6. 23. t. I. f. 3. *Tachina* Fall. Muscid. 11. 18. ♂♀.

Hab. in floribus Calthæ, Umbellatarum &c., per prata, hortos & arva, etiam in ipsa terra camporum aridorum, 10 Maj.—30 Jul., in Scandinavia meridionali & media, haud raro; scilicet in Scania ad Abusa, Lomma, Esperöd &c., passim; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena-löt & Gusum; in Ölandia, D. *Wahlberg*; in Gotllandia ad Wamblingbo & Gothem; in Dania ad Hafniam D. *Staeger*. (E Glogavia a D. *Zeller* missa).

♂♀. Magna, robusta. Caput pallide flavum, leviter albo-micans, fronte latissima, vitta straminea, setis utrinque irregulariter subquadrifariam dispositis, nigris, haud infra antennarum basin descendantibus. Antennæ deflexæ, basi rufæ, articulo ultimo nigro, quam 2:do in ♂ quadruplo, in ♀ vix triplo longiore, seta crassa, in medio geniculata. Epistoma valde prominens, serie setarum 5—6 nigrarum ad latera juxta carinas (sed non in ipsis carinis) ornatum & præterea pilis minutis parvis undique adspersum. Palpi flavi. Abdomen rufo-flavo-pellucidum, vitta dorsali nigra, basi apiceque dilatata, in segmentis 2, 3 plerumque angusta, incisuris tenuiter, & aro latius, albo-micantibus. Segmenta: 1:imum & 2:dum in medio marginis apicalis setis duabus, 3:tum & 4:tum margioe apicali setis pluribus, armata. Alæ hyalinæ, basi flavidо-subfuscæ, nervo transv. ordinario infexo, longitudinali 3:tio basi 5—7-setuloso; area modice aperta. Segmentum costæ secundum (cfr. in *Nephrocero* gen. 100) modice longum, ejus medio opponitur nervus

transversus medius. Squamæ albæ; inferiores magnæ halteres obtegunt. Pedes nigri, unguibus & pulvillis in utroque sexu parvis.

*Obs.* Abdominis vitta dorsalis in segmento 3:tio femineæ in maculam triangularem plerumque dilatata est, & cingulæ albæ magis perspicuae; hinc forsitan *G. ornata* Meig? Specimen femineum alarum area oclusa ad Lund Scaniæ semel inveni.

2. *G. lateralis*: thorace griseo, fusco-vittato, limbo laterali & postico obscure rufo-flavidis, scutello testaceo; capite flavo, antennarum articulo ultimo pedibusque nigris; abdomine pellucido-testaceo, vitta dorsali lata, anoque, nigris, incisuris albis; alis hyalinis, nervo apicali subrecto. ♂♀. (Long.  $3\frac{1}{2}$ — $4\frac{1}{4}$  lin.).

Zeller in Isis. — *Tachina capitata* Fall. Muse. 11. 18. descript. var.: "abdominis linea media dorsali lata."

Hab. in Suecia meridionali, tempore vernali, passim; in Scania ad Lund & Abusa 29 April.—24 Maj. plura specimina utriusque sexus inveni; sub nomine: "*Gonia vacua* Meig." ex Hafnia Daniæ a D. Staeger communica-ta. (E Glogavia specimina typica sub nomine: "*G. lateralis*" obtinui).

♂♀. A priori, cui de cetero similis, differt: magnitudine paullo minore, thoracis limbo posteriore obscuriore, abdominis vitta dorsali nigra duplo latiore, alis basi non flavidis, nervo apicali fere recto, ut & nervi longitudinalis 4:ti angulo nonnihil obtusiore, quam in præcedente. Valde quoque similis videtur Meigeni *Gon. vittatæ*, *divisæ* & *vacuæ*, sed a *G. vittata* incisuris abdominis albis, nec immaculatis; a *divisa* (eujus individua a D. Zeller e Glogavia accepi, Faunæ Scandinaviæ sine dubio peregrina) magnitudine paullo majore, capite flavo, albo-micante (nec luteo, im-

maculato), abdominis lateribus rufo-flavis, nec anguste rufo-ferrugineis, ut & segmento ultimo nigro, basi late cano, (nec nigro, nitidissimo immaenlato); & a *vacua* abdominis vitta dorsali nigra in segmentis 2 & 3 tota subæque lata, & in ♀ postice dilatata, nec ut in *vacua* angusta, postice attenuata, facile dignoscitur.

\*\*) abdome non rufo-picto (in ♂ *G. fasciatae* lateribus leviter ferrugineo-maculato).

3. *G. fasciata*: thorace griseo, fusco-lineato, scutello obscure testaceo; capite flavo, albo-micante; antennis basi ferrugineo-testaceis, articulo ultimo, pedibus abdomineque, nigris, hoc incisuris albis; alis hyalinis, nervo apicali subrecto. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 6. 10. & 7. 244. 13. Macq. Buff. 2. 86. 5. *Tach. capitata* Fall. Musc. 11. 18. var. β.

Hab. in graminosis, floribus Salicis cinereæ, &c., per Scandinaviam meridionalem & medium, 2 Maj.—10 Jun., minus frequens, in copula; scilicet in Scania ad Lund, D. *Dahlbom* & ipse; in Upplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia, D. *Bohemian*; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa; & e Glogavia plura specimina ex utroque sexu sub nomine descripto a D. *Zeller* communicata).

♂♀. Simillima *G. laterali*, sed sœpe nonnihil minor, & abdominis lateribus vix rufo-pictis, nisi in segmentis maris 2 & 3 macula utrinque parva, ferruginea, præcipue distincta. — Caput undique pilosulum. Thorax lineolis 4 angustis, subinterruptis, nigricantibus, limbo laterali & postico, scutelloque, sordide flavidis 1. fusco-testaceis. Abdomen nigrum, nitidum, cingulis 3 ad basin segmentorum 2, 3, 4 argenteo-albis. Reliqua ut in præcedente.

4. *G. hebes*: cinerea, thoracis vittis abdominalisque maculis nigricantibus; capite argenteo, vitta obscura; antennis basi ferrugineis, articulo ultimo pedibusque nigris; scutello rufo-testaceo; alis cinereis, nervi long. 4:ti angulo rotundato. ♂♀. (Long. 3½—4½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 7. 11. ♂. & 7. 24. 12. Macq. Buff. 2. 86. 6. ♂. *Tachina* Fall. Musc. 11. 19. ♀.

Hab. in foliis fruticum, floribus Chrysanthemi leucanthemi, &c., per prata Sueciæ mediæ, 7 Jul.—2 Aug., rarius, valde agilis; scilicet in Gotlandia ad Gothem; in Ölandia, & in Ostrogothia ad Wadstena, a me parce inventa.

♂? ♀. Magnitudo fere *G. capitata*. Cinerea, opaca. Caput minus quam in *capitata* inflatum, totum argenteum, in junioribus rufescenti micans. Antennæ paullo breviores quam in *capitata*, articulo ultimo nigro 2:do rufo vix duplo longiore, setæ articulis basalibus brevibus. Palpi flavi. Thoracis vittæ 4 nigræ. Abdomen cinereum, maculis irregularibus nigricantibus, segmento ultimo toto cinereo. Pedes nigri. Alæ cinereæ, basi subalbescentes, nervis ut in *G. capitata* directis, sed angulo nervi longitudinalis 4:ti magis rotundato. Squamæ albæ.

5. *G. flaviceps*: nigra, nitida, subimmaculata; capite pallido, albo-micante, antennarum basi scutelloque ferruginantibus; palpis nigricantibus; alis hyalinis, nervo transverso apicali subrecto. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 632. 2. ♂.

Hab. in Scandinavia, boreali rarissime; unicam marem in alpium Tornensium jugo inter Alten & Kautokeino Finmarkiae d. 11 Aug. 1821 inveni ipse, unicam-

que seminam in Jemtlandia ad radicem alp. Areskulan d.  
1. Aug. 1840 deprehendit D. Dahlbom.

$\delta\varphi$ . Prioribus paullo minor, ovata, nigra, nitida, in  $\varphi$  vestigio vittarum albarum in thoracis antico, & fasciarum 3 cinerascentium in abdomine. Caput stramineum, albo-micans, modice buccatum, undique parce pilosum, setis frontalibus haud validis. Frons lata, vitta minus lata, flava. Antennae nigrae, basi in  $\delta$  ferrugineae, in  $\varphi$  fuscæ, seta in utroque sexu 3-articulata valida, apice subulata, paullo ante medium geniculata. Epistoma subperpendiculare. Palpi nigricantes. Scutellum in  $\delta$  testaceum, in  $\varphi$  ferrugineo-marginatum. Abdomen breviter ovatum. Alæ cinereo-hyalinae, basi sordide albescentes. Costa inermis. Nervus longitud. 3:tius basi setulis 4—5, 4:tus subobtuse angulatim flexus. Nervi transversi recti, at apicalis in  $\varphi$  levissime incurvus. Squamæ albæ. Ungues basi & pulvilli toti albidi, in  $\delta$  elongati, in  $\varphi$  breviores.

B. Epistoma declivum, vibrissalum. Alarum nervi longitudinales 1 & 3 basi setosi. Corpus haud latum.

6. *G. ruficeps*: nigra, subnitida, thoracis vittis abdominalisque fasciis albo-micantibus; capite rufescente, albo-micante, macula frontali nigro-picea; antennis basi ferrugineis; alis cinereis, nervis ferrugineo-subfuscis, longitudinali 4:to acutangulatim flexo, infra angulum subcontinuato.  $\delta\varphi$ . (Long.  $4\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 5. 8. — 6. 373.  $\varphi$ . — *Tachina* Fall. Musc. 4. 3.  $\varphi$ . *Illigera* Meig. 7. 247. t. t. 71. f. 16.

Hab. in Succiæ mediae floribus Heraclei, Angelicæ &c., 6 Jun.—30 Jul., minus frequens; scilicet in Smolandia, D. Boheman: in Ostrogothia ad Lärketorp, Wad-

stena (in littore arenoso lacus Wettern), & Godegård; ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia rarius.

$\delta\varphi$ . *G. capitata* non brevior, sed angustior. Caput minus buccatum, rufescens, præsertim epistomate declivo margaritaceo. Vibrissæ spuriæ vix ad medium epistomatis assurgentæ. Antennæ elongatæ, validæ, nigræ, artieulis 2:do ferrugineo, 1:mo piceo. Artieulus ultimus 2:do in  $\delta$  triplo, in  $\varphi$  duplo longior. Seta erassa, in  $\delta$  artienlis 2 & 3 subæque longis, in  $\varphi$  articulo ultimo 2:do paullo longiore. Palpi flavi. Thoracis vittæ 4 albicantes. Scutellum summo apice puncto rufo. Abdominis segmenta 2, 3, 4 basi fascia lata albida. Alarum nervi ut in *G. capitata* directi, sed longitudinales: 1 & 3 basi setulosi; 4:tus infra angulum breviter continuatus; ut & nervus transv. ordinarius longius pone medium areæ insertus. Squamæ albæ. Pedes nigri.

7. *G. angustata*: nigra, nitida, thoracis vittis abdominisque fasciis obsoletis, albo-glaucis; capite albo, fronte nigro-micante, vitta ferruginea; antennis basi fuscis; humeris rufis; alis cinereis, nervo long. 4:to subacutangulatim flexo, infra angulum non continuato.  $\delta\varphi$ . (Long. 2 $\frac{1}{4}$  fere 3 lin.).

Hab. in locis aridis & campis arenosis, per Sueciam meridionalem, 4—30 Jul., rarius; scilicet in Scania ad Lund, Silfakra & Lomma (prope littus maris) a D. *Daklbom* & me aliquoties capta.

$\delta\varphi$ . Priori valde similis & affinis, sed sæpe duplo l. triplo minor, & fronte subnigro-micante, vitta tota ferruginea, nec nigro-maculata, antennis basi piceis, nec ferrugineis, vibrissis perspicuoribus ad medium epistomatis adscendentibus, palpis flavis, apice obscuris, nec totis flavis, thoracis abdominisque pictura alba magis obsoleta, humeris

testaceis, nec nigris, alarum nervis minus infuscatis, longitudinali 4:to infra angulum non continuato, ut & area saepissime oclusa, vere distincta. Caput in juvenilibus fulvofuscens. Setae frontales 3—4 infra antennarum basin descendunt, sed minus validæ, quam in præcedente. Abdomen interdum piceum (forte in nuper exclusis), quo *G. piceæ* Macq. appropinquari videtur.

---

## 110. **TRIXA** Meig.

*Corpus* magnum aut medium, ovatum, tachinæforme, pubescens, setosum, opacum. Antennæ incumbentes, brevisimæ, articulis 2 & 3 subæquis, horum ultimo rotundato, ovato, seta biarticulata, recurva, brevissime puberula, basi incrassata. Frons modice prominens, vitta striata. Oculi parvi, nudi, brunnei. Epistoma subperpendiculare, infra oculos longe descendens, nudum, carinatum, vibrissis inferne spuriis. *Mystaces* nulli. Os non reflexum. Palpi magni, clavati. Mentum pilosum. Abdomen plerumque late ovatum, segmentis subæque longis, anticis 2 in medio, reliquis 2 undique, setosis. Alæ divaricatæ. Nervi transversi: ordinarius flexus, paullo pone medium areæ apertæ insertus, apicalis subincurvus, mox ante apicem alæ excurrit. Nervi longitudinales: 3:tius basi setulis 5—9, 4:tus sabacutangulatim flexus, breviter, sed determinate infra angulum descendens. Spinula costæ nulla. Squamæ magnæ albæ, Halteres flavi. *Color* nigricans. *Motu* velocissima: aut volatu continuo juxta terram se movens, aut celerime in ære librans. *Habitatio* in fruticibus & graminosis, libenter locis sylvaticis & montosis, per Sueciam borealem. *Larvæ* forte parasitæ, vix phytophagæ? *Differentia sexus*; *mas*: oculis sat approximatis, serie setarum utrinque simplici, unguibus pulvillisque longis; *femina*: oculis sat late

remotis, serie setarum postice utrinque dupli, unguibus pulvillisque medioeribus.

1. *T. limbata*: nigra, capite thoracisque vittis cinereis; antennis, palpis pedibusque ferrugineis; ab domine aut limbo inaequaliter rufo ( $\delta$ ), aut fasciis cinereis ( $\varphi$ ); femoribus anticis superne vitta nigra; alarum nervis infuscatis.  $\delta\varphi$ . (Long. 3— $4\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 630. 3.  $\delta$ . — *Tr. lapponica* Zett. Ins. Lapp. 629. 1.  $\varphi$ , est forte hujus semina.

Hab. in silvis, montosis, etiam ad paludes Sueciæ borealis, 22 Jun.—30 Jul., passim; scilicet in Lapponia Uensi ad Asele, Stensele & Badstuträsk; in alpe Dovre Norvegiæ, D. Boheman; e Lapponia in provincias adjacentes descendit, & in Jemtlandia ad radicem alpium Åreskutan & Mullsjellen plura specimina invenimus D. Dahlbom & ipse; e Dalecarlia per D. Schönherr etiam obtinui. (E Finlandia a D. Sahlberg communica).

$\delta\varphi$ . *Tachinæ* majori similis, per antennas breves, setam recurvam, mystaces deficientes, epistoma carinatum & abdomen latum, facile dignota. Caput cinereo-argenteum. Vitta frontalis nigra, modice lata, in  $\delta$  posterius angustissima. Oculi in  $\delta$  subcohærentes, in  $\varphi$  late distantes. Antennæ foveolis, fere ut in *Oestro*, insertæ. Thorax cinerens, lineis 4 nigris, antice perspicuis. Scutellum cinerascens, apice saepe rufum. Abdomen nigrum, segmento ultimo cinereo; in  $\delta$  limbo laterali & postico inaequaliter ferrugineo, vestigio fasciæ cinereæ in segmentorum basi; in  $\varphi$  segmentis 2 & 3 fascia basali cinerea, in medio postice emarginata. Alæ cinereæ, nervis, præsertim transverso medio, subinfuscatis; basi fusco-ferrugineæ. Nervus transv. ordinarius inflexus, longitudinalis 4:tus infra angulum determinate descendens. Pedes ferroginei, femoribus anticis

aut anterioribus superne vitta, tarsorumque omnium annulis, nigris. Affinis videtur *Tr. dorsali* Meig.

2. *T. obscura*: nigra, capite, thoracis vittis abdominisque fasciis subintegris, cinereis; antennis, palpis pedibusque ferrugineis; alarum nervis non infuscatis. ♀. (Long. 4 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 630. 2. ♀.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; in silva ad Barrsele 1 Jul. 1832 inventa.

♀. Simillima feminæ prioris, sed differt præcipue alarum nervis non infuscatis, basi flavis, nec fuscis, longitudinalibus: 3:to basi setis pluribus (9—10), nec 6—8, 4:to infra angulam brevius continuato, ut & pedibus totis ferrugineis, nec femoribus anticis superne nigro-vittatis. Caput flavo-griseum.

3. *T. østroidea*: "nigra; abdomine cinereo-micante, palpis antennisque rufis." ♂.

Macq. Buff. 2. 97. 4. ♂. Meig. Dipt. 7. 188. 7. ♂.

Hab. in Ostrogothia rarissime; in floribus Pastinacæ & altera vice in Pteride ad Gusum deprehensa a D. Prof. *Wahlberg*, ut mihi per litteras nuper annuntiavit; a me nec inventa, nec visa.

♂. "Nigra. Palpi flavi, crassi, exserti, apice rotundato, albido. Frons flavo-grisea, vitta nigra. Antennæ flavae. Thorax pilis & vittis griseis. Abdomen cinereo-micans, lateribus interdum rufescens. Tibiae & tarsi obscure flava. Squamae albæ. Alæ cinerascentes, nervis transversis: medio nigro-maculato, ordinario brunneo-marginato." Macq. & Meig. l. c. — Long. circiter 4 lin.

## 111. MILTOGRAMMA Meig.

*Corpus minoris magnitudinis, oblongum, subcylindricum, pubescens, parce setosum, opacum. Antennæ fronti prominenti insertæ, longitudine dimidii epistomatis, incumbentes, articulo ultimo 2:do duplo longiore, linearis, compresso, seta brevi, tri- (an bi-?) articulata, nuda aut brevissime puberula. Caput subvesiculosum. Frons porrecta, in utroque sexu modice lata, saepe vitta lata, setis utrinque haud fortibus, vix infra antennas descendantibus. Epistoma perpendicularare. Os non reflexum, setulosum, sed setis mystacinis & vibrissis subnullis aut saltem non validissimis. Oculi nudi, brunnei. Abdomen subconicum, subnudum, præter setulas paucas in margine segmentorum. Segmentum 1:mum reliquis vix brevius. Alæ longitudine vix abdominis. Nervi longitudinales: 4:tus angulatim flexus, paullo ante apicem alæ excurrentes; 3:tius basi setulis paucis 1. nullis. Spinula costæ nulla. Nervus transv. ordinarius paullo posne medium areæ apertæ insertus. Squamæ magnæ. Pedum unguis & pulvilli in utroque sexu parvi. Color (in nostris) griseescens. Motu celerrima, inquieta. Habitatio in floribus & graminosis, saepe in arenosis, ubi, testante D. Macquart, larvæ parasitæ in larvis aliorum insectorum degunt. Discrimen sexus; mas: ano subobtuso, serie setarum frontalium tenuium subsimpli; femina: ano subacuto, serie setarum frontalium nonnihil validiarum postice subduplici. — Typus generis: *M. aestracea*.*

A.) Seta antennarum nudæ. Abdomen undique pubescens, setulis tantum in margine segmentorum posticorum tenuibus.

\*) Palpi flavi.

1. *M. aestracea*: cinerea, thoracis lineis 4 obscurebris, abdominalis maculis obsoletis olivaceo-micanibus; capite flavo-albo; vitta frontali latissima; antennis fuscis,

basi rufis; tibiis tarsisque nigris; alarum nervo longit. 4:to angulatim flexo. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 229. 4. Macq. Buff. 2. 153. 3. Meig. Dipt. 7. 233. 4. *Tachina* Fall. Muscid. 10. 17. ♂♀.

Hab. in graminosis, sed præsertim in floribus Chrysanthemi lencanthemi, per Succiam meridionalem & medium, 18 Jun.—16 Aug., sat vulgaris; scilicet in Scania ubique copiose; in Smolandia, Ostro- & Westro-gothia, frequens; in Ölandia passim; in Gotllandia rarius; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*. (*Mas* sub nomine *M. marginata* Bouch. & *femina* sub nomine *M. tessellata* a D. *Zeller* e Glogavia mihi communicati).

♂♀. Caput albo-corneum, vitta frontali latissima, flava, setis tenuibus, non infra antenuarum radicem descendantibus, utrinque ornata. Antennarum seta brevis, recta, ad medium incrassata. Setulæ oris breves tennes, nigrae. Thoracis lineolæ 4 fuscæ, quarum laterales abruptæ, parum perspicuae. Abdomen cinereum, fusco-marmoratum seu maculis certo situ olivaceo-micantibus, irregulariter subtrifariam dispositis. Alæ hyalinæ, basi albescentes. Nervi transversi: medius medio segmenti costæ 2:di (cfr. *Nephrocerus* gen. 100 in nota) brevissime oppositus; ordinarius subrectus; apicalis incurvus. Nervi longitudinales: 3:tius non setulosus; 4:tus subacute angulatim flexus, infra angulum apprenenter & breviter subcontinuatus. Squamæ albidæ. Halteres flavi. Pedes nigri, pilosi femoribus cinerascentibus. Pulvilli in utroque sexu parvi, æquales. Tarsi antici in ♂ articulo 4:to apice setis 2 elongatis incurvis munito. — Var. ♀ ab domine albo-cinereo, maculis olivaceis obsoletis. An *M. tessellata* Meig.? In Ölandia & Scania rar.

2. *M. Germari*: grisea, thoracis lineis subquinis obscuris; abdominis maculis distinctis fusco-brunneis, in-

cisuris albidis; capite albo-flavo, vitta frontali latissima; antennis fuscis, basi rufis; tibiis tarsisque nigris. ♂. (Long. sere 2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 229. 5. & 7. 238. 5. Macq. Buff. 2. 154. 4.

Hab. in Suecia meridionali rarius; in Scania ad Sandby & Abusa prope Lund individua 4 inveni. (Sub nomine *M. Germari* e Glogavia a D. Zeller specimina quoque obtinui).

♂. Simillima priori, a qua tamen facile dignoscitur thoracis lineis subquinis, minus determinatis, abdomine maculis olivaceo-brunneis obscurioribus, distinctioribus variegato, incisuris inæqualiter griseo-albidis, ad latera rufescenti albis, ut & tarsis nudis. Reliqua ut in præcedente.

3. *M. punctata*: cinerea, thoracis lineis subquinis obscuris; abdomine flavescenti cinereo, trifariam nigromaculato; capite albo-flavo, vitta frontali lata; antennis nigris, basi fuscis, tarsis nigris. ♂♀. (Long. 2—3 lin.).

Meig. Dipt. 4. 228. 3. & 7. 238. 3. Macq. Buff. 2. 153. 2. *Tach. œstracea* Fall. Muscid. 10. 17. var.

Hab. in Suecia meridionali & media, mense Jul. passim; scilicet in Seania rarius; in Gotlandia ad Stenkyrka 27 Jul. 1841 utrumque sexum paullo frequentius legi.

♂♀. Similis quoque præcedenti; abdominis vero maculis non coherentibus, sed discretis, puneta majuseula in margine apicali segmentorum efficientibus, triplici serie dispositis, incisuris band albidis, vitta frontali fulva lata quidem, sed non latissima, ut & tarsis anticis in ♂ articulo penultimo subtus piloso & apice setis 2 longioribus incurvis munito, mox

dignoscitur. Pubescentia sub ore ut in prioribus pallida, brevissima.

4. *M. arcuata*: cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque maculis, fuscis; capite flavo-albo, vitta frontali latissima; antennis fuscis, basi rufis; tibiis tarsisque nigris; alarum nervo longitud. 4:to arcualim flexo. ♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel deprehensa.

♀. *M. aestraceæ* ut ovum ovo similis, & differt tantum nervo longitud. 4:to mox pone nervum transv. ordinarium curvatum seu arcuatim, nec angulatim, flexo.

5. *M. imberbis*: cinerea, thoracis lineolis anticis subquatuor, abdominisque maculis trifariam positis, obscure brunneis; capite cano; vitta frontali angustata, antennis pedibusque uigris; epistomate argenteo-micante. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Tachina imberbis* Zett. Ins. Lapp. 636. 9. ♀.

Hab. in Scandinavia rarissime; specimen typicum e Tornecå a D. *Deutsch* communicatum; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia mense Julio, ipse.

♀. Parva, ovata, similis *M. punctatæ*, sed minor, & capite argenteo-micante, nec flavo-albo, fronte angustiore, vitta angustata, nigra, nec lata flava, ut & seta utrinque mystacea, pubescentiaque sub ore, evidentioribus nigris, distincta. Thoracis lineolæ anticæ 4 obscuræ, & vitta media longior brunnea. Abdominis ovati maculæ subtrigonæ, triplici serie dispositæ, nigro-brunneæ. Alæ hyalinæ, nervis transversis: ordinario recto, apicali valde incurvo, non procul ab apice excurrente. Nervus long. 4:tus infra angulum continuatus. Squamæ albæ. — Varietas vitta frontali cinerea, nec nigra,

& nervo transv. ordinario levissime flexo, nec exacte reeto; forte hujus; in Scania ad Fogelsång d. 7 Jul. semel lecta.

6. *M. fasciolella*: cinerea, thoracis vitta abdominisque cani fasciis brunneis; capite albo-flavo, fronte modice lata, cana, vitta angustata concolore; antennis pedibusque fusco-nigris. ♂. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad villam Esperöd in parœc. Mellby specimen descriptum inveni.

♂. Minuta, subeylindrica. Siwilis *M. punctatæ*, sed multaties minor, fronte angustiore, cana, vitta angusta parum flava, &c., dignota. Seta utrinque mystacina & setulæ oris, parva, nigra. Thorax einereus, antice obsolete fusco-lineatus, sed vitta media læte brunnea perspicuiori. Abdomen brunneum, incisuris albis, vel si mavis, album, segmento 1:mo toto, reliquisque faseia in margine apicali lata, sinuata, certo situ maculas 3 formante. Nervi alarum & squamæ ut in priori. Pedes nigrieantes, tarsis simplicibus, nudis.

\*\*) Palpi nigri.

a.) Antennæ breviusculæ, seta basi incrassata.

7. *M. conica*: læte cinerea, ab domine trifariam nigro-maculato; epistomate argenteo; antennis pedibusque nigris. ♂♀. (Long.  $1-1\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 232. 13. & 7. 233. 16. Macq. Busf. 2. 155. 12. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 630. 1. ♂♀. *Tachina* Fall. Musc. 9. 11. ♂♀.

Hab. in terra arida & arenosa, libenter locis soli expositis, ubi tranquilla sæpe sedet, interdum in floribus obvia, per Scandinaviam, 10 Jun.—2 Sept., vulgaris; in copula deprehensa; scilicet in Scania, Blekingia, Ostro-

gothia, ubique frequens; in Gotlandia ad Rutbe &c.; in Uplandia passim; deinde non nisi raro occurrit. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa. Ad Jungfern-Heyde & Moabitæ prope Berolinum 7—12 Jul. 1812 a D. *Dahlbom* in pluribus exemplis capta. E Glogavia a D. *Zeller* sub nomine: *M. conica*, quoque communicata.

♂♀. Cylindrica, parva, interdum valde minuta, magnitudine varians; dilute cinerea. Caput flavo-argenteum, fronte subangustata, grisea, vitta modice lata, concolore; interdum totum argenteum. Antennæ parvæ, nigricantes, seta basi incrassata. Epistoma perpendiculare, nudum, seta mystacea & setulis oris, minime validis, nigris. Thorax antice vestigio linearum 3 fuscum. Abdomen conicum, griseo-cinereum, maculis trigonis serie triplici dispositis, lateribus apice intus subobliquo. Nervi ut in *M. aestracea* directi. Squamæ magnæ, niveæ. Pedes nigri, tarsis simplicibus, nudis, pulvillis parvis, albis. — Variat toto corpore cano i. glaucescente, pictura obscura.

b.) Antennæ elongatæ, seta ultra medium incrassata. Frons non lata.

8. *M. cylindrica*: obscure cinerea, capite argenteomicante; antennis mediocribus, vitta frontali, thoracis lineis 4 anticis, abdominis ovalis linea dorsali & maculis trigonis, pedibusque, nigris. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 375. 234. ♂♀. & 7. 233. 21. Zett. Ins. Lapp. 635. 8. ♂♀. *Tachina* Fall. Muse. 8. 13. ♂♀. *Lydella* Macq. Buff. 2. 138. 20. ♂♀. An quoque *Tach. cincta* Meig. Dipt. 4. 297. 102? ♀.

Hab. in Scandinavie meridionalis & mediae Umbellatis, terræ saepè insidens, 4 Jul.—15 Aug. mihi obvia;

seilieet in Scania ad Kjefinge (D. *Dahlbom*), Abusa, utrumque Esperöd, &c., sat frequens; in Ölandia, D. B. *Fries*; in Gotlandia ad Westö, Öja &c.; in Lapponia Umensi ad Lycksele; in Norvegia ad Näs Värdaliæ, rar. (Ad Hamburgum a D. *Dahlbom* 1838. E Glogavia sub nomine: "Miltogr. arvorum Bouch." a D. *Zeller* 1842 communicata).

♂♀. Gyata, convexa. Frons modice prominens, subangustata, vitta modice lata. Antennæ epistomate paullo breviores, angustatae, lineares, articulo ultimo 2:do triplo & ultra longiori. Epistoma subdeclivum, ad latera & in carinis omnium tenuissime & parce setulosum, vibrissis tamen nullis. Seta mystacina & setulae sub ore, parva, nigra. Abdomen ellipticum, convexum, cinereum, segmentis: 1:moto toto, reliquisque vitta media dorsali & utrinque serie macularum trigonarum (interdum cum vitta basi confluentium), nigris, nitidis. Aliae hyalinæ, nervis ut in priori directis, sed transverso apicali fere in apice ake, nec procul ab apice, excurrente. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes ut in priori.

9. *M. convexula*: glauca, capite albescente; antennis medioeribus, vitta frontali pedibusque nigris; thoracis lineis 4, sentelli basi abdominisque fasciis latis, sinuatis, fusco-brunneis. ♀. (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 638. 21. ♀.

Hab. in Lapponia Suecica meridionali rarissime; ad Lycksele Lapponiæ Umensis semel lecta.

♀. Corpore brevi, abdome rotundato, convexo, pictura oliveo-micante, a reliquis affinibus dignota. Caput ut in priori, sed epistoma omnino nudum, seta tantum mystacina & setulis sub ore paucissimis; oculi etiam minores. Lineæ thoracis antice 4 brunneæ, Abdomen glaucum, segmento

1:mo toto, 2 & 3 margine apicali fascia lata antice sinuata (certo situ maculas 3 trigonas basi confluentes formante), fuscis sen olivaceis; totum breviter & depresso pubescens, minime setosum, nec nisi postice tenuiter pilosulum. Alae ut in precedente, sed nervus transversus ordinarius forte propius ad medium areæ insertus, & levissime flexus, nec exacte rectus; longitudinalis 4:tus vix apparenter continuatus infra angulum. Squamæ albidae. Pedes nigri. Tarsi simplices.

10. *M. rotundiventris*: cinereo-grisea, capite albicante; antennis medioeribus, vitta frontali pedibusque nigris; thoracis vittis 3, abdominisque rotundati maculis novem, fuscis. ♀. (Long. circiter 2 lin.).

Hab. in Scania rarissime; detecta a Cel. D. Prof. Boheman, qui specimen descriptum 1834 mutuo misit; a me numquam preprehensa.

♀. Ovata. Frons convexo-prominula, cinereo albida, nitida, linea media angusta, nigra. Oculi non late distantes. Antennæ epistomate fere duplo breviores, apice subacute, articulo ultimo reliquis triplo longiore; totæ nigricantes, seta medioeri. Setæ mystacinæ vix ullæ, sed setæ oris phores, distinctæ. Palpi nigri. Thorax cinereus, vittis 3 sat latis, obsoletis, fuscis. Abdomen ovato-rotundatum, subdepressum, griseum, segmentorum 2, 3 & 4 margine apicali lineola utrinque abbreviata, & maeulis in singulo tribus, fuscis. Alæ hyalinæ. Squamæ albidae. Pedes nigricantes.

11. *M. minuta*: cinerea, epistomate argenteo utrinque setuloso; antennis magnis, abdominis fasciis pedibusque nigris; tarsis fuscis. ♂♀. (Long. ♂  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ ; ♀  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

*Tachina* Fall. Museid. 9. 15. ♂♀. vera & originaria.  
— Meig. Dipt. 4. 407. 292. (secund. Fall. transcripta).

Hab. in Suecia meridionali & media, 16 Jan.—26 Jul., rarius; scilicet in Scania ad Esperöd & Beckaskog; in Ostrogothia ad Wadstena rarissime; in Gotlandia ad Kyllej & in insula Furillen 21 Jul. 1841 paullo frequentius invenimus D. *Dahlbom* & ipse.

$\delta\varnothing$ .  $\delta$  subcylindricus,  $\varnothing$  magis ovata. Per **antennas magnas**, faciem utrinque serie unica pilosulam & tarsos fuseos hæc species a ceteris affinibus mox dignota. Frons minus prominens, cana, in  $\delta$  subangustata, vitta angusta, nigra; in  $\varnothing$  latior, vitta lata, grisea. Antennæ longitudine epistomatis brevis, magnæ, validæ, nigræ, articulo ultimo reliquis quadruplo & ultra longiore, seta nuda ultra medium incrassata. Epistoma subperpendiculare, in carinis lateraliibus subeontinue setulosum, setulis vibrissas spuriæ mentientibus. Seta mystacina & setulæ oris nigræ adsunt. Palpi tenues, nigri. Proboscidis labia ferruginea. Oculi magni, nudi. Thorax & scutellum cinerea, ille antice certo situ rudimento linearum 4 obscurarum. Abdomen nigrum, nitidum, segmentis 2, 3 & 4 basi fascia angusta, sinuata, subinterrupta, alba. Fascia hæc in segmento ultimo latior, segmentum fere totum saltem in  $\varnothing$  occupans. Abdominis pubescentia præterea ut in *M. convexula*. Alarum nervi transversi: ordinarius rectus, in medio arcæ anguste apertæ insertus, apicalis modice ineuryus in apice alæ excurrens; nervus long. 4:tus apparenter sub angulo continuatus. De cetero alæ cum nervis ut in *M. convexula*. Squamæ albæ. Pedes nigri l. nigro-picei, tarsis obscure albidis, apice obscureis, pulvillis parvis, albis.

*Obs.* *Tach. (Harrisia) pagana* Meig. alia est species, oculis hirtis &c. dignota; efr. nota sub *T. minuta* Meig. l. c. p. 408. — Nec *Lydella minuta* Macq. Bußl. 2. 138. 22. ad nostram referenda. Cum *T. saunio* n:o 9, & quibusdam aliis *Tachinis* non confundendæ sunt nostre species *Miltogrammæ*. Ad antennarum setam rectam, breviorem, & ar-

maturam corporis partiumque leviorum probe attendendum, ut *Miltogramman* a *Tachina* distingua.

B.) Seta antennarum breviter pubescens, saepe microscopice tantum puberula. Antennæ breviusculæ.

♀. Palpi nigri.

12. *M. griseola*; cinerea, capite argenteo, vitta frontali lata, atra; antennis, thoracis lineis 4 anticus, abdominis unica obsoleta, pedibusque, nigricantibus. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Tachina* Fall. Musc. 10. 16. ♂♀. typica. — Meig. Dipt. 4. 317. 188. ♂. & Ejusd. 7. 191. 58.

Hab. in Scania rarissime; pauca tantum specimina hactenus ibi lecta.

♂♀. Oblonga subcylindrica, cinerea aut grisea, opaca. Frons distincte prominens, in ♂ paullo angustior quam in ♀, serie setarum in utroque sexu postice subduplici, infra antennarum basin non descendente. Antennæ epistomate brevi duplo breviores, articulo ultimo angustato, 2:do duplo longiore, seta vix ad medium incrassata, apice microscopice puberula. Epistoma subdeclivum, ad latera (inter carinas & oculos) undique tenuissime nigro-pilosulum. Vibrissæ nullæ, sed seta mystacina & setulae oris nigræ adsunt. Palpi filiformes & proboscis, nigra. Oculi medioeres. Thorax antice lineis 4 fuscis obsoletis, mediis tenuioribus. Abdomen subconicum, griseum, lineola dorsali fusca obsoleta. Segmenta subæque longa: 1 & 2 inermia, 3 & 4 marginè apicali setulosa. Alæ cinereæ, nervis ut in *M. astracea* uno 1 directis. Spinula costæ nulla. Squamæ albidæ. Pedes nigri, femoribus leviter cinerascentibus, pulvillis medioeribus, albis.

13. *M. oculata*: glauca, epistomate argenteo; fronte parum prominente, angusta ( $\delta$ ), vitta angusta, brunnea; antennis, thoracis vittis 4, abdominis fasciis latis sinuatibus, pedibusque, nigricantibus.  $\delta$ . (Long. 2 lin.).

Hab. in Gotlandia rarissime; ad Garde 29. Jun. 1819 exemplum descriptum legi.

$\delta$ . Oblongo-ovata. Frons convexa, vix prominula, valde angusta, argenteo-mieante, vitta angusta, brunnea, serie setarum tenuium utrinque vix ad basin antennarum extensa. Antennae epistomate paullo breviores, articulo ultimo 2:do triplo longiori, angusto, seta subelongata, capillari, basi incrassata, apice microscope puberula. Epistoma haud prominulum, nec infra oculos descendens, facie trianguli superne angusta, versus os latiori, tota argentea, nuda, carinis inferne tenuissime pilosulis, lateribus (inter carinas & oenlos) valde angustis. Seta mystacea & setulae sub ore, tenues. Oculi magni, in fronte anguste & æque remoti. Thoracis vittæ 3 latinsculæ, brunnescentes. Abdomen subconicum, convexum, nigrum, nitidum, segmentis: 2, 3, 4 basi inæqualiter anguste albidis; seu alio situ albidum, segmentis: 1:mo toto, reliquisque margine apicali late siuatinis nigris, nigredine certo situ maculas magnas trigonas basi cohærentes formante; totum depresso pubescens, sed non setulosum. Segmenta æque longa. Alæ hyalinæ, nervis ut in priori directis. Squamæ albæ. Pedes nigri, pulvillis parvis, albis.

$\gamma\gamma$ . Palpi filiformes, flavi. Alarum nervi transversi: ordinarius inflexus in medio areae oculæ insertus; apicalis incurvus, ante apicem alæ excurrens. Spinula costæ medioeris.

14. *M. hilarella*: cinerea l. cana, ab domine trifariam brunneo-maculato; antennis obseuris, Lasi, tibiisque posticis, flavidis; tarsis nigris.  $\varphi$ . (Long. 1 $\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Hab. in Scania rarissime; in frutice horti ad Esperöd in parœcia Tranås d. 13 Jul. & altera vice ad Sandhammar 14 Aug. duo exempla inveni.

♀. Similis *M. sticticæ* Meig. Dipt. 6. 367. 17., sed fronte magis prominente, abdominis pictura & pedum colore distincta. Oblonga, cinerea, opaca. Frons distinete porrecta, lata, cana, vitta media modice lata, rufo-straminea. Antennæ ut in priori constructæ, nigro-fuscæ, basi rufo-flavæ, seta non ad medium tenuiter incrassata, in medio pubescente. Epistoma declivum, argenteum, ad os rufescens, lateribus tenuissime pilosulum. Seta mystacina & setulæ oris, nigrae, Thorax subimmaculatus, & vix nisi linea media dilute brunnea ornatus. Abdomen conicum, cinereum l. canum, maculis subtrigonis triplici serie dispositis, nigro-brunneis; segmenta æque longa: 1:mum inerme, 2 & 3 in medio apicis setis 2, 4:tum apice setis circiter 8, armata. Alæ cinereæ, nervis transversis: ordinario leviter flexo, longissime a margine alæ remoto; apicali incurvo longe ante apicem alæ in costa excurrente. Nervi longitudinales: 3:tius basi setulis 2; 4:tus infra angulum continuatus; 5:tus fere ad marginem extensus. Area ocellusa, brevissime petiolata. Segmenta costæ: 1:mum elongatum, spinula distincta; 2:dum brevissimum; 3 & 4 medioeriter & æque longa. Squamæ albæ. Pedes nigricantes, gaeiculis testaceis, tibiis, obscure fuscis. — Affinis etiam videtur *M. 6-punctatæ* Meig. Dipt. 7. 234. 20.

15. *M. siphonina*: cinerea, abdominis punctis minutis brunneis; antennis obscuris, basi, libiisque, testaceis; tarsis nigris. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Hab. in Suecia meridionali, locis aridis, in hortis, campis & pascuis, 24 Jun.—Jul.—16 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund (D. Dahlbom), Abusa, Esperöd (in Quasa), Östra Torp, Trelleborg &c., haud infrequenter.

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed fronte minus prominentia, colore corporis magis flavidu-cinereo, nec cano, abdominis punctis minutis fuscis, ubi in praecedente maeulis trigonis majoribus, alarum hyalinarum nervo transverso ordinario magis oblique flexo, ut & tibialis plerunque omnibus testaceis, certe distincta. — Caput albo-micans, fronte flava. Epistoma subperpendiculare, nudum. Thorax griseus, immaculatus. Abdominis incisuræ tenuissime albidae, pygidio in  $\delta$  atro, nitido. Squamæ sub alis albidae. Femora basi saepe rufescens. Tarsi simplices, pulvilli in utroque sexu parvis. Reliqua ut in priori. — Variat abdominis basi lateribus flava; variat etiam segmentorum punctis fuscis obsoletis l. nullis. — Habitu similis *Siphonæ geniculatae*, sed magnitudine minori, instrumentis cibariis aliis, abunde dignota. — Huc pertinet *M. murina*, de qua D. Dahlbom in suo opere eximio: *Hymenopt. Europ.* 1843 p. 14 narrat, eam in larva *Noctuæ chrysitis* ova deponere.

16. *M. heteroneura*: cinerea, abdominis punctis brunneis; antennis pedibusque flavo-rufis, tarsis nigris.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 6. 367. 18. & Ejusdem 7. 233. 18.

Hab. in Scania rarissime; ad Lund semel inventa. (Sub nomine *M. heteroneura* M. etiam e Glogavia individuum unicum a D. Zeller accepi).

$\delta\varphi$ . Similis iterum priori, sed magnitudine paullo minore, punctis abdominis fuscis pluribus & majoribus, antennis fere totis, pedibusque, rufis, ut & alarum nervo transverso ordinario ad basin alae adhuc magis retracto, vere distincta. Cinereo-cana. Frons minus prominens. Antennæ rufæ, articulo ultimo apice obscuro. Abdomen basi lateribus rufescens, apice nigrum, segmentis basi anguste albescientibus. Alae hyalinæ. Nervi ut in priore directi, sed transversi: ordinarius magis inflexus, adhuc longius a margine alae re-

motus, & medio approximatus; apicalis quoque longior, valde obliquus in costam recta ductus; hinc nervi longitudinalis 4:ti angulus omnium obtusissimus. Pedes flavo-rufi, tarsis nigricantibus.

---

*Obs.* Heic inserendum est genus:

### LOPHOSIA Meig.

*Corpus* mediæ magnitudinis, subcylindricum, nitidum, pubescens. *Antennæ* liberæ, deflexæ, longitudine epistomatis, articulis basalibus parvis, ultimo maximo, compresso, trigoно, basi seta dorsali nuda, 3-articulata, articulo 2:do 1:mo duplo longiore. *Frons* sub prominens, subangusta, serie setarum non infra antennarum radicem continuata. *Epistoma* sub declivum, nudum. *Vibrissæ* nullæ. *Seta mystacina* utrinque tenuis. *Palpi* exserti, clavati. *Oculi* oblongi, nudi. *Thorax* ovatus, setosus. *Abdomen* elongatum, cylindricum, segmentis æque longis, margine apicali setosis. *Alæ* divaricatæ. *Nervi*: transversus ordinarius obliquus, rectus, paullo pone medium areæ apertæ insertus; longitudinalis 4:tus angulatim flexus paullo ante apicem alæ excurrens. *Spinula* costæ nulla. *Squamæ* magnæ, convexæ. *Color* niger. *Motus . . . . Habitatio . . . . Differentia sexus . . . .*

1. *L. fasciata*: nigra, nitida, capite albo; vitta frontali nigra; thoracis lateribus schistaceis; abdominis incisuris 2 mediis albis. ♀? (Long. 3½ lin. mens. Suec.).

Meig. Dipt. 4. 216. 1. t. 40. f. 4. & Meig. Dipt. 7. 210. 1. Macq. Buff. 2. 182. 1.

Hab. in Dania rarissime; ad Hæfniam a D. C. Drewsen semel inventa, teste D. Staeger; in reliqua Scandinavia hactenus non deprehensa, quantum noverim.

♀? Per antennarum articulum 3:tiū maximum, trigonum, 2:do quadrum longiore, & abdomen elongatum cylindricum, ab affinibus generibus mox dignoscitur. Caput album. Palpi nigri, apice rufi. Seta antennarum fere ad medium incrassata. Alae & squamæ hyalinæ. Halteres nigri. Tibiae posteriores ferrugineæ. Reliqua ut in diagnosi.

---

## 112. PHANIA Meig.

*Corpus minoris magnitudinis, oblongum, subsetosum. Antennæ epistomate paullo breviores, (in nostris) subincumbentes, articulo ultimo 2:do duplo longiore, plerumque angusto, compressu, obtuso, basi seta dorsali elongata, bi-articulata, subnuda, basi incrassata. Frons non prominens, angustissima (♂), aut modice angusta (♀), serie setarum tenuium infra antennarum basin haud descendente. Epistoma perpendicularē, nudum, vibrissis nullis. Os subreflexum, mystacinum. Palpi subclavati. Oculi magni, nudi, brunnei. Thorax & scutellum setosa, opaca. Abdomen ellipticum, nitidum, segmentis æque longis, 1:mo inermi, reliquis margine apicali parce setosis. Cauda longe inflexa. Alae hyalinæ. Nervi: transversus ordinarius (in nostris) subperpendiculär, rectus, in medio areæ apertæ insertus; longitudinalis 4:tus areuatim flexus in summo apice alæ excurrentis; longit. 3:tius inermis. Spinula costæ nulla. Segmenta costæ: 1:um elongatum; 2:dum brevissimum; 3:tiū longissimum, 4:um 1:mo duplo brevius. Squamæ magnæ, albæ. Pedum pulvilli medios, albi. Color (in nostris) niger. Pictura nulla; at in speciebus exoticeis abdomen plerumque ferrugineum, subdiaphanum; unde nomen generis. Motu agilis. Habitatio in floribus. Larvæ in Coleopterorum abdомine inventæ. Differentia sexus; mas: oculis subcohaerentibus ant anguste remotis, serie seterum frontalium utrinque simplici, cauda crassa, minus longe inflexa, pulvillis me-*

diocribus; *femina*: oculis modice remotis, serie setarum frontalium duplici, cauda longissime inflexa, cylindrica, pulvillis minutis.

1. *Ph. thoracica*: atra, nitida; thorace cinereo, opaco; capite albido. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 220. 4. ♂♀. Macq. Buff. 2. 184. 4. Zett. Ins Lapp. 629. 1. ♀. *Uromyia* Meig. Dipt. 7. 202. 1.

Hab. in foliis fruticum & floribus Umbellatarum, per Scandinaviam, 11 Jul.—1 Aug.—2 Sept., rarius; scilicet in Scania ad Räfsten prope Lund, Cel. D. *Dahlbom*; in Gotlandia ad Martebo 31 Jul. 1811; in Lapponia meridionali Umensi, nempe ad Wilhelmina & in monte subalpino Stöttingsfjellet; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*.

♂♀. Caput argenteum, levissime flavidoo-micans. Frons in ♂ modice angusta, in ♀ paullo latior, vitta in utroque sexu modice lata, atra. Antennæ nigræ, in ♀ nonnihil latiores. Palpi nigri. Thorax griseus, antiee obsolete fusco-4-lineatus, lineis mediis tenuissimis. Scutellum nigricans. Abdominis segmentum 1:mum 2:do fere longius, in margine apicali bisetosum. Reliqua segmenta apice parce setosa. Cauda in ♂ vix ultra segmentum 3:tium, in ♀ fere ad basin ventris inflexa. Alæ levissime fumato-hyalinæ, basi albicantes. Nervus long. 4:tus rotundato-arcuatus. Halteres sordide albi, fuscescentes.

2. *Ph. curvicauda*: atra, nitida; thorace nigro, opaco; capite argenteo. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 221. 5. ♂♀. t. 10. f. 10. ♂. Macq. Buff. 2. 184. 5. *Tachina* Fall. Muse. 17. 33. ♂♀. *Uromyia* Meig. Dipt. 7. 202. 2. t. 69. f. 1—5 & 6. ♂♀. *Tachina* Bohem. Act. Holm. 1828. p. 164—166.

Hab. in floribus Compositarum ut Chrysanthemi leucanthemi &c., etiam in Umbellatarum, per Sueciam meridionalis & mediae hortos & prata, 4 Jun.—6—9 Jul., minus frequens; scilicet in Scania ad Beckaskog, D. Fallén; in Smolandia, D. Boheman, qui plura specimina ex abdome *Harpali aulici* & *ruficornis* egressa obtinuit (cfr. Act. Holm. I. c.); in Ölandia ad Rella frequens, ♀ tamen rarer; in Gotlandia ad Gothem &c., passim.

♂♀. Similis priori, a qua vero magnitudine duplo minore, capite magis argenteo, minime flavidio-micante, fronte in ♂ multo angustiore, oculis nempe fere coherentibus, thorace in utroque sexu nigro, nec einereo, alis hyalinis vix fumatibus, ut & nervo long. 4:to arcuato minus rotundato, abunde distincta.

---

### 113. MICRA Zett.

*Corpus* parvum, oblongum, pubescens, subopacum. *Antennæ* incumbentes, breves, articulo ultimo 2:do parum longiore, subquadrato, compresso. *Os setulosum*. *Mystaces* & *vibrissæ*, nulla. *Frons* ante oculos minime prominens. *Proboscis* & *palpi*, retracta. *Oculi magni*, obscure brunnei, in ♂ approximati. *Abdomen* rotundato-ovatum, subdepressum, ano infexo, hamato (♂). *Alæ* longitudine abdominis, nervo longitudinali 4:to arcuatim flexo in summo apice alæ excurrente. *Area media* ocellata. *Color nigricans*. *Motus* agilis. *Habitatio* in Scandinavia septentrionali. *Differentia sexus*; *mas*: oculis in frontis postico approximatis; *femina*: ignota.

1. *M. Trixina*: nigricans, epistomate argenteo-micante; abdominis segmentis basi subcinerascentibus; squamis sub alis albidis. ♂. (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 631. 1. ♂.

Hab. in Nordlandia Norvegica rarissime; ad diversorum Björkvik prope Ofotenfjord d. 14 Jul. 1821 individuum unicum inveni.

♂. Nigricans, tota pubescens, seu pilosa, sed setis validis minime vestita. Antennæ epistomate triplo breviores, seta mediocri, subulata, basi articulata. Caput argenteo-micans, macula supra antennas triangulari nigra, pilosa. Thorax antice parum griseo-maculatus. Abdominis fasciæ subcinnereæ linea media nigra interruptæ. Alæ hyalinæ, nervo longitudinali 4:to in summo apice alæ, & mox intra apicem cum nervo long. 3:to confluente. Nervi transversi: ordinarius & apicalis recti. Squamæ sordide albidae. Halteres fusi. Pedes nigri, pilosi, non spinulosi.

---

## 114. OCYPTERA Latr.

*Corpus* mediæ aut minoris magnitudinis, elongatum, cylindricum, nitidum, valide setosum. Antennæ liberæ, deflexæ (sed non incumbentes), epistomate paullo breviores, articulo ultimo 2:do circiter duplo longiore, sublineari, compresso, apice subtus rotundato, basi superne seta triarticulata, nuda, articulis basalibus brevibus. Frons minus porrecta, nudice lata. Epistoma perpendicularare, nudum, vibrissis omnino nullis. Margo oris exsertus. Seta utrinque mystacina & setulæ sub ore adsunt. Palpi brevissimi. Oculi nudi, in utroque sexu fere æque remoti. Abdomen cylindricum, segmentis 1 & 2 æque longis. Alæ abdomine nonnihil breviores, area media occlusa, petiolata. Nervi longitudinales: 3:tius basi 2—4-setulosus, apice curvatum ad costam paullo ante apicem alæ inflexus; 4:tus angulatus. Nervi transversi aut inflexi, aut recti: ordinarius paullo pone medium areæ insertus. Segmenta costæ (cfr. *Nephrocerus* gen. 100 in nota): 1:mum longissimum, spinula nulla;

2:dum duplo brevius; 3:tiui longitudine fere 1:mi; 4:tum 2:do fere duplo brevius. Squaniæ magnæ, albæ. *Color niger*, abdominis lateribus rufis. *Motu* celerrima. *Habitatione* in floribus. *Larvæ* rhizophagæ putantur; an rite? Forte parasitæ vivunt. *Differentia sexus*; *mas*: fronte nonnihil angustiore, unguibus pulvillisque plerumque elongatis; *femina*: fronte nonnihil latiore, unguibus pulvillisque brevioribus. *Typus generis*: *O. brassicaria*.

A. Nervi alarum transversi: ordinarius & apicalis distincte inflexi. Frons nonnihil prominens. Species majores.

1. *O. brassicaria*: thorace cinereo, lineis 4 obscuris; capite argenteo; antennis totis, vitta frontali, pedibusque, atris; abdomine nigro, segmento 1:mo lateribus late, 2:doque toto, rufis; alis cinereis, basi flavidis. ♂♀. (Long. 4 lin.).

Fabr. Antl. 312. 1. Fall. Rhizomyz. 5. 1. ♂♀. Meig. Dipt. 4. 211. 2. t. 39. f. 29. & Ejusd. 7. 215. 2. Maeq. Buff. 2. 125. 2. ♂♀. *Musca cylindrica* Deg. Ins. 6. 30. 9. t. 1. f. 12. *Syrphus segnis* Panz. Fn. 22. 22. (exclus. syn. Linn.)

Var. b. ♂♀. abdominis segmento 2:do quoque linea media nigra.

Hab. in floribus Chrysanthemi, Eryngii &c., per Scandinaviam meridionalem & medium, 27 Jun.—7 Aug., passim; scilicet in Scania, Smolandia & Ostrogothia haud raro; in Ölandia ad Rella, &c.; in Gotlandia ad Fardhem, Nähr, Ahlskog, Gotheum, Kyllej, & Ruthe, copiose; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in silvis Daniæ circa Hafniam non raro, D. *Staeger*. — Var. b. ad Wastena Ostrogothiae.

♂♀. Caput albidum. Frons suborrecta, vitta sat lata, atra, serie setarum in ♂ simplici, in ♀ postice duplice; vitta ad antennarum basin extensa. Antennarum seta vix ad medium incrassata. Epistoma infra oculos descendens. Thorax subcærulescenti niger, antice in primis leviter albo-pollinosus, lineis 4 nigris, mediis angustis. Humeri & pleuræ, albida. Abdomen subincurvum, lateribus parce setosum. Segmenta 1 & 2 in medio marginis apicalis bisetosa; reliqua segmenta margine apicali setis circiter 8. Segmentum 3:tiū basi in illæsis individuis albo-nicat. Anus inflexus. Alæ fusco-cinereæ, basi & ad medium costæ, flavidæ. Nervus long. 4:tus infra angulum breviter, sed determinate continuatus. Pedes nigri, spinosi, tarsis in ♂ breviter setulosis, unguibus pulvillisque valde elongatis; tarsis in ♀ vix setulosis, unguibus pulvillisque brevibus.

*Obs.* *Musca brassicaria* Panz. Fo. 20. 20. cit. Fabr. hoc non pertinet; sed ad *Scævam Ocyti* nostram referenda.

2. *O. cylindrica*: thorace antice albido, lineis 2 obscuris; capite argenteo; antennis fuscis, articulo ultimo, vitta frontali, pedibusque, nigris; abdome nigro, segmentis 1 & 2 lateribus rufis; alis cinereis, basi flavidis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Fabr. Antl. 313. 2. Meig. Dipt. 4. 213. 4. ♂. 1. 39. f. 28. & Ejusdem 7. 215. 6. Maeq. Buff. 2. 186. 4. (*O. cylindrica* Fall. ad *O. interruptam* no 3 pertinet).

Hab. in Suecia media passim; scilicet in Ostrogothia ad Wadstena raro; at in Gotlandia ad Ruthe, Martlebo &c., mense Julio frequenter a me captata.

♂♀. Valde similis priori, differt vero certe: magnitudine constanter duplo minore, epistomate nonnihil minus porrecto, antennarum articulo 2:do apice fuso, vitta frontali, præsertim antice fusca, nec atra, thoracis fundo cinera-

scenti nigro, nec cærulescenti nigro, abdominis linea dorsali nigra segmenta 1 & 2, nec solum 1:mum, transiente, alarum nervis transversis nonnihil minus inflexis, ut & longitudinali 4:to vix infra angulum continuato.

B. Nervi transversi: ordinarius & apicalis recti.  
Abdomen basi angustatum. Frons haud prominens. Species minores.

3. *O. interrupta*: nigra, capite argenteo, antennis & vitta frontali atris; humeris albidis; abdominis segmentis 1 & 2 lateribus rufis; alis fumatis. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 213. 5. ♂♀. & Ejusdem 7. 215. 5.  
*O. cylindrica* Fall. Rhizom. 5. 2. ♂♀. certe.

Hab. in plantarum humiliorum floribus, locis aridis mihi præsertim obvia, per Sueciam meridionalem & in primis medium, mense Julio, passim; scilicet in Scania rarissime; in Ostrogothia ad Gusum (*Wahlberg*) & Lärketorp; in Westrogothia, D. *Dalman*; in Ölandia; in Gotlandia ad Ruthe, Gothem & Thorsborg, frequens. (E Glogavia ♂ a D. *Zeller* sine synonymia communicatus).

♂♀. A præcedente, cui similis est, statim dignoseitur: magnitudine sœpe duplo & ultra minore, fronte angustiore & minus porrecta, alis totis fumatis, costa præsertim infuscata, basi concoloribus, nervis transversis ordinario & apicali rectis, subperpendicularibus, ut & seta antennarum in ♂ apice sat distincte, incrassata seu subclavata. — Squamæ parvæ, integræ, albæ. Halteres nigricantes. Pedes parum spinulosi. *Mas*: tarsis validis, unguibus pulvillisque parvis: *femina*: antennarum seta basi incrassata, apice capillari, simpliei, cauda cornu curvo inflexa, tarsis validis, unguibus pulvillisque minutis.

4. *O. pusilla*: nigra, capite argenteo, antennis & vitta frontali atris; humeris albidis; abdominis segmentis 1 & 2 totis rufis; alis sumatis. ♀. (Long. 2--2½ lin.).

Meig. Dipt. 4. 214. 6. (exclus. syn. Fall. *Ocyptera cylindrica*, quæ ad speciem priorem pertinet). Ejusdem Dipt. 7. 215. 9. Macq. Buff. 2. 186. 6. ♂♀.

Hab. in Suecia media cum priori, 2 Jul.—14 Aug., minus frequens; scilicet in Ostrogothia ad Lärketorp, rarius; sed in Gotllandia ad Lummelund, Fårön, Furillen &c. frequenter a D. *Dahlbom* & me lecta.

♀. Simillima iterum feminæ prioris, sed differt abdominis segmentis 1:mo (ima basi excepta) 2:doque, totis rufis. Segmentum 3:tiū basi quoque sæpe rufescit. Abdomen subinerme, setis tantum 2 in singulo segmentorum 2 & 3. Anus cornu curvo inflexus. Nervus transversus apicalis levissime flexus, nec exacte rectus. Tarsi validi.

---

## 115. WAHLBERGIA Zett.

*Corpus minoris magnitudinis, oblongum, convexum, breviter pubescens, haud setulosum, nitidum. Antennæ liberæ, longitudine fere epistomatis, articulo ultimo 2:do duplo longiore, apice rotundato, basi seta triarticulata, nuda, articulis basalibus brevibus; ad medium incrassata. Frons parum prominula, lata, vitta lata, serie utrinque pilorum brevium (nec setarum) simplici ad antennarum basin continuata. Epistoma perpendiculare, infra oculos nonnihil descendens, nudum. Vibrissæ nulæ; at setæ mystacinæ haud validæ & pili sub ore adsunt. Os vix exsertum. Oculi mediocres, nudi. Abdomen ellipticum, convexum, subcylindricum, punctulatum, nitidum, pubescens, sed omnino inerme,*

segmentis 4 æque longis, arete cohaerentibus. Alæ abdome non longiores, inermes. Nervi ut in *Ocyptera* directi; at nervi longitudinales: 3:tius omnino rectus proprius ad apicem seu fere in apice alæ excurrens, & 4:tius magis arcuatim-angulatus, nec angulo subacuto, versus 3:tiuum haud procul ab apice alæ curvatus; hinc area haud longe petiolata. Nervus transversus ordinarius subrectus in medio, nec pone medium, areæ insertus. Squamæ medioreres. Pedes validiusculi, pubescentes, non setosi. *Color* nigricans, abdome rufescente. *Motu* agilis. *Habitatio* in floribus. *Differentia sexus*; *mas*: fronte modice lata, cauda rotundato-ovata, biarticulata, inflexa, unguibus pulvillisque parvis; *femina*: fronte paullo latiore, cauda subcylindrica, elongata, inflexa, bimarginata, nitidissima \*), unguibus pulvillisque minutis.

**1.** *W. melanura*: alra, nitida; capite argenteo, antennis nigris; vitta frontali thoracisque vittis anticis canis; abdominis segmentis tribus anticis rufis; alis ferrugineo-cinereis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Tachina* Meig. Dipt. 4. 286. 81. ♂? *Gymnosoma* Meig. Dipt. 7. 207. 3. *Ocyptera lateralis* Fall. Rhizom. 6. 3. ♂.

Hab. in Sueciæ meridionalis floribus, locis aridis, 2—23 Jul., rarissime; scilicet in Scania ad diversorium Weberöd, D. Mag. E. Rosenschöld; ad Raflunda, Cel. D. Dahlbom; ad villam Esperöd in parœcia Mellby utrumque sexum ipse deprehendi.

♂♀. Parva. Caput in illæsis individuis argenteum, sed in detritis frons atra, nitida, colore tamen cano in vitta tenacius adhærente. Setæ mystacinæ nigrae. Barba brevis

\*) in Dispositione p. 51 lin. 10 dicitur: ♂, lege: ♀.

sub ore alba. Thorax in exemplis bene conservatis antice canus, vittis 4 nigris, quarum 2 intermediis angustissimis; sed in detritis fere totus niger, humeris tamen plerunque canis. Scutellum apice setulosum. Abdomen rufo-ferrugineum, segmento 4:to toto nigro. In segmento 3:to saepe etiam punctum medianum nigrum cum nigredine marginis apicalis confluens. Rarissime quoque punctum medium nigrum in segmento 2:do adest. Cauda analis jam nigricans, jam picea, jam rufescens. Alae einereæ, nervis basi ferrugineis. Nervus transv. ordinarius leviter flexus. Squamæ albidae. Halteres flavi, clava fusca.

*Obs.* Genus nomine Dipterologi Scandinaviae meritissimi, Celeb. Professoris & Equitis *Wahlberg* jure ornatum. — Nomen specificum Fallenianum originarium, quod conservandum alias semper sancte existimo, in novum Meigeniarum mutare coactus fui, ne cum *Tachina laterali* subsimili confundetur species nostra. — Specimen, secundum quod Clar. *Meigen* l. c. suam descriptionem hujus speciei confecit, detritum masculum fuisse videtur. — Specimen femineum, paullo minus, vitta frontali abdomineque atris, segmentis 1 & 2 rufis, linea dorsali nigra, alarum nervo long. 4:to subangulatim flexo, ut & area brevius petiolata, de cetero *W. melanuræ* simillimum, e Glogavia a D. Zeller missum numer per accepi, certe hujus generis; sed alia species, cui nomen *W. dimidiata* proponerem.

---

## 116. GYMNO~~S~~OMA Fall.

*Corpus* minoris magnitudinis, rotundato-ovatum, glabriulum, nitidum. Antennæ liberæ, longitudine epistomatis, articulo ultimo 2:do vix dimidio longiore, linearis, subobtuso, basi seta dorsali triarticulata, articulis basalibus brevissimis; nuda, fere ad medium incrassata. Frons leviter prominula, lata, serie pilorum brevium utrinque ad antennas continuata. Epistoma perpendicularē, nudum, setulis oris

paeis & brevissimis. Os vix exsertum. Oculi mediocres, nudi, rufo-brunnei, unicolores. Abdomen rotundatum, convexum, fornicatum, glabrum, nitidum, punctatum, segmentis æque longis. Alæ inermes. Nervi longitudinales: 3:ius rectus, fere in summo apice alæ excurrens; 4:tus arcuationis angulatus. Nervus transversus ordinarius leviter flexus, aut rectus; paullo pone medium areæ insertus. Area breviter petiolata. Squamæ mediocres. Pedes validiusculi, mutici. Color nigricans, abdomine rufescente. Motu agilis, non vero celerrima. Habitatio in floribus, ab uno ad alterum cito volando. Differentia sexus; mas: fronte modice lata, pulvillis non magnis: femina: fronte latiore, pulvillis paullo minoribus. Anus in utroque sexu parvus, parum insensus. Typus generis: *Gymnos. rotundata.*

1. *G. rotundata*: nigra, capite flavicante ( $\delta$ ), aut albo ( $\varphi$ ); vitta frontali ferruginea; thoracis antico pallido ( $\delta$ ), obscure vittato; abdomine rufo, maculis dorsalibus nigris; alis fumatis, basi flavis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$ —fere 3 lin.).

*Mas*: oculis modice remotis, fronte flava, vitta ferruginea, thorace antice flavidio-pollinoso, abdomine rufo, maculis 4 subrotundis in serie dorsali positis, discretis, nigris;

*Fem.*: paullo major, oculis nonnihil latius remotis, fronte albida, vitta lata, ferruginea, thoracis humeris albido-pollinosis, abdomine rufo, maculis 4, quarum antieis 3 triangularibus, coherentibus, & ultima saepius parva, rotundata, discreta, nigris; in copula.

Fall. Rhizom. 9. 1.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 4. 204. 1.  $\delta\varphi$ . t. 39. f. 21.  $\delta$ . & Ejusdem Dipt. 7. 207. Macq. Buff. 2. 189. 1.  $\delta\varphi$ . t. 15. f. 5.  $\delta$ . — Zett. Ins. Lapp. 628. 1.  $\delta\varphi$ . *Musca* Linn. Fn. Su. 1838.  $\delta\varphi$ . Panz. Fn. Germ. 20. f. 19.  $\delta$ . Ross. Fn. Etr. 466. 1502.  $\delta\varphi$ . *Tachina* Fabr. Antl. 311. 12.

Var. b. ♀. minor, abdomine nigro, lateribus inæquilater anguste ruso-ferrugineis; alias var. a. simillima. *G. costata* Meig. Dipt. 4. 205. 2. ♀. — *Musca costata* Panz. Fn. Germ. 73. f. 23. ♀.

Hab. in floribus Umbellatarum ut Pimpinellæ nigræ, Dauci &c., & Compositarum ut Chrysanthemi, Achilleæ &c.; per Scandinaviam meridionalem & medium, 1 Jul. — 14 Sept., vulgaris, ad versuras agrorum præcipue obvia, in copula deprehensa; scilicet in Scania ad Röstångæ, Tranås, Kivik, Esperöd &c., haud rara; in Smolandia, D. *Ljungb.* in Ostrogothia ad Wadstena, Omberg, Godegård, Gusum &c., frequens; in Gotlandia ad Stenkyrka, Storungs, Ruthe, Fårön, Kyllej, Ahlskog &c., copiose; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Helsingia ad diversorium Stråtjära, rarius; in Dania haud infrequenter, D. *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

♂♀. *Musca domestica* paullo brevior, at latior. Palpi flavi. Antennæ nigræ, articulo ultimo basi macula rufa. Barba menti & occipitis, brevis, alba. Series pilorum frontaliū in ♂ simplex, in ♀ pustice subduplex. Thorax punctatus; in ♂ postice niger, antice opacus, flavus, lineolis 4 nigris; in ♀ totus niger, nitidus, humeris flavidis l. albidi. Pleuræ cinereæ. Scutellum lineola cinerea (♂), aut puncto apicis cinereo (♀). Squamæ & halteres, albidæ l. flavidæ. Reliqua ut in diagnosi. — Variat ♂ abdominis segmento ultimo maculis tribus nigricantibus. — In varietate b., quam in Ostrogothia cum var. a. haud raro inveni, abdomen nigrum, rufedine laterali sœpe fascias 4 interrupatas, intus valde angustas formante, ut in figura Panzeri. E Wienna Austriae eadem quoque a D. *Andersch* missa; mus. D. *Fallenii*. Formæ transientes ab a. ad b. dantur.

## 117. CISTOGASTER Latr.

*Corpus* parvum, rotundato-ovatum, glabrum, nitidum. Antennæ deflexæ, subincumbentes, epistomate dimidio breviiores, articulo ultimo 2:do parum longiore, ovato-quadrato, basi seta dorsali 3-articulata, articulis basalibus brevissimis; nuda, vix ad medium incrassata. Frons sub prominula, parum lata, vitta angusta, serie pilorum brevissimorum ad antennarum basin continuata. Epistoma perpendicularare, nudum, pilis oris, loco mystacium, paucissimis, tenuissimis. Palpi breves, subfiliformes, pilosuli. Os vix exsertum. Oculi sat magni, nudi, in utroque sexu subæque remoti. Abdomen rotundatum, fornicatum, punctatum, segmentis æque longis, incisuris parum perspicuis. Anus parvus, leviter inflexus. Alæ, etiam quoad nervorum directionem, ut in *Gymnosoma*, at nervus transv. ordinarius fere in medio areæ insertus. Nervus long. 5:tus usque ad marginem alæ extensus. Squamæ majuscule. Pedes validi, mucosi. *Color, motus, habitatio & differentia sexus* ut in *Gymnosoma*. Typus generis: *C. globosus*.

1. *C. globosus*: niger, nitidus, capite flavido (♂), aut albo (♀); thoracis antico pallido (♂); abdomine rufo, apice nigro-maculato (♂), aut toto atro (♀). ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin.).

*Mas*: niger, capite albo, fronte flava, vitta angustissima, nigra; thoracis antico flavo; abdomine rufo-ferrugineo, maculis dorsalibus nigris, versus apicem sensim majoribus; ano infexo;

*Fem.*: nigra, capite albo, fronte saepius detrita atra, vitta angusta, nigra; humeris cinereis; abdomine atro; in copula.

Macq. Buff. 2. 190. ♂. Meig. Dipt. 7. 207. I. t. 69. f. 25. ♂. *Tachina globosa* Fabr. Antl. 311. 13. ♂. *Gymnosoma* Meig. Dipt. 4. 206. 3. t. 39. f. 22. ♂. *Gymnos.*

*dispar* Fall. Rhiz. 9. 2. ♂♀. *Cistogaster ovata* Macq.  
Buff. 2. 190. 2. ♀.

Var. b. ♀. abdomine basi macula utrinque ferrugineo-flava. In Gotlandia.

Hab. in floribus Umbellatarum ex. gr. Dauci, Pimpinellæ nigræ &c., atque Compositarum ex. gr. Achilleæ Millefolium, Chrysanthemi leucanthemi. Matricariæ &c., per Succiam medium, 12 Jul.—4 Aug., minus frequens, in copula sæpe capta; scilicet in Ostrogothia ad Wadstena, Löfsvingsborg prope Skenninge, Högby, Gusum &c.; in Gotlandia ad Ruthe (ubi in Pimpinella nigra d. 15 Jul. 1819 uterque sexus in copula junctus copiose deprehensus), &c.; in Sudermannia, D. *Wahlberg*.

♂♀. Pictura (in ♂) & habitu *Tachinæ pellucenti* n:o 81 valde similis, sed magnitudine minore, antennis adhuc brevioribus, capite corporeque glabrioribus, area alarum oclusa, nec apice aperta, abunde dignotus. — Frons in utroque sexu angustata. Antennarum seta ut mihi videtur 3-articulata, articulo ultimo basi incrassata. Palpi flavi. Proboscis obscura. Barba menti brevissima, alba. Scutellum nigrum. Alæ cinereæ, basi flavicantes. Squamæ subflavidæ (♂), aut albidae (♀). Reliqua ut in diagnosi l. descriptione generis.

## 118. RHINOPHORA Meig.

*Corpus* parvum, subcylindricum, setosum, subnitidum. *Antennæ* incunibentes, epistomate dimidio breviores, articulo ultimo 2:do parum longiore, basi seta dorsali subnuda s. brevissime puberula, basi incrassata. *Frons* subprominna, modice lata, serie setarum sat validarum fere infra antenarum basin continuata. *Epistoma* breve, perpendicularare, ad latera juxta oculos distincte setulosum, vibrissis nullis.

**O**s antice reflexum, setis utrinque mystacinis distinctis, & infra setulis pluribus armatum. Palpi parvi, subelavati, apice pilosi. Oculi rotundati, nudi. Abdomen subcylindricum, lœve, pubescens, segmentis æque longis, 1 & 2 in medio marginis apicalis bisetosis, 3 & 4 margine apicali multisetosis. Alarum nervi longitudinales: 3:tius rectus, fere in summo apice alæ excurrens, basi setulis 4–6; 4:tus subrectangulatim flexus, sat longe infra apicem alæ ad 3:tiuum curvatus; hinc area media (in nostris) longe petiolata. Nervi transversi: medius apiei nervi longitudinalis 1:mi oppositus; ordinarius subrectus, in medio areæ occlusæ insertus; apicalis subrectus. Segmenta costæ (cfr. *Nephrocerus* gen. 100 in nota) breviter ciliatae: 1:mum modice longum (circiter ad 4:tam partem totius alæ extensem), apice (in nostris) spinula subgemina; 2:dum brevissimum; 3:tiuum longitudine 1 & 2 simul sumtorum; 4:tum 1:mo fere dimidio brevius. Squamæ non magnæ. Pedes mediocres, setosi. *Color* niger. *Motu* agilis. *Habitatio* in floribus & truncis arborum. *Differentia sexus*; *mas*: fronte modice lata, abdomine subcylindrico, ano obtuso, tarsis breviter pilosis, unguibus pulvillisque parvis; *femina*: fronte non-nihil latiore, abdomine elliptico s. conico, ano acutiori, tarsis non pilosis, unguibus pulvillisque minutis. *Typus generis*: *Rh. umbratica*.

1. *Rh. umbratica*: nigra, epistomate subargenteo-micante; alis hyalinis, nervis fuscedine cinctis, transverso ordinario recto; squamis albis. ♂♀. (Long. circiter 2 lin.).

*Ocyntera* Fall. Rhizomyz. 7. 6. ♂♀. originaria. — *Tachina* Meig. 4. 287. 83? ♂♀. *Ptilocera* Macq. Buff. 2. 171. 7. *Leucostoma* Meig. Dipt. 7. 212. 10?

Hab. in Umbelliferis & truncis arborum viventium, per Sueciam meridionalem & medium, 10 Jun.—2 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd,

Christinehof &c., frequens; in Ostrogoth. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia, ipse.

♂♀. Nigra, capite plumbeo. Epistoma infra oculos rotundos descendens, lateribus setosum. Vitta frontalis modice angusta, atra, serie setarum utrinque in ♂ subsimplici, in ♀ postice subduplici, in utroque sexu per setas 1 l. 2 infra antennarum radicem descendente. Antennæ totæ nigræ, articulo 2:do superne setuloso. Palpi flavi, apice fusi. Thorax omnium levissime albido-submicans. Abdominis incisuræ 2 & 3 in bene conservatis individuis angustissime albo-micantes. Alarum nervi præsertim ad basin & costam fuscedine perspicue cincti. — Squamæ parvæ, albæ. Halteres testacei, clava fusca.

*Obs.* *Leucostoma umbratica* Meig. l. c. videtur aut alia species, aut cum *Rhinophora* (*Leucostoma nobis*) *maculata* commixta. Meigeni caracter (in suppl. 7 allatus) generis *Rhinophoræ* in *umbraticam* nostram incidit, & is *Leucostomæ* vice versa in *maculatam* nostram cadit. Forte igitur hæ duæ species per cofusionem ad contraria genera a D. *Meigeno* relatæ.

2. *Rh. hyalinata*: nigra, epistomate subargenteomicante; alis hyalinis, immaculatis, nervo transverso ordinario leviter flexo; squamis albis. ♂. (Long. sere 2 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Lund mense Julio specimen descriptum inveni.

♂. Simillima priori; sed magnitudine paullo majore, alarum nervis non infuscatis & transverso ordinario leviter flexo, dignoscitur. Apertura oris rufescens. Alæ hyalinæ, interstitio inter nervum costalem & longitudinalem 2:dum leviter fumato. Reliqua ut in præcedente.

## 119. LEUCOSTOMA Meig.

*Corpus* parvum, subcylindricum (in *L. venosa* ovatum), setosum, nitidum. Antennæ cum seta ut in *Rhinophora*. Frons non prominens, modice lata, serie setarum sat validarum fere infra antennarum basin continua. Epistoma breve, perpendicularare, nudum. Vibrissæ nullæ. Os non reflexum (in *L. ænescente* antice reflexum), omnino ut in *Rhinophora* setosum. Oculi rotundati (in *L. simplici* magni oblongi), nudi. Abdomen omnino ut in *Rhinophora* constructum & setosum, (in *L. venosa* rotundatum, undique setulosum). Alarum nervi quoque omnino ut in *Rhinophora* (sed in *L. simplici* spinula costæ nulla, & in *L. venosa* area breviter petiolata). Squamæ parvæ (in *L. simplici* magnæ). Pedes medioeres, setosi. Color niger. Motu celer. Habitatio in floribus & truncis arborum. Larvæ quarundam in Coleopterorum & Hemipterorum visceribus parasitæ. Differentia sexus ut in *Rhinophora*, a qua: fronte minime prominente, epistomate nudo seu ad latera non setuloso, ut & ore saepissime non prominente, distinguitur. Typus generis: *L. maculata*.

A. Alarum spinula costæ adest. Squamæ sub alis parvæ.

\* Abdomen subcylindricum, segmentis aequis longis, marginæ apicali parce setosis.

1. *L. maculata*: nigra, nitida, capite argenteo-micante; antennis medio ferrugineis; alis cinereis, macula costali versus apicem magna, fusa. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Ocyptera* Fall. Rhizom. 6. 5. ♂♀. originaria. — *Tachina* Meig. Dipt. 4. 286. 82. ♀. *Ptilocera* Macq. Buff. 2. 151. 8. ♀. *Rhinophora* Meig. Dipt. 7. 210. 1. (cfr. quod in nota sub *Rhinophora umbratica* dicitur).

Hab. in floribus; truncis arborum viventium saepe insidens; per Scandinaviam meridionalem & medium, 20 Jun.—11 Aug., passim, in copula multoties deprehensa; scilicet in Scania ad Esperöd, haud rara; in Westrog., D. *Gyllenhal*; in Ostrogoth. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia; in Gotlandia ad Ejsta, Garde, Wamlingbo, Rhone, Thorsborg, Stenkyrka, &c., frequens; in Dania circa Hafniam, D. *Staeger*.

$\delta\varphi$ . Nigra. Caput glauco-argenteum, antice convexum. Vitta frontalis angustata, nigro-brunnea, serie setarum omnino ut in *Rhinoph. umbratica*. Antennæ brevissimæ, seta nuda I. microscopice puberula, imo basi incrassata. Epistoma breve, nudum. Os non reflexum. Setæ mystacinae & setæ sub ore plures sat validæ adsunt. Palpi filiformes, fusci. Thorax & abdominis incisuræ ad latera certo situ glauco-micant. Alæ albido-cinereæ, macula pone medium magna, fusca, ad costam dilatata, versus medium evanescente, nervum tamen transv. ordinarium semper transeunte. Squamæ albidae. Halteres testacei, clava fusca. Pedes nigri, coxis anticis saepe piecis. — Nervus transv. ordinarius mox ante medium areæ insertus.

2. *L. brevicornis*: ænescenti nigra, nitida, capite argenteo-micante; antennis medio ferrugineis; alis cinereis, costa postice fusca; squamis albis, fusco-marginatis.  $\delta\varphi$  (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia media rarissime; scilicet  $\delta$  e Smolandia a D. *Bohemian* 1835 missus;  $\varphi$  in monte insigni Omberg Ostrogothiae Jul. 1828 a me inventa.

$\delta\varphi$ . Simillima priori, sed magnitudine triplo I. quadruplo minore, corpore nigro leviter metallicè nitente, alarum macula costali fusca usque ad summum apicem dilatata, squamis albis anguste fusco-maculatis, ut & pedibus præsertim

basi & coxis livido-piceis, distincta. *Mas* paullo angustior, oculis subapproximatis, vitta frontali angustiori, atra, & ano subinfuso.

3. *L. ænescens*: ænescenti nigra, nitida, capite plumbeo; ore subreflexo; antennis nigris; alis cinereis, immaculatis; squamis albis. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Hab. in graminosis, silvaticis, per Sueciam meridionalem, 10 Jul.—16 Aug., minus frequens; scilicet in Scania: ad Rästen prope Lund, D. *Dahlbom*, ad utrumque Esperöd, ipse.

♂♀. *L. maculata* valde similis & affinis, sed magnitudine sæpe paullo minore, fronte anterius magis depressa, nec convexa, antice leviter prominente, antennis nonnihil longioribus, totis nigris, fere ad os antice subelevatum extensis, palpis nigris, alis cinereis, immaculatis, nervo transv. ordinario in medio, nec mox ante medium, areæ inserto, petiolo areæ breviori, ut & coxis nigris, nec piceis, abunde distincta. Similis quoque videtur Meigeni *Tachinæ* (*Leucostomæ*) *lepidæ*, & *Dexiæ* (*Rhinophoræ*) *nigranti*, sed ab illa colore corporis ænescenti nigro, nec "atro", abdomine immaculato, vix "fasciis duabus albis", ut & oculis maris anguste remotis, nec "cohærentibus"; & ab palpis nigris, nec "albis", ut & alis subhyalinis, nec "dimidiato-fuscis" facile dignota. — Seta antennarum microscopice puberula. Halteres toti flavi. Abdominis segmenta 2, 3 & 4 basi in illæsis individuis certo situ glauco-micanitia. Reliqua ut in *L. maculata*. — Variat rarissime nervo transverso apicali in medio extus nervulo appendiceo aucto.

\*\*) Abdomen (♀) rotundato-ovalum, segmentis in medio & apice scutulosis.

4. *L. venosa*: nigra, nitida, epistomate squamisque albis; alis leviter fuscans, margine interiori cinereo-hyalino; area media breviter petiolata. ♀. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 7. 212. 11? *Tachina* Ejusdem 4. 288.  
86? ♀.

Hab. in Suecia rarissime, in Scania semel capta; in Ölandia 10—11 Jul. 1819 ad Gärdslösa & Galltorp 3 specimen inveni; ut incola Ölandica etiam a D. *Bohemian* 1835 missa.

♀. Parva, ovata, nigra, nitida. Frons latiuscula, minime prominula, nigra, nitida (an detrita?), vitta mediocri, atra. Antennæ breves, seta nuda s. microseopice puberula. Epistoma brevissimum, nudum, album. Os non reflexum; setosum. Abdomen rotundatum, convexum, segmentis: 1:mo brevi, inermi, reliquis in medio & margine apicali setulosis. Alæ fuscanæ, margine interiori subhyalino. Nervi transversi subrecti, horum ordinarius in medio l. mox pone medium areæ insertus. Areæ petiolus brevis. Spinula costæ parva. Squamæ mediocres, albæ. Affinis videtur *Tachinæ gagatinæ* & *phæopteræ* Meig.

B. Alarum spinulae costæ nulla. Squamæ sub alis magnæ.

5. *L. simplex*: atra, nitida, capite squamisque albis; alis albescentibus; ano alterius sexus hamato. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

Meig. Dipt. 7. 212. 4. *Ocyptera* Fall. Rhizom. 8. 10. ♂♀. originaria. — *Tachina* Meig. Dipt. 4. 289. 89. ♂♀. *Melanophora* Maeq. Buff. 2. 178. 19. ♂♀.

Hab. in pratorum floribus Compositarum ut Chrysanthemi leucanthemi &c., per Sueciam meridionalem & medium, 29 Jun.—30 Jul., passim; scilicet in Scania ad Esperöd, rarius; in Smoländia & Westrogothia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Wadstena, Lärketorp, Gusum

&c., passim; in Calmaria ad Berga; in Ölandia ad Rella & Gårdslösa; in Gotllandia ad Garde, Gothem Ruthæ &c., frequens; ad Holmiam, D. Haeffner. (E Wienna Austriae per D. Zeller eliam communicata).

$\delta\varphi$ . Parva, ovata, atra, nitida. Caput album. Frons non prominens, postice subangustata ( $\delta$ ), aut tota lata ( $\varphi$ ), vitta modice lata, atra; setæ utrinque in  $\delta$  tenues, simplici serie, in  $\varphi$  validiores, postice duplii serie, dispositæ. Antennæ nigrae, articulo 2:do fuseo; seta nuda. Os minime reflexum. Palpi flavi. Oculi magui, brunnei. Abdomen ellipticum, segmentis æque longis, 1:mo inermi, reliquis in margine apicali parce setosis. Alæ albidae, nervis tenuibus, pallidis, ut in *L. aenecente* directis, sed petiolo areæ proportione nonnihil longiore. Spinula costæ nulla. Squamae niveæ, superior parva, inferior magna, fornicate. Halteres nigricantes. Pedes nigri, unguibus pulvillisque in utroque sexu parvis. Anus in  $\varphi$  forifice nigra ut in genere Meigeniano *Labidigaster*, appendiculatus, cum quo vero ob oculos nudos, nec hirtos, alarum area oclusa, nec aperta, &c., non confundi potest haec species.

## 120. MELANOPHORA Meig.

*Corpus* parvum, cylindricum, setosum, nitidum. Caput erubre setosum. Antennæ incumbentes, epistomate plus quam dimidio breiores, articulo ultimo longitudine 2:di, basi seta dorsali distincte pubescente, basi incrassata. Frons minus prominula, latissima, serie setarum utrinque duplii. Epistoma breve, latum, nudum. Os subexsertum. Mystacæ & setæ sub ore plures. Palpi breves. Oculi rotundi, nudi. Abdomen ut in *Rhinophora* constructum & setosum. Alæ subangustæ. Nervi longitudinalis: 3:tius nudus, rectus fere in apice l. mox ante apicem alæ excurrens; 4:tius subangulatim flexus longe intra apicem alæ versus 3:tium eur-

vatus; hinc area longe petiolata; 5:tos usque ad marginem extensus. Nervi transversi: medius & ordinarius approximati, hic scilicet rectus ante medium areæ insertus. Segmenta costæ ut in *Rhinophora*, sed costa vix ciliata & spinula nulla. Squamæ parvæ. Pedes mediocre, parum setosi, unguibus pulvillisque in utroque sexu minutis. *Differentia sexus*; *mas*: abdomine cylindrico, ano obtuso, alis (in nostra) nigris, unicoloribus; *femina*: abdomine conico, alis (in nostra) nigris, puncto apieis albo. *Typus generis*: *M. roralis*, quæ antennarum seta perspicue pubescente, alarum nervis transversis mediis approximatis, petiolo areæ longiore, ut & squamis parvis, a proxime præcedentibus facile dignoscitur.

I. *M. roralis*: alra, nitida; alis squamisque nigricantibus; illis apice in ♀ albis. ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin).

Meig. Dipt. 7. 213. I. t. 69. f. 46. ♂. Macq. Buff. 2. 178. 17. *Musca* Linn. Fn. Su. 1846. ♂. Schrank Enum. Austr. 463. 911. ♂. Fabr. Antl. 301. 102. ♂. *Tachina* Meig. Dipt. 4. 281. 79. ♂♀. *Ocyptera* Fall. Rhizom. 7. 7. ♂♀. *Musca grossificationis* Linn. Fn. Su. 1865. ♀. Rossi Fn. Etr. 2. 480. 1533. ♀. Schrank Enum 470. 954. ♀. *Tephritis* Fabr. Antl. 321. 42. ♀.

Hab. in parietibus & truncis arborum, præsertim vero in fenestris, per Scandinaviam meridionalem & medium, 8 Jun. — tota æstate — 20 Sept., vulgatissima, in copula; scilicet in Scania ubique frequens; in Smolandia & Ostrogothia mibi non raro obvia; in Ölandia ad Borgholm &c.; in Gotlandia ad Wisby, Nähr, Thorsborg, &c., haud parce; in Uplandia ad Holmiam & in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; supra has provincias non nisi rarissime occurrit; in Dania ad Hafniam non rara, D. *Staeger*. (In Moabite prope Berolinum atque

in Helgolandia a D. *Dahlbom* lecta. E Glogavia par in copula junctum a D. *Zeller* missum).

♂♀. Tota atra. Caput nigricans. Oculi ferruginei, in utroque sexu late & æque remoti, vitta modice lata, atra. Antennæ brevissimæ. Alæ nigræ ad basin albo-punctatæ, & in ♀ macula apicis alba. Squamæ & halteres nigricantia. Pedes parum setosi. — In junioribus individuis sternum & pedes sæpe livido-picea.

---

## 121. SCOPOLIA Meig \*)

*Corpus minoris magnitudinis aut parvum, subcylindricum, nitidum, setosum. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis, articulo ultimo 2: triplo longiore, basi seta dorsali nuda, fere ad medium inerassata. Frons minus prominula, lata, serie setarum utrinque dupliei, & infra antennarum basin in lateribus faciei usque ad os simpliciter descendente, vibrissas in epistomate mentiente. Epistoma subperpendiculare, aut subdeelivum. Os non reflexum. Mystacæ, & setæ sub ore, plures. Palpi distincti. Oculi mediocres, nudæ. Abdominis segmenta: 1:um breviusculum, inerme, 2:um apice bisetosum, reliqua in disco & margine apicali setosa. Alarum nervi longitudinales: 3:ius rectus, mox ante apicem alæ excurrens, basi a radice usque ad nervum transvers. medium setulosus; 4:tus angulatim flexus. Nervi transversi: ordinarius (in *S. picta* flexus) rectus, in medio areæ insertus, apicalis leviter incurvus. Petiolus areæ modice longus. Segmenta costæ ut in *Rhinophora*; spinula distincta.*

---

\*) *Scopolia* quoque est nomen antiquius plantæ generis, ergo in Dipterologia haud bene ferendum. Retineo tamen ne novo augeatur synonymia.

*Squamæ mediocres. Color ater. Motu agilis. Habitatio* in graminosis & campis arenosis, in terra nuda, arida saepe insidens aut celeriter ambulans. *Differentia sexus vix nisi* in abdomine maris cylindrico, ano obtusiore, tarsis anticis tenuibus, & feminæ abdomine subconico, ano acutiore, tarsis anticis nonnihil crassioribus, quærenda. Typus generis: *Sc. carbonaria.*

\*). Antennæ subangustatæ, lineares.

1. *Sc. carbonaria*: æneo-nigra, epistomate argenteo-micante; antennis linearibus, fuscis; palpis flavis; alis nigricantibus, margine interiori squamisque albidis; nervis transversis validis, apicali leviter incurvo. ♂♀. Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Meig. Dipt. 7. 252. 4? *Musca* Panz. Fn. Germ. 51.  
15. *Ocyptera* Fall. Rhizom. 8. 9. ♂♀. vera. — *Tachina* Meig. Dipt. 4. 420. 315? Maeq. Buff. 2. 176. 9?

Hab. in campis arenosis, terræ saepe insidens, per Sueciam meridionalem & medium, 14 Maj.—15 Sept., vulgaris; in copula saepe deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Kjefliøge, Lomma, Abusa, Björnstorps, Silfåkra, Esperöd &c., sat frequens; in Smolandia; in Westrog., D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Lärketorp & Gusum; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; sed supra Uplandiam versus septentrionem vix procedens; in Dania, D. *Westermann*. (E Glogavia a D. Zeller sub eodem nomine missa).

♂♀. Parva, atra, æneo-micans. Frons argenteo-micans, vitta latiuscula, atra. Seta antennarum, ni fallor, 3-articulata, articulis basalibus brevibus. Epistoma ad latera per totam longitudinem setis validis loco vibrissarum ornatum. Antennarum articulus 2:dus piceus. Thorax in illæsis levissi-

me cinereo-micans. Alæ hyalinæ, costa nigricante, nervis transversis fuscedine cinctis; horum ordinario recto, apicali incurvo. Squamæ albæ. Pedes nigri, setosi, unguibus pulvillisque in utroque sexu parvis, tarsis anticis in ♀ nonnihil crassioribus.

*Obs.* Meigeni *Tach. carbonaria* l. c., "corpore atro & nervis transversis rectis" a nostra differt.

2. *Sc. costata*: aterrima, epistomate argenteomicante; antennis linearibus, nigris; palpis flavis; alis hyalinis, costa anguste nigricante, nervo transverso apicali leviter flexo; squamis albis. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 7. 252. l. t. 71. f. 46? (alis nimis obscuris). — *Ocyptera* Fall. Rhizom. 8. 8. ♀. originaria. — *Tachina* Meig. Dipt. 4. 419. 314? ♀.

Hab. in graminosis & campis arenosis, terræ nudæ sæpe insidens, per Scandinaviam, 24 Maj.—15 Jul., passim; in copula pluries deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Kjeflinge, Abusa, Björnstorps, utrumque Esperöd, &c., sat frequens; in Westrogothia, D. Boheman; in Ostrogothia ad Gusum, D. Wahlberg, & Lärketorp rarissime, ipse; in Norvegia ad Thynæs in parœcia Skogn, D. Dahlbom.

♂♀. Similis & affinis priori, sed magnitudine paullo majore, colore corporis cærulescenti atro, nec æneo-micante, antennis præsertim in ♂ paullo validioribus, ut & alarum costa angustius nigricante, interdum leviter tantum fuscana, & nervis transversis fuscedine haud cinctis, vere distincta. Antennarum seta biarticulata videtur? Nervi transversi subrecti, apicalis plerumque levissime flexus.

*Obs.* Meigeni *Tach. costata* l. c. "palpis nigris, & nervo transverso recto", a Falleni & nostra differt. Ergo dubia.

3. *Sc. picta*: nigra, epistomate inferne argenteo-, superne subrufescenti micante; antennis sublinearibus, basi ferrugineo-maculatis; palpis rufescentibus; abdomine utrinque macula basali, femoribusque, rufis; alis fuscocrescentibus, squamis flavidis. ♀? (Long. circiter 2 lin.).

Wahlb. in litt. 14 Sept. 1813. (An *Scop. rufipes* Meig. Dipt. 7. 252. 8? "nigra, femoribus rufescentibus" — *Melanophora rufipes* Macq. Buff. 2. 176. 12?).

Hab. in Botnia boreali rarissime; in floribus Pyrethri inodori ad pagum Bredåker in parœcia ÖfverLuleå d. 25 Aug. hujus anni (1813) a Cel. Prof. *Wahlberg* in unico specimine forte semineo inventa.

♀? " *Melanophora rorali* paullo longior, subcylindrica, longius setosa, nitidissima. Vertex declivus, setosus, nitidus, vitta media opaca. Frons prominens. Epistoma excavatum, lateribus inferne argenteo-, superne certo situ rufescenti micans. Vibrissæ breves. Setæ mystacinæ elongatae. Antennæ epistomate paullo breviiores, sublineares, articulis 2 basalibus apice rufescentibus, unde maculæ oriuntur; articulo ultimo oblique truncato ceteris simul sumtis fere longiore, seta subnuda, capillari, basi incrassata. Oculi brunnei, nudi, latius remoti. Palpi tenues, rufescentes, versus apicem dilatati & nigricantes. Thorax & scutellum nigra, nitida, pleuris præsertim albido-micantibus. Abdomen anguste conicum, nitidissimum, longe setosum, segmento 1:mo lateribus late ruso. Pedes spinosi, nigri, femoribus rufis, anticis superne macula apicali nigra, tarsis omnibus crassiusculis. Alæ versus costam fusciores, basi subflavescentes, nervo longitudinali 4:to angulatim flexo cum 3:to procul ab exitu ejus juncto, nervo transversu ordinario flexo. Squamæ flavescentes". *Wahlb.*

*Obs.* Au nostra species identica sit cum *Scopolia rufipede* Macq. & Meig. ob horum Auctorum brevitatem & insuffi-

cientiam speciei diagnoseos & descriptionis, dijudicare non possum.

\*\*). Antennæ magnæ, latæ.

†. Nervus longit. 3:ius a Lasi ad nervum transversum medium setulosus.

4. *Sc. cunctans*: nigra, epistomate cinereo-micante; antennis amplis; palpis flavis; alis hyalinis costa anguste fuscana, nervis transversis: ordinario rectissimo, apicali levissime arcuato; squamis albis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 7. 252. 2? *Tachina* Ejusdem 4. 419. 312? *Ocyptera* Zett. Ins. Lapp. 628. 2. ♂.

Hab. in Scandinavia, 2—30 Jul., minus frequens; scilicet in Scania ad Abusa rarissime; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum & Lärketorp; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in Lapponia Umensi ad Stensele in Pinu silvestri semel.

♂♀. Similis *Scopol. costatae*, a qua vero magnitudine sœpe duplo minore, antennis adhuc validioribus, alarum costa obsoletius fuscata, abdominisque segmento 2:do in disco setis 2 & in margine apicali setis totidem, nec solum in margine apicali bisetoso, differt. Epistoma declivum, in medio latissimum, lateribus (inter carinas & oculos) valde angustis continue & valide setosis. Antennarum seta 3-articulata. Palpi flavi. Nervi transversi subperpendiculares, sœpius leviter fuscedine cincti; horum ordinarius exakte rectus, apicalis jam subrectus, jam levissime arcuatus. Spinula costæ parva.

*Obs.* Ob magnitudinem majorem & alarum "nervum transversum apicalem arcuatum" synonymon Meigeni dubium videtur. De palporum colore quoque omnino silet Auctor.

5. *Sc. borealis*: atra, epistomate albo-micante, antennis amplis; palpis flavis; alis hyalinis, nervis transversis rectis; squamis albis. ♀? (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Ocyptera* Zett. Ins. Lapp. 627. 1. ♀.

Hab. in Lapponia septentrionali rarissime; specimen descriptum a Cel. Dom. Assessore *Deutsch* ante plures annos obtinui.

♀? Magnitudo *Sc. costatae*. A *Sc. cunctante*, cui alias simumilla, differt, praeter magnitudinem majorem, etiam alis hyalinis, nec costa, nec nervis infuscatis, nervo transv. apicali reecto, nec arcuato, & suboblique ducto, nec perpendiculari, nervo longit. 4:to paullo magis obtuso, area nonnihil longius petiolata, ut & spinula costae paullo longiore.

6. *Sc. lugens*: "atra nitida; palpis flavis; hypostomate albo; alis infuscatis: nervo transversali apicali sinuato." Meig. ♂♀. (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Meig. Dipt. 7. 252. 3. t. 71. f. 51 (abdomen). — *Tachina* Meig. Dipt. 4. 419. 313. ♀. *Melanophora* Macq. Buff. 2. 176. 10. ♂.

Hab. in Ostrogothia, ubi ad Gusum a D. *Wahlberg* in copula capta erit, ut Ipse mihi per litteras nuper notum fecit; a me nec deprehensa, nec visa.

♂♀. "Similis *Sc. cunctanti*, epistomate albo nigro-micante, alis totis brunnescensibus, margine tamen interiori dilutiori, distineta. Similis quoque *Sc. costatae*. Nervi transversi: apicalis leviter flexus, ordinarius rectus, & ab apicali longius remotus, quam in *Sc. cunctante*. Palpi flavi". Meig. & Macq. l. c.

††. Nervus long. 3:tius a basi & ultra nervum transversum medium setulosus.

7. *Sc. latifrons*: nigra, capite cinereo, fronte latissima; palpis fuscis; alis hyalinis, nervis transversis: ordinario recto, apicali arcuato; squamis albis. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; e Suecia superiore a D. *Marklin* mecum communicata.

♀. Magnitudo & summa *Sc. costatae* similitudo, sed fronte adhuc paullo latiore, alarum costa non infuscata, ut & nervo 3:to ultra transversum medium (usque ad medium areæ) setuloso, differt. Frons parum prominens, lata, cinerea, vitta lata concolore. Epistoma subperpendiculare. Palpi fusi. Antennæ mediocre. Thorax levissime schistaceo-nicans. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis transversis: ordinario rectissimo, apicali perspicue arcuato. Nervus long. 4:tus brevissime infra angulum continuatus. Reliqua ut in *Sc. costata*.

---

## 122. PHASIA Latr.

*Corpus* majoris, mediæ aut minoris magnitudinis, obtuse ova-tum, latum, pubescens, haud setosum, abdomine rotunda-to, subdepresso. Antennæ incumbentes, epistomate dimidio breviores, articulo ultimo 2:do parum breviore, apice ro-tundato, basi seta dorsali, 3-articulata, nuda, vix ad me-dium incrassata, articulis basalibus brevissimis. Frons pa-rum prominula, plus minus angustata, utrinque serie seta-rum haud validarum per setas 3—4 infra antennarum basin descendente. Epistoma perpendicular, apice reflexum. Setæ mystacinæ haud validæ adsunt, at vibrissæ vix ultæ. Barba menti brevissima. Palpi subelavati. Oculi magni, nudi, sæpissime valde approximati; ferruginei. Alæ divaricatæ, latæ, omnino inermes. Nervi transversi: medius apici ner-vi long. 1:mi fere oppositus; ordinarius subrectus fere in

medio areæ mediæ insertus, ad marginem interiorem sat prope retractus. Nervus longitud. 4:tus arcuatim l. angulatim versus tertium rectum flexus; 3:tius in apice alæ excurrens. Area oclusa; sæpe longe petiolata. Spinula costæ nulla. Squamæ magnæ, sæpe subtrigonæ. Abdomen 5-anulatum, segmento ultimo sæpe parvo, retracto; totum subnudum. Pedes mediocres, pilosi, tibiis spinulosis. *Color* niger, obscurus. *Motu* volatu celerrima. *Habitatio* in floribus in primis Umbellatarum & Syngenesistarum; choreas in aëre more Tipulariarum interdum ducunt. *Differentia sexus*; *mas*: genitale inenryo, tuberculum parvum formante, articulato, nec sulcato; alis latioribus; unguibus pulvillisque longissimis; *femina*: apertura anali, antice tuberculata, stylum nitidum includente; alis plerumque minus amplis; unguibus pulvillisque modice longis.

*Obs.* Respectu habito ad diversam nervorum in alis directiōnem specierum præsertim peregrinarum, D. D. Robineau Desvoidy & Macquart hoc genus in plura, ut *Phasiā*, *Elomyiam*, *Alophoram* & *Hyalomyiam* juste dividerunt, quorum exemplum D. Meigen (in Dipteror. Suppl.) etiam secutus est, genus tamen *Hyalomyam* cum *Alophora* conjungens, & nomen *Elomyiam* l. *Helomyam* ut nimium cum *Helomyza* consonans, in *Anantam* mutans. Species vero Scandinaviæ pauciores ad *Alophoram* Meig. pertinentes sub genere Latreilliano *Phasia* retinui, eas in Sectiones & Subdivisiones secundum nervorum diversitatem dividens.

*Sect. 1:ma.* Alarum area media longe petiolata.

*Alophora* Meig.

A. Area subtrigono-ovata; nervus transv. ordinarius leviter flexus medio l. mox pone medium areæ insertus. Majores. *Alophora* Macq.

1. *Ph. subcoleoptrata*: cinerascens, antennis, thoracis lineis 4, pedibusque, nigris; alis hyalinis, aut vittis

2 fuscis (♂), aut immaculatis (♀); area lata, subtrigona; ♂♀. (Long. ♀ 3, ♂  $3\frac{1}{4}$  lin.).

Latr. Gen. 4. 315. Meig. Dipt. 4. 190. 7. ♂♀. T. 39. f. 13. ♂. *Conops* Linn. Syst. Nat. 2. 1006. 13. ♂. *Theræva* Fabr. 217. 1. ♂. (exclus. synon. Panz. 71. t. 13. 11. quod ad *Ph. hemiptera* pertinet). Fall. Rhizom. 2. 1. ♂♀. *Alophora* Maeq. Buff. 2. 201. 1. Meig. Dipt. 7. 281. 2.

Hab. in Suecia media, rarius; in Westrogothia a D. D. *Gyllenhal* & *Dalman* in floribus Salicis cinereæ & capreæ inventa; in Sudermannia ad Nyköping, Doct. *Walmstedt*: in Uplandia ad Upsaliam olim etiam deprehensa, teste Ill. *Linnè*, & in recentiore tempore, D. *Wahlberg*.

♂♀. Magnitudo *Muscae vomitoriae* minoris. Frons aut valde angusta (♀), aut modice angusta (♂); flavida, vitta media fusca, serie setarum utrinque simplici. Epistoma cinereo-albidum, inferne convexum. Palpi flavi. Abdomen fusco-cinerenum, puberulum, segmento ultimo brevissimo. Alæ in ♂ amplæ, albidae, vittis 2 brunneis, quarum exterior a basi ad medium costæ dueitur, & interior late cingit nervos 4:tum longitudinalem atque transversos; in ♀ modice latæ, hyalinæ, basi stramineæ. Nervus long. 4:tus in utroque sexu angulato-arcuatus. Squamæ sordide albidæ. Halteres flavi. Pedes nigri, unguibus pulvillisque in ♂ longissimis, in ♀ modice longis. — Variat ♂ ab domine toto ferrugineo. Similis sequenti, sed forma areæ in alis mox dignota.

2. *Ph. hemiptera*: obscure cinerascens, epistomate albido; antennis, thoracis lineis 4, abdominis ferruginei medio, pedibusque, nigris; scutello ferrugineo; alis aut fusco-flavoque variegatis (♂), aut hyalinis, immaculatis (♀); area ovato-lanceolata. ♂♀. (Long. ♀ 3, ♂  $3\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 191. 8. ♂♀. *Thereva* Fabr. Antl. 218.  
 2. ♂. *Alophora* Macq. Buff. 2. 202. 2. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 284. 1. *Thereva subcoleoptrata* Schäff. Icon. T. 71. f. 6. Panz. Fn. Germ. 74. 13. ♂; 14. ♀. — *Thereva affinis* Fabr. Antl. 218. 4. ♀. Panz. Fn. 74. 16. ♀.

Hab. in Scandinavia rarissime; e Strandmollen Seelandiae a D. Drewsen ante plures annos communicata. (A D. Meigen individuum hujus quoque obtinui).

♂♀. A priori, cui similis, differt præcipue: thoracis lateribus pleurisque ferrugineo-pilosis, oculis (in ♀) magis cohærentibus, scutello livido, ut & in primis alarum area media ovato-lanceolata, apice scilicet angustiore, nervo long. 4:to obtusissime arcuato (nec angulato-arcuato), & nervo transv. ordinario paullo pone medium (nec in medio) areæ inserto. — Frons cinerea. Pedes nigri, femoribus posticis basi flavis. *Mas:* abdomen ferrugineum, vitta media plus minus lata, ante summum apicem abbreviata, nigra. Alæ latæ, flavidæ, basi subferruginea, vittis 2 fuscis, quarum una ultra medium costæ extensa, & altera in disco alæ sita. In apice alæ etiam macula fusca. *Femina:* abdomen nigrum, lateribus plus minus ferrugineum. Alæ modice latæ, hyalinæ, basi leviter flavidæ.

*Obs.* Pictura alarum & abdominis præsertim in ♂ mire ludere dicitur. Forma areæ in alis & pilositas flavo-ferruginea nitida constantiores præbent notas. Figura Panzeri *Ther. affinis* l. c. bene convenit cum specimine feminine a D. Drewsen e Dania missa.

B. Area apice rotundata, nervus scilicet longitudinalis 4:lus regulariter arcualim curvatus; nervus transversus ordinarius rectus, medio l. mox ante medium areæ insertus. Minores. *Alophora* Meig. *Hyalomyia* Macq.

\*). Nervus transv. ordinarius in medio areæ ob-  
ovatae insertus.

3. *Ph. muscaria*: griseo-cinerea, capite cano; an-  
tennis, thoracis lineis 4, abdominis segmento 1:mo, inci-  
suris tenuiter, lineolaque dorsali angusta, pedibusque  
nigris; alis latis fuscis (♂), aut modice latis hyalinis (♀);  
squamis albidis; oculis in utroque sexu subcohærentibus.  
♂♀. (Long. vix 2 lin.).

Meig. Dipt. 4. 196. 18. ♂. Zett. Ins. Lapp. 626. 1.  
♂♀. *Thereva* Fall. Rhizom. 3. 2. ♂♀. typica. — *Alopho-*  
*ra* Meig. Dipt. 7. 284. 17. *Thereva cinerea* Fabr. Antl.  
221. 13. ♀. *Phasia* Meig. Dipt. 4. 198. 22. ♀. *Hyalomyia*  
Maeq. Buff. 2. 201. 8. ♀. t. 15. f. 13. (ala). — *Alopho-*  
*ra* Meig. Dipt. 7. 284. 19.

Hab. in graminosis, at frequentius in floribus Achilleæ,  
Chrysanthemi &c., per Scandinaviam, 15 Jul.—Aug.—15  
Sept., passim; scilicet in Scania ad Esperöd raro; in  
Smolandia, D. Boheman; in Ostrogothia ad Wadstena,  
Gusum &c., passim; in Gotlandia ad Kjellunge; in  
Nericia ad diversorium Öskevik in floribus Achilleæ Mil-  
lefol. 8 Sept. 1810 uterque sexus copiose; in Helsingia  
ad Kårböle; in Jemtlandia ad Berge in Alsen, ad Fax-  
elfven &c.; in parœcia ÖverLuleå ad Storsand, 1843, D.  
Wahlberg; in Lapponia Tornensi ad Kengis & Muonio-  
niska, parœ. (E Finlandia a D. Sahlberg, &c Reinerzi  
Silesiae a D. Zeller, missa).

♂♀. *Musca domestica* minor. Frons convexa cinerea, linea  
media angusta, nigra. Epistoma canum. Palpi parvi, fusi.  
Thorax griseus, lineis 4 antieis nigris. Scutellum ingri-  
eans. Abdomen opacum, canum, segmento 1:mo toto, in-

cisuris tenuissime, & lineola dorsali in segmentis 2<sup>j</sup> & 3, nigris. Variat autem in detritis abdomen frequenter nigro-aeneum, nitidum, indumento cinereo hinc inde, & præsertim ad latera, remanente. Alæ basi pallide flavæ, in ♂ totæ fuscæ, in ♀ hyalinæ. Squamæ flavidо-albidæ. Pedes nigri. Pulvilli albi, in ♂ cum unguibus longi, in ♀ mediocres.

4. *Ph. umbrata*: cinerea, capite cano; antennis; thoracis lineis 4, abdominis lineola dorsali angusta, pedibusque, nigris; alis latis cinereo-hyalinis, macula costali apiceque fuscis, nervis umbra cinctis; squamis albidis; oculis subcohærentibus. ♂. (Long. vix 2 lin.).

Wahlberg in litt. 1842.

Hab. rarius in insula Gotlandiæ, ubi a D. Prof. *Wahlberg* detecta; ibidemque etiam ad Fardhem & Gothem 2—18 Jul. 1811 ad D. *Dahlbom* & me deprehensa. (E Reinerzi, & Wienna, a D. *Zeller* communicata).

♂. Simillima mari prioris, a quo non differt nisi abdominis segmento 1:mo ciuereo, nec nigro, & alis non totis fuscis, sed albido-cinereis, macula costali ante medium (apicem nervi auxiliaris transeunte) fusco-brunnea, apice alæ indeterminate fusco, ut & nervis præsertim transversis umbra fusca sat late cinctis.

*Obs.* Affinis videtur *Therevæ obesæ* Fabr., sed ab domine basi non nigro & alarum pictura alia, distincta. — E Reinerzi & Glogavia Silesiæ a D. *Zeller* plura specimina sub nomine: *Musca (Phasia) nebulosa* Panz. Fn. 51. 20. obtinui, quæ a nostra *Ph. umbrata* non nisi ab domine æneo-nigro, nitido differunt. An hæc specimina speciem propriam vel tantum varietatem detritam efficiant dijudicare non possum. — Nec Meigeni *Phas. atropurpurea*, *hamata* & *nubeculosa* ab Ejusdem *Ph. nebulosa* multum differre videuntur.

5. *Ph. grisea*: cinerea, capite cano; antennis, thoracis lineis 4, abdominis lineola dorsali angusta, pedibusque, nigris; alis modice latis, hyalinis, squamis albis; oculis subcohærentibus. ♀. (Long. vix 2 lin.).

Hab. in Gotlandiæ pratis rarius; ad Fardhem & Stenkyrka 2—30 Jul. 1841 3 specimina inveni. (Eadem e Reinerzi sine synonymia a D. Zeller communicata).

♀. Simillima iterum priori, cuius femina forte est. Differt ab illa tantum alis hyalinis, immaculatis, & unguibus pulvillisque multo brevioribus. *Ph. muscaria* feminæ quoque valde similis, & vix nisi abdominis basi cinerea ab illa dignoscitur. — Epistoma læte canum. Frons cinerea, linea angusta nigra. Thorax cinereus, vittis 4 nigris. Scutellum nigricans. Abdomen cinereum, opacum, segmentis: 1:mo obscure cinerascente, 2:do & 3:to lineola dorsali fusca, raro in segmento 4:to continuata. Alæ hyalinæ, basi stramineæ. — Var. ♀ minor (1½ lin. longa) in Smolandia a D. Ljungb inventa mihiique ante plures annos communicata).

6. *Ph. flavipennis*: griseo-cinerea, capite cano; antennis, thoracis lineis 4, pedibusque nigris; abdominis disco æneo, nitido; alis (♂) latis albidis, basi flavis, apice dilute fuscis, nervis mediis umbra leviter cinctis; squamis albidis; oculis subcohærentibus. ♂. (Long. circuit. 2 lin.).

Wahlberg in litt. 1843.

Hab. in floribus Achilleæ Millefol. in parœcia Över-Luleå Botniæ borealis, 23—28 Aug. 1813, primum a Prof. Boheman ad pagum Storsand inventa, deindeque a Prof. Wahlberg & D. Andersson ad pagos Bredåker & Råbäcken in societate cum *Ph. muscaria* lecta.

♂. A. *Ph. muscaria* (3), cui de cetero simillima, differt: magnitudine paullo majore, abdominis disco magis nitido, & præcipue alis latioribus, basi flavis, medio albis (nec continue fuscis), nervis dilute infuscatis, apice fusco. Similis quoque *Ph. umbratæ* (4), sed abdome metallice nitente, nec cinereo, alis latioribus, basi flavis, interstitio costali ad basin minus infuscato, nervisque umbra dilutiori cinctis, dignota. Caput, thorax, nervorum directio, squamæ & pedes ut in *muscaria* & *umbrata*. Sed abdomen (an detritum?) supra cupreum, nitidissimum, limbo omni anguste cinereo-pruinoso, opaco. Alæ latæ, segmento 1:mo costali in primis dilatatum, sordide albidæ, basi late flavae, nervis umbra dilute fusco-flavida cinctis. Tonus apex alæ (usque ad apicem areæ) fuscus.

*Obs.* *Ph. nervosæ* Meig. valde quoque affinis videtur, vix tam eadem.

7. *Ph. pusilla*: nigra, epistomate subargenteo; abdome cano, segmento 1:mo lineolaque dorsali angusta, nigris; alis hyalinis, squamis albis; oculis cohærentibus. ♀. (Long. circiter  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 198. 23. *Hyalomyia* Macq. Buff. 2. 201. 9. *Alophora* Meig. Dipt. 281. 20.

Hab. in Scania minus frequens; ad Sandhammar & ad Esperöd prope Kivik 10--15 Aug. 1837 specimina 4 inveni. (E Glogavia & Wienna a D. Zeller missa).

♀. Parva. Caput albidum, lineola frontali angustissima nigra. Frons minime prominens. Antennæ nigræ, cinereo-nicantes. Abdomen canum, opacum, segmento 1:mo toto, lineaque dorsali per segmentum 2:dum fere totum & ad medium 3:ti continnata, nigris. Segmentum vero 2:dum loco lineolæ macula dilatata denudata nigra sœpe gaudet. Alæ hyalinæ, basi subpallidæ. Squamæ albæ. Pedes nigri,

unguis pulvillisque brevibus. — Individua plura congregata choreas in aere instituant, teste D. Macquart.

\*\*). Nervus transvers. ordinarius mox ante medium areæ oblongæ insertus.

8. *Ph. hyalipennis*: atra nitida, epistomate argenteo-micante; alis hyalinis, squamis nigricantibus; in ♂ remotiusculis, in ♀ cohærentibus. ♂♀. (Long. circiter  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 4. 199. 25. *Thereva* Fall. Rhizom. 4. 3. ♂♀. (sed ♂ apud Clar. Auctorem est ♀, & contra). — *Hyalomyia* Macq. Buff. 2. 204. 10. *Alophora* Meig. Dipt. 7. 284. 22.

Hab. in floribus Laserpitii &c., per hortos & prata Sueciæ mense Julio, rarius; scilicet in Scania ad diversorium Röstånga, villam Esperöd &c.; in Ostrogothia ad Gusum, D. Wahlberg.

♂♀. Tota atra, nitida, immaculata. Caput argenteo-micans, linea frontali nigra in ♀ postice angustissima, in ♂ modice angusta. Frons non prominens. Oculi ferruginei, in ♂ mediocres, in ♀ magni. Abdomen in ♂ ovatum, ano incrassato; in ♀ rotundatum, depresso, ano non incrassato. Alæ hyalinæ, immaculatæ. Area angustata, longe petiolata. Squamæ parvæ, brunneæ. Halteres obscuri. Ungues & pulvilli breves.

9. *Ph. nana*: nigra subnitida, epistomate argenteo-micante; alis nigricantibus, apice albis, squamis obscuris; femoribus lividis; oculis remotiusculis. ♂♀. (Long. 1 lin.).

Meig. Dipt. 4. 199. 26. *Thereva* Fall. Rhizom. 4. 4. ♀. typica. — *Alophora* Meig. Dipt. 7. 284. 23.

Hab. in Scania rarissime; duo tantum specimina lustravi, unum ( $\text{♀}$ ) in horto Esperöd a D. Prof. Fallèn inventum, & alterum ( $\text{♂}$ ) ad Lomma in campo arenoso prope littus maris d. 20 Jul. 1830 a me captum.  $\text{♀}$  major, in Smolandia ni fallor, a D. Boheman quoque deprehensa.

$\text{♂♀}$ . Priori affinis, sed paullo minor, angustior, fusco-nigra & minus nitida. Frons modice angusta. Abdomen in  $\text{♂}$  subcylindricum, anu inflexo; in  $\text{♀}$  ovatum, anu roso, an semper? Alæ parum latæ, fuscæ, apice (usque ad nervum transv. apicalem) albo. Nervi ut in priori directi. Squamæ parvæ, bronneæ. Halteres sordide albidi. Pedes in  $\text{♂}$  fusco-lividæ; in  $\text{♀}$  nigri, femoribus livido-flavis, unguibus pulvillisque in utroque sexu parvis.

10. *Ph. pygmæa*: nigra subnitida, epistomate albido-micante; alis hyalinis, costa nigricante, apice albis, squamis obscuris; oculis coherentibus.  $\text{♂♀}$ . (Long. 1 lin.).

Meig. Dipt. 4. 200. 27. *Thereva* Fall. Rhizom. 4. 5.  
 $\text{♂}$ . *Alophora* Meig. Dipt. 7. 281. 21.

Hab. in Suecia valde rara; scilicet in Scania, in horto Beckaskog mense Julio a D. Fallèn semel capta; in Ostrogothia in folio fruticis Populi tremulæ in Krogarängen prope Wadstena 11 Aug. 1829 marem unicum inveni; &  $\text{♀}$  in Gotlandia d. 8 Maj. a D. Prof. Sundevall deprehensa.

$\text{♂♀}$ . Valde similis & affinis præcedenti, sed differt præcipue: colore corporis nigriore, oculis coherentibus, alis albido-hyalinis, costa tantum nigricante, ut & pedibus totis nigris, nec femoribus testaceis. Frons & regio sub ore perspicue pilosæ. Palpi parvi, obscuri. Alas in mare vivo vibrantes vidi.

**11. *Ph. fasciola:*** atra opaca, epistomate griseo; abdomine fasciis 3 interruptis ferrugineis; alis hyalinis, squamis fuscis; pedibus obscuris; oculis coherentibus. ♀? (Long. vix 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 626. 3. ♂. (an ♀?).

Hab. in Suecia boreali rarissime; in Pino sylvestri ad Lycksele Lapponiae Umensis 19 Jun. 1832 inventa.

♀? Atra, pilosa. Frons non prominens, postice angustissima, supra antennas testacea. Antennæ brevissimæ, rotundatæ, nigrae. Epistoma in medio cinereum, lateribus testaceum. Proboscis nigra, apice flavida. Palpi testacei, apice nigricantes. Abdomen rotundatum, subdepressum, pilosum. Incisuræ 1, 2 & 3 ferrugineæ, fascias tres transversas, rectas ad latera dilatatas, in medio interruptas efficientes. Alæ modice latæ, cinereo-hyalinæ. Squamæ mediocres, dilute fuscæ. Halteres obscuri. Pedes obscure lividi, tibiis tardisque dilutioribus; unguibus pulvillisque brevissimis.

**12. *Ph. zonella:*** opaca, thorace cinereo; capite pallido, antennis, vitta frontali, pedibusque, flavis; tarsis fuscis; alis hyalinis, squamis albis; abdomine nigro, fasciis 3 interruptis ferrugineis; oculis remotis. ♀. (Long. vix 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 627. 4. ♀. *Hyalomyia fasciata* Macq. Dipt. 71. 9? ♀. *Alophora* Meig. Dipt. 7. 290. 26? ♀.

Hab. in Lapponia meridionali Umensi rarissime; in Pino ad Stensele d. 3 Jul. 1832 in uno individuo deprehensa.

♀. Affinis priori, sed in multis diversa. Caput flavo-albidum. Frons modice lata, vitta latiuscula, aurantiae, utrinque pilosula. Antennæ rotundatæ, flavæ. Palpi flavi. Regio

sub ore brevissime albo-pubescentes. Oculi parvi, rotundi. Thorax & scutellum cinereum, pilosa. Abdomen ut in priori constructum & pictum, at macula flava ad latera in segmento 1:mo etiam conspicitur. Alæ ut in præcedente. Squamæ mediocres, & halteres, albida. Pedes flavi, posticorum femorum tibiarumque apice, tarsisque omnibus, fuscis. Ungues pulvillique miniati.

*Sect. 2:da.* Alarum area media breviter petiolata. Alæ haud dilatatae,

13. *Ph. opaca*: nigra, opaca, epistomate canescente; alis cinereo-hyalinis, squamis albis; oculis cohærentibus. ♂? (Long. 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 626, 2. ♂.

Hab. in inferalpinis Nordlandiæ Norvegicæ rarissime; scilicet ad divisorium Björkvik juxta Ofotensfjord d. 14 Jul. 1821 seimel a me inventa.

♂? Affinis & similis *Ph. fasciolæ* (11), sed tota nigra & area breviter petiolata dignota. Tota pilosa. Oculi magni in vertice cohærentes. Epistoma cinereum. Palpi nigri. Frons supra antennas triangularis, nigra, linea utrinque ad oculos albida. Abdomen rotundatum, depresso, certo situ leviter cinereo-fasciatum. Anus breviter inflexus. Alarum nervi: longitudinalis 4:tus obtuse angulatus; transversus ordinarius paullo ante medium areæ sublanceolatæ insertus. Squamæ majnsculæ, albæ. Femora nigra. Tibiæ tarsique nigro-fusca. Ungues & polvilli miniati.

14. *Ph. ruficeps*: nigra, subopaca, capite albo-rufescente; antennarum basi, vitta frontali femorumque basi ferrugineo-flavis; abdomine cinereo-marmorato; alis hyalinis, squamis albis; oculis remotis. ♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$  sere 1 $\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 627. 5. ♀.

Hab. cum priori rarissime; in foliis Betulae albæ ad Björkvik Norvegiae 14 Jul. duo specimina inveni.

♀? Similis praecedenti, nonnihil major, oculis distantibus, ut & capitis femorumque colore, præsertim dignota. Pilosa. Caput rufescens, albo-micans. Frons lata, cinerea, vitta lata, aurantiaca. Antennæ breves, rotundatæ, ferrugineæ, articulo ultimo cum seta nigris. Setulæ mystacinæ panicæ, nigræ. Pubescens sub ore brevis, nitida, alba. Palpi albidæ, in altero exemplo apice subfuscæ. Oculi non magni, rotundati. Thorax niger, levissime cinereo-micans. Abdomen rotundatum, depresso, nigrum, subnitidum, fasciis indeterminatis cinereis. Anus summo apice albido. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis ut in priori directis. Squamæ majuscule, albæ. Halteres fuscæ. Pedes pilosi, nigri, femoribus omnibus basi indeterminate, caxisque antieis, flavis. Ungues pulvillique minuti.

15. *Ph. couveva*: "breviter ovata, convexa, supra cinerea nigro-maculata, subtus nigricans; antennis pedibusque nigris; alis hyalinis, nervo longitudinali 1:to arcuatim flexo, in apice ake, mox ante exitum cum tertio juncto. ♀?" (Long. circit. 2 lin.).

Wahlb. in litt. 1813.

Hab. in floribus Achilleæ Millefolii ad Råbäcken in parœ. Öfver-Luleå Botniæ borealis d. 28 Aug. 1813 in unico exemplo a Cel. Prof. *Wahlberg* detecta.

♀? Speciem ipsam non vidi, ergo descriptionem illam completam, a Cel. Detectore communicatam, heic immutatam reddam. "Femina? Magnitudine & statu brevi *Ph. muscaria*, setosa, capite abdomeque multo convexioribus. Caput magnum, thorace latius, oculis maximis, semiglobosis, brunneis, glabris, superne interstitio satis angusto disjunetis. Vertex ater, velutinus, inferne dilatatus, longe setosus.

Frons planiuscula, minime prominula. Epistoma subconvexum, immarginatum, apice prominulum, plumbeo-albidum, orbitis argenteis & setis oris longioribus. Antennæ epistomatè dimidio breviores, incumbentes, nigrae, articulo ultimo brevi, rotundato, seta longe capillari, nuda. Palpi parvi, angusti, fusco-testacei. Thorax convexus, atro-albidoque varius, disco scilicet atro, lateribus posticeque maculis majoribus albidis cinctus, quarum 2 utrinque laterales & unica velut gemina postice supra scutellum posita. Pleuræ cinerascentes. Scutellum atrum. Abdomen rotundatum, supra convexum, subtus fere planum, dorso cinereum, setosum, segmento 1:mo toto, maculisque 2 dorsalibus magnis trigonis secundi atris. Pedes nigri spinosi, femoribus præsertim anticis subtus nigro-ciliatis. Alæ latiusculæ, hyalinæ, nervis ut in diagnosi indicatum directis, transverso ordinario recto. Squamæ magnæ, flavescenti albidae.

---

### 123. GYMNOPEZA Zett.

*Corpus* parvum, oblongum, subnitidum, nudum. *Antennæ* ineumbeates, brevissimæ, rotundatæ, articulo ultimo 2:do non duplo longiore, compresso, apice subobtuso, basi seta dorsali biarticulata, articulo basali brevissimo; nuda, basi inerasata. Frons convexa, haud prominens, glabriula. Ocelli in vertice 3. Epistoma perpendiculare, breve, apice non reflexum. Os non mystacinum, sed peristoma brevissime pubescens. Palpi & proboscis retracta. Oculi magni, nudi; cohaerentes ♂, aut remoti ♀. Alæ divaricatæ, subangustatæ, inermes. Nervi longitudinales: 1:ius ad medium costæ extensus; 3:ius 4:usque leviter flexi in summo apice alæ cum nervo costali fere coëuntes; 5:ius ad marginem interiorem continuatus. Nervi transversi: medius apici nervi longit. 1:mi oppositus; ordinarius perpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ lanceolatæ apiceque an-

gustæ apertæ insertus. Squamæ mediocres. Halteres subnudi. Abdomen ellipticum 5? — (4?) annulatum, segmento 1:mo 2:do nonnihil longiore, ano inflexo; totum glabrum. Pedes mediocres, inermes, nudi; hinc nomen generis. Color niger. Motus — — —. Habitatio in floribus & campis aridis. Differentia sexus; mas: oculis cohærentibus, ano modice inflexo, unguibus pulvillisque minutis; femina: oculis late remotis, fronte punctulata, ano cylindrico, longissime inflexo, unguibus pulvillisque minutissimis. Similis *Phaniæ*, sed ore non mystacino, instrumentis cibariis retractis, antennis brevioribus & corpore toto glabro, dignota. A *Phasia*, cui etiam sat similis, glabritie corporis, alarum area media lanceolata, apice subaperta, ut & canda feminæ longe inflexa, vere differt.

1. *G. albipennis*: nigra, epistomate subargenteomicante; alis squamisque albis. ♂. (Long. circiter  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. p. 629 in observat. sub *Phania thoracica*.

Hab. in Suecia rarius; in Scania ad Esperöd prope Kivik 20 Jul. 1817 specimen unicum inveni; e Smolandia a D. Boheman 1834 benigne communicata.

♂. Tota nigra, subnitida, omnium tenuissime l. vix visibili-  
ter puberula. Oculi maximi, postice cohærentes. Antennæ  
fuscæ. Frons brevissime nigro-subpubescens. Epistoma  
albido-micans. Pubescentia sub ore brevissima, nigra. Thorax  
brevissime puberulus. Abdomen glabrum, genitale tubercu-  
lato, inflexo. Alæ albidæ, nervis albis. Squamæ albæ.  
Halteres nigricantes. Pedes nigro-picei, tenuiter pilosuli.  
Tibiæ posticæ incurvæ, basi coartatæ. Polvilli minuti,  
albi.

2. *G. denudata*: nigra; alis infuscatis, squamis al-  
bis. ♀. (Long. fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia rarius; in Scania in campo arenoso ad littus maris prope Lomma d. 6 Jun. 1826 duo individua inveni; e Smolandia quoque a D. *Bohemian* missa.

♀. Similis priori; aut ejus femina? Differt ab illa præcipue: corpore glaberrimo, oculis remotis, & alis fuscis. Frons lata, punctulata, stria media impressa. Antennæ fuscæ. Epistoma parum cinerascens. Oculi medioeres. Cauda longe inflexa ventris basin fere attingens, apice rufo-uncinata. Alæ aut fuscæ, basi albescentes, aut subhyalinæ, nervis late infuseatis, & ima radice sordide albida. Squamæ non magnæ, albæ. Halteres pallidi, clava obscura. Pedes nigri, femoribus nigro-fuscis.

---

#### 124. XYSTA Meig. \*)

*Corpus* medium, oblongo-ovatum, subcylindricum, pubescens & setosum. *Antennæ* incumbentes, epistomate duplo breviores, articulo ultimo 2:do paullo longiore, compresso, basi seta dorsali nuda aut subnuda, biarticulata, vix ad medium incrassata. *Epistoma* subcontractum. *Os mystacinum*. *Palpi* subfiliformes. *Frons* sub prominens, setulosa. *Vibrissæ* spuriæ. *Oculi* magni, nudi, approximati (♂), aut paullo remoti (♀). *Abdomen* ovatum, convexum, 5—6-annulatum. *Alæ* divaricatae, mediores, inermes, hyalinæ. *Nervi longitudinales*: 3:tius rectus; 4:tius angulatim flexus in apice 1. paullo ante apicem alæ excurrentes. *Nervi transversi*: medius nonnihil infra apicem nervi long. 1:miductus; ordinarius aut in medio aut mox pone medium areæ apertæ insertus. *Squamæ* mediores. *Color* nigricans. *Motu* agi-

---

\*) *Xysta* est nomen quoque Coleopterorum generis inter *Melastomata*. Cfr. Magazin de Zoologie par Guerin. Paris 1833, p. 30. 31.

lis. *Habitatio* — — —. *Differentia sexus* non rite cognita; sed in altero sexu, forte masculo, oculi appropinquantes; in altero, forte femineo, oculi modice remoti, & anus aculeo exerto, recto. *Genus dubium.*

1. *X. striginervis*: glauco-cinerea, fronte prominente subargentea; antennis, vitta frontali, thoracis vittis 3, abdominis maculis triplici serie, pedibusque, nigris; alarum nervo longit. 3:to versus apicem strigulis 3 minutis. ♀? (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.)

Zett. Ins. Lapp. 633, 1. ♀?

Hab. in Lapponia meridionali Umensi rarissime; ad lacum Wojmsjön parœciæ Wilhelminæ d. 11 Jun. 1832 specimen descriptum detegi.

♀? *Musca domesticæ* habitu similis. Affinis *Tachina*, cuius speciem primo obtutu & ante examen adoratus crederes. Caput argenteum. Frons prominens, modice lata, vitta latissima atra, serie setarum utrinque postice subduplici. Epistoma subperpendiculare, infra oculos non magnos ovalles descendens, lateribus tenuissime pilosulum. Setæ circa os utrinque plures, sed non validæ. Vibrissæ nullæ, sed loco illarum pili minutti. Proboscis & palpi exserta, nigra. Thoracis vittæ nigrae latæ, media subduplicata. Abdomen ovatum, pubescens, glaneum, maculis trigonis triplici ordine dispositis, basi subcohærentibus, nigro-brunneis, 1:mo segmento fere toto nigricante. Segmenta distinete 5, subæque longa, 1 & 2 margine apicali in medio bisetosa, 3, 4 & 5 margine apicali multisetota. Ex apice ani erumpit stylus cornens, subulatus, longitudine segmenti 5:ti, rectus, niger, nitidus. Alarum nervus long. 4:tus subrectangulatim flexus, infra angulum appareater subcontinuatus; longitudinalis 3:tus ad apicem strigulis 3 transversis minutissimis, oculo tantum armato observandis. Nervi transversi: ordinarius subobliquus paullo pone medium areæ insertus; api-

ialis inervus ante apicem alae in costa excurrens. Area Aperta, Spinula costæ nulla. Squamæ albæ, inferior magna. Halteres albidi. Pedes pilosi. Tibie Spinulosæ. Pulvilli albi & unguis, longioris.

2. *X. grisea*: obscure cinerea, fronte parum prominente subargentea; antennis angulo supero acuminato, totis, vitta frontali, palpis, thoracis antico lineolis 4 obsoletis, pedibusque, nigris. ♂. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 633. 2. ♂.

Hab. in Dalecarlia; a D. Boheman detecta mihiique benevole communicata.

♂. Subsimilis priori; sed magnitudine paullo minore, fronte vix prominula, oculis majoribus magis appropinquantibus, antennis apice superne distinete acuminato, epistomate lateribus nudo, infra oculos parum descendente, thoracis lineolis anticis angustioribus minus perspicuis, abdomine cinereo, hand maenlato, aculeo anali nullo, alarmum nervis transversis; ordinario subperpendiculare in medio areæ inserto, apicali parum curvo fere in apice alte excurrente, area ocellusa sessili, nervo long. 4:to angulato-arcuatim flexo, ut & longitudinali 3:tio absque strigulis, abunde dignota. Probus apice rufa. Abdomen conicum, ut in priori setosum; griseum, vix fusco-maculatum. Segmenta tantum 4 perspicua. Squamæ sordide albidae. Halteres pallidi. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, pulvillis albis ungvibusque, medioeribus.

Nov. genus Wahlbergianum *Cinochira* statura quidem *Gymnopezæ*, seta nuda & toto habitu *Ocypterae* l. *Tachinæ* parvæ affine & simile; sed propter nervorum in aliis directionem, *Cyrtoneuræ* valde appropinquantem, ad Familiam Museariarum forte rectius relegandum.

## 125. DEXIA Meig.

*Corpus majoris aut mediæ magnitudinis, subcylindricum aut oblongum, pubescens & setosum, abdomine subconico. Antennæ incubentes, breviuseculæ, articulo ultimo 2:do duplo l. triplo longiore, compresso, basi seta dorsali, aut tota dense plumata, aut saltem distinete pubescente. Frons sæpe prominens, setosa. Oculi oblongi, nudi, in ♂ approximati, in ♀ sat late remoti. Epistoma nudum, in medio plerumque carinatum. Vibrissæ nullæ. Os mystacinum. Palpi filiformes aut subclavati; setulosi. Abdomen 4:annulatum, segmentis: 1:mo plerumque paullo breviore, interdum inermi, 2 & 3 in diseo & margine apicali sæpe setosis, & 4:to unidique setoso. Alæ divaricatæ. Nervi longitudinales: 3:tius reetus, basi sæpissime setulis 3—5; 4:tus angulatim, raro arcuatim, flexus, l. in apice l. paullo ante apicem alæ excurrentis. Nervus transv. ordinarius pone medium, raro in medio, areæ sæpissime apertæ insertus. Squamæ mediocres. Pedes elongati. Color obseurus aut grisescens, numquam metallicus. Motu agilis. Larræ in vegetabilibus putridis vivunt teste D. Robineau Desvoidy. Plures vero species certe parasitæ in aliorum insectorum larvis degunt. Imagines innocuae e melie florum nutrimentum hauriunt, loca elevata præsertim amantes, in foliis fruticum & graminum sedentes. *Differentia sexus; mas:* frons angustata, serie setarum utrinque simpliei; abdomen conicum; unguis & pulvilli elongati; tuberculum anale inflexum; *femina:* frons lata, serie setarum utrinque duplici; abdomen oblongum, vagina anali brevi; unguis & pulvilli breves. — *Muscæ Sylvaticæ* nobis Ins. Lapp.*

*Subdiv. 1:ma.* Alarum area media apice aperta (*D. grisescens* area subocclusa in *Subd. 2:da* quærenda).

A. Seta antennarum plumala.

α). Seta longe plumata.

\*. Nervus transversus apicalis sursum flexus.

†. Antennæ & pedes flava. Alarum costa spinula distincta.

1. *D. canina*: cinerea, thoracis dorso flavo-grisecente, nigro-lineato; abdominis fasciis tarsisque fuscis; antennis, palpis pedibusque flavis; alis basi flavescentibus, nervo longitudinali 4:to infra angulum distinete continuato. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 47. 21. ♂♀. & 7. 270. 12. Macq. Buff. 2. 212. 2. T. 15. f. 17. ala. — *Musca* Fabr. Antl. 296. 60. Fall. Muscid. 41. 8. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 653. 2. ♂♀.

Hab. in lucis & pratis umbrosis, libenter in Coryletis, mense Julio & Aug., passim; scilicet in Scania ad diversorium Röstånga; Ringsjön, Abusa, Esperöd &c., frequens; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Egebylund &c.; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; in Dania, passim. Mas in folio fruticis sedens, sole sereno avolat, mox ad idem punctum revertens; quem lusum saepe repetit. (E Glogavia a D. Zeller missa).

♂♀. Magna, subcylindrica, opaca. Caput canum, genis carnis. Frons prominens subflavida, in ♂ angusta, in ♀ latior, vitta in utroque sexu sordide ferruginea. Antennæ angustæ, lineares, cum seta flava. Epistoma in medio retusum, apice non exsertum. Setæ mystacinæ & setæ sub ore nigræ. Palpi & proboscis flava. Thorax cinereus, dorso griseo I. flavidio, lineis in medio 2 anticus angustis, & vitta laterali untrinque abbreviata, maculiformi, fuscis. Scutellum cinereum. Abdomen cinereum (raro supra griseum), fascia ante apicem segmentorum 1, 2 & 3 fusca certo situ maculas 3

(1 in medio & 2 laterales) in singulo segmento obscuras formante. Segmenta: 1:muni breve, subinerme; 2 in medio apicis bisetosum; 3:tiui margin'e apicali 6-8 setosum; 4:tum postice multisetosum. Alarum nervi longitudinales: 3:tiu's versus apicem paullo flexus, basi 4-5-setulosus; 4:tus sub angulo subacuto sat longe continuatus; transversi: medius longe ante apicem nervi long. 1:mi situs; ordinarius flexus, pone medium areæ insertus; apicalis basi valde incurvatus, mox ante apicem alæ in costa excurrens. Area modice aperta. Spinula costæ distineta. Squamæ albidae (superior parva), pallido-marginatæ. Halteres pallidi. Pedes elongati, flavi, nigro-spinosi. Tarsi inermes, fusci, nigro-pubescentes. Pulvilli albi, in ♂ elongati. — Variat detrita ab domine nigricante.

2. *D. rustica*: cinerea, thoracis dorso flavo-grisecente, nigro-lineato; abdome in ♂ ferrugineo-pellucido, vitta dorsali fusca, continua; scutelli apice anoque in utroque sexu testaceis; antennis, palpis pedibusque rufo-flavis, tarsis nigris; alarum nervis flavescensibus, longitudinali 4:to vix l. parum infra angulum continuato. ♂♀. (Long. 4— $1\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 46. 22. ♂♀. (exclus. syn. Fall. *Musca tachinoides*, quæ est *Tachina circumflexa* nob. no 173), & 7. 270. 8. Macq. Buff. 2. 211. 1. ♂♀. (exclus. syn. Fall. *Musca tachinoides*). *Musca rustica* Fabr. Antl. 296. 61. ♀.

Hab. in Scandinaviae nemoribus, mense Julio & Aug., minus frequens; scilicet in Scania rarius; in Ostrogothia ad Gusum (in foliis Pteridis capta, sub nom. "Dex. inanis" n. sp." a D. Wahlberg missa, ♂), ad Lärketorp &c., ipse; in Dania ad Hafniam, D. D. Fabricius & Staeger. (E Glogavia a D. Zeller ♂ sub nom. "Dex. vacua", signo dubitationis adjecto, communicatus).

Var. b. *D. lyrata* ♂. abdomine ferrugineo-pellucido, vitta dorsali fusca lyrata seu inaequali, nec linearis ut in var. a. cui alias simillima. In Scania ad Lindholmen 10 Jul. 1838 semel a D. *Dahlbom* deprehensa.

♂♀. Valde similis & affinis priori; sed differt: magnitudine plerumque nonnihil majore; antennis forte paullo brevioribus; epistomate in medio carinato; scutelli apice anōque testaceis; setis quibusdam etiam in disco segmentorum abdominis 2:di & 3:tii præsentibus; alarum nervis (sed vix alarum basi) flavescentibus, longitudinali 4:to infra angulum subdescendentem aut non aut tantum brevissime continuato; tarsis totis nigris; fronte in ♂ paullo angustiore, abdomine neque flavo-diaphano, vitta media angusta nigro-fusca; ut & abdomine in ♀ toto cinereo ligriseo, immaculato, nec fusco-fasciato; abunde distincta. — Variat ♀ abdomine nigrante in speciminiibus detritis.

3. *D. vacua*: cinerea, thoracis dorso flavo-grisecente, nigro-lineato; abdomine in ♂ flavo-pellucido, vitta dorsali fusca, subinterrupta, in ♀ cano, nigro-fasciato; scutelli apice in utroque sexu subtestaceo; antennis, palpis pedibusque rufo-flavis, tarsis nigris; alarum nervis fuscis, longitudinali 4:to vix l. parum infra angulum continuato. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Var. a. ♂♀. nervo alarum longitudinali 4:to infra angulum minime continuato.

Meig. Dipl. 5. 16. 23. ♂♀. & 7. 270. 13. Macq. Buff. 2. 212. 3. ♂♀. *Musca* Fall. Act. Holm. 1816. p. 240. 10. ♂♀. & *Muscides* 42. 10. ♂♀. vera.

Var. b. ♂♀. nervo alarum longitud. 4:to infra angulum inchoante s. breviter continuato.

Hab. ultraque varietas in foliis fruticum, præsertim

Coryli & Quercus, per Scandinaviam meridionalem & medium, 15 Jul.—Aug.—23 Sept., passim, in copula; scilicet in Scania ad Abusa, Skarhult, Ringsjön (D. Petersson), Lindholmen, Esperöd, &c., haud raro; in Smolandia, D. Ljungh; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Wadstena, Medhamra &c., frequens; in Dania ad Hafniam, D. Dahlbom. (E Glogavia a D. Zeller missa). Mores *Dexiae caninæ*; at præsertim vespere ante solem occidentem vigens.

$\delta\varphi$ . Simillima *D. rusticæ*; differt vero certe ab illa: magnitudine plerumque fere duplo minore; abdominis vitta dorsali in  $\delta$  non integra, sed subinterrupta h. e. in singulo segmento versus basin angustata l. evanescente; abdomine in  $\varphi$  cinereo, segmentis omnibus apice fascia sat lata nigra; ut & alarum nervis in utroque sexu fuscedine plus minus perspicua cinctis. Abdomen in  $\delta$  certo situ fasciis subalblicantibus micat, & alio situ incisuræ tenuiter nigrescunt. Anus  $\varphi$  niger, nec ut in priori rufescens.

††. Antennæ & pedes nigra. Alarum costa spinula nulla. *Sericocera* Macq. *Thelaira* Rob. Desvoid.

1. *D. leucozona*: nigricans, subnitida, thoracis lateribus alblicantibus; capite argenteo, vitta frontali anten-nisque nigris, palpis flavis; alarum nervis longitudinalibus 1 & 3 basi multi-setulosis; abdomine fasciis alblicantibus, in  $\delta$  lateribus ferrugineo-diaphano.  $\delta\varphi$ . (Long.  $\varphi$  3,  $\delta$  4 lin.).

*Mas*: frons angustata, utrinque simplici serie dense setulosa; abdomen nigrum, fascia basali in segmentis 2, 3 & 4 interrupta, alba; segmentis iisdem (2, 3, 4) lateribus plus minus late testaceo-vel ferrugineo-pellucidis; alæ abdomine longiores; pulvilli elongati:

*Fem.*: frons modice lata utrinque dupli serie parce setosa; abdomen nigrum, fascia basali in segmentis 2, 3 & 4 subinterrupta, glauco-alba; alae longitudine abdominis; pulvilli parvi.

Meig. Dipt. 5. 37. 7. ♀. & 7. 270. 1. *Musca* Panz. Fb. Germ. 104. 19. ♀. (in figura oculi approximati manrem repräsentant, & area alarum immerito occlusa depicta). — *Sericocera* Macq. Buff. 2. 165. 5. ♀. ( $\delta$  male etiam hoc refertur). — *Musca nigrina* Fall. Muscid. 42. 12. ♀. (male etiam  $\delta$ ). — *Musca nigripes* Fabr. Autl. 293. 47.  $\delta$ . — Panz. Fn. Germ. 104. 18.  $\delta$ . *Dexia* Meig. Dipt. 5. 38. 8.  $\delta$ . *Sericocera* Macq. l. c. 167.  $\delta$ . *Musca lateralis* Fall. Muscid. 42. 11.  $\delta$ . (immerito quoque ♀).

Hab. in graminosis, Umbellatis & foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem & medium, 15 Jun. usque ad 22 Aug., haud rara; scilicet in Scania ad Lund, Kjellby, Abusa, Tranås, Esperöd &c., sat frequens; in Ostrogothia rarius; in Westrogoth. ad Gotoburgum; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; ad Holmiam, D. *Stenhammar*; in Dania rar., D. *Staeger*. (Ad Rixdorf, Johannis Thal & Rudower, prope Berolinum, Jul. 1812 a D. *Dahlbom* lecta; e Glogavia in utroque sexu a D. *Zeller* communicata). — E pupa ovali, brunnea (larva educata) exclusa 2 Febr.; & alia vice imagines plures utriusque sexus 24 Jun. egressæ e pupis, quæ e larvis *Bombycis* (*Cheloniæ*) *Cajæ* & *tubricipedæ* proventæ erant. — Individua quidem non copulata inveni; sed cum e *D. leucozona* numquam nisi seminea, & e *nigripede* numquam nisi mascula, et talia etiam simul sœpe exclusa, inveni, mihi perswasissimum est, illa ad unam eandemque speciem pertinere.

$\delta\varphi$ . Frons & epistoma non prominentia. Vitta frontalis lata, atra, puncto supra antennas albo. Antennæ nigricantes, lineares; seta longe plumata. Oculi valde oblongi. Epistoma in medio non carinatum, apice non exsertum. Thoracis latera & pleuræ cinerea. Abdominis segmenta subæquæ longa; 1:um in medio apieis bisetosum, reliqua in disco & margine apicali setosa. Alæ cinereo-hyalinæ, basi parum ferruginantes. Nervi ut in *D. rustica* directi, at longitudinales: 1:mus fere totus, & 3:tius basi, multisetosi; nervus quoque transversus apiealis minus incurvus. Squamæ albæ, inferior magna. Pedes nigri, tibiis in  $\delta$  sæpe fusco-testaceis.

5. *D. ferina*: cana, vitta frontali, thoracis lineis 3, intermedia triplicata, abdominis maculis irregularibus micantibus, pedibusque, nigris; antennis obscuris, basi rufescens; palpis flavis; alis subinermibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 1— $1\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 42. 16. & 7. 270. 6. Macq. Bußl. 2. 213. 9.  $\delta\varphi$ . *Musca* Fall. Act. Holm. 1816. 242. 14.  $\delta\varphi$ . & Muscid. 43. 14.  $\delta\varphi$ .

Hab. in soliis fruticum, Umbellatis, etiam in ligno secco, per Sveciam medium, 8 Jul.—15 Aug., passim; scilicet in Westrog., D. *Fallèn*; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Gotlandia ad Kyllej; in Uplandia ad Halmiam, D. *Wahlberg*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

$\delta\varphi$ . Similis priori, sed paullo major, latior, fronte prominente, epistomate exerto, in medio carinato, apice subreflexo, antennis nonnihil brevioribus, articulis 1 & 2 fuso-rufescens; thoracis lineis nigris distinctioribus, abdome in utroque sexu similiter pictu, maculis nempe nigro-micantibus irregularibus, setis in disco segmentorum 2 & 3 nullis, ut & alis præsertim in  $\delta$  abdome multo longioribus, sub-

inermibus seu nervo long. 3:tio basi tantum setulis 2 instrueto, abunde distincta. — Caput margaritaceum, inferne subrufescens, epistomate apice sub prominente. Alæ hyalinae. Nervi transversi: ordinarius paullo inflexus, apicalis parum ineurvus. Squamæ albæ. — Cum *Sarcophaga carnaria*, cui similis, non confundenda.

6. *D. triangulifera*: cana, vitta frontali, thoracis lineis 4, abdominis maculis quatuor trigonis, pedibusque nigris; antennis fuscis, basi rufescentibus; palpis flavis; alis subinermibus. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Wahlberg in litteris 1842.

Hab. in floribus Umbellatarum ex. gr. Pimpinellæ nigrae, Angelicæ &c., ut & Solidaginis virgaureæ, atque etiam in ligno cæso Pini, per Sveciam medium & borealem, 2 Jul.—26 Aug., passim; scilicet in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Lärketorp & Wadstena, D. *Dahlbom* & ipse; in Gotlandia ad Westö, Storungs prope Kappelshamn, Ruthe, Kyllej &c., sat frequens; in Bohemia boreali inter Säfvast & Råbäcken in paroec. ÖverLuleå, 1843, D. *Wahlberg*. (E Finlandia a D. *Sahlberg*, & e Silesiæ campis lacustribus (Seefelder) a D. *Zeller*, benigne communicata).

♂♀. Praecedenti valde affinis & similis; ab illa vero certe distincta: corpore plerumque breviore, sed paullo latiore, antennarum seta paullulum longius plumata, oculis fere minoribus, epistomate ut videtur magis buccato, apice forte minus reflexo, thorace 4-lineato, lineis 2 mediis nigris subsimplicibus (h. e. lineola obscura vix interjecta), alis & pedibus, praesertim in ♂, non nihil brevioribus, nervi longitudinalis 4:ti angulo, ni fallor, minus obtuso, sed paullo magis descendente, ut & in primis pictura abdominis a posteriori visi, maculis scilicet duabus in singulo segmen-

torum 2 & 3, regulariter triangularibus, nigris, per seriem medium alarum macularum trigonarum einerearum separatis, Abdominis 1:ium segmentum fere totum nigrum, inerme; 2:um in medio apieis 2-setosum, 3:ium margine apicali multisetosum. — Affinis videtur *Dex. pectinata* Meig. Dipt. 5. 43. 17, sed vix eadem. — Sub nomine: *Dexia geminata* a me olim inter Amicos entomologicos divulgata fuit. — Specimen ex ÖfverLuleå mihi communicatum Gotlandieis vulgaribus duplo minus, alias simile.

\*\* Nervus transversus apicalis rectus. Nervus longitudinalis 4:tus infra angulum non continuatus.)

7. *D. carinifrons*: cinerascens; capite cano, fronte distinete prominente; epistomate inferne subrufescente; antennis, vitta frontali, palpis, thoracis lineis 3, intermedia triplicata, pedibusque, nigris; abdome fusco-subtestellato; alis inermibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Var. a. ♂♀. alis hyalinis, immaculatis, nervis nigricantibus.

Meig. Dipt. 5. 45. 20. ♂♀. & 7. 270. 9. Macq. Buff. 2. 211. 10. ♂♀. *Husca* Fall. Muscid. 41. 15. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 653. 1. ♂♀. *Myocera anthophila* Rob. Desv. n:o 3.

Var. b. ♂♀. alis hyalinis, nervis fuscis, basi præsertim flavedine cinctis. Sub nomine *Dex. fuscinervis* olim vendita.

Hab. utraque varietas in graminosis, sed præcipue in floribus Compositarum ut Achilleæ Millefol., Matricariae &c., ad vias & versuras agrorum, per Scandinaviam, 21 Jun.—2 Octob. (versus autumnum præsertim copiose) omnium frequentissima; vivipara; scilicet in Scania, Smolandia, Ostrogothia, Ölandia, Gotlandia (ad Nähr, Marte-

bo, Stenkyrka, Gothem &c., vulgatissima; deinde rarevit & in Nericia, Uplandia (ad Holmiam, D. *Wahlberg*) & Gestricia parce lecta; in Dania, D. *Dahlbom*. (E Glogavia utrumque sexum & seminam nomine: "D. *griseola* Bouch." communicavit D. *Zeller*).

$\delta\varphi$ . Oblonga, cinerascens, opaca. Caput cinereo-albidum. Frons valde porrecta, in  $\delta$  præsertim postice angusta, setis utrinque simplici serie dispositis; in  $\varphi$  latissima, setis paucioribus, postice duplici serie utrinque positis; in utroque sexu cana, vitta nigra, in  $\delta$  subangusta, in  $\varphi$  latori. Antennæ lineares, nigræ, seta plumata. Epistoma nudum, infra oculos descendens, in medio carinatum, inferne rufescens & subtus nigro-pubescent; oris margine antico subreflexo. Abdomen conicum ( $\delta$ ), aut ovatum ( $\varphi$ ), maculis obsoletis fusco-micantibus, segmentis: 1:mo bisetoso, 2 & 3 margine apicali multisetosis, 4:to toto setuloso. Alæ omnino nudæ, nervo transverso ordinario inflexo. Squamæ sordide albidae. — Oculi in viva rufo-ferruginei. Var.  $\varphi$  abdomine griseo, immaculato.

$\beta$ .) Seta breviter plumata. Species nigræ, subnitidae (*D. pygmæa* n:o 11 cinerascens).

8. *D. volvulus*: nigra, nitida, capite argenteo, fronte prominente, vitta latiuscula, atra; thoracis maculis humeralibus abdominisque cingulis 3, albis; alis hyalinis, basi squamisque subflavicanibus, halteribus flavis; nervo longitudinali 4:to subareuatim flexo in summo apice alæ excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 35. 2.  $\delta\varphi$ . T. 43. f. 19. — *Musca* Fabr. Ent. Syst. 4. 328. 17. Zett. Ins. Lapp. 653. 3.  $\delta\varphi$ . *Ocyptera* Fabr. Anth. 311. 7. *Sericocera* Macq. Buff. 2. 166. 3.  $\delta\varphi$ . *Melania* Meig. Dipt. 7. 275. 1. T. 73. f. 23.  $\delta$ . *Musca cylindrica* Fall. Act. Holm. 1816. 242.

13. & Dipt. Suec. Muscid. 43. 13. ♂♀. certiss. (exclus. syn. *Musca halterata* Panz., quod ad *Muscam mauram* Fabr. seu *Dexiam mauram* Meig. pertinet, Faunæ Scandinaviae forte ignotam).

Hab. in soliis fruticum, floribus Umbellatarum &c., per Scandinaviam, 2 Jul.—15 Sept., vulgaris; scilicet in Scania ubique frequentissima; in Smolandia, D. *Ljung*; in Ostrogothia ad Godegård &c.; in Nericia ad Kärr; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Ångermania ad Hernösand; in Dalecarlia raro; in Lapponia Umensi ad Lycksele rar.; in alpe Dovre Norvegiae, D. *Bohemani*; ad Thynæs & Næs Værdaliiæ Norvegiae, frequens, D. *Dahlbom*. (E Glegavia a D. Zeller sine synonymia missa).

♂♀. Similis & affinis *Tachinæ albinceræ* (71) & *Erinaceus* (75), sed antennarum seta subplumata, nec nuda, &c. ab illis distincta. Cylindrica. Oculi non magni, in ♀ paullo remotiores quam in ♂. Antennæ lineares, angustæ, longitudine fere epistomatis. Epistoma argenteum, nudum, subdeclinatum, infra oculos descendens, in medio non carinatum nec margine antico distincte reflexo. Palpi subfiliformes. Pleurae cinereæ. Abdominis segmenta æque longa, omnia in disco & margine apicali setosa; cingulis 3 subinterruptis (hunc ultimo valde obsoeto) albis in basi segmentorum 2, 3 & 4 locatis. Alæ divaricatae cinereo-hyalinæ, basi subflavidae; inermes præter setulas 2-3 in basi nervi longit. 3:tii. Spinula costæ nulla. Area in apice alæ sœpe anguste aperita. Nervus transv. ordinarius parum flexus paullo pone medium areæ insertus. Squamæ albidae, flavidо-marginaltæ; valvula superiore parva. Halteres subnudi, flavi. Unques & pulvilli in ♂ nonnihil longiores quam in ♀.

9. *D. melanoptera*: nigra, subnitida, capite argenteo, fronte parum prominente, vitta angusta (♂), aut lata (♀), atra; alis fuscis, margine costali saturationi, squamis

parvis fuscans, halteribus obscuris; nervo longitudinali 4:to arcuatim flexo in summo apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 36. 4. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 52. 34. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 654. 7. ♂♀. *Morinia* Meig. Dipt. 7. 275. 1.

Hab. in Sueciæ mediæ & borealis fruticibus & Umbellatis, mense Julio, rarius; scilicet in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Lärketorp, ipse; in Westrog., D. *Gyllenhal*; in Uplandia ad Holmiam, Idem D. *Wahlberg*; in Lapponia Umensi ad Åsele & Almsele. (E Glogaviæ montosis in utroque sexu a D. *Zeller* missa).

♂♀. Oblonga, subdepressa, tota nigra, immaculata, thoracis humeris perparum, & pleuris, albo-micantibus. Caput argenteum, vitta frontali atra. Frons nigra. Oculi in ♂ cohaerentes, in ♀ remoti. Antennæ breves, articulo 2:do apice superne denticulo parvo; seta fusca, breviter plumata, apice nuda. Epistoma subperpendiculare, in medio non carinatum, nec apice reflexum. Palpi nigri. Abdomen pilosum, sed vix setulosum, segmentis subæque longis. Alæ sub quiete paralleliter subincumbentes, ad marginem interiore hyalinae, nervis omnibus fuscedine late cinctis & costa nigriore; totæ inermes & spinula costæ nulla. Nervi ut in priori directi, sed longitudinalis 4:tus magis obtuse arcuatus. Squamæ in ♂ fuscæ, in ♀ albidae. Halterum clava obscura. Pedes setulosi, sed vix spinulosi.

*Obs.* 1. Sub nomine: "Coeliopsis lasiops Bouché" individuum hujus quoque mihi misit D. *Zeller*.

*Obs.* 2. Pupa hujus speciei a Cel. *Baumhauer* in ligno putrido inventa, mense Majo exclusa, teste D. *Meigen*.

**10. *D. minima*:** nigra, parum nitida, capite sordide argenteo-micante; fronte non prominente, vitta angusta (♂), aut lata (♀), atra; alis totis fuscans, squamis sordi-

de albidis, halteribus obscuris; nervo longitudinali 4:to arcuatim flexo in summo apice alae excurrente. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

*Musca* Zett. Ins. Lapp. 654. 8. ♂♀. An *Bexia nana* Meig. Dipt. 5. 37. 5? *Melanophorus nana* Macq. Bußl. 2. 175. 4? *Morinia nana* Meig. Dipt. 7. 275. 3. T. 73. f. 29. ♂?

Hab. cum priori, in Suecia mense Julio minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd rarissime; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogoth. ad Gusum; in Westrogothia, D. D. *Gyllenhal* & *Marklin*; in floribus Pimpinellæ nigræ ad Ruthe Gotlandiæ, ipse; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Norvegia ad Dovre, D. *Bohemian*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

♂♀. Simillima priori, sed magnitudine constanter duplo 1. triplo minore, colore minus nitido, fronte minime prominente, epistomate minus pure argenteo, antennis proportione ut videtur paullo longioribus, alis totis fere æqualiter leviter fuscans, nec ad nervos intensius infuscatis, ut & nervo transverso ordinario omnino recto, vere differt.

*Obs.* *Moriniam nanam* Meig. I. e. hanc certe haberem, nisi in figura alæ *hyalinæ costa late nigra* repræsentarentur, quales in nostra non sint.

11. *D. pygmaea*: cinerascens, subopaca, capite sordide argenteo-micante; fronte non prominente, vitta latiuscula (♀), nigra; alis vix fuscans, squamis sordide albidis, halteribus flavis; nervo longitudinali 4:to arcuatim flexo in summo apice alae excurrente. ♀. (Long. 1 lin.)

Hab. in Gotlandia rarissime; ad Gothem d. 17 Jul. 1811 individuum descriptum detexit oculatissimus *Dahlbom*.

♀. Valde similis & affinis præcedenti, sed colore corporis obscure cinereo, nec nigro, alis minus infuscatis, fere hyali-

nis, ut & halteribus flavis, nec nigris, vere diversa. — Haud nitida. Caput albido-cinereum. Oculi late remoti, vitta frontali modice lata nigra, per orbitam oenlorum albo-cinereum utrinque marginata. Reliqua ut in priori.

*Nota.* In collectione mea adest individuum masculum *Dexiae*, e Suecia superiori missum, quod hoc modo descriptum tradere volui:

*Dexia* tota atra, nitida, pilosa, oculis cohaerentibus; antennis brevibus, seta longe plumata; epistomate brevi; alis ad marginem interiore hyalinis, costa late (inclusis nervis) nigricante, nervis: longitudinali 4:to angulatim (nec arcuatis) fleso paullo ante apicem in costa excurrente & infra angulum subcontinuato, transverso ordinario recto in medio areæ subocellusæ inserto, longitudinali 3:to basi setuloso, spinula costæ distincta, squamis majusculis albis halteres obscuros obtentibus; 2 lineas longa;

affine & simile videtur Meigeni *Dexiis fimbriatae* & *mauræ*; sed cum ejus patria mihi ignota est, illud seriei specierum Scandinaviearum inserere non potui.

#### B. Seta antennarum pubescens.

12. *D. dolens*: nigricans, parum nitida, capite argenteo-micante, palpis lividis; fronte sub prominente, vitta angusta (♂), alra; alis hyalinis, squamis albis, nervis transversis rectis, apicali mox ante apicem alæ excurrente. ♂. (Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.).

*Musca* Zett. Ins. Lapp. 654. 5. ♂.

Hab. in Lapponia septentrionali rarissime; ad lacum insignem Torneåträsk in regione subalpina Lapponiae Tornensis situm, 9 Jul. 1821 specimen unicum inveni.

♂. Oblonga, affinis *D. carinifronti* (7), corpore vero nigro, fronte multo minus produeta, alis magis pure hyalinis,

squamis albidiорibus, ut & oculis (maris) adhue magis approximatis, fere cohaerentibus linea frontali angustissima nigra tantum remotis, mox dignota. Antennae etiam fere breviores, quam in *D. carinifronte*, nigro-fuscæ, seta non usque ad apicem pubescente. Thorax antice parum cinereo-micans. Abdomen nigrum, subnitidum, pilosum. Alarmi nervi ut in *carinifronte* directi. Spinaula costæ adest, sed parva. Pedes picei.

**13. *D. puberula*:** cinerascenti nigra, subopaca, capite argenteo-micante, epistomate inferne rufescente, palpis flavis; fronte modice prominente, vitta angusta ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), nigro-fusca; alis hyalinis, squamis albis, nervis transversis: ordinario leviter flexo, apicali recto mox ante apicem alee excurrente.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Zett. Ins. Lapp. 654. 6.  $\delta\varphi$ .

Hab. in Norvegiæ Nordlandia septentrionali; ad urbem Tromsoe d. 21 Jul. 1821 unicum par copulatum deprehendi.

$\delta\varphi$ . Priori affinis & similis, sed paullo major, & colore corporis nigro magis cinereo-micante, palpis flavis, ut & oculis (maris) non tam prope conniventibus, distineta. Caput, in  $\delta$  argenteum, linea frontali media angusta (angustiori nempe quam in *D. carinifronte*, at paullo latiori quam in *D. dolente*), piceo-atra; in  $\varphi$  cinereum, interstitio frontali lato, vitta media nigro-fusca. Antennæ ut in præcedente, sed articulo 2:do apice rufescente. Seta ut in priori. Epistoma inferne utrinque macula carneæ, margine antico subreflexo. Vibrissæ inferne paucæ decrescentes. Thorax niger, cinereo-micans. Abdomen dense pubescentis, sed vix nisi in margine apicali segmentorum 2, 3 & 4 setulosum, cinereo-nigricans, incisuris tenuiter, & maculis dorsalibus certo situ perspicue, fusco-aeneo-micantibus; in  $\delta$  subcylindricum, ano subtuberculato, inflexo (non vero tam magno ac in *Sar-*

*cophagis*, quibus alias subsimilis); in ♀ subdepressum. Alæ ut in *D. curinifronte* etiam quoad nervorum directionem, sed spinula eostæ distinctior. Pedes in ♂ picei, in ♀ nigri. — *Musca rudi* quoque affinis & similis, sed magnitudine minore, corpore subcylindrico, nec late ovato, ut & seta antennarum pubescente, nec plumata, distincta.

*Subdiv. 2:da.* Alarum area media apice oclusa.  
Nervus longit. 4:tus angulatus, mox ante apicem  
alæ excurrens.

**11. *D. compressa*:** glauca, capite argenteo, anten-  
narum nigrarum basi, palpis, abdominis compressi lateri-  
bus femoribusque, rufis; vitta frontali, thoracis lineis 2,  
abdominis vitta dorsali, tibiis tarsisque, nigris; alis sub-  
hyalinis, nervo longitudinali 4:to infra angulum continua-  
to; antennarum seta breviter pubescente. ♂♀. (Long.  
 $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 41. 13. ♂♀. (synonymon Fabricii:  
"*Ocyptera rufa*," erroneum). — *Musca* Fabr. Ent. Syst. 4.  
327. 61. Zett. Ins. Lapp. 652. I. ♂♀. *Ocyptera* Fabr.  
Autl. 314. 5. *Sericocera* Macq. Buff. 2. 169. 10. ♂♀.  
*Wiedemannia* Meig. Dipt. 7. 253. I. T. 72. f. 1. ♀. *Mu-  
sea lateralis* Panz. Fn. Germ. 7. 22. (cum *Tachin. laterali*  
commixta). — *Musca rufiventris* Fall. Muscid. 41. 8. ♂♀.

Hab. in fruticibus, fenestris & parietibus ligneis, per  
Sueciam medium & australem, 15 Jun.—2 Aug., minus fre-  
quens; scilicet in provincia Calmariensi Smoldaniæ ex.  
gr. ad Berga & Ryssby; in Ostrogothia ad Gusum, D.  
*Wahlberg*; in Gotlandia ad Ejsta, Gothem & Kjellunge.  
(E Glogavia a D. Zeller communicata).

♂♀. Longa, angustata, cylindrica. Caput argenteum. Frons  
parum prominens, convexa, in utroque sexu subæqualiter,

modice & fere paralleliter lata, vitta modice lata, nigra. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis, angustæ, articulo ultimo basalibus rufis fere triplo longiore, nigro, seta biarticulata, breviter puberula, vix ad medium incrassata. Epistoma subperpendiculare, nudum, vibrissis inferne spuriis, macula utrinque ad os sæpe rufa. Margo oris non reflexus. Thorax glaucus, vittis 2 lateralibus (in illæsis) brunneo-nigris. Scutellum glaucum, lateribus nigrum. Abdomen nigrum, nitidum, lateribus (in segmentis 1, 2 & 3) rufis, cingulo in basi segmentorum 2 & 3 certo situ albo-nicante; segmentis subæque longis, in disco & margine apicali setosis. Alarum nervi fere ut in *D. carinifronte* directi, sed nervus long. 4:tus magis acutangulatum flexus, infra angulum perspicue continuatus. Area apiee distincte cælusa (minime aperta), & spinula costæ evidens. Nervus long. 3:tius basi setulosus. Squamæ albæ. Halteres testacei. Pedes nigri, femoribus rufo-slavis. Pulvilli & ungues in utroque sexu parvi. — Valde affinis *Tachinæ laterali* n:o 192.

**15. *D. griseescens*:** cinerea, capite cano, epistomate inferne rufescente; antennarum nigrarum basi, palpis tibiisque testaceis; vitta frontali picea; pedibus nigris; alis subhyalinis, nervo longitudinali 4:to infra angulum non continuato; antennarum seta plumata. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{3}{4}$  lin.).

Var. a. ♂♀. pedibus nigris, tibiis testaceis.

Meig. Dipt. 5. 45. 21. ♂. & 7. 270. 10. *Musca* Fall. Muscid. 41. 16. ♂. *Dinera* Maeq. Buff. 2. 211. 4. ♂.

Var. b. ♂♀. pedibus testaceis, tarsis nigris.

Hab. utraque varietas in floribus Achilleæ Millefol. &c., per hortos & prata Succiæ meridionalis & mediae; locis plerumque aridis sæpe littoralibus, 27 Jun.—Jul.—29 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund, Eperöd, Kivik, Raflunda &c., sat frequens; in Smolaudia ad villam

Skärsjö prope Eksjö, D. Sv. *Ingem. Ljungh*; in Ostrogothia ad Gusum (D. *Wahlberg*) & Wadstena; in Westrog, D. *Gyllenhal*; in Ölandia ad Glömminge & Galltorp; in Gotlandia ad Ruthe, Gothem, Nähr, Kyllej &c. (E Silesia & Wienna a D. *Zeller* benevole missa).

$\delta\varnothing$ . Variat magnitudine. Cylindrica, grisea, immaculata, opaca. Caput ut in *D. carinifronte* (7) constructum, griseo-canum. Frons distincte porrecta, in  $\delta$  angusta, in  $\varnothing$  lata, serie setarum in utroque sexu ad antennarum basin continuata, utrinque in  $\delta$  simplici, in  $\varnothing$  dupli. Vitta frontalis ferruginea. Antennæ breves, rosæ, articulo ultimo nigricante, seta fusca, distincte plumata. Epistoma nudum, inferne flavo-rufum, antice reflexum. Palpi flavi. Oculi præsertim in  $\varnothing$  parvi. Thorax antice lineolis 4 fuscis obsoletis & tenuibus. Abdominis segmenta subæque longa, margine apicali setosa. Alæ flavido-cinereæ, nervis ut in *carinifronte* directis, at area media apice occlusa. Spinula costæ adest. Squamæ albæ. Pedes ut in diagnosi. — Varietas b. plerumque individua feminea continet.

16. *D. cristata*: cinerea, palpis tibiisque testaceis; vitta frontali pedibusque nigris; thoracis lineolis 4, abdominisque maculis, obsoletis fuscis; alis cinereo-hyalinis, nervo longitudinali 4:to infra angulum non continuato, area media petiolata; antennarum seta plumata.  $\delta\varnothing$ . (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 41. 14.  $\delta\varnothing$ . T. 43. f. 21. (ala) —. *Dinera* Maeq. Buff. 2. 210. 1.  $\delta\varnothing$ . Meig. Dipt. 7. 269. 1. T. 73. f. 13.  $\delta$ . f. 15.  $\varnothing$ .

Hab. in Suecia boreali rarissime; femina in Dalecarlia in uno specimine a Cel. Prof. *Bohemian* inventa, mihiique ad describendam benigne communicata.

$\varnothing$ . Affinis & similis priori; sed magnitudine majore, antennis totis & vitta frontali nigris, ut & alarum area media petiolata, præcipue & vere differt. Læte griseo-cinerea. Caput subvesiculosum. Antennarum articulus ultimus 2:do cinereo-micante duplo longior, niger. Frons lata, serie se-

tarum utrinque dupli. Epistoma perpendicularare, inferne parum rufescens. Palpi flavi. Oculi parvi. Thorax antice lineolis 4 obscureis, quarum mediis tenuibus, omnibus parum perspicuis, posticeque evanescientibus. Scutellum griseum. Abdomen oblongo-ovatum, griseum, certo situ maculis irregularibus fusco-micantibus. Segmenta: 1:mum breve, inerme; reliqua disco bisetata. Alae cinereæ, basi leviter fusco-ferrugineæ. Nervi transversi fuscedine paullo cincti, horum ordinarius pone medium areæ insertus, obliquus & inflexus, ultimus subrectus nonnihil intra apicem alæ cum nervo longit. 3:to fere ut in *Ocyptera* conjuncto. Hinc area media sat longe petiolata. Spinula costæ gemina adest. Squamæ magnæ, sordide albidae. Pedes nigri, tibiis testaceis.

♂ similis feminæ, sed oculis conniventibns, per vittam frontalem angustam tantum sejunetis, dignotus.

### *Species dubia.*

17. *D. tachiniformis*: cinerascens, antennis cuneatis, thoracis vittis, abdominis linea dorsali media & fasciis transversis, pedibusque, nigris; palpis, scutelli apice, abdominis lateribus, genubus tibiisque ferrugineis; alis hyalinis, squamis albidis, nervo longitudinali 4:to angulatione flexo fere in apice alæ excurrente; antennarum seta breviter pubescente. ♂. (Long. circiter 2 lin.).

Hab. in Ölandia, ubi inventa a D. Prof. *Bohemani*, qui 1831 specimen descriptum mibi mutuo amice communicavit.

♂. Affinis *Sarcophagæ*; *Dexiæ puberulæ* (13) proxima. Cylindrica, grisea. Antennæ epistomate breviores, cuneatæ, nigrae, articulo 2:do summo apice rufo. Vitta frontalis brunnea. Oculi non late remoti, nudi. Palpi flavi. Scutelli summas apex ferruginens. Abdomen cylindricum, macula lateralí ferruginea. Anus tuberculatus, subtus rufo-bimaculatus. Alarum nervus transversus ordinarius rectus & subperpendicularis. Halteres flavi. Pedes nigri, genubus præsertim posticis late, tibiisque obscure ferrugineis.

# DIPTERA SCANDINAVIÆ

DISPOSITA ET DESCRIPTA.

---

Auctore

PHL. D:RE JOHANNE WILHELMO ZETTERSTEDT

AD UNIVERSITATEM LUNDENSEM BOTAN. ET OECON. PRACT.  
PROFESS. REG. ET ORD.; EQUITE AURATO REG. ORDINIS DE  
WASA; REG. ACAD. SCIENT. HOLM., SOCIET. ENTOMOL. PARIS.,  
NATUR. CURIOS. LIPS., SOCIET. CUVIER. PARIS., SCIENTIAR.  
LITTERARUMQUE ELEGANT. GOTHOB., PHYSIOGRAPH. LUND.,  
CULTURE BOMBYCINÆ SUECANÆ HOLM., ENTOM. SCANDINAV.  
HAFNIE., ET OECON. MALMOG., SODALI; REG. SOCIET. OECO-  
NOM. BOTN. OCCIDENTALIS ET SOC. PRO FAUNA ET FLORA  
FENNICA HELSINGFORSLÉ, MEMBRO HONORIFICO;  
ATQUE SOCIET. ENTOM. STETINI  
CORRESPONDENTE.

---

TOMUS QUARTUS.

---

LUNDE,

EX OFFICINA LUNDBERGIANA,  
SUMTIBUS REGIIS.

---

1845.

**REGIÆ ACADEMIÆ SCIENTIARUM**

**HOLMIENSI**

hanc sui operis Sectionem

venerabundo animo

dicat

**Auctor.**

## Famil. 24. SARCOPHAGARIÆ.

## 126. SARCOPHAGA Meig.

*Corpus* majoris aut mediæ magnitudinis, oblongo-ovatum, ta-chiniforme, pubescens & setosum. Antennæ inenmbentes, sœpissime breviusculæ, articulo ultimo elongato, prismati-co, compresso, basi seta dorsali ad dimidiam partem l. paullo ultra plumata, apice nuda. Frons plerumque promi-nens. Oculi in utroque sexu remoti, nudi. Epistoma in medio non carinatum, apice subreflexum. Setæ mystacinæ validæ. Vibrissæ nullæ l. spuriæ. Abdominis segmenta saltem posteriora margine apicali setosa. Alæ divaricatæ, hyalinæ. Nervus longitudinalis 4:tus angulo acuto l. sub-acuto ad costam sœpissime sursum flexus, paullo ante api-cem alæ excurrens. Area media plerumque apice aperta, raro subocclusa. Alæ inermes, nervo tantum long. 3:ti-o basi paucisetuloso, at spina costæ sœpe nulla. Squamæ distinetæ. Pedes simplexes. *Color* nigricans, cinereus, interdum metallicus; pictura nigro-lineata aut tessellata. *Motu* velox, volatu celeri. *Habitatio* in foliis fruticum, flori-bus, parietibus, muris, terra lapidibusque. Larvæ in eada-veribus, fungis putridis &c., degunt. Feminæ viviparæ. *Discrimen sexus*; *mas*: abdomine cylindrico-conico, ano bi-tuberculatim infexo, oculis magis appropinquantibus, inter-dum sat approximatis, serie setarum frontalium utrinque simplex, tibiis posticis interdum villosis, ut & tarsis magis pilosis, ungibus pulvillisque elongatis; *femina*: abdomine ovali, ano acutiori, oculis late remotis, serie setarum frontalium utrinque duplii, tibiis posticis numquam villosis, ut & tarsis minus pilosis, ungibus pulvillisque brevioribus. — *Typus generis*: *S. carnaria*. (Species 1:mæ Sectionis ægre distinguuntur, & notæ discernentes vix nisi e maribus sumi possunt. Feminæ multarum inter se simillimæ. Hinc indi-vidua in copula juncta sollicite colligenda utpote pro spe-

cierum determinatione necessaria). Species Creophilarium omnes, antennarum incumbentium seta circiter ad medium plumata apice longe nuda, fronte porrecta, ore exerto, oculis nudis, alarum nervo transverso apicali mox ante apicem alae in costa excurrente, abdominis convexi segmentis saltem 3:to & 4:to margine apicali setulosis, ut & anno maris inflexo bituberculato, tarsorum ungibus pulvillisque in mare elongatis, præditas, ad *Sarcophagæ* genus numeravi. Unde etiam species quasdam (ex gr. *S. Vespillonem* &c.) his notis instructas a *Muscæ* genere removi & *Sarcophagæ* introduxi. — Ut autem facilius examinentur species sequentem earum subdivisionum conspectum allegare non inutilem duxi.

### *Sarcophaga*:

*Cohors Prima*. Anus maris magnus, lumen. Color corporis aut cinerascens nigro-pictus, aut metallicus.

*Sect. 1:ma*. Palpi nigri (*S. fuscipalpis* palpis obscuris in Sect. 2:da sub n:o 27 querenda). Alarum nervus longitudinalis 4:tus infra angulum saltem apparerter continuatus. Color corporis cinerascens, pictura nigro-lineata (in thorace), aut nigro-tessellata (in abdome). Tibiae posticæ intus in ♂ sæpe villosæ. *Sarcophaga* & *Agriæ* species Macq.

A. Anus niger; in ♂ nitidus, interdum medio (sutura), aut antice, cinereus. (In ♀ *S. vagantis* n:o 10 anus rufescens).

\*) Tibiae posticæ in maribus intus obscure villosæ.

**1 carnaria.** **2 cærulescens.** **3 striata.** **4 Atropos.** **5 albiceps.** **6 melanura.** **7 sinuata.** **8 agricola.** **9 pumila.** **10 vagans.**

\*\*) Tibiae posticæ intus in utroque sexu nudæ. Species pleræque parvæ.

†. Abdomen cinereum nigro-tessellatum.

**11 arvorum. 12 depressifrons.**

††. Abdomen cinereum, triplici serie nigro- vel fusco-lineatum aut punctatum.

**13 effusis. 14 lineata. 15 latifrons. 16 obsoleta.**

.B Anus rufus aut rufescens. (*S. vagantis* se- mina ano rufo in subdivisione A. sub n:o 10 invenienda).

α). Mares: tibiis posticis intus obscure villosis.

**17 hæmorrhoidalis. 18 cruentata.**

β). Mares: tibiis posticis intus nudiusculis.

**19 hæmorrhou. 20 hæmatodes. 21 erythrura.**

*Sect. 2:da.* Palpi flavi (in *S. fuscipalpi* n:o 27 obscurei). Alarum nervus longitudinalis 4:tus infra angulum non continua- tus. Varicolores. Tibiæ posticæ intus semper nudæ.

*Subd. I.* Color præcedentium. Corpus scilicet ci- nereum, thorace nigro-lineato, abdomine obscure macula- to. *Sarcophaga* Macq. *Theira* Rob. Desvoid.

**22 ruralis. 23 muscaria. 24 pygmæa.**

*Subd. II.* Color corporis metallieus, nitens, thora- cis scilicet cœrulecenti niger, lineatim albo-micans, abdo- minis chalybeus aut virescens. *Cynomyia* Rob. Desv. & Macq.

**25 Mortuorum. 26 alpina. 27 fuscipalpis. 28 Vespollo.**

*Cohors Secunda.* Anus maris parvus. Color corporis obscure cœruleus \*). Palpi aut flavi, aut nigri.

\*) Equidem concedo hanc *Sarcophagæ* cohortem *Muscariarum* Familiæ satis prope accedere, & quidem cum *Luciliis* ali-

29 *genurum*. 30 *cerulea*. 31 *atriceps*.

*Cohors Prima.* Anus in mare magnus, tumidus.

*Sect. 1:ma.* Palpi nigri. Alarum nervus longitudinalis 4:tus infra angulum saltem apparenter continuatus. Color corporis cinerascens, pictura nigro-lineata. Tibiae posticæ in ♂ sæpe villosæ.

A. Anus niger; in ♂ nitidus, interdum medio aut antice cinereus. (In ♀ *S. vagantis* n:o 10 anus rufescens).

\*). Tibiae posticæ in masenlis intus villosæ.

1. *S. carnaria*: cinerea, capite albo-flavescente, fronte longe porrecta; antennis, villa frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ♂: tibiis posticis intus villosis, ano alto, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long. 3—5 lin.).

Meig. Dipt. 5. 18. 6. ♂♀. Macq. Buff. 2. 226. 10. Zett. Ins. Lapp. 619. 1. ♂♀. *Musca* Linn. Fn. Sv. 1832. Degeer Ins. 6. 63. 8. t. 8. f. 5. Reaum. Ins. 4. T. 29. f.

quotque *Muscis*, ex. gr. *vomitoria* ♂. *Grönlandica* valde congruere. Cum vero seta antennarum ad medium l. vix ultra medium tantum plumata ut nota constans & facilis mihi visa fuit *Sarcophagarias* a *Muscariis* seta antennarum usque ad apicem plumata instructis, distinguendi, ex hac quoque setæ ratione caracterem essentialē pro *Sarcophagæ* generere in sua familia unico stabiliendo finxi, non omnino neglectis aliis notis magis accidentalibus. Neque heic plane desunt ejusmodi notæ secundariae. Nam abdومine magis setuloso, a *Luciliis*, & corpore magis convexo a pluribus *Muscis* depresso saltem nostræ species *Sarcophagæ* 29 & 30, discernuntur.

2—8. Schrank Ins. Austr. p. 456. 927. Fabr. Antl. 284.  
4. Latr. Gen. 4. 345. Fall. Museid. 38. 1. (sub qua vero  
plures latent species). *Musca variegata* Scopol. Carn.  
n:o 869.

Hab. in hortis, pratis, agris, per totam Scandinaviam  
usque ad Lapponiam, a primo vere ad serum autumnum,  
omnium vulgatissima, in copula frequenter observata, e  
pupa cylindrica, lævi, brunnea sæpe exelusa. Larva in  
vegetabilibus putridis, & stercore pecorum hominisque,  
vix in carnosis, degit secundum Cl. *Bouché* Naturgesch.  
der Insecten, 1831. I. 61. Status nympharum 4—8 heb-  
domadibus; seriores vero in statu pupæ hybernant. (Ex Hel-  
golandia etiam plura specimina communicavit D. *Dahlbom*).

♂♀. Magna, sed variat etiam minor. Oculi exserti, in viva  
rufo-ferruginei. Antennæ epistomate paullo breviores, arti-  
culo ultimo 2:do duplo & ultra longiore, seta distinete plu-  
mata. Epistoma ad latera (juxta oculos) utrinque setulis  
5—6. Vibrissæ vix inchoandæ. Frons longe prominens, in  
♂ modice lata, in ♀ paullo latior, vitta in utroque sexu  
atra. Thoracis vittæ dorsales nigrae 5, laterales abbreviatæ  
& obsoletæ; vitta media ex anteriori inspecta tripleata. Ab-  
domen nigrum, tessellis quadrifariam dispositis, cinereis.  
Segmenta: 1:mum subinermie, 2:dum in medio apicis bise-  
tosum (setis facile deterendis), 3 & 4 margine apicali multi-  
setosa. Anus in ♂ niger, in medio cinereus. Alarum ner-  
vi transversi: ordinarius leviter flexus paullo pone medium  
areæ sat late apertæ insertus; medius obliquus, fuscedine  
sæpe cinctus. Nervus longit. 2:dus ferrugineus. Squamæ  
albæ. Pedes in utroque sexu valide spinosi; in ♂ femori-  
bus anterioribus subtus tibiisque posticis latere interiori sat  
longe & dense nigro-villosis, pulvillis magnis, suborbicula-  
tis, albidis. Ungues in ♂ anteriores recti, truncati, in ♀  
omnes curvati.

2. *S. cærulescens*: nigro-cærulescens, capite albo-flavescente, nitido, fronte minus porrecta; antennis, vitta frontali pedibusque, nigris; thoracis lineis 6, abdominisque tessellis, glaucis; ♂: tibiis posticis intus villosis, ano atro, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long. 4— $4\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 650. 2. ♂♀.

Hab. in sylvis & truncis Pini sylvestris, præsertim in Scandinavia boreali & Lapponia, 23 Jun.—21 Aug., rarius; d. 12 Jul. in copula capti; scilicet in Scania semel inventa; in Lapponia Umensi ad Tresunda, Wojm-sjön & Rusle, passim; in Lapponia Tornensi ad Kihlangi, Juckasjervi usque ad Torneåträsk procedens; in Norvegia ad Garnæs Værdalæ rarissime, D. Dahlbom.

♂♀. Priori parum brevior, sed fere latior, præsertim ♀. Præterea ei valde similis, fronte tamen minus prominenti, antennis forte nonnihil latioribus, ut & colore corporis magis cærulecente, lineis thoracis abdominisque tessellis albo-glaucis, dignota. — In uno specimine vere masculo unguis omnes incurvatos vidi, in aliis vero individuis unguis anteriores rectos, truncatos ut in præcedente inveni.

3. *S. striata*: cinerea, capite albido, nitido, fronte modice porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, media antice subtriplicata, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ♂: tibiis posticis intus villosis, fronte subangustata, ano atro, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long. 4—5 lin.).

Meig. Dipt. 5. 21. 7. ♂♀. Macq. Buff. 226. 12. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 288. 20. *Musca carnaria* var. "colore linearum thoracis tessellarumque abdominis albicante" Fall. Muscid. 38. 1. in descriptione.

Hab. in soliis fruticum & floribus, per hortos, prata & agros Scandinaviae, 20 Maj.—15 Aug., passim frequens; in copula multoties deprehensa & mense Mayo sæpe exclusa; scilicet in Scania ad Lund, Kjellby, Abusa &c. vulgaris; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena &c.; in Gotlandia a Lärbro &c.; in Jemtlandia usque ad alpes Åreskutan & Mullfjellen; in littore arenoso insulae in lacu Randijaur Lapp. Lul. D. *Wahlberg*; in Dania, D. *Staeger*. (In insula Helgolandia utsique sexus a D. *Dahlbom* inventus. E. Glogavia a D. *Zeller*, ex Hamburgo a D. v. *Winthem*, & e Kilia a D. *Wiedemann* quoque communicata).

♂♀. Simillima *S. carnariæ*, sed differt: statura nonnihil angustiore, capite albido-, nec flavidomicante, fronte minus prominente (paullo tamen magis quam in *S. cæruleoresente*), thoracis lineola media nigra ab anteriore visa subtriplicata, abdominis tessellis glaucis l. albidis, nec flavidomicantibus, ut & alis forte purius hyalinis. — Nervus transversus ordinarius flexus. Tibiæ posticæ in ♂ intus crebro villosæ.

4. *S. Atropos*: cinerea, capite albido, nitido, fronte modice porrecta: antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ♂: tibiis posticis intus villosis, fronte subangustata, ano ante cinereo, signaturis nigris, postice nigro, nitido. ♂♀. (Long. 2½—3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 23. 10. ♂♀. Macq. Buff. 2. 227. 15.

Hab. in Scania rarius; mibi aliquoties ad Lund & Fogelsång, mense Julio in copula obvia. (Mas e Glogavia a D. *Zeller*, & e Kilia a D. *Wiedemann* communicatus).

*S.*. *S. carnariae* iterum simillima, nec ab illa differre videtur nisi capite albido vix l. parum flavidio micante, fronte minus prominente, ut & maris ano segmentis: 1:mo postice cinereo signaturis nigris, nempe lineola intra marginem apicalem transversa, & alia longitudinali media tenui obsoleta juxta quam utrinque puncto, atris denudatis nitidis; ultimo atro nitido. Feminam vero a femina *S. striatae* hand distingnere valeo, nisi frontem in *S. Atropos* levissime flavidam, in *S. striata* magis albam dicerem. — Segmentum 1:mum ani in mare interdum ad dimidium & ultra retractum.

5. *S. albiceps*: cinereo-albida, capite albo, nitido, fronte modice porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; nervo transverso ordinario flexo; ♂: tibiis posticis intus cerebro villosis, fronte latinacula, ano atro, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 22. 8. ♂♀. Maeq. Buff. 2. 226. 13. ♂♀.

Hab. in Suecia meridionali Jul. Aug., rarius; in Dania, teste D. Staeger. (Ex Hamburgo a D. von Wintheim sub eodem nomine communicata).

♂♀. A *S. carnaria*, cui in ceteris simillima, differt: magnitudine plerumque paullo minore, colore magis albido l. glauco, capite subargenteo-albo, fronte minus porrecta, & propriis fronte in mare magis lata. — A *S. striata* fronte latiore dignoscitur. — Venter in utroque sexu cinereo-maculatus.

Obs. *Sarc. albiceps* Zett. Ins. Lapp. non ad hanc, sed ad *S. melanuram* n:o 6 pertinet. — Anus in ♂ *S. albiceps* segmento 1:mo jam exerto, jam retracto.

6. *S. melanura*: dilute cinerea, capite albido, fronte modice porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ner-

vo transverso ordinario leviter flexo; ♂: tibiis posticis intus crebro villosis, fronte latiuscula, ano nigro, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 23. 11. ♂♀. Macq. Buff. 2. 227. 17.  
♂♀. *S. albiceps* Zett. Ins. Lapp. 650. 3. ♀.

Hab. in Suecia meridionali frequens; circa Lund & Kjesslinge Scaniæ Jul. Sept. & feminæ usque ad 3 Octob., haud raro capta; in copula sæpe deprehensa; in Nordlandia Norvegica ad radicem alpium Andenes, rarissime. (♂ etiam e Kilia a D. Wiedemann communicatus, & uterque sexus e Glogavia a D. Zetter missus).

♂♀. Valde similis priori, a qua fronte nonnihil minus prominente & nervo transverso ordinario paullulum minus flexo præcipue differt. Thoracis lineæ 3 brunnescentes; ♂: fronte flavidio-alba; ♀: abdomine cinereo, maculis dorsalibus olivaceo-nicantibus, lateralibus parvis nigricantibus.

7. *S. sinuata*: cinerea, capite albido, fronte minus porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis, ventre pedibusque, nigris; nervo transverso ordinario subrecto; ♂: tibiis posticis intus parce villosis, fronte subangustata, ano nigro, nitido. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 22. 9. ♂.

Hab. in Scandinavia minus frequens, Jun.—Aug.; scilicet in Scania circa Lund passim; in Ölandia ad Glimminge in copula capta; in Gotlandia ad Sanda rar.; in Norvegia ad Næs Værdalæ, rarius; in Dania mense Junio, D. Staeger. (E Glogavia a D. Zetter communicata).

♂♀. Similis proxime præcedentibus, sed differt præcipue, a *striata*: thoracis lineis 3 nigris subsimplicibus; ab *Atropos*: ano signaturis non ornato; ab *albiceps*: colore cinereo, parum glauco, fronte paullo minus lata; & a *melanura*: thoracis lineis nigris, nec brunneis & abdominis tessellis nigris, nec olivaceis, fronte subangustata; ut & ab his omnibus: magnitudine plerumque paullo minore, fronte minus prominente, ventre nigro, nitido (nec cinereo t. cinereo-maculato), nervo transverso ordinario fere recto, ut & in ♂ tibiis posticis intus parcus villosis & ano toto nigro, nitido. — Pictura nigra in ♂ præsertim obscura sen atra est.

8. *S. agricola*: cinerea, capite albido, fronte minus porrecta; antennis, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ventre cinerascente; nervo transverso ordinario subflexo; ♂: tibiis posticis intus mediocriter villosis, fronte subangustata, ani nigri nitidi segmento 1:mo subretracto, incisura cinerea. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 227. 16? ♂♀. — Meig. Dipt. 7. 278. 33? "Nigra, cinereo-micans; abdomine maculato apice nigro; tibiis posticis maris villosis". Similis *S. carnariae*.

Hab. in Suecia Jul. Aug. minus frequens; nempe in agris & Salicetis Scanie ad Lund, Tygelsjö & Abusa; in Ostrogothia ad Wadstena; in Ölandia; in Norvegia ad Garnæs Værdalæ.

♂♀. Similis proxime præcedentibus; sed a *striata* magnitudine minore &c., ab *Atropos* ano absque signaturis cinereis, ab *albiceps* & *melanura* fronte maris paullo angustiore, & a *sinuato* ventre cinereo, nec nigro, ut & nervo transverso ordinario magis flexo, præcipue dignoscitur. A sequente magnitudine majore etiam differre videtur. — Ani nigri seg-

mentum I:rum I. totum I. ad maximam partem plerumque retractum, relicta tantum incisura griseo-cinerea.

*Obs.* Brevitas & insufficientia diagnoseus & descriptionis a Celeberrimis Macquart & Meigen I. e suæ *S. agricolæ* datae, in dubium facile inducunt.

9. *S. pumila*: cinerea, capite albido, fronte parum porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; nervo transverso ordinario leviter flexo; ♂: tibiis posticis intus mediocriter villosis, fronte subangustata, ano nigro, nitido, incisura cinerea. ♂♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 24. 12. ♂.

Hab. in Scandinavia minus frequens; in Scania ad Lund & Abusa Jun. Jul. aliquot specimina inveni; in Jemtlandia ad Åreskutan & Mullsjellen; in Norvegia ad Næs Værdaliae rarissime.

♂♀. Proxime præcedentibus plerumque adhuc paullo minor. A *S. sinuata*, cui de cetero similis, differt præterea: fronte fere adhuc minus prominente, tibiis posticis intus crebrius (forte tamen minus crebro quam in *melanura* & ei antecedentibus) & longius villosis, ut & ano maris nigro, incisura grisea. — A *S. agricola* magnitudine paullo minore, fronte nonnihil minus prominente & nervo transverso ordinario fere recto dignoscitur.

10. *S. vagans*: dilute cinerea, capite albido, fronte minus porrecta; antennis, vitta frontali, thoracis lineis subtribus, abdominis tessellis pedibusque, nigris; nervo transverso ordinario leviter flexo; ♂: tibiis posticis intus villosis, fronte latiuscula, ano nigro, nitido; ♀: ano rufo. ♂♀. (Long. circiter  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 26. 18. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; in Dania a D. *Staeger* mense Aug. capta. (Plura individua semi-nea a D. *Zeller* e Silesia (ubi 20 Aug. 1811 lecta) mihi communicata sub nomine allato, signo interrogationis adjecto).

♂♀. Alfinis & similis *S. arvorum* n:o 11, a qua maris tibiis posticis intus villosis, nec nudis, & feminæ ano rufo-testaceo, nec nigro, differt. A *S. pumila*, cui quoque valde similis, magnitudine nonnihil majore, corpore albidiore, alis cinereis, fronte maris paullo latiore, & feminæ ano, ut dictum, rufescente, dignoscitur.

*Obs.* An hæ omnes supra allatæ species inter se valde affines & similes vere distinctæ sint, vel quædam tantum ut varietates *S. carnariæ* typicæ considerandæ, ulteriores observationes docebunt.

\*\*) Tibiæ posticæ intus in utroque sexu nudæ.

†. Abdomen cinereum nigro-tessellatum.

11. *S. arvorum*: cinerea, capite albicante, fronte parum porrecta; antennis, thoracis lineis 3, abdominis tessellis, ventre pedibusque, nigris; nervis transversis: ordinario subrecto, apicali inflexo; ♂: fronte angustata, ano nigro, nitido. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 24. 13. ♂♀. Macq. Buff. 2. 227. 19. ♂♀.

Hab. in Suecia meridionali & media, 24 Maj.—30 Jul., passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Tranås, Esperöd &c.; in Smolandia; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia pratis ad Stenkyrka, Nähr, Gothem &c. Feminæ frequentiores; in Dania, D. *Staeger*.

♂♀. Similis prioribus. Fronte minus prominente, capite sordide albicante, nervorum transversorum ordinario fere recto,

apicali flexo, ventre parum cinereo-micante, tibiis postieis nudis, maris fronte subangustata, ano toto nigro nitido, absque sutura cinerea, & feminæ abdomine subconvexo, notis simul sumitis, a præcedentibus facile dignoscitur. — Tessellæ abdominis nigrae sat magnæ, nitidæ.

12. *S. depressifrons*: cinerea, capite albo, nitido, fronte non porrecta; antennis, thoracis lineis 3, abdominis tessellis pedibusque, nigris; ventre cinereo-micante; nervis transversis subrectis; ♂: fronte angustata, ano nigro, nitido. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Hab. in Suecia mense Julio, Aug. rarissime; in Scania ad Lund, in Ostrogothia ad Wadstena & in Gotlandiæ insula Furillen mihi parce obvia. (E Glogavia etiam specimina ex utroque sexu a D. Zeller benevole communicata).

♂♀. A præcedente, cui sat similis, differt magnitudine plerumque paullo minore, fronte adhuc minus prominula, capite albidiore, nitidiore, nervo transverso apicali fere recto ut & ventre saltem certo situ cinereo-micante. — Meigeni *S. clathratae* & *dissimili* valde quoque affinis & similis videtur; sed ab illa magnitudine minore, squamis sub alis albis, nec brunneis, abdomine subtus cinereo, nec nigro, ano maris toto nigro, nec segmento 1:mo cinereo; & ab hac abdomine maris cinereo, nigro-tessellato, nec "albo, trifarium nigro-lineato", & abdomine feminæ cinereo, nigro-tessellato, nec "nigro, punctis lateralibus albis", facile dignoscitur.

††. Abdomen cinereum trifarium nigro- vel fusco-lineatum aut punctatum.

13. *S. affinis*: ovata, cinerea, antennis seta medio-criter plumata, vitta frontali, thoracis lineis tribus, media triplicata, abdominis linea media subcontinuata maculis-

que lateralibus majoribus, pedibusque, nigris; ♂: oculis anguste remotis. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 30. 27. ♂♀. T. 43. f. 10. — *Musca* Fall. Muscid. 39. 1. ♂♀. *Agria* Macq. Buff. 2. 229. 1.

Hab. in Suecia meridionali & media, saepe locis aridis l. littoralibus, Maj.—Jul., passim; scilicet in Scania ad Lund, Kivik, Raflunda; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Omberg & Wadstena, &c. — Larvae (parasitae in larvis *Tineæ padellæ*) ad Wadstena copiose collectæ mense Julio 1835 a D. *Dahlbom*. Imagines utriusque sexus e pupis proventæ 20—21 Maj. anni sequentis. (Femina in individuis pluribus, nostris simillimus, a D. *Leon Dufour* 1811 communicata, ad St. Sever Galliae collecta).

♂♀. Magnitudo *Muscæ domesticæ*. Ovata. Caput albidum. Frons parum porrecta, in ♂ saltem postice valde angusta, in ♀ modice & paralleliter lata. Scutellum cinereum. Abdomen cinereum, segmento 1:mo fere toto, linea dorsali media fere ad anum continuata, maculisque utrinque tribus irregularibus in segmentis 2:do & 3:tiō majoribus, in 4:to minoribus, nigris, subnudis. Segmenta: 1:mum breve, inerme; 2:duum margine apicali tantum ad latera parce setulosum (sed in disco & medio nudum); 3 & 4 margine apicali setosa. Anus in ♂ haud tuberculatus, in utroque sexu cinereus. Alæ hyalinæ, inermes, nervo longit. 3:tiō tantum ad basin setulosu, sed spinula costæ omnino nulla. Nervi transversi: ordinarius & apicalis inflexi. Squamæ albidæ. Tarsorum unguis in ♂ elongati incurvi, in ♀ breviores.

14. *S. lineata*: dilute cinerea, antennis seta longe plumata, vitta frontali, thoracis abdominisque lineis tripli-ci serie dispositis subcontinuis, pedibusque, nigris; ♂:

oculis anguste remotis. ♂♀. (Long. ♂ 2—2½, ♀ 2½ fere 3 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 40. 5. ♂.

Hab. in Suecia meridionali & media, 10 Jul.—26 Aug., passim; feminæ terræ arenosæ & lapidibus insidentes, perterritæ cito avolantes, at mox ad idem punctum revertentes, sat vulgares; scilicet in Scania ad Esperöd, Bäckaskog &c., rarius; in Ostrogothia ad Wadstena, Lärketorp, Godegård, Gusum &c., frequens; in Helsingia ad Glösbo feminæ 25 Aug. 1840 a D. Dahlbom lectæ. (E Glogavia a D. Zeller sine synonymia missa).

♂♀. Similis priori, sed saepe paullo minor, magis cylindrica præsertim ♂, & magis dilute cinerea fere cana præsertim ♀. Differt præterea ab illa: fronte paullo magis prominula & albidiore, antennarum seta longius plumata, alis cinereo-hyalinis, squamis albidiorebus, ut & abdominis pictura. Abdomen nempe in ♂ subcylindricum, cinereum, lineis 3 subcontinuis (media tamen in segmento ultimo abrupta) nigris, in detrita nitidis; in ♀ ovatum convexum, eanum, linea media in segmentis tribus primis continuata, maculaque subovali utrinque in basi segmentorum 2, 3 & 4 locata, nigro-brunneis, opacis. — Antennæ in utroque sexu angustæ.

*Obs.* Feminas hactenus nullibi descriptas sub nomine: *Sarcophaga lapidosa*, olim inter Amicos meos entomologicos divulgavi.

15. *S. latifrons*: subcylindrica, cinerea; antennis seta breviter plumata, vitta frontali, thoracis lineis tribus, abdominis punctis triplici serie dispositis, pedibusque, nigris; ♂: oculis late remotis. ♂♀. (Long. ♂ 1½—2, ♀ 1½—2 fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 31. 28. ♀. *Musca* Fall. Muscid. 40. 7. ♂. *Agria* Macq. Buff. 2. 230. 2. ♀. T. 16. f. 3. caput.

Hab. in Suecia meridionali & media, libenter in campis aridis & locis arenosis littoralibus, 2 Jun.—20 Aug., passim; scilicet in Scaniae littoribus maris ex. gr. ad Lomma, Malmogiam, Kjeflinge, Östra Torp, Sandhammar, Esperöd &c., vulgaris; in Ölandia ad Ekerum &c.; in Gotllandia ad Slitö &c.; in Dania ad Dyrhaven Jul. 1811. D. *Dahlbom*. (E Glogavia a D. *Zeller* in pluribus exemplis communicata).

♂♀. A priori, cui similis, differt: magnitudine plerunque minore, corpore in utroque sexu subcylindrico, antennis paullo latioribus, seta brevius plumata, thoracis striis nigris obsoletioribus, abdomine nigro-punctato, nec nigro-lineato, alarum nervo transv. ordinario magis recto, ut & fronte in utroque sexu latiore. Oculi in utroque sexu late distantes, vitta frontali latissima, nigra. Abdomen cinereum opacum, in singulo segmentorum 2 & 3 prope marginem apicalem puncta tria fusco-nigra, quorum tamen intermedium saepe majus, oblongum lineam medium subinterruptam formans. Nervus transversus apicalis in individuis majoribus distincte incurvus, in minoribus leviter flexus. Spinula costae adest, licet minuta. Ungues & pulvilli in utroque sexu parvi. Anus maris rotundatus, obscurus, nitidus; feminæ acutiseulus.

16. *S. obsoleta*: subcylindrica, cinerea; antennis seta longe plumata, vitta frontali, thoracis lineis tribus, abdominis lineola media abbreviata punctisque lateralibus obsoletis, pedibusque, nigricantibus; ♂: oculis subanguste remotis. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 31. 29. ♀. *Musca* Fall. Museid. 40.  
7. ♂.

Hab. cum priori, 6 Jun.—15 Aug., passim; scilicet in Scania ad Esperöd, Sandhammar &c., haud raro; in

Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Ölandia ad Borgholm; in Gotllandia ad Fårö &c. rarius.

♂♀. Priori iterum valde similis & affinis; sed antennarum seta distinctius plumata, thoracis abdominisque signaturis fuscis multo obsoletioribus, ut & maris fronte evidenter angustiore, facile dignota. Magnitudine valde variat. — Frons in ♂ angustata, in ♀ modice lata. Antennæ angustatae. Thoracis lineæ obsoletæ. Abdomen in ♂ subcylindricum, in ♀ ovato-rotundatum, convexum, in utroque sexu griseum, opacum, lineola dorsali in segmentis 2 & 3, tenui, brunnea, & punetis utrinque 2 in iisdem segmentis, nempe in basi singuli segmenti utrinque puncto unico parvo fusco sœpe valde obsoleto. Incisuræ ad latera albantes. Alæ ut in præcedente. Pedes cinerascentes, tarsis nigris. Variat detrita abdome thoraceque obscuris nitidis.

*Obs.* Specimen masculum *Sarcophagæ*, 2 lin. long., cylindricum, totum atrum, nitidum, antennis angustis, seta medio-eriter plumata, fronte modice angusta, alarum nervo longitud. 3:to a basi ad transversum medium setuloso, ut & squamis albis; in Scania ad Abusa ante plures annos inveni; sed cum forte non nisi individuum detritum *S. lineatæ* sit, illud hoc modo tantum indicare volo.

B. Anus rufus aut rufescens. (*S. vagans*: femina ano ruso in subdivis. A. sub n:o 10 quærenda).

α). Mares: tibiis posticis intus obscure villosis.

17. *S. haemorrhoidalis*: cinerea, capite albo-flavido; antennis, vitta frontali, thoracis lineis 3, pedibusque, nigris; abdome fusco-lessellato, ventre cinereo; ano nitido, sanguineo, segmento 1:mo in ♂ atro. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 28. 22. ♂♀. Macq. Buff. 2. 224. 5. ♂♀.  
*Musca* Fall. Muscid. 39. 2. ♂♀. Var.

Hab. in Scandinavia, Jun.—Aug., passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c.; in Smolandia, D. *Ljung*; in Ostrogothia ad Lärketorp, Gusum &c.; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia usque ad Muilfjellen; in Lapponia Umensi rar.; in Norvegia ad Thynæs. (E Kilia a D. *Wiedemann* missa).

♂♀. Similis *S. carnariae*, sed magnitudine paullo minore, capite minus flaviente, fronte multo minus porrecta, ut & in ♂ tibiis posticis intus minus crebre villosis, & ani segmento ultimo sanguineo, differt. Abdominis segmentum 2:dum in medio apicis ♂♀ bisetosum.

**18. *S. cruentata*:** schistacea, capite albo; antennis, vitta frontali, thoracis lineis 3, pedibusque, nigris; abdome fusco-tessellato, ventre cinereo; ano nitido, sanguineo, segmento 1:mo in ♂ atro. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 28. 23. ♂♀. Macq. Buff. 2. 225. 6.  
*S. ruficauda* Zett. Ins. Lapp. 650. 4. ♂. Var. detrita.

Hab. cum priore, cui simillima, praeter caput album, nec flavidum, colorem corporis schistaceum l. glaucum, ut & tibias in ♂ intus forte brevius villosas.

♂). Mares: tibiis posticis intus nudiusculis.

**19. *S. haemorrhoa*:** albido-cinerea, capite albo; antennis, vitta frontali, thoracis lineis 3, abdominis tessellis pedibusque, nigris; alarum nervis longitudinalibus 1 & 3 basi setulosis; ano nitido, in ♀ rufo, in ♂ sanguineo segmento 1:mo atro. ♂♀. (Long. 2—2 $\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 29. 24. ♂♀. Macq. Buff. 2. 225. 7. ♂♀.

Hab. in Suecia, Jul. Aug., passim, in copula sæpe deprehensa; scilicet in Scania ad Lund &c., vulgaris; in Gotllandia ad Thorsborg, Martebo, Kyllej &c. frequens; in Ångermannia ad Hernösand. (Ad Jungfern-Heyde & Moabite prope Berolinum a D. Dahlbom lecta; & e Glogavia a D. Zeller communicata).

♂♀. Similis *S. cruentatæ*, sed plerumque multo minor, & maris tibiis posticis intus nudis, vere diversa. Frons parum porrecta, in ♂ angustata. Antennæ præsertim in ♂ haud latæ. Abdominis segmenta: 1:uum ad latera, & 2:dum in medio apicis & ad latera, parce setosa. Alarum basi fuscarum nervi longitudinates 1 & 3 basi distinete setulosi, ut in priori. Spinaula costæ distincta. Squamæ albæ. Pulvilli in ♂ magni, in ♀ parvi. Ani segmentum 1:uum in medio apicis in ♂ sæpe macula cinerea. Venter in utroque sexu cinereus.

20. *S. hæmatodes*: cinerea, capite albido; anten-  
nis pedibusque nigris; thoracis lineis 3, abdominisque tes-  
sellis, olivaceo-micantibus; alarum nervo longitudinali  
3:tio basi setuloso; ano in ♀ griseo-rufescente, in ♂  
sanguineo nitido segmento I:mo cinereo opaco. ♂♀. (Long.  
2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 29. 25. ♂♀. vera. Macq. Buff. 2. 225.  
8. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 650. 5. ♂♀. *Musca hæmorrhoi-*  
*dalis* Fall. Muscid. 39. 2. ♂♀. genuina.

Hab. in foliis fruticum, sepibus, parietibus ligneis,  
&c., per Sueciam, Daniam & Norvegiam, usque ad Lap-  
poniam Umeensem procedens, tota aestate, ubique vulgatis-  
simæ, in copula multoties capta. Feminas vermiculos fe-  
re 1 lineam longos, apodos, albos, antice macula sangu-  
inea notatos, parientes in Gotllandia d. 15 Jul. vidi. (E)

Glogavia utrumque sexum, seminasque sub nomine: "S. vagans?" communicavit D. Zeller. Ad Moabite prope Berolinum a D. Dahlbom frequenter lecta).

♂♀. Similis priori, a qua vero colore magis griseo-cinereo, signaturis olivaceis, nec nigris, antennis nonnihil latoribus, fronte in ♂ latiore, alis basi in utroque sexu parum infuscatis, nervo tantum longitudinali 3:ti, nec quoque 1:mo, basi setuloso, ut & ano in ♀ cinereo-rufescente, in ♂ segmento 1:mo toto opaco cinereo, 2:do nitido sanguineo, abunde dignoscitur. — Spinula costæ nulla. Abdominis signaturæ olivaceæ certo situ subtrifariam positæ, segmentis 1:mo & 2:do in disco & medio apieis nudis.

21. *S. erythrura*: albido-cinerea, capite albo; antennis, vitta frontali, thoracis lineis 3, abdominis maculis elongatis trifariam positis, pedibusque, nigris; alarum nervo longitudinali 3:ti basi setulosa; ano in utroque sexu nitido, sanguineo. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 30. 26. ♂.

Hab. in fruticibus, etiam campis aridis, per Sueciam medium & meridionalem, passim; scilicet in Scania ad Silfakra, atque in campis littoralibus ad Sandhammar, Seanör, Lomma, &c., frequens; in Ostrogothia ad Lärketorp rarius.

♂♀. Affinis & similis duabus proxime præcedentibus; sed a *S. hæmorrhœa* alarum nervo longitudinali tantum 3:ti basi setuloso, spinula costæ minuta; ab *hæmatodes* colore albidiore, signaturis corporis nigroribus, nec fuscis, fronte in ♂ nonnihil angustiore; & ab utraque abdominis maculis certo saltem situ lineas tres subinterruptas formantibus, anoque in utroque sexu toto sanguineo nitido, in ♂ minus quam in prioribus exerto. Abdomen in ♀ sæpe totum nigricans, maculis cinereis hinc inde micantibus; per anum

vero totum sanguineum nitidissimum facile dignota. Segmentum abdominis 2:dum in medio apicis bisetosum.

*Sect. 2:da.* Palpi flavi. Alarum nervus longitudinalis 4:tus infra angulum non continuatus. Varicolores. Tibiae posticæ intus semper nudæ.

*Subd. I.* Color præcedentium. Corpus scilicet cinereum, thorace nigro-lineato, abdomine obscure maculato.

22. *S. ruralis*: cinerea, antennis basi fuscō-rufis; capite albido, fronte prominente, concolore, vitta, thoracis lineis 3, abdominis maculis tripliæ serie dispositis, pedibusque, nigris. ♂♀. (Long. 2  $\frac{1}{2}$ —3 $\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 17. 2. T. 43. f. 9. Macq. Buß. 2. 223.  
1. *Musca* Fall. Muscid. 39. 3. ♂♀.

Hab. in floribus Umbellatarum, truncis arborum viventium Populi tremulæ, &c., 4 Jun.—15 Aug., passim; scilicet in Scania ad Abusa, Björnstorps, Esperöd &c., haud raro; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Lärketorp, ipse; in Ölandia ad Borgholm.

♂♀. Similis *S. affini* (13) & *lineatæ* (14), sed palpis flavis mox dignota. Caput album. Frons porrecta, in ♂ modice angustata, in ♀ lata, vitta in utroque sexu atra, serie setarum ad antennarum basin continuata. Antennæ late, fuscō-nigræ, articulis 1 & 2 fuscō-rufescens, seta ad medium breviter plumata & in medio flavescens. Epistoma ad latera juxta os setulis 4—6 tenuissimis. Palpi subfiliformes, flavi. Abdomen ovatum, convexum, opacum, cinereum, segmento 1:mo fere toto nigro, & in singulo segmentorum 2 & 3 maculis tribus elongato-triangularibus ejusdem coloris. Segmenta: 1:um nudum, 2:dum in medio apicis tenuiter bisetosum, reliqua margine apicali plurisetosa. Anus & venter cinerea. Alaæ cinereo-hyalinæ, nervis: lon-

gitudinali 3:to basi setuloso; transversis: medio sub-perpendiculare, infuscato, ordinario oblique distinete flexo, apicali incurvo. Area sat late aperta. Spinula costæ adest. **Squamæ albæ.** Pedes nigri, cinereo-micantes. — **Cum *Dexia carinifrons*** seta antennarum fere ad apicem plumata, & palpis nigris prædicta vix confundenda.

**23. *S. muscaria*:** cinerea, capite albido, fronte parum prominente concolore, villa, antennis, thoracis lineis 3, abdominis maculis dilatatis micantibus, pedibusque, nigris. ♀. (Long. fere  $3\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipl. 5. 17. 3. Macq. Buff. 2. 224. 2. ♀.

Hab. in Suecia media rarissime; in insula Gotllandia ad Kyllej d. 8 Jul. 1819 specimen descriptum inveni.

♀. Similis priori, a qua vero fronte multo minus porrecta, antennis & seta totis nigris, palpis apice crassioribus & dilutius flavis, abdome paullo breviore & latiore, maculis subolivaceo-micantibus majoribus dilatatis irregularibus, spinula costæ nulla, ut & alarum nervo transvesso ordinario propius ad angulum nervi long. 4:ti ducto, abunde dignoscitur. Setæ quoque 5 in epistomatis lateribus juxta oculos multo validiores, rigidæ. Abdomen certo situ nigrum, maculis præsertim ad latera cinereo-micantibus, alio situ cinereum, maculis mediis dilatatis margineque apicali segmentorum nigro-micantibus. Anus niger. Venter in nostro specimine levissime cinereo-micat.

**24. *S. pygmaea*:** cinerea, fronte non prominente, concolore, antennis subrufescensibus; villa frontali, abdominis linea media obsoleta pedibusque, nigricantibus. ♀. (Long. vix  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania unicum individuum inveni.

♀. Minuta. Subsimilis *S. obsoletæ* (16), sed palpis vere flavis, antennis sordide rufescentibus, seta non omnino tam longe plumata, pictura corporis fusca adhuc obsoletiore &c., certe distincta. Opaca, cinerea. Frons mediocriter lata. Thorax vix fusco-lineatus. Abdomen rotundato-ovatum, vitta dorsali in segmentis 1, 2 & 3 brunnea obsoleta, juxta quam utrinque vestigium strigularum brunnescentium in segmentis 2 & 3. Segmenta 1 & 2 omnino inermia. Venter cinereus. Alæ cinereo-albidæ, nervis pallescentibus; transversis: ordinario subreto, apicali subcurvo. Spinula costæ nulla. Squamæ & halteres albida. Pedes nigro-fusci.

*Subd. II.* Color corporis metallicus, nitens, thoracis scilicet cærulecenti niger, lineatim albo-micans, abdominis chalybeus aut virescens.

25. *S. Mortuorum*: cærulecenti nigra, capite aureo-fulvo, antennis luteis; thorace antice obsolete albo- I-vittato; abdomine viridi-chalybeo, nitidissimo, unicolor. ♂♀. (Long. 4 sœpe 5 lin.).

Var. a. ♂♀. abdomine viridi-chalybeo, antennis aut luteis, aut sœpius superne fuscis.

Meig. Dipt. 5. 16. 1. (exclus. syn. Schrank Austriæ *M. vomitoria*). *Musca* Linn. Fn. Su. 1830. Fall. Muscid. 45. 18. ♂♀. (exclus. syn. Fabr. Antl., quod ad *Muscam vomitoriam* pertinet). Latr. Gen. 4. 345. Zett. Ins. Lapp. 650. 6. ♂♀. *Cynomyia* Macq. Buff. 2. 233. 1. ♂♀. T. 16. f. 4. ♂. — *Musca chrysocephala* De Geer Ins. 6. 60. 5. *Musca vomitoria* Fabr. Antl. 290. 34. Rossi Fn. Etr. 463. 1191.

Var. b. ♂♀. abdomine toto aureo-viridi; antennis ut in var. a. variantibus.

Meig. l. c. var. — Zett. Ins. Lapp. l. c. var. b. ♀.

Hab. ultraque varietas in graminosis, parietibus saepe insidens, etiam in domibus, per Scandinaviam totam a Scania meridionali usque ad NordCap, alpibus lapponicis summis tantum exceptis, Maj.—Sept., vulgaris, saepe in copula capta. — Strenue volans. Larva in cadaveribus & carne putrida, libenter in caninis, unde nomen *Cynomyia* Robin. Desvoidy. (Ex Helgolandia plura specimina reportavit D. *Dahlbom*).

♂♀. Magnitudo valde variat. Caput totum fulvum, nitens, vertice postice praesertim in ♀ interdum grisecente. Oculi obscure ferruginei, in viva aeneo-nicantes. Frons distincte porrecta, in ♂ modice lata, in ♀ latissima, vitta lata lutea. Antennae epistomate paullo breviores, late, luteæ, articulo ultimo superne saepe fusco 2:do saltem triplo longiore; apice revera obtusæ, sed in mortuis margo interior saepe inflexus, unde apex earum in his acutus videtur, qualis a D. *Fallén* describitur. Seta nigra, in medio supra longe, subtus breviter, plumata. Epistoma prominens & descendens, nudum, setis mystacinis & sub margine oris nigris. Vibrissæ nigrae parum inchoantes. Palpi flavi. Proboscis obseura. Abdomen pubescens, segmentis 1 & 2 inermibus, reliquis marginæ apicali nigro-setosis. Venter niger. Anus ater, in ♂ magnus, longe inflexus, dense villosus, hamulis 2 corneis, inflexis terminatus. Alæ hyalinæ, nervis obseruis; transversis: medio obliquo, crasso, ordinario distincte inflexo, apicali concavo. Area aperta. Nervus long. 3:tius basi parce setulosus, 4:tus angulatus, angulo subdescendente. Spinula costæ parva. Squamæ albæ. Halteres fusi. Pedes nigri, tarsorum unguibus in ♂ distincte incurvis, pulvillisque, longis. Variat abdome chalybeo, violaceo aut viridi, splendido.

26. *S. alpina*: cærulecenti nigra, capite fulvo, antennis nigricantibus, basi luteis, genis & vertice fuscis;

thorace antice obsolete albo-4-vittato; abdomine cæruleo, nitido, leviter albo-micante. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  lin.)

Zett. Ins. Lapp. 651. 7. ♂. — *Sarc. vomitorina* Wahlb. in litteris 1842.

Hab. in Suecia media & boreali, in soliis fruticum & ligno cæso mihi obvia, 24 Jun.—15 Sept., passim; in copula ter capta; scilicet in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljung* rar.: in Ostrogothia ad Gusum, & in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Berge, Forsa, Skalstugan usque ad summa cacumina alpium Åreskutan & Mullfjellen adscendens, sat frequens; in jugo alpino Norvegiae inter Kongsstue & Höjsjeldbroe atque ad divisorium Suul, D. *Dahlbom*; in Lapponia Umensi ad alpem Brattiksfjell rarissime; in alpe Njunnas ad Quickjock Lapponiae Lulensis 1841 a D. Prof. *Wahlberg* lecta.

♂♀. Similis priori; sed præter magnitudinem minorem differt etiam: fronte paullo minus porrecta in ♂ nonnihil angustiore, vertice latius obscuro, antennis nigricantibus, articulis 1 & 2 totis, 3:tioque basi luteo-rufis; epistomate fulvo subalbido-micante in medio orichalceo, vibrissis brevissimis, spuriis, genis obscuris, abdomine cæruleo, maculatum albo-micante, segmento primo fere toto & lineola in medio segmenti secundi nigris. Reliqua ut in præcedente. Anus magnus omnino *Sarcophagæ*. Abdominis segmentum ultimum in femina sæpe viride. A *Musca vomitoria* ♂ *erythrocephala*, quibus sat similis, differt: magnitudine minore, corpore saltem minus lato, antennis basi rufis, seta tantum in medio superne longe, inferne breviter plumata, nec a basi & fere usque ad apieem undique subæque longe plumata, oculis in ♂ nonnihil remotioribus (licet magis approximantibus quam in *S. Mortuorum*), squamis sub alis al-

bis, nec fuscans, tuberculo anali maris majori, ut & abdominis segmento ultimo in femina apice acutiore.

**27. *S. fuscipalpis*:** chalybea, capite plumbeo, antennis palpisque nigricantibus; abdomine violaceo, nitidissimo, apice aureo-viridi, segmento 1:mo, vitta frontali angusta ( $\delta$ ), aut lata ( $\varphi$ ), pedibusque, nigris; alis hyalinis, squamis albis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali rarius; in Jemtlandia boreali ad cataractam Ristansfors, radicem alpium Mullfjellen & ad diversorium Skalstugan in jugo alpino situm; in Norvegia ad Suul Værdalæ, 27 Jun.—5 Aug. 1840 specimina 3 maseula & totidem feminea inveni.

$\delta\varphi$ . Statura omnino & summa *S. Mortuorum* similitudo, sed multoties minor, capite plumbeo, nec fulvo, &c., diversa. Caput plumbenum, nitidum, interdum macula utrinque ad os pieca. Frons minus exserta, in  $\delta$  angusta (ut in *Musca erythrocephala*) vitta angusta nigricante; in  $\varphi$  lata, vitta latissima, nigra. Antennæ in  $\delta$  modice latae, in  $\varphi$  latissimæ, articulo ultimo in utroque sexu reliquis quadruplo longiore, fusc-nigro, seta superne sat longe plumata. Epistoma vibrissis brevissimis, spuriis. Palpi filiformes, obscure fusi l. lividi. Mentum non dense pilosum. Thorax chalybeus, nitidus, disco dorsali præsertim antice virescente, certo situ vestigio striarum tenuum nigrarum in medio. Scutellum & pleuræ violacea l. cyanea. Metathorax niger. Abdomen violaceum nitidissimum, pilosulum, segmentis 1:mo inermi toto nigro, 3 postice, & 4 toto, aureo-viridibus. Segmenta 2 & 3 margine apicali, & 4:tum fere totum, setulosa. Venter niger. Anus maris proportione sat magnus nitidus, tuberculo 1:mo nigro, ultimo virescente. Alæ hyalinæ, basi subfuscæ. Nervi longitudinales: 3:ius basi brevissime setulosus, 4:tus subrectangulatum flexus. Nervi transversi: ordinarius leviter flexus, apicalis subrectus. Area

aperta. Spinae costæ nulla. Squamæ albæ. Halteres testacei. Tarsorum unguis & pulvilli mediocres.

*Obs.* Valde similis videtur *Musca violacea* Meig. 7. 301. 5. ♂, sed differt ab illa abdomine convexo, nec plano, ut & squamis sub alis albis, nec griseis. De palporum tamen colore suæ *M. violacea* silet D. Meigen. — A *S. genarum*: palpis obscuris, nec flavis, antennis angustioribus, colore corporis violaceo, nec cæruleo, facile distincta. A *S. cærulea*, cui adhuc similior, colore multo splendidiore, oculis forte nonnihil magis remotis & ano maris distinctius exerto, differt. Cum *M. azurea*, quæ antennis brevioribus, seta usque ad apicem plumata, eorpore depresso, squamis sub alis fuscanis, &c., gaudet, vix confundi potest.

28. *S. Vesillo*: nigricans, thorace antice albo-micante, striis alris; capite obscure albido, palpis flavis; antennis, vitta frontali pedibusque, nigris; abdome virecente aut cærulecente, albo-micante; alis cinereis, squamis albis. ♂♀. (Long. 1½, saepe 2½, plerumque 3, raro fere 3½ lin.).

*Musca Vesillo* Fall. Act. Holm. 1816. 217. 23. ♂♀. & *Museid*. 47. 23. ♂♀. genuina. — Fabr. Antl. 292. 39. (secundum Mus. Fabric. teste D. Wiedemann). Meig. Dipt. 6. p. 371. Zett. Ins. Lapp. 658. 20. ♂♀. var. a. & b. — *Musca sepulchralis* Meig. Dipt. 5. 71. 34. ♂♀. & 7. 300. 10. (Ad *Onesiæ* aut *Calliphoræ* genus Macq. haec species forte pertinet.).

Hab. in graminosis, foliis fruticum, floribus Compositarum, & sepibus, per hortos, campos prata &c., totius Scandinavie, Jun.—Aug., & præsertim seminæ usque ad Sept., vulgatissima, in copula capta & e pupa saepe exclusa; scilicet in tota Suecia, Lapponia usque ad radicem alpium procedens, Dania, & Norvegia, ubique frequens.

(Ad Reinberg & Neuenkirchen a D. D. Prof. *Hornschuch* & *Dahlbom* lecta mihique in pluribus individuis communicata. E Kilia quoque a D. *Wiedemann* missa).

♂♀. Magnitudine valde variat. Caput nigrum albo- l. cinereo-micans, plerumque macula utrinque ad os ferruginea. Frons modice porrecta, in ♂ postice angustissima (oculis fere co-barentibus), in ♀ lata; in utroque sexu vitta nigra, in ♂ antice lata postice omnium angustissima, in ♀ latissima. Antennæ epistomate fere duplo breviores, nigræ, articulo ultimo 2:do duplo longiore, in ♂ angusto, linearis, in ♀ paullo latiore. Seta tantum ad medium plumata, plumæ superne longa, inferne brevi. Palpi cylindrici, flavi, interdum apice fusti. Peristomium summum sœpe rufescens. Mentum pilosum. Thorax niger, opacus, in illæsis antice præsertim cinereo-micans, lineis tribus distinctioribus nigris, media duplicata. Abdomen ovatum, convexum, nitidum, aut æneo-virescens, aut cœrulecenti viride, linea dorsali brunnea obsoleta; albo-maculatum, pubescens, segmentis: 1:mo brevi, inermi, obscuro; 2:do ad marginem lateralem parce setoso; 3:to margine apicali multisetoso; & 4:to fere toto setuloso. Venter niger. Anus in ♂ hanc magnus, inflexus, niger, nitidus, pilosus. Alæ inermes, hyalinæ, basi infuscatae, nervis ut in priori directis. Nervus transv. medius distincte infuscatus. Squamæ albæ in ♂ leviter fuscæ. Halteres flavi. Pedes nigri, tarsorum unguibus incurvatis. Alarum area media fere in summo apice alæ terminatur, ibique sœpissime aperta; sed aberrat quoque interdum oclusa. — In uno specimine, (in alpe Areskutan Jemtlandiæ captum) nervi alarum longitudinalis 4:ti angulum in discum paullo descendente, & in altero hunc nervum infra angulum non-nihil continuatum vidi.

*Obs.* Varietatem cœrulecentem sub nomine: "Musca. chrysorrhœa Meig." e Dania obtinui. — *Musca agilis* Meig. Dipt. 5. 70. 33. *Sarc. vespilloni* (seu *sepulchrali* Meig.) in omnibus simillima, præter palpos nigros, in Germania

frequens, in Scandinavia forte non occurrit, mihi saltem numquam obvia, nisi varietatem *S. respillonis*: palpis flavis apice obscuris, hue referre vellem. Individua 2 unum masculum & unum femineum *Sarcophagæ vespilloni* nostræ simillima ad St. Sever Galliæ capta, sub nomine: "Calliphora rufipalpis Macq." a Cel. D. Leon Dufour 1844 obtinui. Specimina duo minora seminea ab Eodem sub nomine: "Pollenia vespollo Fabr." quoque missa ad nostram *Sarcophagæ vespillonem* referri debere etiam videntur.

*Cohors Secunda.* Anus in mare parvus.

29. *S. genarum*: nigricans, thorace antice albo-micante, striis atris; capite albido, vitta frontali latiuscula picea, epistomate inferne palpisque rufescentibus, antennis latis genisque obscuris; abdomine cærulecente; alis hyalinis, squamis albis; pedibus nigris. ♂♀. (Long. 2 se-  
re 3 lin.).

*Musca* Zett. Ins. Lapp. 658. 18. ♂. *Musca laticornis* Zett. Ins. Lapp. 658. 19. ♀.

Hab. in Scandinavia boreali & Lapponia, 8 Jul.—  
17 Sept., minus frequens, in copula 21 Jul. deprehensa;  
scilicet in Jemtlandia ad radicem alpium Mullfjellen; in  
Botnia occidentali; in Lapponia Umensi ad alpem Brat-  
tiksfjell; in Lapponia Tornensi ad Muonioniska, lacum  
Torneâträsk atque in alpium Tornensium jugo in ipsa  
nive ambulans; in Norvegia ad Garnaes Værdaljæ rarissime.

♂♀. Similis *M. vomitoriae* ♂ *erythrocephala*, sed multo minor  
& antennarum seta brevius plumata, apice nuda, squamis  
sub alis albis, nec fuscanis, oculis in ♂ paullo remotioribus,  
&c., distincta. A *S. alpina* (26), cui etiam valde similis,  
magnitudine plerumque paullo minore, antennarum seta bre-  
vius plumata, abdomine minus lucido, ut & ano in ♂ multo  
minore, differt. Caput albo-nitens. Frons minus porrecta,

in ♂ latiuscula, vitta parum angusta, nigra aut picea; in ♀ lata, vitta latissima, nigra. Antennæ epistomate nonnihil breviores, nigricantes, articulo ultimo reliquis quadruplo longiore, latissimo (præsertim in ♀), ima basi & articuli 2:di apice rufescens. Seta ad medium breviter plumata, deinde nuda. Epistoma ferrugineum, in medio, superne ad latera & genis nigricantibus. Vibrissæ inferne brevissimæ, spuriæ. Palpi clavati, flavi. Proboscis nigra. Mentum non dense pilosum. Thorax cærulescenti niger, opacus, antice leviter albo-micans, vittis 3 nigris. Abdomen violaceo-cæruleum, nitidum, certo situ albo-micans, lineola dorsali segmentoque 1:mo toto, nigris, 3:to 4:toque plerumque cærulescenti viridibus. Segmenta: 1:mum breve, inerme, 2 & 3 margine apicali multisetosa, 4:tum fere undique setulosum. Alæ inermes, hyalinæ, ima basi fuscane. Nervus longitud. 4:tus subrectangulatim flexus. Nervi transversi, ordinarius subflexus, apicalis subrectus. Squamæ albæ. Halteres fusi. Pedes nigri, tarsorum unguibus curvatis pulvillisque introque sexu non magnis.

**30. *S. cærulea*:** violaceo-nigra, thorace antice albo-micante, striis atris; capite albido, vitta frontali angusta (♂), aut latiuscula (♀), antennis angustis, palpis, genis pedibusque, nigris; abdomine cæruleo-cente; alis hyalinis, squamis albis. ♂♀. (Long. 1½ fere 2½ lin.).

*Musca* Meig. Dipt. 5. 63. 23. ♂♀. *Calliphora* Macq. Buff. 2. 261. 8? ♂♀. *Musca cognata* Meig. Dipt. 6. p. 371. & 7. 300. 4.

Hab. in Suecæ meridionalis & mediae hortorum pratorumque fruticibus, 2 Jul.—30 Aug., passim, mihi præsertim in foliis Alni obvia; in fenestris quoque, forte errabunda, visa; scilicet in Scania ad Lund, Tranås, Kivik, Esperöd &c. haud rara; in Smolandia; in Ölandia; in

Gottlandia ad Ruthe raro; e Dania a D. Staeger communicata.

♂♀. Similis priori, sed saepe duplo & ultra minor, & antennis angustioribus, seta longius plumata, palpis nigris, epistomate non rufo-maculato, ut & fronte in ♂ multo angustiore, distincta. — Antennae lineares, nigrae. Palpi subfiliformes, nigri. Alarum nervi transversi: ordinarius leviter flexus, apicalis rectus. Angulus nervi long. 4:ti subobtusus. Oculi in ♂ fere cohærentes. Reliqua exacte ut in præcedente. Variat abdomine toto violaceo. — In collectione Falleni adest individuum in Ölandia captum nomine: "*Musca azurea minuta*" digito ipsius Cel. Viri designatum, quod ad hanc speciem certe referendum. — E Dania specimen sub nomine *Musca azurea* obtinui.

31. *S. atriceps*: violaceo-cærulea, nitida, capite villoso, antennis latis, palpis pedibusque, atris; alis hyalinis, squamis nigris. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia boreali rarissime; in Jemtlandie ad radicem alp. Mullfjellen specimen descriptum d. 27 Jul. 1840 detegit Cel. D. Dahlbom.

♀. Valde similis & affinis *M. grönlandicæ*, *sordidæ* & *azureæ*, sed a *grönlandica* palpis nigris, nec flavis, a *sordida* squama sub alis nigra, nec albida, ab *azurea* capite toto atro, nec ad latera cinereo, & ab his omnibus antennarum seta breviter & vix ad medium plumata, apice longe nudo, certe differt. — Ovalis, subdepressa. Caput atrum, villosum, supra genas juxta oculos utrinque macula triangulari certo situ grisecenti micante. Frons latissima, vitta lata. Antennæ epistomate fere duplo breviores, articulo ultimo latissimo, subquadrato, 2:do fere duplo longiore. Vibrissæ tenues fere ad medium epistomatis adscendunt. Palpi subclavati, nigri, basi lividi. Mentum villosum. Thorax violaceo-cæruleus, nitidus, antice certo situ lineis obscurioribus. Abdomen ovale, subdepressum, cæruleo-violaceum,

postice cæruleo-virescens, totum dense atro-pubescent, apice nigro-pilosulum. Alæ hyalinæ, inermes, basi subinfuscatae. Nervi validi; transversi: medius obliquus, ordinarius inflexus, apicalis rectus fere in apice l. mox ante apicem alæ excurrens. Squamæ, halteres & pedes nigra.

---

## Fam. 25. MUSCARIÆ.

### 127. LUCILIA Robin. Desv.

*Corpus* mediæ magnitudinis, breviter ovatum, thorace setoso, abdome pubescente. Antennæ incumbentes, epistomate paullo breviores, sublineares, articulo ultimo 2:do circiter triplo longiore, basi seta dorsali longe plumbata, plumis versus apicem decrescentibus. Oculi nudi. Frons parum exserta. Epistoma descendens, ore subreflexo. Vibrissæ nullæ aut inferne spuriæ. Abdomen breve, rotundatum, inerme, nec nisi in paucis setulosum, ano pilosulo. Segmentum I:uum breve. Alæ divaricatae, subinermes, spinula costæ nulla; in nostris hyalinæ. Nervus longitud. 4:tus angulatim flexus mox ante summum apicem alæ excurrens, infra angulum non continuatus. Nervi transversi: medius obliquus; ordinarius leviter flexus paullo pone medium areæ insertus; apicalis subrectus. Area aperta. Squamæ distinctæ. Pedes simplices. Tarsi pulvilliique in utroque sexu fere æque longi. *Color* aureo-viridi. I. cæruleo-nitens. *Motu* velox. *Habitatio* in foliis plantarum, floribns, graminosis &c. *Differentia sexus*; *mas*: oculis cohærentibus aut apopinquantibus; *femina*: oculis late remotis, oviduetu longe vaginato.

A. Palpi rufi vel ferruginei. Typus: *Lucilia Cæsar*.

I. *L. Cæsar*: aureo-viridis, nitens, interdum cæruleo-nitens, abdominis I:mo segmento concolore, aut ob-

scuro; epistomate lateribus argenteo, medio fusco, apice rufescente; genis albo-micantibus; palpis flavis; antennis pedibusque nigris; oculis in ♂ aretissime cohærentibus, in ♀ modice remotis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Robin. Desvoid. n:o 1. Maeq. Buff. 2. 252. 3. ♂♀.  
Meig. Dipt. 7. 292. 1. T. 73. f. 45. ♂. *Musca* Linn. Fn.  
Su. 1828. De Geer Ins. 6. 61. 6. Sehrank Austr. 923.  
Reaum. Ins. 4. T. 8. f. 1. Rossi Fn. Etr. 462. 1491. Fabr.  
Antl. 289. 26. Latr. Gen. 4. 345. Fall. Muscid. 46. 20.  
♂♀. Meig. Dipt. 5. 51. 1. Zett. Ins. Lapp. 655. 9. ♂♀.

Hab. imagines in foliis fruticum & herbarum, per totam Scandinaviam usque ad Lapponiam (alpes vero aufugieus), a primo vere ad autumnum, ubique vulgatissima; larvæ in cadaveribus, carnibus, putridis, &c. (E Finlandia, Kilia, Lubeca, Sedino, Glogavia, Wienna &c quoque communicata. Ad Lewenhagen & Elisenheyne prope Gryphiam etiam in pluribus exemplis a D. Dahlbom hoc anno (1811) lecta).

♂♀. Magnitudine & colore variat, aut tota viridis, aut thorace cærulescens & abdomine viridis, aut tota cærulescens I. eyanea, aut denique tota (in veteribus) ænescens I. cuprea. Præter capitis colorem (apud *L. ruficipitem*), oculorum connectio est fere unica nota essentialis & constans hanc a reliquis hujus subdivisionis distinguendi speciem, nam color corporis minus valet. Caput argenteo-micans, epistomatis apice pallide rufo-testaceo, genis nigris albo-micantibus. Epistomatis discus concavus griseo-nigricans, opacus. Frons minime prominens. Oculi magni, in ♂ arce coherentes, per lineam tantum angustissimam geminam albam in fronte distantes; in ♀ per vittam frontalem latam griseo-nigram opacam utrinque anguste argenteo marginatam remoti. Series seta-

rum frontalium utrinque in ♂ simplex, in ♀ postice duplex, in utroque sexu ad radicem antennarum continuata. Vertex in ♀ viridi-micat. Antennæ nigro-fuscæ. Thorax & scutellum setosa. Abdomen pubescens, apice tantum subpilosum. Segmentum primum in medio pro receptione scutelli excavatum; totum plerumque, saltem a posteriori visum, obscurum seu cyaneo-nigricans. Alæ hyalinæ, basi leviter fuscæ. Nervus longitudinalis 3:tius basi setulosus. Nervi transversi; ordinarius subinflexus, apicalis fere rectus. Squamae albæ. Halterum clava albida. Pedes nigri.

2. *L. ruficeps*: aureo-viridis, nitens, interdum cæruleo-micans, abdominis 1:mo segmento obscuro; epistomate pallide rufescente, orbita oculorum alba, genis nigris albo-micantibus; palpis flavis; antennis pedibusque fuscis; oculis in ♂ arctissime cohaerentibus, in ♀ modice remotis. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Macq. Buff. 2. 252. 6? Meig. Dipt. 7. 292. 3?  
*Musca* Meig. Dipt. 5. 55. 8? ♂♀.

Hab. in Scandinavia rarius; marem e Dania sub hoc nomine a D. Staeger obtinui; feminam in Smolandia inveni. (Sub nomine: "*Musca flaviceps* Bouch." individuum masculum e Silesia mihi quoque misit D. Zeller).

♂♀. Similis priori, a qua magnitudine duplo minore, antennis pedibusque fuscis, ut & facie magis rufescente dignoscitur.  
**Macula rufescentia in fronte supra antennas, in ♂ parva, in ♀ magna vittam frontalem antice efficiens, adest.**

3. *L. sericata*: aureo-viridis, nitens, interdum cæruleo-micans, abdominis 1:mo segmento obscuro; epistomate argenteo, inferne nigro albo-micante, oris margine antico rufescente; palpis flavis; antennis pedibusque

nigris; oculis in ♂ cohærentibus, in ♀ late remotis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Var. a. ♂♀. 2½—3 lin. longa, corpore viridi aut cærulecente.

Mæq. Buff. 2. 252. 5? ♂♀. — Meig. Dipt. 7. 292. 2? *Musea* Meig. Dipt. 5. 53. 3? ♂♀. — Zett. Ins. Lapp. 655. 10. ♂♀.

Var. b. ♂♀. 3 lin. longa, viridis, cærulecenti micans, thorace vittis 4 æquali spatio remotis, scutelloque chalybeis l. violaceis.

*Lucilia cærulescens* Mæq. Buff. 2. 253. 9? ♂♀. — Meig. Dipt. 7. 292. 4? *Musca* Meig. Dipt. 5. 55. 10?

Hab. cum priori tota aestate, var. a. frequentissima; var. b. præsertim in Scania ad Lund, in Blekingia (D. v. *Borch*), &c. in Ostrogothia ad Wadstena, lecta.

♂♀. Simillima *L. Cæsari*, a qua vix nisi oculorum connectio-  
ne discrepat. Oculi scilicet in ♂ sat intime quidem cohærent, at non tam aretissime ut in *Cæsare*. Oculi quoque in ♀ paullo magis distant quam in ♀ *Cæsarisi*. Variat præterea color ut in *Cæsare*, sed pictura in varietate b. paullo constantior, unde forte propria species.

4. *L. fulgida*: aureo-viridis, nitens, interdum cæruleo-micans, abdominis 1:mo segmento obscuro; epistomate argenteo, inferne nigro albo-micante; palpis flavis; anten-  
nis pedibusque nigris; oculis in ♂ paullo distantibus, in ♀ latissime remotis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Hab. in Suecia minus frequens, in copula capta, 15 Jul. ad 10 Sept. mihi obvia; scilicet in Scania ad Lund, Lackalänga (D. *Dahlbom*), &c.; in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljungh*.

$\delta\varphi$ . Valde similis & affinis priori, nec ab illa differt, nisi oculis aperte remotioribus, & id in utroque sexu. Apertura oris quoque parum rufescit. Caput fere totum argenteum. Oculi in ♂ appropinquantes per vittam angustam nigram utrinque (præsertim antice) albo-marginatam separati; in ♀ latissime distantes, nempe per vittam latam griseo-atram utrinque late albo-marginatam remoti; vertex metallice nitet. — Marem toto corpore aureo-viridi, cum femina toto corpore cœruleo-splendente in copula vera junctum deprehendi.

### B. Palpi nigri.

5. *L. cornicina*: aureo-viridis, e cœruleo splendens, abdominis nudi 1:mo segmento concolore; epistomale argenteo, medio obscuro; fronte & genis virescentibus aut cœruleis; palpis, antennis pedibusque nigris; alarum nervo transverso apicali basi incurvo; oculis in ♂ paullo distantibus, in ♀ late remotis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$  fere 3 lin.).

*Mas.*: fronte modice angusta, linea media angustissima, grisea, oculis microscopice puberulis;

*Fem.*: fronte lata, linea media angusta, grisea, oculis nudis; in copula.

*Musca* Fabr. Antl. 289. 29. Fall. Museid. 47. 21. certissime,  $\delta\varphi$ . — Zell. Ins. Lapp. 655. 11.  $\delta\varphi$ . (excl. syn. Meig.) *Musca Cæsarion* Meig. Dipt. 5. 57. 14.

Hab. in foliis fruticum & herbarum, floribus Compositarum &c., a primo vere usque ad serum autumnum, per totam Scandinaviam, omnium vulgatissima. Larvæ in stereoratis degunt. (E Kilia sub nomine: *Musca cornicina* Fabr. a D. Wiedemann, & ex Hafnia sub nomine: *M. Cæsarion* Meig., a D. Staeger, missa. (In horto Senatoris Krey Gryphiæ Sept. 1811 a D. Dahlbom, lecta.

Etiam e Glogavia a D. Zeller communicata ut "ex Hirundinis cadavere exclusa." — Sub. nom. "*Lucil. ignita* Macq." ♂ e St. Sever Galliae a D. Leon Dufour missus).

♂♀. Similis *L. Cæsari*, sed colore plerumque cæruleo-splendente, fronte metallice nitente magis polita, oculis magis remotis, vitta frontali in ♀ angustiore, genis metallice nitentibus, palpis nigris, ut & alarum nervi longitudinalis 4:ti angulo magis rotundato, nervo scilicet transverso apicali basi coneavo I. inflexo, abunde distineta. Facies argentea, cavitate media obscura. Apertura oris parva. Seta antennarum longe, sed parce plumata. Abdomen subnudum, apiee plerumque viride, ano hanc piloso. Variat colore frontis & genarum plerumque chalybeo, raro virescente. Pleuræ sæpissime virides, fascia obliqua chalybea.

*Obs.* *Musca (Lucilia) cornicina* Meig. 5. 52. 2 in Scandinavia vix occurrit.

6. *L. illustris*: aureo-viridis, e cæruleo rarius resplendens, abdominis subnudi 1:mo segmento obscuro; capite argenteo, genis subdescendentibus albis; palpis, antennis, vitta frontali pedibusque nigris; alarum nervis transversis: ordinario inflexo, apicali subrecto; oculis in ♂ paulo distantibus, in ♀ latissime remotis. ♂♀. (Long. circiter 3 lin.).

Meig. Dipt. 7. 292. 18. Macq. Buff. 2. 255. 16. *Musca* Meig. Dipt. 5. 51. 7. ♂♀.

Hab. in graminosis (sæpe in paludosis) & foliis fruticum, per Sueciam meridionalem & medium, 2 Jul.—24 Sept., minus frequens, in copula capta; scilicet in Scania ad Lund (in fenestra), & Björnstorpe (D. Dahlbom); in Smolandia, D. Ljungb.; in Ostrogothia ad Wadstena rarissime, ipse; in Norvegia ad Christiania D. Dahlbom. (Ex

Helgolandia etiam & Gryphia specimen reportavit idem D. Dahlbom).

♂♀. Statura, magnitudo & color variabilis ut in *L. Cæsare* (n:o 1); sed fronte nonnulli magis porrecta, in utroque sexu multo latiore, antennis paullo longioribus, genis paullo magis descendantibus, pesistomio nigro, nec rufescente, ut & palpis nigris, nec flavis, aperte differt. A *L. cornicina*, cui etiam similis, magnitudine plerumque paullo majore, frontis genarumque colore albo, nec metallice nitente, ut & nervo transv. apicali levissime & tenui, nec tantum basi, concavo, facile dignoscitur. Frons & oculi omnino ut in *L. fulgida* (4). Orbita oculorum occipitalis alba. Abdominis segmenta: 1 & 2 nuda, 3:tum imagine apicali, & 4:tum fere totum, setulosum. Squamæ sub alis albæ. Halterum clava albida. — Abdomen lateribus & postice in feminis illæsis certo situ levissime albo-micat. — Marem aureo-viridem in copula cum femina cærulecenti viridi junctum deprehendi.

7. *L. Silvarum*: aureo-viridis, e cæruleo plerumque resplendens, abdominis subsetosi 1:mo segmento lineolaque dorsali obseuris; capite argenteo, genis subdescendentibus albis; palpis, antennis, vitta frontali pedibusque nigris; alarum nervis transversis: ordinario inflexo, apicali subrecto; oculis in ♂ paullo distantibus, in ♀ modice late remotis. ♂♀. (Long. circit. 3 lin.).

Meig. Dipt. 7. 292. 15. *Musca* Meig. Dipt. 5. 53. 4. ♀.

Hab. cum præcedente, rarius; scilicet in Scania ad Lund, Grönby, Lindholmen, &c.; in Smolandia ad Skär-sjö, D. Ljungb. (E Finlandia a D. Sahlgberg missa).

♂♀. Simillima priori; colore autem frequentius in cæruleum I. cyanum vergente, lineola dorsali in abdominis segmentis 2 & 3 obscura plerumque obsoleta (interdum deficiente), segmento etiam 2:do marginie apicali setose, ut & fronte in

♀ modice lata, nee latissima, mox dignota. — Antennæ elongatæ, validæ. Vitta frontalis nigra, utriusque albo-marginata, in ♂ angustata, in ♀ lata. Orbita oculorum occipitalis alba. Abdominis segmenta: 2 & 3 margine apicali setosa, ultimum fere totum setulosum. Squamae sub alis albæ. Halteres fusi. Reliqua ut in præcedente.

S. *L. splendida*: aureo-viridis, e cæruleo aut violaceo plerumque resplendens, abdominis subsetosi 1:mo segmento obscuro, ultimo viridi; capite argenteo, genis parum descendantibus albis; palpis, antennis, vitta frontali pedibusque nigris; alarum nervis transversis: ordinario subflexo, apicali recto; oculis in ♂ anguste distantibus, in ♀ modice late remotis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{3}{4}$  raro 3 lin.).

Macq. Buff. 2. 255. 19. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 292. 20. T. 73. f. 50. (abdomen). — *Musca* Meig. Dipt. 5. 56. 11. ♂♀.

Hab. in Scandinavie meridionalis fruticibus & floribus Compositarum Jul. Aug. Sept. sat frequens; in Suecia superiori rarius; scilicet in Scania ad Lund, Rästen (D. D. Dahlbom & v. Borck), Grönby (D. Kinberg), &c.; in Smolandia, D. Ljungb; in Gotlandia ad Gothem, ipse; e Dania a D. Staeger missa. (Ad Putbus Rugiæ & ad Gryphiam, jam versus finem mensis Maji collegit D. Dahlbom. Ex Hamburgo a D. v. Winthem, & e Glogavia a D. Zeller, quoque communicata).

♂♀. Similis iterum priori; sed magnitudine minore, genis minus descendantibus &c., differt. Frons ut in præcedente, sed oculi maris forte nonnihil magis approximati. Abdomen ut in priori setosum; segmento 1:mo semper obscuro, 2:do plerumque cæruleo l. violaceo, 3 & 4 stepissime aureo-viridibus; sed variat quoque saepè abdomen totum (excepto segmento 1:mo obscuro) viride aut cæruleoscens. Incisuræ interdum nigrescunt. Alarum nervus transv. apicalis om-

nino rectus. Squamæ albæ, sed inferior interdum in ♂ le-  
viter fuscana. Halteres obscuri. Reliqua ut in priori.

---

## 128. PYRELLIA. Rob. Desv.

*Corpus* mediæ aut minoris magnitudinis, breviter ovatum, convexum, thorace setoso, abdome pubescente. Antennæ incubentes, epistomate paullo breviores, sublineares, articulo ultimo 2:do circiter triplo longiore, basi seta dorsali longe plumata. Oculi nudi, raro hirtuli. Frons haud exserta. Epistoma parum descendens, ore subreflexo. Vibrissæ nullæ. Abdomen breve, rotundatum inerme, ano parum setuloso. Segmentum 1:uum breve. Alæ divaricatae inermes, nervo tantum long. 3:tio basi setuloso; spinula costæ nulla. Nervus longit. 4:tus areuatim flexus in summo apice alæ excorrens. Nervi transversi: medius subperpendicula-  
ris; ordinarius leviter flexus fere in medio areæ apertæ insertus. Squamæ distinctæ. Pedes simplices. Tarsi unguibus pulvillisque in utroque sexu subæque longis. Color aureo-viridis, aut cœruleus, nitens. *Motu* velox. *Habitatio* in floribus, foliis plantarum, graminosis, cadaveribus & stereo-  
ratis. *Differentia sexus*; *mas*: oculis arcte cohærentibus;  
*femina*: oculis late remotis, oviductu longe vaginato. *Ty-  
pus generis*: *P. cadaverina*.

\*). Oculi nudi.

1. *P. cadaverina*: aureo-viridis, e cœruleo sæpe resplendens, nitidissima; capite, antennis, palpis pedibusque nigris, epistomatis lateribus argenteis; thorace, abdomeque pubescente inermi, subunicoloribus; alis palle-  
scentibus, squamis albidis. ♂♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 7. 298. I. T. 73. f. 51. ♂. — *Musca*  
Linn. Fn. Su. 1829. De Geer Ins. 6. 62. 7. Schrank Austr.

455. 925. Rossi Fn. Etr. 2. 462. 1191. Fabr. Antl. 289.  
 30. Fall. Muscid. 53. 35. ♂♀. (exclusis in descriptione:  
 "individuis minoribus in Caltha palustri primo vere ob-  
 servatis", quæ ad *Pyr. aeneam* (3) pertinent). Meig. Dipt.  
 5. 59. 19. ♂♀. & 6 371. var. chalybea. — Zett. Ins. Lapp.  
 656. 12. ♂♀. *Lucilia* Macq. Buff. 2. 257. 28. ♂♀.

*Mas.*: oculis magnis arete cohærentibus, linea angustissima nigra tantum remotis; abdomine nigro-pubescente; squamis sub alis albis, leviter brunneo-tinctis;

*Fem.*: oculis mediocribus, fronte sat lata nitida nigro-cærule-  
 scente, aut nigro-virescente, vitta modice lata, nigra opaca,  
 postice nitida; abdomine subnudo; squamis sub alis albidis,  
 vix brunneo-tinetis; in copula.

Hab. in cadaveribus & stercoratis, per totam Scan-  
 dinaviam, a primo vere usque ad autumnum, ubique vul-  
 gatissima; in Lapponia vero rarius obvia. (E Finlandia,  
 Petropoli, Wienna, St. Sever Galliae & Glogavia etiam missa).

♂♀. Similis *Lucil. cornicinæ*, sed magnitudine paullo minore,  
 oculis minus remotis, ut & nervo longitudinali 4:to arcua-  
 tis, nec angulationi, flexo, statim dignota. — Frons breviter  
 & tenuiter setosa. Antennæ epistomate paullo breviores,  
 angustæ. Epistoma breve, nigrum, opacum, lateribus ar-  
 genteis nitidis. Genæ nigrae, nitidæ. Vertex nitidus. Or-  
 bita oculorum occipitalis nigra aut metallica. Thorax &  
 abdomen variant aut viridia (plerumque in ♀), aut cærule-  
 scensia l. violacea (plerumque in ♂); semper nitidissima.  
 Alæ cinereo-albidæ. Nervi transversi: medius perpendicularis,  
 ordinarius leviter inflexus. Halteres flavidi. Pedes  
 nigri, femoribus in medio late viridi-micantibus. — Variat  
 thorax in fundo viridi vittis l. maculis violaceis.

2. *P. purpureo-fasciata*: aureo-viridis, nitidissima,  
 capite, antennis, palpis pedibusque nigris, epistomatis la-

teribus argenteis; abdominis pubescentis inermis segmento 2:do fascia interrupta violacea; alis pallescentibus, squamis albidis. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad villam Esperöd in paroccia Mellby d. 12 Aug. duo specimen inveni.

♂. Simillima priori & differt tantum fascia abdominis purpurea. Tota scilicet aureo-viridis, splendida, abdominis segmento secundo basi fascia (dimidiati longitudinem segmenti occupante) in medio modice interrupta, pulchre violacea & cyanea, nitidissima, glaberrima, & in ambobus exemplis simillima. Reliqua omnia exacte ut in praecedente.

3. *P. serena*: obscure viridis, nitens; capite, antennis, palpis pedibusque nigris, epistomatis lateribus argenteo-micantibus; thoracis antico vittis tribus albidis lineisque subquatuor, atris; alis cinereo-hyalinis, squamis albis; abdomine pubescente inermi, apice pilosulo; oculis nudis. ♂♀. (Long. 2½ sere 3 lin.).

Meig. Dipt. 7. 298. 2. *Musca* Meig. Dipl. 5. 59. 18. ♀. Zett. Ins. Lapp. 656. 3. ♂♀. var. a. — *Lucilia* Macq. Buff. 2. 258. 32.

Hab. in Sueciæ mediae & borealis silvis & cultis 1 Jun.—14 Aug., minus frequens, & mas rarissime; scilicet in Botnia boreali; in Lapponia Umensi ad Lyksele & Tresunda; in Luleensi ad Quickjock, D. Andersson; in Lapponia Tornensi ad Wittangi & Juckasjervi; in Dania ad Hafniam frequens. (Sub nomine "Musca serena" e Glogavia plura exempla seminea etiam a D. Zeller 1842 obtinui).

♂♀. Similis *P. cadaverinae*, sed paullo major, robustior, & colore obscuriore, minus nitido, ut & thoracis pictura &c.

differit. Caput ut in *cadaverina*, sed fronte in femina vix nisi postice (in vertice) nitida. Frons scilicet feminæ lata nigra opaca, orbita tantum ocalorum ad medium frontis albida nitente; & serie setarum subduplici paullo validiore quam in *cadaverina*. Thorax in utroque sexu obscure cærulecenti viridis, subnitidus, antice maculis tribus albis, una media & 2 humeralibus, vittas latas inchoantes formantibus, obsoletis præsertim in ♂. Inter has vittas albas lineæ nigricantes indeterminatæ certo situ apparent. Abdomen obscure viride, parum cæruleo-micans, nitidum, nudiusculum, ano pilosulo. Segmentum ultimum certo situ ad latera levissime albicat. Abdomen subtus cærulescit, ventre nigro. Squamæ sub alis albæ. Pedes nigri.

4. *P. cyanicolor*: cyanea, nileus; capite, antennis, palpis pedibusque nigris; epistomatis lateribus argenteo-micantibus; thoracis antico vittis tribus albidis lineisque subquatuor, atris; alis hyalinis, squamis albis; abdomine pubescente inermi, apice pilosulo; oculis nudis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

*Pyrellia violacea* Meig. Dipt. 7. 299. 8. ♀. *Lucilia* Macq. Buff. 2. 258. 33. ♀: thorace viridi, violaceo-micante, antice albo-vittato; abdomine pulchre violaceo; alis hyalinis, squamis albis. — *Musca serena* var. b. Zett. Ins. Lapp. 656. 12. ♀.

Hab. in Suecia media & boreali, 12 Maj.—15 Aug., passini; scilicet in Ostrogothia ad Wadstena, Lärketorp, Gusum; in Gotlandia ad Garde 12 Jul.; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jenitlandia ad Faxelven, Undersåker, Ristansfors, usque ad radicem alp. Åreskutan procedens, frequens; in Botniæ borealis stercoratis ad Jo-hannis Ro, rarius; in Norvegia ad Garnæs Værdaliae parce.

♂♀. Simillima priori, a qua non differt nisi colore thoracis, scutelli abdominalisque violaceo, alis forte purius hyalinis,

nec cinereis, ut & squamis albidiōribus. — Vix species distincta; forte tantum varietas praecedentis.

*Obs.* Nomen specificum: *violacea* in hac genere rejiciendum, ne confondendum cum *Musca violacea* Fabr. Antl., quæ certe *Pyrelliæ* species est.

5. *P. ænea*: aureo-viridis, nitens; capite, antennis, palpis pedibusque nigris; epistomatis lateribus argenteomicantibus; thoracis antice in ♀ vittis 3 albis obsoletis; alis cinereo-hyalinis, squamis albis (♀), aut subalbidis (♂); abdome pubescente, subinermi, apice pilosulo. ♂♀ (Long. 1½—2 lin.).

*Mas*: cupreo-anreo-viridis, thorace non albo-vittato; oculis arcte coherentibus; abdomine tenuiter pubescente, pube suberecta; alis cinereo-hyalinis, basi subfuscatis; squamis leviter brunneo-tinctis;

*Fem.*: aureo-viridis, thorace antice vittis tribus inchoantibus albis; oculis remotis, fronte vitta lata atra opaca utrinque ad medium argenteo-marginata; vertice metallice nitido; abdomine subglabro 1. pube tenuissima depressa tecto; alis hyalinis, squamis albis; in copula.

*Musca ænea* Zett. Ins. Lapp. 656. 12 inter synonyma *M. cadaverinæ*. — *M. cadaverina* Fall. Muscid 53. 35. in descriptione: "individua minora in Caltha palustri primo vere observata." — Forte etiam inter Macquarti *Luciliæ ignitam*, *nitidam*, *calidam* aut *cupream* latet, sed ob Cl. Auctoris descriptiones harum specierum perbreves & insufficientes, synonymiam extricare non valeo.

Hab. in floribus Achilleæ Millefol., Chrysanthemi leucanthemi, Pruni spinosa, Calthæ palustris &c., per Sueciam meridionalem & medium, 15 Maj.—15 Sept., vulgaris & passim copiose, in copula deprehensa; scilicet

in Scania ad Lund, Kjellby, Kjeflinge, Östra Torp, Esperöd &c., frequentissima; in Ostrogothia ad Wadstena Julcopiose; in Ölandia, D. *Bohemian*; in Gotlandia ad Wisby &c.; in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; sed vix in Suecia borealiori obvia. (E Glogavia marem sub nomine: "*Musca luteipennis*" & feminam sub nomine: "*Musca parviceps*" a D. Zeller obtinui. E St. Sever Galliae mares sub nomine: "*Lucil. cadaverina* Linn. Maeq." cum aliis individuis genuinæ *cadaverinæ* a D. Leon Dufour 1844 quoque communicati).

♂♀. Similis *P. serenæ*, sed sæpe duplo minor, & mas colore thoracis magis æneo l. cupreo, vittis albis nullis, abdomine crebrius pubescente, alis saltem basi magis flavescensibus, squamis brunneo-flavis; & *femina* colore totius corpore lætius viridi, differunt. Nec cohabitant. Thoracis dorsum in ♂ plerumque æneo-viride, vittis 3 cupreis perspicuis, discretis aut interdum subconfluentibus. Hujus picturæ in dorso thoracis feminæ quoque vestigium adest.

\*\*). Oculi hirti.

6. *P. lasiophthalma*: obscure viridis, nitens; capite, antennis, palpis pedibusque nigris; epistomatis lateribus argenteo-micantibus; thoracis antico vittis 3 albidis obsoletis lineisque subquatuor atris; alis subhyalinis, squamis albidis; abdomine cæruleo-viridi pubescente, inermi, apice piloso; oculis hirtis. ♂♀. (Long. fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 7. 299. 9. ♂. *Lucilia* Maeq. 2. 258. 34. ♂.

Hab. in Scandinavia media & boreali rarius; utrumque sexum in floribus Salicis cinereæ in Ostrogothia ad Gusum & in Uplandia ad Holmiam captum sub nomine: "*Musca cyanella*" mihi communicavit Prof. *Wahlberg*;

in Norvegia ad Thynæs in paroecia Skogn ♀ a D. Dahl-bom quoque inventa.

♂♀. Simillima *P. serenæ*, a qua vix nisi oculis tenuiter hirtis, in ♂ non tam arctissime cohærentibus dignoscitur. Caput de cetero ut in *serena*. Thorax in fundo quidem viridis l. cœrule-scenti viridis, sed in disco dorsali maculæ indeterminatæ lineas subconfluentes formantes, cupreæ, nitidæ; antice vittæ 3 latæ inchoantes albæ cum lineis 4 nigris alterantes. Scutellum obscure viride aut cœruleescens. Abdomen cœrulecenti vi ride, nitidum, lateribus & apice pilosum. Alæ subhyalinæ, basi leviter fuscaneæ. Squamæ albæ, in ♂ parum fusco-tinctæ. Reliqua ut in *P. serena*.

7. *P. eriophthalma*: cœruleo-violacea, nitens; capite, antennis, palpis pedibusque nigris; epistomatis lateribus argenteo-micantibus; thoracis antico vittis 3 albidis obsoletis lineisque subquatuor, atris; alis hyalinis, squamis albis; abdome pubescente, inermi, apice piloso; oculis hirtis. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 7. 299. 10. ♂. *Lucilia* Macq. Buff. 2. 258. 3. ♂. An *Musca cyanella* Meig. Dipt. 5. 77. 45? & Ejusdem *Cyrtoneura* 7. 309. 18?

Hab. in Scandinavia media & boreali, 2 Jul.—10 Aug., minus frequens; scilicet in Gotlandia insula Furilen rarissime; in Jemtlandia boreali ad eataractam Ristans-fors in paroecia Undersåker, raro; in Norvegia ad Thynæs & Næs Værdaliae, passim.

♂♀. Simillima iterum priori, a qua differt ut *P. cyanicolor* a *serena*. Color scilicet dominans thoracis abdominisque in violaceum abiit. Alæ quoque forsitan purius hyalinæ & squamæ albidiiores quam in *lasiophthalma*.

*Obs.* Oculi maris cohærentes, nec "perspicue remoti", & frons feminæ fusco-nigra, antice utrinque sordide albido-mar-

ginata, vertice tantum obseure leviter cæruleo-micante, nec frons "cæruleo-nigra nitida, vitta atra", identitatem cum *M. cyanella* Meig., quæ huic de cetero valde affinis, prohibere videntur.

---

## 129. MUSCA Linn.

*Corpus* magnum aut medium, ovatum aut ovale, thorace setoso. Antennæ inermibentes, epistomate paullo breviores, articulo ultimo 2:do duplo, triplo aut ultra longiore, basi seta dorsali undique longe (in *M. pubicipite* n:o 5 breviter) plumata. Oculi nudi (in *M. pubicipite* n:o 5 hirti). Frons modice, interdum parum, exserta. Epistoma infra oculos plerumque descendens, ore reflexo. Vibrissæ nullæ aut spuriæ. Abdomen late ovatum, pubescens, antice inerme, postice setosum. Segmentum 1:mum breve. Alæ divaricatæ, in quibusdam subincumbentes, inermes, nervo tantum long. 3:tio basi bil. trisetosæ; spinula costæ nulla. Nervus longit. 4:tus angulatim flexus mox ante apieem alæ excurrens. Nervi transversi: medius obliquus; ordinarius plerumque flexus, semper paullo pone medium areæ insertus. Area normaliter aperta, raro subocelusa, sed non petiolata. Squamæ distinctæ. Pedes simplices. Tarsi unguibus ineurvis pulvillisque in utroque sexu subæque longis. *Color* niger, cæsius, obscurus, opacus, raro cæruleo-seens & nitidus. *Motu* velox. *Habitatio* in floribus, vegetabilibus putridis, cadaveribus, domibus &c. *Disserimen sexus*; *mas*: oculis plus minus cohærentibus, setis frontalibus utrinque simpliei serie; *femina*: oculis late remotis, setis frontalibus postice duplii serie dispositis. — A *Lueilia* vix nisi colore obscuro, nec aureo-nitente, & abdome interdum depresso, differt. — *Muscæ plebejæ* Auctorum.

A. Thoracis dorsum non tomentosum.

\*). Palpi ferruginei (in *M. sordida* palpi fusi).

**1. *M. vomitoria*:** thorace cæsio, antice subvittato; capite nigricante, orbita oculorum faciali albida; antennarum medio, epistomatisque carinis subvibrissatis & apice, ferrugineis; palpis flavis; barba fulva; abdomine cœruleo, nitido, maculatim albo-micante, incisuris anguste pedibusque atris; alarum angulo nervi longitudinalis 4:ti acuto, descendente, squamis nigris. ♂♀. (Long. 2½, plerumque 4—5 lin.).

***Mas:*** oculis arcte cohærentibus, linea tantum angustissima nigra utrinque albo-marginata disjunctis;

***Fem.:*** oculis late remotis, vitta lata nigra opaca, antice utrinque cinereo-marginata disjunctis;

Linn. Fn. Su. 1831. De Geer Ins. 6. 57. 4. Reaum. Ins. 4. T. 12, 21. Røsel Ins. 2. T. 9. 10. Schrank Austr. 455. 926. Panz. Fn. 10. 19. ♀. Meig. Dipt. 5. 60. 21. certe. ♂♀. Fall. Muscid. 47. 22. ♂♀. (exclus. syn. De Geer & Fabr., sub qua species sequens etiam latet). Dahlbom Skand. Ins. 318. 217. T. 2. f. 23. ♀. Zett. Ins. Lapp. 656. 14. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 300. 1. *M. carnívora* Fabr. Antl. 285. 5. (teste *Meigen*). *M. Mortuorum* Fabr. Antl. 290. 32. *Calliphora fulvibarbis* Macq. Buff. 2. 262. 3. ♂♀.

Hab. ad domicilia per Scandinaviam tota æstate frequens, in Lapponia rarius, ex. gr. ad Quickjock Lapp. Lul. (Ad Elisenheine prope Gryphiam 6 Sept. 1844 copiose, D. *Dahlbom*). Larvæ in carne & recenti & putrida degunt, etiam in caseo antiquo, teste D. *Bouché*. In statu larvæ circiter 7—8 diebus, & in pupæ adhuc paucioribus, manet. Suet. *Spyfluga*.

♂♀. Genæ obscuræ & barba fulva speciem a sequente in primis distingunt. *Sarc. Mortuorum* sœpe brevior, sed proportione latior, ovata, convexa. Frons parum prominens,

serie setarum ad antennarum basin continua, macula supra antennas picea. Antennæ epistomate paullo breviores, fuscognigræ, articulo ultimo linearis 2:do quadruplo longiore, basi, 2:doque apice, rufis. Epistoma ad latera griseum, nitens, cavitate media nigra, opaca, carinis lateralibus ad medium breviter nigro-vibrissatis, & peristomio, ferrugineis. Palpi clavati, flavi. Genæ nigrae cinereo-micantes, nigro-pubescentes. Mentum fulvo-barbatum, barba nitida. Oculi rufo-brunnei, ænea-micantes. Orbita pone oculos albida. Thorax cæsio-niger, opacus, setosus, antice vittis albis & nigris alternantibus, obsoletis. Sutura transversa distincta. Scutellum cæsio-nigrum, apice sæpe piecum. Alæ hyalinæ, basi subfuscæ. Nervi transversi: medius fuscedine cinctus, ordinarius inflexus, apicalis basi distincte concavus. Area sat late aperta. Squamæ nigricantes, inferiores albo-marginatæ. Halteres obscuri, clava albida. Abdomen breviter ovatum, cæruleum, nitidum, pubescens, præsertim ad latera maculatum albo-micans. Segmenta: 1:um breve, inermis, totum, reliquaque linea dorsali obsoleta, incisurisque, nigra. Segmenta: 2:um ad latera, 3:um margine apicali, & 4:um fere totum, setulosa. Pedes nigri.

2. *M. erythrocephala*: thorace cæsio, antice subvittato; capite ferrugineo; orbita oculorum faciali flavidæ; vitta frontali, antennarum articulo ultimo fere toto, epistomatisque breviter vibrissati medio, nigricantibus; palpis flavis; barba nigra; abdomine cæruleo, nitido, maculatum albo-micante, incisuris anguste, pedibusque, atris; alarum angulo nervi longitudinalis 4:ti acuto, descendente, squamis nigris. ♂♀. (Long. 2½ sæpe 4—5 lin.).

*Mas*: oculis non acte cohærentibus, vitta angusta nigra, anterioris dilatata sæpe rufescente, utrinque albo-marginata, disjunctis;

*Fem.*: oculis late remotis, vitta lata nigra opaca, antice utrinque cinereo-marginata, disjunctis.

Meig. Dipt. 5. 62. 2. certe ♂♀. & 7. 300. 2. Zett. Ins. Lapp. 656. 15. ♂♀. *Musca vomitoria* Fall. Muscid. 47. 22. var. — *Calliphora vomitoria* Macq. Buff. 2. 262. 2. T. 16. f. 16. male colorata & alis justo longioribus. — (A pluribus Auctoribus cum *M. vomitoria* confusa).

Hab. cum praecedente, sed multo frequentior & longius procedens, per totam etiam Lapponiam (exceptis aliibus) usque ad NordCap inventa. A mense Majo usque ad Novemb. obvia. Culinas frequentans, coquis inimica; larvas in carne, cremore &c., uti prior, deponens. (E Regio monte a D. *Andersch*, e Kilia a D. *Wiedemann* & ex Helgolandia & Gryphia in utroque sexu a D. *Dahlbom*, communicata).

♂♀. Simillima priori, a qua tamen epistomate inferne ad latera magis rufescente, genis rufis, barba menti nigra, nec fulva, alis magis hyalinis, nervis nempe ad basin non infuscatis, ut & oculis in ♂ non tam arete cohærentibus, vere distineta. Barba menti nigra, gulæ lutescens. Genæ præsertim postice in individuis senioribus interdum nigrescent, sed tomentum menti fulvum, & oculorum distantia in ♂, constantes præbent notas. — Cicatrix flava pleurarum antice in fovea sub humeris ut in priori adest.

3. *M. gröulandica*: ovalis subdepressa, violaceo-cærulea nitida, immaulata, thoracis limbo antico interdum virescente; capite, antennis pedibusque nigris; orbita oculorum faciali albicante; palpis flavis; alarum nervo transverso apicali subrecto; squamis nigricantibus. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

*Mas*: oculis nonnihil distantibus, fronte angustata;

*Fem.*: oculis longe remotis, fronte latissima; in copula.

Zett. Ins. Lapp. 657. 16. ♂♀. — Vix *Calliphora rufipalpis* Macq. Buff. 2. 261. 10?

Hab. aut in floribus Salicis, in stereoratis, truncis Populi, & ligno recenti Pini, locis sylvaticis, aut in cultis, in parietibus ligneis, sepibus, in piscibus mortuis, &c., 20 Maj.—2 Sept. mihi obvia, per Scandinaviam præsertim borealem, passim frequens, in copula capta; scilicet in Scania ad Lund rarissime; in Smolandia rarius; in Ostrogothia parce; in Uplandia ad Holmiam omnium vulgatissima; in Gestricia passim; in Jemtlandia usque ad radicem Åreskutan & Mullsjelleu, frequens; in Ångermannia & Botniis occidentali & boreali; in Lapponiis omnibus per regionem sylvaticam, passim; e Dania. (Jun. Aug. passim) a D. Staeger missa; in Norvegia: a Dovre usque ad Alten Finmarkiae haud rara; ad urbem Christianiam Jul. 1814 in utroque sexu a D. Dahlbom lecta. In Holmia intra domos hybernat quemadmodum *M. rufis*, testante D. Prof. Wahlberg. (E Grœnlandia per D. Westermann ut "Musca grœnlandica Wiedm." communicata, & e Finlandia a D. Sahlberg missa).

♂♀. Aut plerumque obscure violaceo-cærulea, aut interdum cæruleo-virescens, thoracis limbo antico & abdominis apice magis viridibus; tota subdepressa, ovalis, nigro-pubescentia in abdome præsertim depresso. Caput totum nigrum, orbita oculorum albida. Frons parum prominens. Antennæ epistomate fere duplo breviores, nigro-fuseæ, validæ, articulo ultimo 2:do triplo longiore, seta longe plumata, apice summo nudo. Vibrissæ brevissimæ, spuriæ. Palpi flavi. Cieatrix pleurarum in forea sub humeris nigra. Abdomen ovale, depresso, unicolor. Alæ hyalinæ, in quiete subincumbentes, nervis ut in prioribus directis, sed angulus nervi 4:ti subrectus, nec descendens,

& transversus apicalis fere rectus. Area modice aperta. Nervus long. 5:tus ad marginem non continuatus, mox infra transversum ordinarium abruptus. Squamæ fuscantæ. Halterum clava albida. Pedes nigri.

4. *M. sordida*: ovalis, subdepressa, thorace cæsio, limbo antico virescente, cinereo- & nigro-alternatim vittato; abdome viridi nitido unicolo; capite, antennis pedibusque nigris, epistomatis frontisque lateribus griseis; palpis fuscis; alarum nervo transverso apicali subrecto, squamis albidis. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

*Mas*: oculis nonnihil distantibus, fronte angustata; thorace cæsio, antice vittis albidis nigrisque alternantibus obsoletis;

*Fem.*: oculis longe remotis, fronte latissima, vitta lata grisecente nigra; thorace antice vittis latis griseo-cinereis lineisque augustioribus nigris alternantibus.

Zett. Ins. Lapp. 657. 17. ♀.

Hab. in Scandinaviæ mediae & borealis pratis & floribus Salicis, 2 Jun.—28 Aug., minus frequens; scilicet in Ostrogothia ad Gusum & in Westrogothia ad Gothenburgum, ♀, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Lärbro, ♀, D. *Dahlbom*; in Lapponia Umensi ad Lycksele 2 individua seminea inveni; in Botnia boreali ad Bredåker in paroecia ÖfverLuleå, D. D. *Wahlberg* & *Bohemian*; in Jemtlandia ad Faxelvén ♂; in Norvegia ad Næs Værdalæ ♂ rarissime.

♂♀. Valde similis & affinis *M. grönlandicæ*; sed antennis paullo angustioribus, palpis retraetis fuscis, frontis epistomatisque lateribus latius sordide griseis, thoraeis vittis anticus præsertim in ♀ cinereo-griseis distinctis, abdome latius viridi linea dorsali angusta violacea, ut & squamis albidis vix infuscatis, dignota. — Thorax: in ♂ cærulescens,

antice vittis 5 suturam non attingentibus albidis obsoletis, & lineis 4 infra suturam (sed non ad sentellum) descendenter angustioribus nigris; in ♀ cæsius aut virescens, antice vittis cinereis & lineis nigris ad suturam l. paulo infra continuatis. Abdomen in ♀ viride interdum aureo-viride, in ♂ magis cæruleo-virescens. Nervi alarum ut in priori, sed transversus ordinarius plerumque nonnihil magis incurvus. — Reliqua ut in præcedente.

5. *M. pubiceps*: ovala, subconvexa, nigra, thorace antice cinereo-vittato, capite albido; palpis flavis; abdome ænescente, nitido; alarum nervo transverso apicali subrecto, squamis flavidis; oculis maris hirtis. ♂. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Botnia boreali inter Luleå & limitem Lapponiæ Lulensis 1843 a D. Prof. Boheman detecta mihi que in uno specimine ad describendam communicata.

♂. Species dubia. Affinis *Tachinæ*, & in vicinitate *T. chalconotæ* 182, l. *T. chalybeatæ* 185, illam reposuisse, nisi antennarum plumatura obstetisset. Similis quoque *Sarcophagæ Vespilloni* n:o 28, sed antennarum pubescencia, colore alio, &c., diversa. Oculi oblongi, sat magni, distinete hirti, postice fere cohærentes. Frons parum prominula, nigricans, antice triangularis. Antennæ incumbentes, nigræ, articulo ultimo 2:do duplo longiori, seta biarticulata, basi incrassata, fere tota pubescente l. breviter plumata, apicem versus subnuda. Epistoma breve, albido-nigra, ore non reflexo. Palpi flavi. Thorax nigricans, antice vittis 5 cinerascentibus & lineolis 4 atris. Abdomen ovatum, subconvexum, nigro-æneum, nitidum, omnium levissime cinereo-nigricans. Segmenta: 1:um parum breve; postica setulosa. Tuberculum anale parvum. Alæ subhyalinoæ, basi leviter fuscanæ. Nervi transversi: ordinarius paulo pone medium insertus, obliquus & flexus, apicalis subrectus fere in apice alæ excurrentis. Area media anguste aperta. Spinula costæ

nulla. Squamæ medioeres, flavidæ, halteres flavos tegentes. Pedes nigri, spinulosi. Polvilli longiusculi, albi.

*Obs.* *Dexia triangulifera* Wahlb. forma corporis omnino *Muscæ*, sed propter picturam & alias affinitates cum *Dexia ferina* illam in genere *Dexia* descripsi, ibique sub n:o 6 inveniendam.

\*\*). Palpi nigri (*M. sordida* palpis fuscis supra sub n:o 4 quærenda).

6. *M. azurea*: ovalis, subdepressa, violaceo-cærulea nitida, subimmaculata; thorace antice obsolete albo-subvittato; capite, antennis, palpis pedibusque nigris, epistomatis frontisque lateribus albido-cinereis; alarum nervo transverso apicali leviter incurvo; squamis fuscavitis. ♂♀. (Long. 3—4 lin.).

*Mas*: oculis anguste distantibus, vitta atra utrinque tenuiter albo marginata disjunctis;

*Fem*: oculis late remotis, vitta lata fusco-nigra, utrinque cinereo-marginata.

Fall. Act. Holm. 1816. p. 245. 19. ♂♀. Muscid. 46. 19. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. p. 657 in observ. sub n:o 17. Meig. Dipt. 5. 63. 21? *Calliphora* Macq. Buff. 2. 264. 9?

Hab. in sepibus, ligno recenter cæso, parietibus ligneis, &c., 15 Jul.—2 Sept., per Sueciam medium, minus frequens; scilicet in Smolandia meridionali ad diversorium Dihult; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Gusum; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*, mus. D. *Falleni*.

♂♀. *M. grönlandicae* iterum valde similis & affinis; sed palpis nigris, nec flavis, thoracis vittis 4 anticis albis obsoletis, &c., ut & oculis maris magis approximatis, vere differt.

*Obs.* An Meigeni *M. azurea* l. c. ad nostram *azuream*, aut *sordidum* (4), aut denique aliam quandam Faunæ nostræ

ignotam speciem pertineat, pro certo dicere non audeo, eum Cl. Auctor de palporum colore suæ *azureæ* nihil dicit, neque comparationem cum quadam alia specie facit.

**7.** *M. domestica*: nigricans, fronte flava, vitta atra; thoracis vittis abdominalisque tessellis cinereis; alarum nervo transverso ordinario subrecto, squamis sordide albidis; abdominis basi lateribus in ♂ saepissime flavo-diaphanis. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

**Mas**: oculis subapproximatis, vitta latiuscula atra disjunctis; abdominalis segmentis 1 & 2 lateribus plerumque flavo-pellucidis;

**Fem.**: oculis late remotis, vitta lata atra disjunctis; abdominalis segmentis 1 & 2 lateribus vix pellucidis; in copula.

Linn. Fn. Su. 1833. De Geer Ins. 6. 71. 10. 1. 4. f.  
**5.** 6. Schrank Austr. 456. 928. Fabr. Antl. 287. 18. Fall.  
 Muscid. 49. 26. ♂♀. Latr. Gen. 4. 345. Meig. Dipt. 5. 67.  
**31.** & **7.** 300. 12. Macq. Buff. 2. 265. 1. Dablb. Skand.  
 Ins. 319. 218. Zett. Ins. Lapp. 659. 24. ♂♀.

Hab. in domibus per totam Scandinaviam etiam Lapponiam, ubi scilicet homines extruxerunt domicilia, omnium vulgatissima, notissima; hybernans. In silvis & pratis a domibus longe remotis interdum errahundam vidi. Larva in colluvariis & in stereoratis, praesertim in stercore equino & gallino, D. *Bouché*; in vaseculo sputis exceptiendis pupas invenit D. *Fallén*; 200 specimina semel e nasu infantis, ubi exclusæ fuerunt, provenisse, narrat *Tengmalm* in Act. Holm. 1796. p. 286. Educatam e larvis in ulceribus immundis ægroti inventis quoque obtinuit Profess. Doct. *Wahlberg*. In statu pupæ degit 8—14 diebus. Plures generationes anno.

♂♀. Oblonga, subconvexa opaca, pubescens, parum setosa. Frons parum prominens. Antennæ epistomate paullo breviores, mediocres, seta tota longe plumata. Cicatrix in fovea subhumerali grisea. Abdomen cinereum, lineis triplici serie dispositis, lateralibus interruptis, incisurisque tenuiter, nigris. Venter pallidus. Nervi transversi ordinarius subrectus, apicalis paullo incurvus. Area non late aperta. Halteres albi.

8. *M. corvina*: nigricans, epistomatis frontisque lateribus albidis; thoracis vittis abdominalisque tessellis cinereis; alarum nervo transverso ordinario subflexo, squamis sordide albidis; abdominis lateribus in ♂ flavo-dianaphis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: niger, thorace antice obsolete albo-4-vittato; oculis in fronte arete cohaerentibus; abdomine ferrugineo, basi & vitta dorsali nigro, submaculatum velbo-nicante; squamis fuscanis;

*Fem.*: cinerea, oculis late remotis, vitta frontali lata atra; thoracis lineis 4 abdominalisque tessellis subtrifariam dispositis, nigris; squamis albidis; in copula.

— Fabr. Antl. 291. 19. ♂. Fall. Muscid. 48. 25. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 69. 32. ♂♀. & 7. 300. 17. Macq. Buff. 2. 266. 4. ♂♀. T. 16. f. 17. ♂. Zett. Ins. Lapp. 659. 23. ♂♀. *Musca autumnalis* De Geer Ins. 6, 83. ♂. *Musca Tau* Schrank Austr. 458. 931. ♂. *M. ludifica* Fabr. Antl. 298. 73. ♂. Panz. Fn. 105. 13. ♀. *Musca nigripes* Panz. Fn. 60. 13. ♂.

Hab. supra lapides soli expositos, etiam in floribus, foliis fruticum, sepibus, parietibus, &c., raro in fenestris, plerumque extra domos, per totam Scandinaviam usque ad Lapponiam, a primo vere usque ad serum autumnum

frequentissima; in copula multoties capta; ♀ viatoribus & pecoribus valde molesta. Larva in stereore, caseo antiquo &c., degit, teste D. *Bouché*. (Ad Hamburgum non parcer visa a D. *Dahlbom*. E Vienna missa a D. *Zeller*.).

♂♀. Similis priori, sed capite magis albido, subargenteo, nec flavescente, nervo transverso ordinario magis flexo, abdomine breviore magis rotundato, pelluciditate laterum in ♂ in segmenta 3 & 4 descendente, ut & oculis in ♂ arcte cohærentibus, mox dignota.

*Obs.* *M. tempestiva* Fall.: nervo longitud. 4:to subangulato-arcuatim flexo, in genere *Cyrtoneura* sub n:o 4 invenienda.

B. Thoracis dorsum tomentosum. Corpus ovale, subdepressum. *Pollenia* Macq.

α.) Alarum area media apice occlusa.

9. *M. atramentaria*: nigricans, capite griseo; antennis fuscis, basi rufo-piceis; palpis pedibusque nigris; thorace fulvo-tomentoso; abdomine cinereo-tessellato; alarum area media apice occlusa. ♂♀. (Long. 2—3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 65. 26. ♂♀. & 7. 301. 28. Zett. Ins. Lapp. 658. 21. ♂♀. *Pollenia* Macq. Buff. 2. 272. 23. ♂♀. (Sub *M. rudi* Fall. Muscid. 48. 24. haec species etiam latet).

Hab. in truncis arborum viventium, floribus, muris, parietibus ligneis, domibus, fenestris, &c., per totam Scandinaviam etiam Lapponiam, ubique vulgatissima, mensibus Majo & Septembr. præsertim abundans; in domibus hibernans. (E Finlandia, Pommerania & Glogavia quoque missa. Ad Eldena prope Gryphiam etiam a D. *Dahlbom* capta mihi que communicata).

♂♀. Nigricans, opaca, magnitudine valde varians. Caput sub-inflatum: maris cinereum, oculis cohaerentibus, macula supra antennas triangulari nigra, anguste cinereo-marginata; feminæ griseum, oculis late remotis, vitta lata griseo-nigra. Frons sub prominens. Series setarum usque ad antennarum basin continuata. Antennæ epistomate fere duplo breviores, angustæ, fuscæ, basi rufescentes, articulo ultimo 2:do duplo longiori, seta distincte plumata. Epistoma in cavitate media nigrum, sed ad latera supra genas sæpe rufum. Palpi nigri l. fuscæ. Barba tenuis, grisea. Thorax & scutellum parvae & breviter aureo-tomentosa, tomento facile deterendo, reflecto dorso nigro, ubi tamen setæ tenacissimæ adhaerent. Abdomen ovatum, griseo-cinerenum, maculis irregularibus olivaceo-micantibus; pubescens, apice pilosulum. Alæ hyalinæ, in quiete incumbentes, basi subinfuscatae. Angulus nervi 4:ti subrectus. Nervi transversi: ordinarius distincte inflexus; apicalis leviter incurvus. Area apice oclusa, sessilis. Squamæ albidae. Halteres pallidi. Pedes nigri.

*Obs.* *Musca Lanio* Meig. Dipt. 5. 64. 25. parum a nostra *atramentaria* differt, & vix nisi antennis fuscis dignoscitur.

**10. *M. depressa*:** nigricans, capite griseo; antennis fuscis, basi rufo-piceis; palpis, ab domine nitido pedibusque nigris; thorace fulvo-tomentoso; alarum area media apice oclusa. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Meig. Dipl. 5. 67. 30. & 7. 301. 31. *Pollenia* Macq. Buff. 2. 273. 19.

Hab. in Suecia meridionali, Maj.—Sept., minus frequens; in Scania ad Lund & Esperöd aliquoties inventa. (E Glogavia sub hoc nomine a D. Zeller quoque communicata).

♀. Simillima priori, a qua tantum differt magnitudine multo minore & ab domine nigro, nitido, certo situ levissime albomicante, sed haec albedo superficiem totam æqualiter tegit

& nullas tessellas l. maculas format. — Caput & thorax omnino ut in *M. atramentaria*. Abdomen rotundatum, depresso, nigrum, nitidum, polline albido in illæsis leviter vestitum. Alæ ut in præcedente, sed nervus transversus apicalis omnino rectus. Squamae albidae. Halteres pallidi. Pedes nigri.

♂: fronte albida triangulo nigro, & oculis sutura disjunctis, a Cel. Meigen l. e. describitur, mihi non obvins.

$\beta$ ) Alarum area media apice aperta.

II. *M. rufis*: nigricans, capite griseo; antennis nigro-fuscis, medio rufo-piceis; palpis pedibusque nigris; thorace fulvo-tomentoso; abdomine cinereo-tessellato; alarum area media apice aperta. ♂♀. (Long. 2—3 lin.).

Fabr. Autl. 287. 16. Fall. Muscid. 48. 24. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 66. 28. & 7. 301. 38. Zett. Ins. Lapp. 659. 22. ♂♀. *Pollenia* Macq. Buff. 2. 269. 1. ♂♀. T. 16. f. 18.

Hab. in floribus, truncis arborum, domibus, &c., per totam Scandinaviam tota aestate longe frequentissima, in fenestris tempore vernali & autumnali sape copiosissima, multoties in copula visa; locis occultis intra domos hibernans. (E Rixdorf, Eldena & Moabite a D. Dahlbom, e Finlandia a D. Sahlberg, e Lubeca a D. J. Behrens & e Glogavia a D. Zeller, etiam communicata; e St. Sever Galliae sub nomine *Pollenia rufis* tandem a Leon Dufour missa).

♂♀. Simillima iterum *M. atramentariæ* (9), a qua non nisi alarum area media plus minus aperta, nec inclusa, differt, & vix ab illa distinguenda. Nervus transversus apicalis plerumque distincte incurvus. Antennæ fusco-nigræ, saltem articulo 2:do apice rufo. Thorace abdomineque detritis

corpus nigrum, opacum evadit, & hinc *M. obscura* Fabr. — Variat etiam tomento thoracis cinereo l. griseo.

12. *M. nitens*: nigricans, capite griseo; antennis fuscis, basi rufo-piceis; palpis pedibusque nigris; thorace fulvo-tomentoso; abdomine olivaceo-nigro, nitido; alarum area media apice aperta. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  lin.).

*M. Vespollo* Meig. Dipt. 5. 65. 27. (excl. syn. Fabr.) & 7. 301. 40. *Pollenia* Macq. Buff. 270. 6. ♂♀?

Hab. in foliis fruticum, in floribus Salicis cinereæ, Chrysanthemi, &c., locis littoralibus mihi sæpe obvia, per Scandinaviam meridionalem & medium, 2 Jun.—15 Sept., passim; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c.; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Gusum &c., sat frequens; in Gotlandia ad Westerby & Thorsborg, D. *Dahlbom*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; e Dania sub nomine *M. Vespollo* a D. *Staeger* missa.

♂♀. A *Musca rudi*, cui in omnibus aliis exakte convenit, differt ab domine supra toto olivaceo-nigro, nitente, immaculato, nullo vestigio macularum, & ita in utroque sexu. A de tritis individuis prioris ab domine nitido obscure olivaceomicante, nec opaco, mox dignoscitur. Antennæ fuscæ, articulis 1 & 2 rufescentibus.

*Obs.* Cel. *Meigen* in Part. 6. add. p. 374 ipse fatetur suam *M. sepulcrale* in museo Fabriciano, teste D. *Wiedemann*, ut *M. Vespillonem* adesse. Secundum igitur legem sanctam nomen antiquius *Vespillonem* pro specie Fabriciana servavi, & *Meigeni Vespilloni* hoc novum nomen *nitens* imposui, ut evitetur confusio. — Cfr. etiam *Sarcophaga vespollo* n:o 28.

---

## 130. MESEMBRINA Meig.

*Corpus magnum, late ovatum, tomentosum, non setosum. Antennæ incubentes, epistomate paullo breviores, lineares, articulo ultimo basalibus duplo l. fere triplo longiore, basi seta dorsali undique longissime plumata. Oculi nudi. Frons parum exserta, serie setarum utrinque ad antennarum basin continuata. Epistoma infra oculos paullo descendens, ore antice reflexo. Vibrisse brevissimæ. Setæ mystacinæ plures. Palpi clavati, pilosi. Genæ & mentum pilosa. Abdomen convexum, segmento 1:mo brevi. Alæ divaricatæ, basi coloratæ, totæ omnino inermes. Nervi longitudinales: 4:tus leviter arcuatus l. in apice l. mox pone apicem alæ excurrens; 5:tus non ad marginem continuatus. Nervi transversi: medius subperpendicularis, apici nervi auxiliaris oppositus; ordinarius leviter flexus, fere in medio areæ insertus. Area apice late aperta. Squamæ distinctæ. Pedes simplices, pilosi, tibiis spinulosis. Tarsorum unguis curvati. Pulvilli rotundati, albi. Color niger, hirsutie sæpe flava. Signaturæ lineatæ l. tessellatæ nullæ. Motu velox, strenue & alacriter volans. In truncis arborum latere soli exposito sæpe tranquille sedens. Habitatio in sylvis. Opinante D. Robineau Desvoidy vivipara, veluti *Sarcophaga*, sed secundum Macquart ovipara, utpote plures *Muscæ* species. Larvæ in stereore bovino degunt. Differentia sexus; mas: oculis approximatis; unguibus pulvillisque majoribus; femina: oculis late distantibus; unguibus pulvillisque minoribus.*

1. *M. mystacea*: alra, thoracis dorso fulvo-villoso; abdominis apice pallide hirsuto; palpis alarumque basi flavis; squamis fuscanis. ♂♀. (Long. 5 lin. & ultra).

*Mas*: oculis fere coherentibus; tibiis intermediis intus versus apicem longe pilosis;

*Fem.*: oculis late remutis; tibiis intermediis reliquis non longius pilosis.

Var. a. ♂♀. hirsutie thoracis anique fulva.

Zett. Ins. Lapp. 651. I. ♂♀. *Musca* Linn. Fn. Su. 1793. var. α. — De Geer Ins. 6. 133. I. T. 8. f. 2. ♀. Fall. Museid. 50. 29. var. α. ♂♀.

Var. b. ♂♀. hirsutie thoracis fulva; ani grisea aut albida.

Meig. Dipt. 5. 12. 2. T. 42. f. 26. ♂. Zett. I. e. var. b. ♂♀. Macq. Buff. 2. 273. I. ♂♀. *Syrphus apiformis* Panz. Fn. Germ. 91. 20. ♀. (nervis longitudinalibus 3 & 4 in apice alae in figura immerito subcoœuntibus). — *Eristalis apiarius* Fabr. Antl. 231. I.

Var. c. ♂♀. hirsutie thoracis grisea, ani aut grisea aut albida.

Fall. I. e. var. β. — Zett. I. e. var. c. ♂♀.

Hab. in silvis Scandinaviæ mediae & borealis, 24 Jun.—12 Sept., passim haud raro, in ligno Pini & Abietis recenter secato, gummoso, mihi sæpe obvia; e pupa cylindrica nuda brunnea, in stercore bovino ad Juckasjervi Lapponiæ Tornensis capta, d. 30 Jun. egredientem vidi; varietates descriptæ mixtæ occurunt, scilicet in Smolandia ad Skärsjö &c., passim; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena, Gusum, &c., haud rara; in Nericia ex. gr. ad Laxbro, & in Sudermannia; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia ad Smedby; in Jemtlandia usque ad cataractam Ristansfors & radicem Mullsjellen, frequens; in Lapponia Umensi ad Stensele & Badsjuträsk; in Lulensi ad Quickjock, D. D. *Wahlberg* & *Bohemani*, qui eandem ad ripas fluvii Kama legerunt; in Lapponia Tornensi ad Kengis, Juckasjervi & Muonioniska; in Norvegia ad Alteidet Nordlandiæ septentrionalis, parec.

♂♀. Obovata, posterius valde lata, inter Museides nostras majorres numeranda, *Volucellam plumatam* mentiens. Caput obscurum, epistomatis lateribus griseis suboitidis. Setae frontales ferrugineæ l. fusæ. Genæ nigrae, nitidae. Oculi in 7 subcohaerentes, in ♀ late disjuncti. Antennæ fuscae, medio roseo-escentes. Palpi flavi. Thorax niger, dorso fulvo- l. griseotomentosus. Cieatrix in fovea subhumerali nigra. Scutellum nigrum & nigro-hirtum. Abdomen nigrum, segmentis 3 & 4 fulvo- l. albido-villosis. Alæ subfuscantæ, basi fulvescentes. Nervi longitudinales: 3:tus mox ante apicem, & 4:tus mox pone apicem alæ excurrentes, hinc area media late aperta, nec ut in figura Panzeri fere occlusa. Halteres nigri a squamis fuscanis teeti. Pedes nigri. Tibiae posticæ subcurvæ; at intermediae in ♂ intus riliatae, & versus apicem uno latere longissime brunneo-pilosæ.

2. *M. meridiana*: alra, nitida, immaculata, palpis concoloribus; epistomatis lateribus flavo-aureis; alarum basi squamisque fulvo-flavis, nervo longitudinali 4:to in apice alæ excurrente. ♂♀. (Long. 1 lin.).

*Mas*: oculis approximatis s. anguste remotis, sed non subcohaerentibus;

*Fem*: oculis latissime distantibus, virtu media lata.

Meig. Dipt. 5. 11. 1. ♂♀. T. 42. f. 25. ♀. — Macq. Buff. 2. 274. 2. ♂♀. T. 16. f. 19. Zett. Ins. Lapp. 652. 2. ♂♀. *Musca* Linn. Fa. Su. 1827. Reaum. Ins. 4. t. 26. f. 10. De Geer Ins. 6. 55. 2. Schrank Austr. 454. 922. Fabr. Antl. 281. 3. Pauz. Fa. 10. 17. ♀. Fall. Muscid. 51. 30. ♂♀.

Hab. in floribus Umbellatarum, parietibus, truncis arborum, sepibus &c., Maj.—Oct., per Scandinaviam meridionalem & medium, passim frequens; in provinciis borealibus raro; feminæ in truncis arborum viventium latere meridiei

verso sedentes autumno s<sup>e</sup>pe deprehenduntur; in Scania ubique vulgaris; in Blekingia, D. v. *Borck*; in Smolandia & Ostrogothia, frequens; in Gotlandia ad Ruthe, Wamblingbo, &c., passim; in Nericia; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*, ad Upsaliam, D. Prof. *Thunberg*; in Jemtlandia boreali usque ad radicem alpium Mullsjellen mihi parce obvia; in Dania freq., D. *Staeger*; in Norvegia ad Thynæs rar. (E Finlandia a D. *Sahlberg* missa).

♂♀. Priore minor, ovalis, tota atra, nitida, tenuiter nigro-pubescentia. Caput nigrum, opacum, epistomate lateribus (ab antennis ad genas atras nitidas) pulchre aureo-flavo, nitido. Antennarum seta basi flava. Palpi nigri. Thorax sutura transversa dorsali distincta. Alæ ut in priore, sed nervus long. 4:tus in apice (nec pone apicem) alæ excurrit, unde area minus late aperta quam in præcedente. Squamæ fulvescentes. Halteres nigri. Pedes nigri. Tibiae subrectæ, intermediæ in ♂ minime longe pilosæ. Tarsorum articulus ultimus interdum etiam penultimus in ♂ testacei.

*Obs.* Larvæ conicæ, flavæ, nitidæ in stercore bovinæ degunt. Præterea quoad metamorphosin hujus speciei conferantur quæ attulerunt *Reaumur*, *De Geer* & *Meigen* l. c.

3. *M. resplendens*: cærulescenti atra, nitidissima, immaculata, palpis concoloribus; epistomatis lateribus argenteis; alarum basi late, squamisque fulvo-flavis, nervo longitudinali 4:to paullo pone apicem alæ excurrente. ♀ (Long. 3½ lin. & ultra).

Wahlberg in litt. Sept. 1843. \*)

Hab. in convallibus Quickjockensibus ad ripas fluvii Kama Lapponiæ Lulensis, 23—27 Jul. foliis & truncis

---

\*) In Conspectu Actorum Helm. 1844 n:o 4. p. 66 hanc speciem ab ipso Detectore deinde quoque descriptam vidi.

arborum insidens; loca umbrosa amans; a D. Prof. *Wahlberg* nuperrime detecta, mihique, adjectis observationibus, benigne communicata. Mas ignotus.

♀. Species insignis, priori valde affinis & similis; sed magnitudine paullo minore, colore corporis atro nonnihil in cærñlescentem vergente, epistomatis lateribus argenteis, nec fulvis, antennarum seta tota nigra, nec basi flava, alarum nervis: transverso ordinario magis recto, & præcipue longitudinali 4:to versus apicem minus curvato paullo pone apicem, nec in ipso apice, excurrente, unde area media apice saltem duplo latius aperta, abunde & vere dignota. Caput proportione paullo minus quam in præcedente, totum nigrum, epistomatis lateribus argenteum. Orbita oculorum occipitalis albida. Thorax antice vestigio vittarum 3 albarum. Abdomen atrum, subcærulescenti splendens. Alæ hyalinæ, leviter fuscaneæ, a radice ad medium flavæ. Nervi ut in diagnosi indicatum directi. Squamæ fulvæ. Halteres nigri, basi ferruginei. Pedes nigri, forte paullo graciliores & minus hirti, quam in priori.

---

### 131. CYRTONEURA Meig.

*Corpus* mediae, raro minoris magnitudinis, ovatum, parce pubescens & setulosum. Antennæ incumbentes, epistomate paullo breviores, angustæ, articulo ultimo antecedentibus fere triplo longiore, basi seta dorsali unique longe plumata. Oculi nndi aut hirti. Frons parum exserta, serie setarum utrinque ad antennarum basin continuata. Epistoma infra oculos minus quam in *Mesembrina* descendens, ore antice subreflexo. Vibrissæ brevissimæ. Setæ mystacinæ plures, quarum unica utrinque interdum longior. Palpi subclavati. Genæ pubescentes. Mentum breviter pilosum. Abdomen convexum, lateribus & postice parce setosum. Seg-

mentum 1:mum breve. Alæ inermes, hyalinæ, basi non coloratae. Nervus longitudinalis 4:tus arcuatus in apice alæ excurrens. Nervi transversi: medius perpendicularis, medio inter apicem nervorum auxiliaris & longitudinalis 1:mi oppositus; ordinarius paullo flexus, fere in medio areæ insertus. Area apice late aperta. Squamæ distinctæ. Pedes simpli-ces (excip. in speciebus 2 & 3), pilosi, tibiis parce spinulosi. *Color* nigricans, pictura thoracis sæpe lineata, & abdominis subtessellata. *Motu* agilis. *Habitatio* in hortorum & pratorum floribus, & foliis fruticum, sæpe etiam in parietibus morans. *Larvæ* in vegetabilibus & Fungis putrescentibus degunt. *Differentia sexus*; *mas*: oculis subcohærentibus saltem approximatis, tarsorum unguibus curvis pulvillisque rotundatis nonnihil majoribus; *femina*: oculis plus minus late remotis.

### A. *Oculi nudi*.

#### \*). Palpi nigri.

##### a.) Alarum area media apice modice aperta.

**1. C. Hortorum**: atra, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque nigris; epistomatis lateribus, thoracis vittis 3 abdominisque tessellis albidis; *mas*: pedum posticorum tibiis subrectis, metatarsis subtus nudis; *femina*: abdome late ovato. ♂♀. (Long. 2 $\frac{3}{4}$ —3 lin.).

Macq. Bußl. 2. 276. 5. ♂♀. (*Curtoneura*). — Meig. Dipt. 7. 309. 1. *Musca* Fall. Act. Holm. 1816. 252. 33. ♂♀. & Muscid. 52. 33. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 73. 39. ♂♀. T. 43. f. 33. ♀. — Zett. Ins. Lapp. 560. 30. ♂♀. (excl. syn. *Anthom. cinerascens* Wiedem.). — *Anthomyia hor-torum* Wiedem. Zoolog. Mag. I. 1. p. 83. 35. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum, floribus Umbellatarum, parietibus, sepibus, &c., per totam Scandinaviam & Lapponiam

usque ad radices alpium procedens in hortis, pratis, pascuis & sylvis, Maj.—Sept., ubique vulgatissima, in copula multoties deprehensa, & e pupa, in sterecore bovino inventa, saepe exclusa. (Ad Neuenkirchen & Hamburgum etiam a D. *Dahlbom* frequenter lecta. E St. Sever Galliae a D. *Leon Dufour* quoque missa).

♂♀. Magnitudo & statuta *Musc. domesticæ*. Cœsia, subnitida. Caput nigrum, opacum. Epistoma ad latera argenteum. Punetum supra antennas album. Oculi in ♂ cohærentes (non vero arctissime); in ♀ modice remoti, vitta media latiuscula atra, regione circa ocellos cinerea. Thorax antice vittis 3 latis albidis. Pectus in illæsis leviter albo-micat, cicatrice in fovea subscutellari atra. Abdomen ovatum, cinereum, linea dorsali maculisque indeterminatis nigricantibus. Alæ hyalinæ. Nervi: transversus ordinarius fere rectus I. leviter tantum flexus; longitudinalis 5:tus non ad marginem descendens. Squamæ albæ. Halteres pallide flavi. Pedes nigri, parum pilosi & parce setosi. Tibiæ omnes rectæ. Tarsi inermes. Femora antica extus in ♂ villosa, in ♀ setulosa.

2. *C. curvipes*: atra, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque nigris; epistomatis lateribus, thoracis vittis 3, abdominisque tessellis albidis; *mas*: pedum posticorum tibiis areuatis, metatarsis subtus barbalis; *femina*: abdome subovali. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

Maeq. Buff. 2. 276. 7. ♂. Meig. Dipt. 7. 310. 11. ♂♀.

Hab. in Scandinavia rarissime; mas semel in Scania deprehensus, at ulerque sexus e Dania, ubi in Umbellatis mense Augusto frequenter obveniat, a D. *Staeger* benigne missus. (Ad pagum Zirkow prope urbem Putbus Rugiæ d. 6 Jun. 1842 mas quoque a Cel. D. *Dahlbom* lectus mihiique benevole communicatus).

♂♀. Simillima priori, sed magnitudine s<sup>e</sup>pe duplo minore, & mas: pedum posticorum tibiis distinete incurvis, extus parce setosis, apice, prae*ter* spinulos ordinarios, intus setulis 2 curvatis, metatarso subtus rigide nigro-ciliato, ut & femoribus anticis extus parce pilosis, nec dense villosis; & semina: abdome subovali; certe differt. ♂ a precedente facillime notis allatis dignoscitur, sed ♀ a femina prioris vix nisi magnitudine, ut dictum, minore, abdome nonnihil angustiore, ut & nervo longit. 4:to forte paullo minus arcuatim flexo, distinguitur.

3. *C. valga*: cœrulecenti nigra, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque nigris; epistomate thoracisque vix vittati lateribus albo-nitentibus; abdome cinereo-submicoante, linea dorsali incisurisque indeterminate obscurioribus: mas: pedum posticorum tibiis arcuatis & parce spinulosis, metatarsis intus barbatis. ♂. (Long. circiter  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Wahlb. in litteris d. 5 Nov. 1844.

Hab. ad Quickjock Lapponiæ Lulensis, ubi sub æstate 1843 a D. Prof. Wahlberg in unico exemplo inventa.

♂. Speciem hanc, quæ priori valde similis videtur, ipse non lustravi. Ut diversam tamen illam affero auctoritate Cel. Detectoris, qui sequentem completam ejus descriptionem per litteras nuperrime mihi communieavit: "Cyrtoneura valga ♂: Cyrt. curvipedi Macq. affinis, sed colore corporis, pictura thoracis, spinis apicalibus tibiarum posticarum non uncinatis & loco natali sine dubio distincta. — Cœrulecenti nigra, nitida, setosa. Oculi nudii, nonnihil remoti, orbitis scilicet & linea media angusta nigra disjuncti. Frons vix prominula. Epistoma medio impressum, infra oculos parum descendens, certo situ argenteo-nigra, ore produeto, seta mystacina utrinque unica longiori. Genæ nigræ, nitidæ, cum

vertice, fronte & ore setosæ. Antennæ epistomate dimidio breviores, articulo tertio basalibus fere longiori, linearis-oblongo, seta longe plumata, basi incrassata, secundo seta propria tenui, ordinaria vix dimidio breviori, munita. Palpi nigri, parum exserti. Thorax lateribus albido-nitens, vix lineatus. Scutellum triangulare, longe setosum. Abdomen certo situ cinereo-micans, linea media & apicibus segmentorum indeterminate nigrioribus, ano subclavato, corniculis 2 brevibus obtusis. Alæ hyalinæ, margine interiori in regione nervi 5:ti leviter emarginato; nervis nigris, ut in *C. Hortorum* directis, transverso ordinario flexo, obliquo, paullo ante medium areæ, sat late apertæ, inserto, longitudinali quinto apice subevanescente. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Halteres pallide flavo testacei. Pedes setosi, anteriores simplices, postici tibiis valde incurvis, crassiœculis, extus in dimidio apicali & ad apicem spinulas aliquot longiores gerentibus, metatarsis intus dense & rigide barbatis. Pulvilli albi." Wahsb.

4. *C. tempestiva*: nigra, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque concoloribus; epistomate argenteo; thorace sublineato; abdomine cinereo, linea dorsali incisurisque anguste nigris. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

*Mass.* niger, oenlis arcte cohærentibus, abdomine subænescenti cinereo, segmento 1:mo toto, reliquisque linea dorsali incisurisque nigris;

*Fem.*: oculis late remotis, cinerascens, capite albido, antennis, vitta frontali, palpis, thoracis lineis 4 tenuibus, abdominis linea dorsali incisurisque nigris; in copula.

Meig. Dipt. 7. 309. 6. *Musca* Fall. Muscid. 53. 36.

♂♀. Meig. Dipt. 5. 76. 44. ♂. Zett. Ins. Lapp. 661. 31.

♂♀. Forte etiam *Musca nana* Meig. Dipt. 6. 375. 51. ♀. & *Cyrtoneura nana* Meig. Dipt. 7. 309. 8?

Hab. in Scandinavia præsertim meridionali & media, tota æstate vulgatissima; in copula capta; viatores, tem-

pestate serena, tenaciter persecuitur & manus nudas hominum quiescentium replando saepe laedit; in Umbellatis interdum obvia. Oecurrit: in Scania ubique longe frequentissima; in Smolandia, Ostrogothia, Ölandia & Nericia quoque vulgaris; in Gotlandia ad Wamblingbo, Gothem, Stenkyrka, Kjellunge, Ruthe, Furillen, &c.; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; deinde rarescit, & intra Lapponiae limites tantum ad Lycksele & Åsele Lapponiae Umensis a me visa; in Dania, D. *Dahlbom*. (E Glogavia sub nomine: "*Musca curvinervis* Bouch." a D. *Zeller* missa).

$\delta\varphi$ . Inter minutissimas Muscariarum nostrarum. Epistoma argenteum. Antennae nigrae, cinereo-micantes, seta longissime plumata. Abdomen breviter ovatum. Alae albido-hyalinae, nervis subpallescibus. Nervus long. 4:tus subangulato-arcuatim flexus in summo apice alae excurrentis. Area anguste aperta. Nervus transv. ordinarius leviter flexus. Squamae albæ. Halteres pallidi. Pedes nigri, parum pilosi. Reliqua ut in diagnosi.

$\beta\delta$ . Alarum area media apice latissime aperta; nervus scilicet longit. 4:tus parum arcuatus, juxta apicem tantum levissime curvatus.

5. *C. cæsia*: cæsia, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque nigris; capite albicante; thoracis vittis abdominisque tessellis cineraceentibus; scutelli apice ferrugineo; oculis in ♂ subcohærentibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 3 lin.).

Macq. Buff. 2. 278. 13. ♀. Meig. Dipt. 7. 309. 5. *Musca* Meig. Dipt. 5. 76. 43. ♀. *Musca borealis* Zett. Ins. Lapp. 660. 28. ♂♀.

Hab. in Suecia mediae, sed præsertim borealis & Lapponiae floribus Salicium, in parietibus interdum sedens,

14 Maj.—15 Jul., 6 Sept., rarius; scilicet in Ostrogothia ad Wadstena semel; in Botnia boreali ad Johannis Ro; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele & Wilhelmina, Lulen-si ad Quickjock (*Wahlberg*), & Tornensi ad Wittangi.

♂♀. Antennæ nigrae, cinereo-micantes, seta apice nuda. Oculi in ♂ subcohaerentes, linea angusta nigra remoti; in ♀ late distantes, vitta lata nigra, regione circa ocellos cinerea. Thorax cæsius, lineis 4 nigris, & vittis 3 latioribus, antee albidis, postice glaucescentibus. Scutellum cæsium, cinereo- I. glauco-micans, summo apice ferrugineum. Abdomen subdepressum, in fundo quidem cæsium, sed certo situ glauco-micans, maculis irregularibus nigro-olivaceis micantibus. Alæ hyalinæ. Nervus transv. ordinarius flexus. Nervi longitudinales: 3:tus mox ante apicem & 4:tus mox pone apicem alæ excurrentes, unde area media late aperta. Nervus long. 5:tus sat longe infra transversum continuatus, non tamen ad marginem ductus. Squamæ albæ. Halteres pallescentes.

*Obs.* Macquarti *Cyrt. fungivora* ♂ *nigripalpis* parum ab hac specie differre videntur. Cave ne confundas hanc cum *Aricia (Anthomyia) dentipede* n:o 36, quæ nervorum directione convenit, sed antennarum seta nuda I. tantum pubescente, &c. discrepat.

6. *C. assimilis*: nigra, antennis, palpis, vitta frontali pedibusque concoloribus; capite albido; thoracis vittis abdominalisque tessellis cinerascentibus; scutelli apice ferrugineo; oculis in ♂ arce cohaerentibus. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

*Musca assimilis* Fall. Muscid. (Anno 1823). 56. 41. ♀. ipsissima secundum specimen typicum. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 105. 39. ♂♀. *Hylemyia* Ejusd. Dipt. 7. 316. 20. — *Curtoneura aperta* Macq. Dipt. (Anno 1833) 5. 11. 4. ♂♀. & Buff. 2. 278. 15. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 311. 14.

Hab. in foliis fruticum per hortos & prata Scandinaviae meridionalis & mediæ, Jul.—Sept., mibi rarius obvia; scilicet in Scania ad Lund (in horto botanico 26 Jul. 1823), & ad Esperöd, atque in Ostrogothia ad Wadstena, aliquoties deprehensa; etiam ad Gusum & Holmiam a D. *Wahlberg* capta erit; sed specimina ex utroque sexu sub nomine "*Cyrt. aperta* Macq." e Dania communicavit D. *Staeger*, qui simul asseverat, "hujus speciei individua in truncis arborum Daniæ mens. Sept. & Oct. frequenter occurrere" ( $\delta$  e Glogavia a D. *Zeller* sub nomine *Anthom. assimilis* missus).

$\delta\varphi$ . Simillima priori, a qua non differt, nisi colore in fundo thoracis & abdominis magis nigricante, quam cæsio, ut & oculis in  $\delta$  arctius cohærentibus, linea tantum angustissima disjunctis. — Variat magnitudine jam *Cyrt. stabulantis* majoris, jam *Anthomyzæ (Ariciæ) alboleatæ*.

\*\*). Palpi ferruginei. Alarum area media late aperta.

7. *C. pabulorum*: nigra, pedibus concoloribus; capite albido; antennarum articulo ultimo basi, palpis scutellique apice, testaceis; thoracis vittis abdominisque tessellis cinerascentibus; oculis in  $\delta$  arce cohærentibus.  $\delta\varphi$ . (Long.  $3\frac{1}{4}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 277. 8.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7. 309. 2. *Musca* Fall. Muscid. 51. 31.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 5. 75. 41.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 660. 27.  $\delta\varphi$ .

Hab. in parietibus stabulorum &c., per Scandinaviam, 12 Maj.—6 Sept., passim; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c., certis annis haud infrequenter; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Westrogothia ad Örlösa

prope Lidecopiam & in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; sed deinde longius versus septentrionem rarissime occurrit; in Dania non raro, D. *Staeger*. (E Reinerzi Silesiae a D. *Zeller* missa).

♂♀. Sat late ovata. Oculi in ♂ arcte cohærentes, tantum linea angustissima gemina alba disjuncti; in ♀ late remoti, vitta atra postice cinerea. Antennæ fuseæ, medio rufescentes. Orbita pene oculos albida. Oculi in viva brunnei. Thorax cinereus, antice lineis 4 nigris. Scutellum cinerascens, apice testaceum. Abdomen glauco-cinereum, maculis irregularibus nigro-olivaceis micantibus. Alæ hyalinæ. Nervus transversus ordinarius flexus. Nervi longitudinales: 4:tus versus apicem subito & distincte arcuatus in ipso apice alæ excurrentis; 5:tus infra transversum aperte continuatus. Squamæ albæ. Halteres sordide albidi.

8. *C. pascuorum*: cæsiæ, capite albido, antennis, vitta frontali pedibusque nigris; antennarum articulo ultimo basi, palpis scutellique apice, testaceis; thoracis vittis cinerascentibus; oculis in ♂ arcte cohærentibus. ♂♀. (Long. 3½ lin.).

Macq. Buff. 2. 277. 9. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 309. 1. *Musca* Meig. Dipt. 5. 71. 40. ♂♀.

Hab. in Scandinavia rarius; in succo destillante Betulæ albæ capta; in Scania ad Lund; in Ostrogothia ad Gusum, & in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; ex Hafnia a D. *Staeger* communicata.

♂♀. Valde similis & affinis priori; sed colore corporis magis cæsio, & præsertim abdome subimmaculato, nec cinereo-tessellato, sine dubio distincta. Caput, thorax, scutellum, alæ & pedes ut in præcedente. Abdomen late ovatum, sub-

depressum, cæsiom, leviter glauco-micans, & certo situ linea dorsali nigra obsoleta.

9. *C. stabulans*: nigra, capite albido; antennarum articulo ultimo basi, palpis, scutelli apice, pedibusque, testaceis, femoribus basi tarsisque nigris; thoracis vittis abdominalisque tessellis cinerascentibus; oculis in ♂ subcohærentibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 277. 10. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 309. 3. *Musca* Fall. Muscid. 52. 32. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 75. 42. ♂♀. t. 43. f. 35. ala. — Zett. Ins. Lapp. 660. 29. ♂♀. *Anthomyia cinerascens* Wied. Zool. Mag. 1. 1. p. 79. 28. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum, truncis arborum, muris, jumentorum stabulis, fenestris, &c., per totam Scandinaviam, a primo vere usque ad serum autumnum (nec sub ipso mense Decemb. omnino deest), vulgatissima, in copula multoties deprehensa; scilicet in Suecia meridionali & media usque ad Upsaliam ubique frequentissima; in provincebus borealibus ex. gr. ad Gevaliam, Hernösand, Umeå &c., rarius, & intra Lapponiæ limites non nisi rarissime visa; in Norvegia meridionali passim; in Dania copiose. (In insula Helgolaudia & in horto Senatoris *Krey Gryphiæ* a D. *Dahlbom* lecta; e St. Sever Galliæ a D. *Leon Dufour*, & e Finlandia a D. *Sahlberg* missa). Larvæ in vegetabilibus putridis fungorum & fructuum, etiamque in stercore, vivunt.

♂♀. Similis *C. pabulorum*, sed magnitudine paullo minore, antennis in medio minus distincte rufescens, alarum area media apice paullo latius aperta, pedibus ad maximam partem testaceis, ut & oculis in ♂ minus cohærentibus, vere & facile dignoscitur. Opaea. Caput albidum, vitta frontali in ♂ angustata, nigra, in ♀ lata, obscura. Orbita oculo-

rum tota alba. Antennæ obscuræ, in medio anguste rufescentes. Thorax cinerascens, antice lineis 4 nigris. Scutellum cinereum, apice testaceum. Abdomen cinereum; linea dorsali & maculis irregularibus olivaceo-nigris micantibus. Alarum nervus transv. ordinarius parum flexus. Nervi longitudinales: 3:tius mox ante apicem & 4:tus mox pone apicem excurrens, unde area in hac specie nonnihil latius aperta quam in *C. pabulorum*. Pedes testacei, femoribus anticis fere ad apicem, posterioribus (in ♂) plerumque paullo ultra medium, & coxis tarsisque omnibus totis, nigris. Cetera ut in *C. pabulorum*.

B. *Oculi hirti*. Alarum area media apice late aperta. Palpi nigri.

10. *C. maculata*: cinerea, antennis, palpis, vitta frontali, pedibus, thoracis lineis 4, abdominisque rotundati punctis numerosis, nigris, hoc in ♂ lateribus flavodiaphano. ♂♀. (Long. 2½, plerumque 3 lin.).

*Mas*: capite obscure livido-albido; oculis subcohærentibus, vitta nigra angusta antice dilatata; thorace hirto, cinereo, lineis 4 atris; abdomine cinereo, lateribus testaceo-pellucido, punctis in dorso circiter 12 nigris, lateralibus propter pelluciditatem obsoletioribus; alis leviter infuscanis;

*Fem.*: capite albido, vitta frontali latissima nigra geminata; thorace subnudo, cano, lineis 4 atris; abdominae cano, punctis majoribus minoribusque circiter 12 atris distinctis, & maculis certo situ olivaceo-micantibus; alis hyalinis; in copula.

Macq. Buff. 2. 275. 1. ♂♀. T. 16. f. 20. ♀. — Meig. Dipt. 7. 309. 15. *Musca* Linn. Syst. Nat. Ed. 12. 2. p. 990. 70. ♀. De Geer Ins. 6. 81. 13. T. 3. f. 22. ♂. figura non bona. — Panz. Fn. 44. 22. ♀. Fabr. Antl. 287. 14. ♀. Fall. Muscid. 49. 27. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 78. 18. ♂♀.

Zett. Ins. Lapp. 659. 25. ♂♀. *Musca vulpina* Fabr. Antl. 292. 13. ♂.

Hab. in floribus præsertim Umbellatarum, per Scandinaviæ hortos & prata, 2 Jun.—15 Sept., passim; scilicet in Scania, Blekingia (*r. Borck*), Smolandia & Ostrogothia, frequens; in Ölandia & Gotllandia, passim; in Uplandia ad Holmiam & Upsaliam; deinde rarius occurrit, & intra Lapponiam tantum ad Lyksele Lapponiæ Umensis rarissime visa; in Norvegia inter Kongstue & Höjfeldbro in jugo alpino, rarissime, D. *Dahlbom*; in Dania non raro, D. *Staeger*. (Ad Neuenkirchen jam d. 20 Maj. a D. D. Prof. *Hornschuch* & *Dahlbom* lecta; & e Lubeca a D. *Behrens* missa; e St. Sever Galliæ a D. *Leon Dufour* quoque communicata). Larvam flavam, stigmatibus posterioribus circularibus; & pupam brunneonigrum, describunt Auctores. Larvæ in stercoratis degere dicuntur.

♂♀. *Musca domestica* robustior. Antennæ angustæ, cinereo-micantes, seta longe plumata. Palpi nigri. Scutellum canum (♀), aut testaceum (♂), maculis 3 atris, media majori, trigona. Abdomen breve, late ovatum, maculis tribus nigris in singulo segmentorum 2, 3 & 4 in triangulum dispositis, & una laterali in segmentis 3 & 4. Segmentum 1:um quoque obscure maculatum. Alæ hyalinæ. Nervi transversus ordinarius distinete flexus; longitudinalis 4:tus regulariter arcuatus in summo apice alæ excurrit. Area sat late aperta. Squamæ albæ. Halteres pallidi. Pedes nigri. — Varietatem maris singularem colore feminæ præditam, h. e. abdome toto cano (absque pelluciditate testacea), maculis ordinariis atris, ad Cedersdal prope Holmiam in pluribus exemplis invenit eximius ille observator Cel. Profess. *Wahlberg*; similem varietatem quoque in Lapponia Lulensi ad Quickjock Idem legit.

11. *C. meditabunda*: cinerea, antennis, palpis, vitta frontali, pedibus, thoracis lineis 4, abdominisque ovato-conici punctis totidem, nigris. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

*Mas*: oculis subcohaerentibus, vitta frontali angustata nigra; oculis & thorace fortiter hirtis; abdomine subconico, griseo, punctis 4 fuscō-nigris; alis fuscaneis;

*Fem.*: oculis late remotis, vitta frontali lata, gemina, nigra; oculis & thorace tenuiter hirtis; abdomine ovato, cinereo, punctis 4 dilute brunneis, interdum obsoletis; in copula.

Macq. Buff. 2. 275. 2. Meig. Dipl. 7. 309. 16. *Musca* Panz. Fn. 44. 23. ♂. Fabr. Antl. 297. 68. ♂♀. Fall. Muscid. 50. 28. ♂♀. Meig. Dipt. 5. 79. 19. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 660. 26. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum Betulæ, Salicis, Populi, &c., per totam Scandinaviam usque ad Lapponiæ regionem sylvaticam, a vere ad autumnum, vulgaris, in copula deprehensa; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostrogothia, Nericia & Uplandia, frequens; in Ölandia. & Gotlandia ad Slitö &c., passim; in Jenitlandia boreali usque ad Frösön & Åreskutan; in Lapponia ad Lycksele & Muonioniska, paree; in Dania frequens, D. *Staeger*. (Ad Neuenkirchen a D. *Dahlbom* capta mihiique communicata. E Finlandia a D. Prof. *Sahlberg* missa).

♂♀. A priore, cui in multis convenit, magnitudine minore praesertim statura multo angustiore, & in primis abdomine proportione longiore, cinereo, maculis in singulo segmentorum 2 & 3 tantum duabus, unde extant in abdomine maculæ quatuor subtrigonæ nigrae aut brunneæ, differt. In medio segmenti 4:ni etiam 2 maculæ fuscae adsunt. Haec autem pictura in ♀ plenumque magis obsoleta. Palpi & antennæ nigrae. Scutellum cinereum, linea media obscura. Alae ut in priori etiam quoad directionem nervorum, sed nervus

long. 4:tus paullo tamen minus arcuatus. Squamæ non magnæ, albæ, in ♂ leviter subbrunnescentes. Halteres flavæ. Pedes nigri.

### *Species dubia.*

12. *C. cyanea*: "obscure cyanea, abdomine paullo albo-micante; antennis majusculis, palpis pedibusque nigris; thorace obsoletissime lineato". ♂♀.

Wahlberg in litt. 1842.

Hab. in Gotlandia rarissime; ad pagum Ethelhem ultrumque sexum detexit D. Prof. *Wahlberg*; a me numquam inventa, neque visa.

♂♀. "Musca corvina paullo minor. Exempli minori *Sarcophaga* *Tespillonis* simillima, sed magis obscure cyanea, antennis longioribus palpisque nigris distincta. Nervus alarum 4:tus subarcuatus flexus." Wahlb.

*Obs.* Meigeni *Cyrtoneuræ cyanellæ*, ut & nostris *Pyrelliæ latiophtalmæ* (quam tamen sub nomine *M. cyanella* ab ipso D. *Wahlberg* obtinui & ergo alia est), & *eriophtalmæ* valde affinis videtur hæc species. Nec a *Sarcophaga cærulea* nob. (n:o 30) multum abludere videtur.

---

In Museiarum Familia post *Cyrtoneuram* aplissimus locus mihi videtur pro insertione nuper a Cel. *Wahlberg* detecti affinis generis, quod descripsi sub nomine:

### CINOCHIRA Wahlb.

*Corpus* parvum. *Caput* rotundatum, supra planiusculum, thorace fere latius. *Oculi* rotundi, longe remoti, nudi. *Vertex* setosus, setis 2 ceteris longioribus, occipitalibus, versus thoracem recurvatis. *Frons* non prominula, parce setosa.

Epistoma vix infra oculos descendens, impressum, superne a fronte velut area disjunctum, inferne subreflexum: apertura oris magna, rotundata. Vibrissæ nullæ, setæ vero mystacinæ adsunt. Palpi (saltem in mortua) exserti, simplices. Antennæ epistomate dimidio breviores, sub arcu frontalí insertæ, subdeflexæ, articulo ultimo longitudine reliquorum, rotundato, seta longiuscula, capillari. Scutellum longins setosum. Abdomen oblongum, thorace angustius, subcurvatum, setosum, 4-anulatum, segmento 1:mo ceteris majori (an e 2 annulis constante?), ano (♂?) hamulis 2 brevibus, firmis, distantibus. Pedes longiusculi & crassiusculi, spinuloso-pubescentes, coxis anticis magnis. Alæ ab domine longiores, inermes & absque spinula; nervis fere ut in *Cyrtoneura* aut *Aricia* directis, nervo tamen 3:tio longitudinali nonnihil versus 4:tum subrectum flexo, ut apice longe a 2:do distet. Hinc area media lanceolata, aperta. Nervus 2:dus longitudinalis paullo ante apicem alæ in costa, 3:tius in apice, & 4:tus pone apicem excurrunt. Nervus transversus medius apici nervi auxiliaris oppositus, transversus ordinarius non longe a margine interno, pone medium alæ & paullo ante medium areæ mediæ situs. Nervus secundarius & auxiliaris sejuncti. Squamæ majusculæ. — *Color* ater. *Motu* agilis; pedes anticos singulari modo agitat, unde nomen generis a ζεω, moveo, & χειρ, manus, desumptum.

1. *C. alra*: atræ, nitida, macula frontalí, antennarum basi palpisque testaceis; alis leviter fuscanis, basi subflavidis. ♂? (Long. 1½ lin.).

Wahlb. in litt. 1842.

Hab. in Ostrogothia rarissime; ad Gusum d. 5 Jul. 1838 in unico specimine a D. Prof. *Wahlberg* inventa.

♂? Cum speciem ipse non vidi, observationes circa illam a Cel. Detectore communicatas tradam. *Ocypterae* I. *Tachi-*

*uæ parvæ subsimilis & affinis, sed nervorum directione dignota. Statura fere *Gymnopeza*. Atra, nitida, setosa. Vertex niger, subopacus. Frons supra antennas anguste testacea. Epistoma testaceo-infuscatum, orbitis & genis pallescentibus. Palpi testacei. Antennæ flavo-testaceæ, articulo ultimo atro. Scutellum & auncæ nitidissima. Pedes nigri, exoxis, præsertim posterioribus, testaceo-infuscatis. Pulvilli non magni, albidi. Alæ dilute infuscatae, versus basin subflavidæ. Squamæ albide. Halteres albicantes.*

---

## Fam. 26. ANTHOMYZIDES \*).

### 132. DRYMEIA Meig.

*Corpus mediæ magnitudinis, ovato-oblongum, undique setosum. Antennæ incumbentes, epistomate fere duplo breviores.*

\*) Secundum methodum Meigenianam in Parte 7:ma Dipteror. Europ. genera & species *Anthomyzidum* Scandinaviae ita disponi possunt:

A. Frons maris angustissima.

a.) Seta antennarum plumata.

1. *Aricia*. Oculi hirti. (Abdomen ovatum, setosum. Squamæ sub alis sat magnæ).

\* pedibus nigris (*Aricia* Zett.).

*tardaria* 1. *albolineata* 2. *incana* 3. *lucorum* 4. *plumbea* 5. *annosa* Zett. 6. *nivalis* Z. 7. *obscurata* 8. *dispar* 9. *serva* 10. *veterana* Z. 11. *Morio* Z. 12. *lugubris* 13. *consobrina* Z. 14. *alpicola* Z. 15. *variabilis* 16. *longipes* Z. 17. *atra* 18. *umbratica* 19.

\*\* pedibus plus minus flavis (*Anthomyza* Zett.).  
*errans* 1. *signata* 2. *vagans* 3. *perdita* 4. *scutellata* Z. 5. *spinicosta* Z. 6. *laeta* 7. *magnicornis* Z. 31.

res, angustæ, artieulo ultimo secundo duplo longiore, basi seta dorsali elongata, biarticulata, basi distinete licet breviter, versus apicem microscopice, pubescente. Oculi nudi.

*erratica* 65. *4-notata* 66. *basalis* Z. 67. *pallida* 123.

*Populi* 124. *scutellaris* (Fall. non Meig.) 125. *abdominalis* Staeg. 126. *cincta* Z. 127.

2. *Hylemyia*. Oculi nudi. (Abdomen aut ovatum, aut oblongum aut conicum).

\* pedibus nigris (*Aricia* Zett.).

*vespertina* 20. *nigrinervis* Z. 21. *nigritella* Z. 22. *duplicata* 23. *duplaris* Z. 24. *notata* 25. *carbonella* Z. 26. *ambigua* Fall. (*divisa* Meig.) 27. *sordidiventris* Z. 28. *variata* 29. *lasciva* Z. 30. *flavipennis* Fall. (*crassirostris* Meig.) 31. *grisea* 32. *hilaris* 33. *festiva* Z. 34.

\*\* pedibus ex parte flavis (*Anthomyza* Zett.).

*coaretata* 10. *nigricolor* 11. *fuscipes* Z. 12. *ignobilis* Z. 13. *subtessellata* Z. 14. *immatura* Z. 15. *vittipes* Wahlb. 16. *conica* 18. *dubitata* 19. *strigosa* 20. *operosa* 22. *coronata* Z. 23. *vetula* Z. 25. *brunneifrons* Z. 26. *Quadrum* 27. *anceps* Z. 28. *depuncta* 29. *fuscata* 30. *flavotibiella* Z. 32. *troglodytes* Z. 33. *vilis* Z. 34. *aqualis* 175.

\*\*\* pedibus totis (tarsis nigris exceptis) flavis. (*Anthomyza* Zett.).

*Angelicæ* 8. *tincta* Z. 9. *urbana* 17. *nigrimana* 21. *linogrisea* 24. *pagana* 68. *impuncta* 69. *demigrans* Z. 70. *modesta* 71. *vittifera* Z. 72. *de-trita* Z. 73. *olivacea* Z. 74. *præpotens* 75. *fer-rugineo-vittata* Z. 76. *uliginosa* 128. *gramini-cola* Z. 129. *maculiventris* Z. (an *Anthomyiæ* generis Meig. ?) 131.

Frons parum exserta, serie setarum utrinque ad antennarum basin continuata. Epistoma infra oculos majusculos parum descendens, ore antice reflexo. Vibrissæ nullæ. Se-

b.) Seta antennarum pubescens aut nuda.

3. *Lasiops. Oculi hirti.* (*Ariciæ species Zett.*).

*spinipes* Fall. (*Hydrotæa ciliata* Macq.) 93. *cystoneurina* Z. 94. *occulta* 95. *aculeipes* Z. 96. *subfuscinervis* Z. 97. *turpis* Z. 98. *fulvisquama* Z. 99. *luteisquama* Z. 100. *hirtula* Z. 101. *innocua* Z. 102. *hirsutula* Z. 103. *separ* Z. 104. *subrostrata* Z. 105. *leucogaster* Z. 106. *depressiuscula* Z. 107. *tristiola* Z. 108. *pubipes* Z. 109. *cinereiventris* Z. 110. *semicinerea* (*Hylomyia* Meig.) 111. *glacialis* Wahlb. 131. *innocens* Z. 132. *semipellucida* Z. 133. *depressiventris* Z. 134. *hirticeps* 135. *decolor* 136.

4. *Hydrotæa. Oculi nudi.* Femora antica subtus ad apicem dente aut spina in ♂ armata. (*Ariciæ species Zett.*).

*dentipes* 36. *palæstrica* 37. *bispinosa* Z. 38. *meteoretica* 39. *irritans* 40. *velutina* 41. *curvipes* 42. *scambus* Z. 43. *armipes* 44. *glabricula* 45.

5. *Anthomyia. Oculi nudi.* Pedes inermes.

\* *pedibus nigris* (*Aricia* Zett.).

*leucostoma* 46. *piligera* Z. 47. *fuscinervis* Z. 48. *obscuripennis* Z. 49. *inuncta* Z. 50. *æneiventris* Z. 51. *nigriventris* Bohem. 52. *argyrata* Z. 53. *maculifrons* Z. 54. *lividiventris* Z. 55. *squalens* Z. 56. *cinerea* 57. *brunneilinea* Z. 58. *ignobilis* Z. 59. *pullula* Z. (*Hylemyia longula* Meig. non Fall.) 60. *cinerosa* Z. (*Hylemyia cinerella* Meig. non Fall.) 61. *sulciventris* Z. 62. *verticina* Z. 63. *frontata* Z. 64. *decrepita* Z. 65. *brunnescens* Z. 66. *villipes* Z. 67. *compuncta* Wied. 68. *trigonifera* Z. 69.

tæ mystaciæ plures. Mentum & genæ pilosa. Proboscis exserta, apice geniculata, capitulo longo, simplici, subconico. Palpi cylindrici, pilosuli. Thorax sutura transversa.

- sororcula* Z. 70. *depressula* Z. 71. *didyma* Z. (non Meig.) 72. *brunneisquama* Z. 73. *contractifrons* Z. 74. *fumipennis* Z. 75. *vana* Z. 76. *trianguligeræ* Z. 77. *triangulifera* Z. 78. *trigonata* Z. 79. *7-notata* Z. 80. *vitticollis* Z. 81. *dorsata* Z. 82. *5-lineata* Z. 84. *maculipennis* Z. 85. *surda* Z. (*triangula* Meig.? non Fall.) 86. *4-maculata* (*Hylemyia* Meig.) 87. *borealis* Z. 88. *solitaria* Z. 89. *maculigera* Z. 90. *abbreviata* Z. 91. *buccata* 116. *laminata* Z. 117. *latipennis* Z. (*A. versicolor* Meig.?) 118. *canescens* Z. 119. *scatophagina* Z. 120. *arenosa* Z. 121. *unistriata* Z. 122. *hilarella* Z. 123. *trapezina* Z. 124. *lepturoides* Z. 125. *marginalis* 126. *Histrio* Z. 127. *unilineata* Z. 128. *odonto-gaster* Z. 129. *albescens* Z. (*M. buccata* Fall. ♀. *Hylem. albula* Meig. exclus. syn. Fall.) 130. *silvestris* 137. *Billbergi* Z. 138. *atricauda* Z. 139. *articulata* Z. 140. *anilis* Z. 141. *moerens* Z. 142. *cuneicornis* Z. 143. *murina* Z. 144. *senilis* Z. 145. *brevicornis* Z. 146. *floralis* 147. *sepia* 148. *transversalis* Z. 149. *pictiventris* Z. 150. *fusciceps* Z. 151. *lineariventris* Z. 152. *sepiella* Z. 153. *angustiventris* Z. 154. *ciliatocosta* Z. 155. *spathulata* Z. 156. *striolata* 157. *candens* Z. 158. *dissecta* 159. *platura* 160. *intersecta* 161. *muscaria* 162. *vetula* Z. 163. *Naso* Z. 164. *fusciceps* Z. 165. *obscura* Macq. 166. *trapezoides* 167. *lucidiventris* Z. 168. *florilega* Z. 169. *strigilata* Z. 170. *rotundiventris* Z. 171. *albinervis* Z. 172. *pluvialis* 173. *praticola* 174. *stygia* 175. *subpellucens* Z. 176. *armata* 177. *sociella* Staeg. 178. *longula* Fall. (non Meig.) 179. *antiqua* 180. *arrogans* Z. 181. *melanogaster* Z.

Abdomen 4-annulatum, supra undique setosum, setis tamen in disco segmentorum 1, 2 & 3 minus validis. Segmenta omnia subæque longa. Alæ subdivaricatæ, inermes, nervis

182. *seminitida* Z. 183. *conifrons* Z. 184. *S-guttata* Z. 185. *obtusa* Z. 186. *longicornis* Z. 187. *canicularis* 188. *scalaris* 189. *maunicata* 190. *incisurata* Z. 191. *lugens* Z. 192. *cristata* Z. 193. *mutica* Z. 194. *albipuncta* Z. 195. *Radicum* 196. *riparia* 197. *infirma* 198. *glaucescens* 199. *lacteipennis* Z. 200. *foveolata* Z. 201. *perpendicularis* Z. 202. *veterrima* Z. 203. *barbiventris* Bohem. 204. *triquetra* 205. *Macquarti* Staeg. 206. *Stægeri* Z. (*Atomogaster tibialis* Staeg.) 207. *serena* 208. *lepidula* Fall. (vix Meig.) 209. *lugubrina* Z. 210. *inermella* Z. 211. *latifrons* Wahlb. 212. *stigmatella* Z. 213. *Macula* Z. 214. *parvicornis* Z. 215. *albicincta* 216. *aërea* Fall. (non Meig.) 217. *globuliventris* Z. 218. *parvula* 219. *ærea* 220. *aterrima* 221. *melanaria* Z. 222. *albula* Fall. (non Meig.) 226. *cinerella* Fall. (vix Meig.) 227. *humrella* Z. 228. *mortionella* Z. 229. *frontella* Z. 230. *cordifrons* Z. 231. *mucronatella* Z. 232. *parva* 233. *curvicauda* Wahlb. 234. *remotella* Z. (*Coenosia* generis) 235. *albidella* Z. 236. *confidella* Z. 237. *dissitineris* Z. 238. *longisquama* Z. 239. *pilifera* Z. 240. *alpicola* Z. 241. *atomaria* Z. 242.

\*\*) pedibus ex parte flavis (*Anthomyza* Zett.;

*Anth.* *mutata* pedibus nigris sub n:o 147  
quærenda).

- consimilis* 35. *pertusa* (*Hylemyia* eadem Meig.?)  
36. *fratercula* Z. 37. *binotata* Z. 38. *sororia* Z.  
39. *consors* Z. 40. *protuberans* Z. 41. *lineatipes* Z.  
42. *apicalis* Z. 43. *cineraria* Z. 44. *obscuripes* Z.  
45. *pallipalpis* Z. 46. *Sundewalli* Z. 47. *socia* 48.

omnino nudis & spinula costæ nulla. Nervi longitudinales recti: 3:tius fere in apice & 4:tus pone apicem alæ inserti, unde area media apice late aperta. Nervi transversi: medius

*grandæva* Z. 49. *deserta* Z. 50. *denudata* Z. 51. *socculata* Z. 52. *verticella* Z. 53. *frigida* Z. 54. *rugulosa* Z. 55. *fuscula* 56. *atricolor* 57. *depressiventris* Z. 58. *atritarsis* 59. *tergina* Z. 60. *dorsalis* Z. 61. *hæmorrhoum* Z. 62. *palliceps* Z. 63. *niveipennis* Z. 64. *mutata* (*Ariciæ generis*) 147. *transgressa* Z. 154. *rotundicornis* Z. 156. *stupida* Z. 163. *lurida* Z. 164.

\*\*\* pedibus totis (exceptis tarsis atris) flavis. (*Anthomyza* Zett.).

*conformis* 77. *calceolata* Z. 78. *laticornis* 79. *deprimata* Z. 80. *flavipalpis* Z. 81. *mimula* Z. 82. *maculipes* Z. 83. *lunatifrons* Z. 84. *Salicis* Z. 85. *viduata* Z. (*Musca rufipes* Fall. ♀.) 86. *punctiventris* Z. 87. *pubiseta*. Z. 88. *postica* Z. (an *posticata* Meig. variet.?) 130. *maculiventris* Z. (an *Hylemyiæ generis* Meig.?) 131. *rufipes* 133. *transversa* Z. 134. *capueina* Z. 135. *latitarsis* Staeg. 136. *consobrina* Z. 137. *invisa* Z. 138. *pallicornis* Z. 139. *littoralis* Z. (an *Coenosiaæ generis* Meig.?) 141. *rufina*; 143. *hamata* Macq. 144. *impar* Z. 145. *hians* Z. 146. *flavipes* 148. *flavo-scutellata* Z. 149. *tenera* Z. 150. *zonata* Z. 151. *tuficeps* Z. 153. *guttifrons* Z. 155. *bicolor* (var. a. *bicolor* Meig. var. b. *mitis* Meig.?) 157. *strigipes* Z. 158. *calyptata* Z. 159. *scapularis* Z. 160. *pubipes* Z. 161. *nigritarsis* Z. (vix *A. fulgens* Meig.??) 162. *notabilis* Z. 165. *limbatella* Z. 166. *inanis* 167. *varians* Z. 168. *flaveola* 169. *diaphana* 170. *tunicata* Z. 171. *vittigera* Z. 172. *gilva* Z. 173. *ephippium* Z. 174. *Hyoseyami* 176. *Wintbemi* 177.

perpendicularis, apici nervi longitudinalis 1:mi oppositus; ordinarius modice a medio remotus, paullo pone medium disci, sed nonnihil ante medium areæ insertus, parum obli-

6. *Drymeia*. Oculi nudi; in ♂ cohærentes. Proboscis subexserta: capitulo oblongo.

*hamata* Z. (*Musca* Fall. *Drymeia obscura* Meig.) 1.

7. *Eriphia*. Oculi nudi; in ♂ cohærentes. Os hirsutissimum, Antennæ longitudine dimidii epistomatis. Corpus maris rigide setosum,  
*cinerea*; vix Scandinaviæ incola.

B. Frons in utroque sexu lata,

8. *Coenosia*. Oculi nudi, remoti. Antennæ epistomate breviores. Palpi cylindrici. (*Aricia* & *Anthomyzæ* species Zett.).

\* Antennarum seta plumata.

*obtusipennis* (*Aricia* Z.) 35. *tigrina* (*Anthomyza* Z.) 89. *ciliatocosta* (*Anthom.* Z.) 90. *flavicornis* (*Anthom.* Z.) 91. *Fungorum* (*Anthom.* Z.) 121. *Graminum* (*Anthom.* Z.) 122.

\*\* Antennarum seta pubescens aut nuda.

a. pedibus totis nigris (*Aricia* species Zett.).

*litorea* 83. *triangula* (*Anthom.* Meig.?) 92. *scrupulosa* Z. (*Anth.* *pacifica* Meig.??) not. sub n:o 92. *denticauda* Z. 112. *myopina* (*Coenosiae* & *Cordiluræ* species Meig.) 113. *scoparia* Wahlb. 114. *moriens* Z. 115. *agromyzina* 223. *Trollii* Z. 224. *albitarsis* Z. 225. *remotella* Z. 235.

b. pedibus aut ex parte aut totis flavis (*Anthomyzæ* spec. Zett.; in *Anth.* *pingvicula* n:o 142 pedibus totis brunneis).

*meditata* 92. *exsul* Z. 93. *nana* Z. 94. 6-maculata 95. 6-notata 96. *bilineella* Z. 97. *genicula-*

quus, levissime flexus. Præterea segmenta costæ (Cfr. *Nephrocerus* gen. 100): 1:um circiter 4:tam totius costæ partem attingens; 2:dum 1:mo fere duplo brevius; 3:tiū antecedentibus nonnihil longius; 4:tum 3:tio fere triplo brevius, & 5:tum apicale 4:to iterum nonnihil brevius. Squamæ sat parvæ, subæquales. Halteres nudi. Pedes simplices, spinulosi, tarsis subinermibus. *Color obscurus, subnitidus,*

*ta* 98. *pygmæa* Z. (*pusilla* Staeg.) 99. *verna* 100. *lacteipennis* Z. 101. *intermedia* 102. *biocellata* Z. 103. *trilineella* Z. 104. *means* 105. *albimana* Wahlb. 106. *genarum* Z. 107. *fulvicornis* Z. 108. *flavimana* Z. 109. *8-punctata* Z. 110. *pumila* Fall. Meig. (*Coenos. albicornis* Meig. forsan quoque hic pertinet.) 111. *nigrifemur* Z. (*Coenos. nigrimana* Meig.) 112. *humilis* 113. *pulicaria* Z. 114. *pedella* 115. *decipiens* 116. *tarsella* 117. *de-albata* Z. 118. *metallipennis* Z. 119. *ambulans* Z. 120. *mollicula* Fall. (*Coen. nemoralis* Meig.) 132. *alma* (*spuria* Z. Ius. Lapp.) 140. *littoralis* Z. (forte *Coenosia* generis) 141. *pingvicula* Z. 142. *tricolor* Z. (*Coenos. bicolor* Staeg.) 152.

9. **Lisp e** (*Lispa*). Oculi nudi, remoti. Seta antennarum plumata. Palpi paullo exserti, cochleariformes.  
*tentaculata* 1. *uliginosa* 2. *litorea* 3. *hydromyzina* 4. *pygmæa* 5.

10. **Dialyta**. Oculi nudi, paralleliter remoti. Antennæ longitudine epistomatis, seta nuda.  
*erinacea* 1.

11. **Leptopa** Zett. Oculi nudi, remoti. Antennæ brevissimæ, seta subnuda. Mystaces in lamina. Corpus angustissimum. Pedes graciles.  
*filiformis* Z. 1.

*Motu tarda. Habitatio* in floribus, per hortos, prata & campos. *Differentia sexus*; *mas*: corpore nigricante, crebre setoso, fronte subexserta, oculis cohærentibus, linea tantum anguste remotis, serie setarum frontalium utrinque simplici, crebra, ano subtus bi-appendiculato, abdomine oblongo, apice obtuso, alis subfuscans, tarsorum unguibus nigris, anticis rectis, pulvillis omnibus rotundatis albis, parvis; *femina*: corpore cinerascente, parcus setoso, fronte minus exserta, oculis distantibus, vitta lata atra remotis, serie setarum frontalium utrinque postice subduplici, parca, abdomine ovato, apice acuto, ano mutico, alis subhyalinis, tarsorum unguibus curvis nigris pulvillisque rotundatis albis, minutis.

1. *D. hamata*: nigra ♂, aut cinerascens ♀, capite glaucescente l. albicante; abdominis vitta dorsali atra. ♂♀. (Long. circiter  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas* & *femina* ut in descriptione generis indicatum differunt.

*Musca hamata* Fall. Muscid. 1823. p. 61. 57. ♂♀.

*Drymeia obscura* Meig. Dipt. 1826. 5. 201. 1. ♂♀. T. 41. f. 14. ♂. 15. ♀. — Macq. Buff. 2. 322. 1. ♂♀. T. 17. f. 9. caput.

Hab. in floribus præsertim Compositarum, ut Chrysanthemi, Achilleæ, Hieracii &c., sed etiam Ranunculorum &c., per hortos, prata, campos etiam silvas, Scandinaviæ meridionalis & mediæ, 12 Jul.—28 Sept. passim frequens, in copuli multoties capta; versus autumnum imprimis vigens; scilicet in Scania ubique vulgatissima; in Blekingia, Smolandia, Calmaria, Westrogothia (ad Gotthoburgum), Ostrogothia (ad Wadstena &c.) & Nericia etiam vulgaris; in Gotlandia ad Martebo, Nähr &c. haud rara; in Dalecarlia ad diversorium Uppbo (2 Sept. 1840) passim; in Helsingia ad Kårböle rarius; sed longius ver-

sus septentrionem mihi non obvia, nec in Lapponia visa; at in Norvegia ex. gr. ad Næs Værdalæ haud parce inveni; in Dania ad Hafniam a D. *Dahlbom* frequenter lecta. (Ad Elisenheyne prope Gryphiam a D. *Dahlbom* quoque capta).

♂♀. Proboscide exserta hamata ab omnibus Anthomyzidibus facile dignota. Variat paullo magnitudine. Mas semper nigror. Caput glaucum, palpis & proboscide nigris. Oculi obscure ferruginei. Antennæ nigræ. Linea frontalis angusta in ♂, & vitta lata in ♀, atræ. Abdominis vitta dorsalis in ♂ perspicua, in ♀ plerumque obsoleta. Squamæ sub alis albidæ. Halteres nigri. Pedes nigri. Reliqua ut in diagnosi.

*Obs.* Nomen Fallenianum jam 1823 impositum, ut antiquius & characteristicum reduxi.

---

### 133. DIALYTA Meig.

*Corpus mediæ magnitudinis, subcylindricum, undique setosum. Antennæ incumbentes, longitudine epistomatis, modice latæ, l. potius angustatæ, compressæ, articulo ultimo 2:do quadruplo longiore, apice intus rotundato, basi seta dorsali elongata, biarticulata, subnuda l. tantum microscopice puberula, basi incrassata. Oculi oblongi, mediocres, nudi, in utroque sexu distantes. Frons exserta, lata, vitta lata, utrinque serie setarum validarum ad antennarum basin continuata. Epistoma longum, declivum, infra oculos parum descendens, ore non reflexo; nudum. Vibrissæ nullæ. Seta mystacina utrinque unica valida. Sub ore setæ plures tenues. Palpi cylindrici. Thorax sutura transversa. Abdominis 4-annulati segmenta æque longa, basalia subinermia, apicalia setosa. Alæ subdivaricatae inermes h. e. nervis omnino nu-*

dis, sed costa basi ciliata & spinula costæ distincta. Nervi ut in *Drymeia* directi, sed transversus ordinarius exacte rectus. Squamæ minores, valvulis inæqualibus. Halteres nudi. Pedes ut in genere priori. *Color nigricans*, nitidus. *Motu agilis*. *Habitatio* in pratis uliginosis. *Differentia sexus*: *mas*: oculis sat late distantibus, abdomine subcylindrico, ano obtuso, alis costa a basi ad spinulam breviter serrata; *femina*: oculis adhuc latius distantibus, abdomine ovato-oblongo, apice subacuto, alis costa a basi ad spinulam longe serrata.

1. *D. erinacea*: nigricans, subnitida, capite argenteo-micante; antennis, palpis pedibusque nigris; alis albido-cinereis, nervo transverso ordinario infuscato, squamis albis. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas* & *femina* ut in descriptione generis differunt.

Meig. Dipt. 5. 208. 1. ♂♀. T. 41. f. 23. ♂. 24 & 25 ♀. — *Musca* Fall. Muscid. 65. 61. ♀. (erit ♂). *Anthomyza angulicornis* Zett. Ins. Lapp. 681. 89. ♂.

Hab. in paludosis Scandinaviae meridionalis & mediæ, tempore verno, rarius; scilicet in Scania ad villam Abuissa prope Lund die 30 Maj. 1816 in palude plura specimina detegit D. Prof. B. Fries; deinde ibi frustra pervestigata; in Smolandia, ♀ a D. Boheman, & ad Skärssjö a D. Ljungb capta; in alpib. Dalecarlicis etiam D. Boheman; in Dania ad Hafniam, D. Staeger; in Lapponia Umensi ad Åsele die 27 Jul. 1832, ipse. (E Finlandia a D. Sahlberg missa).

♂♀. Statura *Tachinæ*. Caput argenteum, vitta frontali nigra. Thorax niger, leviter cinereo-pollinosus, lineis 2 nigris obsoletis. Scutellum concolor. Abdomen in ♂ nigricans, in ♀ nigrum. Alæ albido-cinereæ, in ♀ præsertim latæ; basi

flavidæ. Squamæ albæ. Halteres nigri. Pedes nigri, spinulosi. Tibiæ apice 5-calcaratæ. Tarsi inermes. Ungues pulvillique ut in *Drymeia*, at unguis omnes curvati.

---

## 134. ARICIA Macq.

*Corpus* majoris, plerumque mediae, raro minoris magnitudinis; ovatum, setosum. Antennæ incumbentes, epistomate paullo breviores, modice latæ l. subangustatæ, compressæ, articulo ultimo 2:do duplo aut triplo longiore, basi seta dorsali biarticulata, longe plumata, aut pubescente, aut nuda. Oculi hirti, aut nudi; unicolores; in ♂ plerumque approximati. Frons plus minus prominula; series setarum ad antennarum basin continuata. Epistoma subperpendiculare, infra oculos nonnihil descendens, ore leviter reflexo; nudum. Vibrissæ nullæ aut spuriæ. Setæ mystacinæ plures, validæ. Genæ, & os subtus, pilosa. Palpi cylindrici, pilosi. Thorax sutura transversa. Abdomen 4-annulatum, ovatum, segmentis: 1:mo brevinsculo, inermi, 2:do & 3:to margine apicali subsetulosis, 4:to toto parce setoso. Alæ subdivaricatæ, ab domine paullo longiores, inermes, nervis ut in *Drymeia* directis. Nervus transversus ordinarius aut flexus, aut rectus. Spinula costæ aut abest, aut adest. Squamæ mediores, valvula inferiore superiore plerumque duplo majore, utraque breviter ciliata. Halteres nudi, Pedes pilosi & spinulosi, raro dentati; tarsis semper inermibus. Color obscurus, nigricans. Antennæ, palpi & pedes (in *A. manicata* (190) & *Staegeeri* (207) tibiæ anticæ testaceæ) semper tota nigra. Motu subagilis; volatus minus rapidus quam in *Tachinariis* & *Muscariiis*. Habitatio in floribus, foliis fruticum &c.; stercoreata certæ species non responentes. Differentia sexus: mas: oculis plus minus coherentibus; unguibus pulvillisque majusculis; femina: oculis late remotis; unguibus pulvillisque minoribus. Typus generis *A. lardaria* n:o 1.

## Index specierum cum subdivisionibus:

*Divis. Prima.* Seta antennarum plumata (in *A. dispure* n:o 9, *consobrina* 14, *nigrinervi* 21, *nigritella* 22, *notata* 25, *carbonella* 26 & *festiva* 34, seta tautum breviter plumata).

*Phalanx 1:mo.* Oculi hirti (in ♀ ♀ interdum subnudi, ut ex. gr. in *A. Lucorum* 4, *dispire* 9, *variabilis* 16, *longipede* 17, *atra* 18 & *umbratica* 19).

A. Squamæ sub alis albæ. Nervus transversus ordinarius inflexus.

**1 lardaria** Fabr. ♂♀. **2 alboleuata** Fall. ♂♀.

B. Squamæ sub alis aut totæ, aut saltem margine, flavescentes (in *A. dispure* 9, *lugubri* 13, *consobrina* 14, & *alpiola* 15, squamæ fere totæ albidae).

a.) Nervus transversus ordinarius inflexus.

**3 incana** Wied. (*nemorum* Fall.) ♂♀. **4 Lucorum** Fall. ♂♀ **5 plumbea** Meig.? ♂♀. **6 annosa** Zett. ♀. **7 nivalis** Zett. ♂ (♀). **8 obscurata** Meig. (*A. Sahlbergi* Zett.) ♂♀. **9 dispar** Fall. (*Spilogaster eadem* Macq.) ♂♀.

b.) Nervus transversus ordinarius rectus, l. subrectus.

**10 serva** Meig. ♂♀. **11 veterana** Zett. (*basalis* ejusdem var. ♂) ♂♀. **12 Morio** Zett. ♂♀. **13 lugubris** Meig.? ♂. **14 consobrina** Zett. ♂. **15 alpicola** Zett. ♂♀. **16 variabilis** Fall. (*Hydrophoria eadem* Macq.) ♂♀. **17 longipes** Zett. ♂♀. **18 atra** Fall. ♂♀. **19 umbratica** Meig. ♂♀.

*Phalanx 2:du.* Oculi nudi (in ♂ *A. nigritella* 22, oculi omnium tenuissime puberuli. Feminae *A. disparis*

9, *variabilis* 16, *longipedis* 17, *atrae* 18, & *umbraticæ* 19, oculis nudis aut subnudis, in Phalange 1:ma quærendæ).

*Sect. Prima.* Oculi in ♂ cohærentes aut saltem appropinquantes.

A. Squamæ sub alis mediocre: valvula superiore inferiorem non tegente.

\*). Alarum nervus transvers. ordinarius rectus (in *A. duplari* 24 leviter flexus).

20 *vespertina* Fall. ♂♀. 21 *nigrinervis* Zett. ♂♀. 22 *nigritella* Zett. ♂♀. 23 *duplicata* Meig. (*Spilogaster ead.* Macq.) ♂♀. 24 *duplaris* Zett. ♂♀. 25 *notata* Fall. (*Spilogaster ead.* Macq.) ♂♀. 26 *carbonella* Zett. ♂.

\*\*). Alarum nervus transv. ordinarius inflexus (*A. duplaris* nervo eodem tantum leviter flexo supra sub n:o 24 invenienda).

27 *ambigua* Fall. (*Anth. divisa* Meig. *Anth. lineatocolpis* Zett. Ins. Lapp.) ♂. 28 *sordidiventris* Zett. ♂♀.

B. Squamæ sub alis parvæ: valvula superiore inferiorem tegente. Antennarum seta longe plumata (in *A. festiva* 34 breviter plumata). *Hylemyia* Macq. Meig.

†. Nervus transvers. ordinarius rectus (in *A. variata* 29, leviter flexus). Tibiae posticæ spinosæ.

29 *variata* Fall. ♂♀. 30 *lasciva* Zett. ♂♀. 31 *flavipeennis* Fall. (*Anth. crassirostris* Meig.) ♂♀. 32 *grisea* Fall. ♂♀.

††. Nervus transv. ordinarius inflexus. Tibiae præsertim posticæ fortiter spinosæ.

33 *hilaris* Fall. ♂♀. 34 *festiva* Zett. ♀.

*Sect. Secunda.* Oculi in utroque sexu distantes.  
*Coenosia* Meig.

35 *obtusipennis* Fall. ♂♀.

*Divis. Secunda.* Seta antennarum pubescentia (in *A. armipede* 44, *glabricula* 45, *leucostomate* 46, *com-puncta* 68, *didyma* 72, *contractifronte* 74, *trianguligera* 77, *triangulifera* 78, *trigonata* 79, *boreali* 88, & *tri-angula* 92, seta nuda. — In *A. verticina* 63, *frontata* 64, *4-maculata* 87, & *semicinerea* 111, seta subplumata. — *Aricia parvula* seta pubescente in Divis. Tertia sub n:o 219 inter suas affines quærenda).

*Tribus 1:ma.* Oculi in utroque sexu nudi (in ♂ *Ar. irritantis* 40 var. b., & ♀ *aeneiventris* 51 var. b., oculi tenuissime hirtuli).

A. Femora antica subtus in ♂ uni- l. bi-dentata.

*Hydrotœa* Maeq. Meig.

a.) Nervus longitudinalis 4:tus versus apicem le-  
vissime curvatus. Frons supra antennas pun-  
cto niveo.

36 *dentipes* Fabr. ♂♀. 37 *palæstrica* Meig. ♂. 38 *bispino-  
sa* Zett. ♂ (♀).

b.) Nervus longitudinalis 4:tus rectus. Nervi  
longitudinales 3 & 4 paralleli.

\*). *Mas*: femoribus anticis subtus bidentatis.

39 *meteorica* Linn. ♂♀. 40 *irritans* Fall. ♂♀.

\*\*). *Mas*: femoribus anticis subtus unidentatis;  
oculis arte cohærentibus.

41 *velutina* Rob. Desv. ♂. 42 *curvipes* Fall. ♂. 43 *scam-*

*bus* Zett. ♂ (♀). 44 *armipes* Fall. ♂♀. 45 *glabericula* Fall. ♂♀.

B. Femora antica in utroque sexu mutica. *Anthomyia* Meig.

*Subdiv. 1:ma:* abdomine aut nigro aut cinereo; subimmaculato aut linea tantum dorsali plus minus dilatata l. sinuata, instructo, sed nullis maculis discretis ornato.

†. Nervus transversus ordinarius rectus aut subrectus.

46 *leucostoma* Wied. (*Ophyra ead.* Macq.) ♂♀. 47 *piligeria* Zett. ♂. 48 *fuscinervis* Zett. (etiam *A. lanceolata* Zett. Ins. Lapp.) ♀. 49 *obscuripennis* Zett. ♂. 50 *inuncta* Zett. ♀. 51 *aeneiventris* Zett. ♀ (♂). 52 *nigriventris* Bohem. ♀. 53 *argyrata* Zett. (*argyrocephala* Zett. Ins. Lapp. non Meig.) ♂. 54 *maculifrons* Zett. ♂. 55 *lividiventris* Zett. ♂. 56 *squalens* Zett. ♀. 57 *cinerea* Fall. (*Musca flavicans* Panz. ♀. *M. floralis* Fall. ♀. var.) ♂♀. 58 *brunneilinea* Zett. ♂. 59 *ignobilis* Zett. ♂ (♀). 60 *pullula* Zett. (*Anth. longula* Meig. Dipt. 5., non Fall. — *Hylemyia eadem* Meig. Dipt. 7. & Macq.) ♂♀. 61 *cinerosa* Zett. (*Anth. cinerella* Meig.? non Fall. — *Hylemyia ciuerella* Meig.?) ♂♀. 62 *sulciventris* Zett. ♂.

††. Nervus transvers. ordinarius inflexus.

63 *verticina* Zett. ♀. 64 *frontata* Zett. ♂♀. 65 *decrepita* Zett. ♂. 66 *brunnescens* Zett. (*Musc. floralis* β. Fall.) ♂. 67 *villipes* Zett. ♂.

*Subdiv. 2:da:* abdomine cinereo, maculis determinatis, discretis, plerumque trigonis, nigris.\* *Limnophora* Macq.

---

\*) Propter picturam abdominis nigro-maculatam l. nigropunctatam per totam Subdivisionem subsimilem, quæ nota

*Turma 1:ma.* Alarum nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem alae leviter divergentes; hinc area media apice paullum latior quam medio.

*a.* Nervus transversus ordinarius sat procul ante medium areæ insertus.

\* Alarum costa subnuda seu inermi & spinula minuta l. nulla.

†. Antennæ breviuscule h. e. epistomate multo breviores, articulo ultimo 2:do circiter duplo tantum longiore.

68 *compuncta* Wied.? (non Fall.) ♂♀. 69 *trigonifera* Zett. ♂. 70 *Sororella* Zett. (*sororia* olim) ♂♀. 71 *depressula* Zett. ♂. 72 *didyma* Zett. (non Meig.) ♂♀. 73 *brunneisquama* Zett. ♂♀. 74 *contractifrons* Zett. (*Anth. arctica* Ins. Lapp. var.). ♂♀. 75 *fumipennis* Zett. ♂. 76 *vana* Zett. ♂♀. 77 *trianguligera* Zett. ♂♀. 78 *triangulifera* Zett. ♂♀. 79 *trigonata* Zett. ♂. 80 *7-notata* Zett. ♂♀. 81 *vitticollis* Zett. ♀. 82 *dorsata* Zett. ♀.

††. Antennæ longiuscule h. e. epistomate paullo tantum breviores, articulo ultimo 2:do sere triplo longiore.

83 *litorea* Fall. (*Coenosia ead.* Meig.?) ♂♀. 84 5-linea-

affinitatem quandam majorem prodere videtur & viam faciliorem species sub hac subdivisione militantes etiam examinandi sine dubio præbet, illas quoque, quæ antennarum seta nudiuseula l. nuda & abdome 4- l. 6-maculato gaudent, ut ex. gr. *Ar. compunctam* 68, *didymam* 72, *contractifrontem* 74, *trianguligeram* 77, *trianguliferam* 78, *trigonatan* 79, *borealem* 88, ♀ *triangulam* 92, ad hanc Subdivisionem retuli. Maculæ vero obseuræ in abdominis fundo nigro, nitido *Ar. 5-linetae* 84, band sunt conspicienda.

*ta* Zett. ♀. 85 *maculipennis* Zett. ♂♀. 86 *surda* Zett. (vix *Anth. triangula* Meig.) ♂.

\*\* Alarum costa subciliata & spinula distineta (*Ar. maculipennis*: costa subciliata & spinula parva, sub n:o 85 querenda). Antennæ longiusculæ.

87 4-*maculata* Fall. (*Hylemyia* Meig. *Musc. cornuta* Fabr.) ♂♀. 88 *borealis* Zett. ♂. 89 *solitaria* Zett. ♂.

β. Nervus transversus ordinarius sere in medio l. mox ante medium areæ insertus. Costa subnuda; spinula minuta.

90 *maculigera* Zett. ♀. 91 *abbreviata* Zett. ♂♀.

*Turma 2:da.* Alarum nervi longitudinales 3 & 4 paralleli; hinc area media apice & medio æque lata. Oculi in utroque sexu remoti.

92 *triangula* Fall. ♂♀. 92 b. in *Not.: scrupulosa* Zett. (vix *Anthom. pacifica* Meig.??) ♀.

*Tribus 2:da.* Oculi saltem in ♂ hirti (in ♀ plerumque nudi). *Lasiops* Meig. (*Ar. irritantis* var. b. ♂, & *Ar. œneiventris* var. b. ♀, oculis tenuissime hirtis, sub n:ris 40 & 51 inveniendæ).

A. abdomine in utroque sexu nigro aut cinereo.

a.) pedibus in ♂ dentatis aut aculeatis. Oculi (♂) cohærentes. *Hydrotæa* M eq.

93 *spinipes* Fall. (*Musca ciliata* Fabr.) ♂♀. 94 *cyrtoneurina* Zett. ♂. 95 *occulta* Meig. ♂♀. 96 *aculeipes* Zett. ♂♀.

b.) pedibus in utroque sexu inermibus.

\*). Alarum nervus transversus ordinarius inflexus. Frons prominens.

**97** *subfuscinervis* Zett. (*Anth. vicina* Z. Ins. Lapp. ♀♂. 98 *turpis* Zett. (*Anth. inconspicua* Ins. Lapp. ♂♂. 99 *fulvisquama* Zett. ♂♀. 100 *luteisquama* Zett. ♂.

\*\*). Alarum nervus transversus ordinarius rectus l. subrectus. Frons haud prominens. Oculi maris cohærentes.

†. Abdomen in mare subconicum.

**101** *hirtula* Zett. ♂. **102** *innocua* Zett. ♂♀. **103** *hirsutula* Zett. ♂♀. **104** *separ* Zett. ♂♀. **105** *subrostrata* Zett. ♂♀.

††. Abdomen in mare ovatum, subdepressum.

**106** *leucogaster* Zett. ♂. **107** *depressiuscula* Zett. ♂♀. **108** *tristiola* Zett. ♂♀. **109** *pubipes* Zett. ♂. **110** *cine-reiventris* Zett. ♂.

B. abdomine in utroque sexu flavo.

**111** *semicinerea* Wied. (*Hydrophoria* Macq. *Hylemyia* Meig. *Musca hyalinata* Fall.) ♂♀.

*Divis. Tertia.* Seta antennarum nudiuscula aut nuda (in *Ar. buccata* 116, *latipenni* 118, *canescente* 119, *unistriata* 122, *trapezina* 124, *Histrione* 127, *uni-lineata* 128, *odontogastere* 129, *albescente* 130, *silvestri* 137, *articulata* 140, *florali* 147, *angustiventri* 151, *ciliato-costa* 155, *striolata* 157, *caudente* 158, *fuscincipite* 165, *obscura* 166, *longula* 179, *antiqua* 180, *parvula* 219, *humarella* 228, *remotella* 235 & *albidella* 236, seta breviter puberula).

*Phalanx 4:ma.* Corpus saltem maris subcylindricum (*Ar. silvestris* 137, *sepia* 148, *parvula* 219, &c., abdo-

mine maris subcylindrico, in Phalange 2:da quærendæ). Caput internum subinflatum. Frons porrecta. Oculi nudi. Species mediocrem magnæ. Plures parasitæ (cfr. ex. gr. *A. albescens* n:o 130).

A. Alarum nervus transversus ordinarius rectus.

\*) Oculi in utroque sexu distantes. *Coenosia* Meig.

**112** *denticauda* Zett. ♂♀. **113** *myopina* Fall. (*Myopina reflexa* Macq.) ♂♀. **114** *scoparia* Wahlb. ♂ (♀). **115** *moriens* Zett. ♂♀.

\*\*). Oculi in mare approximati aut cohærentes.

Squamæ sub alis parvæ, valvulis subæqualibus h. e. superiore inferiorem tegente (in *Ar. transversali* 119 valvula superiore inferiorem vix tegente).

a. Alæ immaculatæ.

†. nervis longitudinalibus 3 & 4 parallelis.

**116** *buccata* Fall. (*Anthomyia* Meig. *Liwnophora* Macq.) ♂♀. **117** *laminata* Zett. ♂. **118** *latipennis* Zett. ♂♀. **119** *canescens* Zett. (*pallipennis* Ins. Lapp. ♀ var.) ♀. **120** *scatophagina* Zett. ♂♀. **121** *areuosa* Zett. ♂♀. **122** *unistriata* Zett. ♂. **123** *hilarella* Zett. ♀.

††. nervis longitudinalibus 3 & 4 versus apicem levissime divergentibus.

**124** *trapezina* Zett. ♂♀. **125** *lepturoides* Zett. ♂.

b. Alæ nervis transversis fuscedine cinctis.

**126** *marginalis* Fall. ♂♀.

B. Alarum nervus transversus ordinarius inflexus.

Costa inermis.

$\alpha$ ). Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes.

127 *Histrio* Zett. ♂♀. 128 *unilineata* Zett. ♂♀. 129 *odontogaster* Zett. ♂♀.

$\beta$ ). Nervi longitudinales 3 & 4 parallelis.

130 *albescens* Zett. (*Musca buccata* Fall. ♀. *Anthom. albula* Meig., non Fall. *Hylemyia albula* Meig.) ♂♀.

*Phalanx* 2:da. Corpus ovatum aut oblongum (in *Ar. silvestri* 137, *sepia* 148, *sepiella* 153, *longula* 179, *conifronte* 181, *barbiventri* 204, *parvula* 219, *agromyzina* 223, *Trollii* 224, *abitarsi* 225, *cinerella* 227, *curvicauda* 234 & *remotella* 235, abdomen maris angustatum subcylindricum; in *Ar. brevicorni* 146, *florali* 147, *transversali* 149, *pictiventri* 150, *flavicipite* 151, *lineariventri* 152, *angustiventri* 154, *striolata* 157, *candente* 158, *dissecta* 159, *platura* 160, *intersecta* 161, *muscaria* 162, *obscura* 166, *trapezoides* 167, *florilega* 169, *antiqua* 180, 8-guttata 185, *infirma* 198, *lepidia* 209, *stigmatella* 213, *humerella* 228, *morionella* 229, *frontella* 230, *parva* 233, *atomaria* 242, abdomen maris lineare, subdepressum \*).

A. Oculi saltem maris hirti (in ♀ *decoloris* 136, nudi; *Ar. cristata* illæsa individua mascula oculis tenuissime puberulis instrueta sub no 193 quærenda). Seta antennarum elongata, nuda, basi incrassata. Alarum nervi longitudinales 3 & 4 subparallelis aut versus apicem levissime divergentes. Costa nuda & spinula nulla. Squamæ mediocreis, valvula superio-

---

\* propter affinitatem cum ceteris has species in hanc Phalan-  
gem amandavi.

re inferiorem (saltem in ♀) non tegente. Pedes simplices. *Lasiops* Meig.

- 131** *glacialis* Zett. (*hirticeps* Ins. Lapp.) ♂♀. **132** *innocens* Zett. ♂. **133** *semipellucida* Zett. ♂. **134** *depressiventris* Zett. ♂. **135** *hirticeps* Fall. ♀. **136** *decolor* Fall. ♀.

B. Oculi in utroque sexu nudi (*Ar. decolor* ♀, oculis nudis, in subdivisione A. sub 2:do 136 invenienda. In mare Ar. cristatae 193, oculi tenuissime puberuli).

**Tribus 1.** Majores, aut mediæ, aut minores.

**Manipulus 1:mus.** Squamæ sub alis parvæ: valvula superiore inferiorem tegente (*Ar. Rudiculum* 196, *riparia* 197, *infirma* 198, *glaucescens* 199, *lacteipennis* 200, *foveolata* 201, *perpendicularis* 202, *veterrima* 203, & aliquot antecedentium, valvula superiore inferiorem vix aut non tegente in Manipulo 2:do quærendæ).

\*) Nervus transvers. ordinarius rectus aut subrectus (in *A. silvestri* 137, & *florali* 147, interdum leviter subflexus).

α. Nervi longitudinal. 3 & 4 versus apicem leviter aut levissime divergentes (in *A. atricunda* 139, *articulata* 140, *cuneicorni* 143, *brericorni* 146, *florali* 147, *sepia* 148, *pictiventri* 150, & *lineuriventri* 152, subparalleli).

- 137** *silvestris* Fall. ♂♀. **138** *Bilbergi* Zett. (*Cæthiops* ♂ Ins. Lapp.) ♂♀. **139** *atricunda* Zett. ♂. **140** *articulata* Zett. ♀. **141** *aulis* Zett. ♀. **142** *maerens* Zett. ♂♀. **143** *cuneicornis* Zett. ♀. **144** *murina* Zett. ♂. **145** *senilis* Zett. ♀. **146** *brevicornis* Zett. ♂♀. **147** *floralis* Fall. ♂♀. **148** *sepia* Meig. (*Chortophila* vad. Macq.) ♂♀. **149**

*transversalis* Zett. ♂. 150 *pictiventris* Zett. ♂. 151 *flaviceps* Zett. ♂. 152 *lineariventris* Zett. ♂ (♀). 153 *sepiella* Zett. ♂. 154 *angustiventris* Zett. ♂. 155 *ciliatocosta* Zett. ♀.

β. Nervi longitudinali 3 & 4 paralleli (huc quoque referuntur *Ar. atricauda* & reliquæ ut exceptiones in subdivisione *a.* allatæ species).

†.) Squamæ sub alis in mare nigrantes.

156 *spathulata* Zett. ♂♀.

††.) Squamæ sub alis in utroque sexu albæ, raro flavidæ.

*Decas 1:ma.* Alarum costa nuda aut nudiuscula (interdum imma basi ciliata).

157 *striolata* Fall. ♂♀. 158 *candens* Zett. ♂♀. 159 *dissecta* Meig. (*Chortophila* Macq.) ♂♀. 160 *platura* Meig. ♂♀. 161 *intersecta* Meig. ♂. 162 *muscaria* Fabr. ♂♀. 163 *vetula* Zett. ♀. 164 *Naso* Zett. ♂. 165 *fusciceps* Zett. ♂. 166 *obscura* Macq. ♂. 167 *trapezoides* Zett. ♂. 168 *lucidiventris* Zett. ♀. 169 *florilega* Zett. ♂. 170 *strigilata* Zett. ♀. 171 *rotundiventris* Zett. ♂. 172 *albinervis* Zett. ♀. 173 *pluvialis* Linn. ♂♀. 174 *praticola* Panz. ♂♀. 175 *stygia* Meig. (*Ophyra* ead. Macq.) ♀. 176 *subpellucens* Zett. ♂♀. 177 *armata* Meig. ♂♀. 178 *sociella* Staeg. ♂♀.

*Decas 2:da.* Alarum costa plus minus ciliata; spinula saepius distincta.

‡. Nervi transversi fuscedine cincti.

179 *longula* Fall. (non Meig.) ♂♀.

††. Nervi transversi fuscedine non cincti.

**180 antiqua** Meig. ♂♀. **181 arrogans** Zett. ♀. **182 melanogaster** Zett. ♀. **183 seminitida** Zett. ♀.

\*\*) Nervus transvers. ordinarius plus minus distincte inflexus.

**184 conifrons** Zett. ♂♀. **185 8-guttata** Zett. ♂. **186 obtusa** Zett. ♂.

*Manipulus 2:dus.* Squame sub alis mediocres l. parvæ: valvula superiore inferiorem haud tegente (in *A. barbiventri* 201 valvula superiore inferiorem fere totam tegente).

\* Nervi: transversi fuscedine cincti; longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; costa subciliata. Magna.

**187 longicornis** Zett. ♂♀.

\*\* Nervi transversi fuscedine non cincti. Minores aut parvæ.

a.) Abdomen basi flavo-subpellucidum. (*Musca mutata* Fall. abdome rufo, pedibus nigris, in *Anthomyzæ* genere sub n:o 147 exstat).

**188 cauicularis** Linn. ♂♀.

b.) Abdomen totum cinereum aut nigrum.

†. Venter in utroque sexu nudus aut nudiusculus.

α. Nervi longitudinales 3 & 1 parallelī.

*Pugillus* 1. Nervus transvers. ordinarius leviter inflexus. Frons & os non prominentia. Antennæ longiusculæ. Alarum costa nuda aut subnuda. (*Ar. armata* 177 speciebus huic Pugillo subjectis valde affinis). Oblongæ.

- 189 *scalaris* Fabr. ♂♀. 190 *manicata* Meig. (*Anth. armillata* Zett. Ins. Lapp. ♀) ♂♀. 191 *incisurata* Zett. (*A. impura* Ins. Lapp. ♀) ♂♀. 192 *lugens* Zett. ♂. 193 *cristata* Zett. ♂. 194 *mutica* Zett. ♂♀. 195 *albipuncta* Zett. ♂♀.

*Pugillus* 2. *Nervus transversus ordinarius rectus.* Pedes in utroque sexu simplices. *Squamæ sub alis mediocreis, valvulis inæqualibus.*

- 196 *Radicum* Linn. (*Anth. Brassicæ* Wied.) ♂♀. 197 *ripuria* Fall. ♂♀. 198 *infirma* Meig.? ♂. 199 *glancescens* Zett. ♀. (♂?). 200 *lacteipennis* Zett. ♀.

β. *Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes.*

- 201 *foveolata* Zett. ♂. 202 *perpendicularis* Zett. ♂♀. 203 *veterima* Zett. ♀.

††. Venter in mare fasciculatim longe pilosus

- 204 *barbiventris* Bohem. ♂. (*A. lucidiventris* 168 an hujus semina?).

*Tribus* 2. Minutæ, aut minutissimæ.

*Subdiv. 1:ma.* Frons non prominens. Antennæ mediocreis (in *A. agromyzina* 223, longissimæ, in *Macquarti* 206, & *Staegeri* 207, longiusculæ).

a. Oculi in mare cohærentes, in semina distantes.

\*). *Squamæ sub alis halteresque in utroque sexu albida* (in *triquetra* 205, *Macquarti* 206, & *Staegeri* 207, *squamæ brunnescentes*).

*Manipulus 1:mus.* Alarum costa nuda.

*Pugillus* 1. *Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.*

$\alpha$ . Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem tegente, l. subtegente.

- 205 *triquetra* Wied. ♂♀. 206 *Macquarti* Staeg. (*Atomogaster triquetra* Macq.) ♂♀. 207 *Staegeri* Zett. (*Atomogaster tibialis* Staeg. sed non Macq. & Meig. eadem. — Sub *Musca triquetra* Fall. & Meig. latet) ♂. 208 *serena* Fall. ♂♀. 209 *levida* Fall. (vix Meig.) ♂♀. 210 *lugubrina* Zett. ♂♀. 211 *inermella* Zett. ♀. 212 *latifrons* Wahlb. ♀. 213 *stigmatella* Zett. ♂. 214 *Macula* Zett. ♀. 215 *parvicornis* Zett. ♀.

$\beta$ . Squamæ mediocres l. parvæ: valvula superiore inferiorem non tegente.

- 216 *albicincta* Fall. ♂♀.

*Pugillus* 2. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes.

- 217 *aërea* Fall. (non Meig.) ♂♀. 218 *globuliventris* Zett. (an *Coenos. nigra* Meig.?) ♀.

*Manipulus* 2:dus. Alarum costa breviter ciliata.

- 219 *parvula* Fall. ♂♀.

\*\*). Squamæ sub alis halteresque in mare saltem nigricantia, illæ sœpissime, hi interdum in femina, albida.

- 220 *aërea* Meig. (*Musca aërea* variet. Fall.) ♂♀. 221 *aterrima* Meig. (*Chortophila* Macq.) ♂♀. 222 *melanaria* Zett. ♀.

b. Oculi in utroque sexu remoti. *Coenosia* Auctorum. (*A. remotella*, oculis in ♂ remotis, sub n:o 235 invenienda. — An *A. globuli-*

*ventris* 218, cuius ♂ mihi latet, hue quoque referenda?).

223 *agromyzina* Fall. ♂♀. 224 *Trollii* Zett. (*Musca serena* β. ♀. Fall.) ♂♀. 225 *albitarsis* Zett. ♂♀.

*Subdiv. 2:da.* Frons plus minus prominens. Squamæ sub alis valvulis subæqualibus (in *A. mucronatella* 232 & *longisquama* 239, valvula superiore minore inferiorem non tegente).

a. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

\* Costa alarum nuda.

226 *albula* Fall. (non Meig.) ♂♀. 227 *cinerella* Fall. (vix Meig.) ♂♀. 228 *humrella* Zett. (*Musc. cinerella* β. Fall.) ♂♀. 229 *morianella* Zett. ♂. 230 *frontella* Zett. ♂♀. 231 *cordifrons* Zett. ♀. 232 *mucronatella* Zett. ♀. 233 *parva* Macq. ♂♀.

\*\* Costa alarum ciliata.

234 *curvicauda* Wahlb. ♂♀. 235 *remotella* Zett. ♂♀. 236 *albidella* Zett. ♂♀. 237 *confidella* Zett. ♀. 238 *disil inervis* Zett. ♀. 239 *longisquama* Zett. ♀.

b. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem subdivergentes. Costa subnuda. Squamæ albæ.

240 *pilifera* Zett. ♂. 241 *alpica* Zett. ♂♀. 242 *atomaria* Zett. ♂♀.

### *Aricia.*

*Divis. Prima.* Seta antennarum plumata.

*Phalanx 1:ma.* Oculi hirti.

A. Squamæ sub alis albæ. Nervus transversus ordinarius flexus.

**I.** *A. lardaria*: ovala, nigro-cæsia; capite flavidobrunneis, albo-piceo-nigra; thorace vittis abdominalisque tessellis glauco-albis; alis aqueis, nervo transverso ordinario distincte flexo, paullo pone medium areæ inserto; spinula costæ nulla. ♂♀. (Long. 3 fere  $\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: oculis arce cohærentibus, linea media gemina albida tantum angustissima remotis;

*Fem.*: oculis late remotis, vitta lata brunneo-nigra opaca, utrinque albescenti-marginata.

Macq. Buff. 2. 286. I. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 313. I.

*Musca* Fabr. Antl. 285. 6. Fall. Muscid. 54. 37. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 83. I. ♂♀. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 661. I. ♂♀.

Hab. in floribus, fruticibus & præcipue stercoratis fungisque putridis, per totam Scandinaviam ubique vulgatissima, versus autumnum præsertim abundans, in sylvis sæpe copiosissima; in provinciis tamen septentrionalibus magis rarescit, & intra Lapponiæ fines vix nisi rarissime obvia. Supra radicem alpium Mullfjellen Jemtlandiæ borealis Sueciæ, & Næs Værdaliæ Norvegiae, a me non visa. (Ad Zirkow Rugiæ, Elisenheyne prope Gryphiam, & ad Hamburgum, a D. *Dahlbom* frequenter lecta; e S:t Sever Galliæ a D. *Leon Dufour* quoque missa).

♂♀. In hoc genere inter nostrates maxima. Ovata, lata. Caput orichalceo-albidum, nitidum. Frons parum prominens. Oculi distincte hirti. Antennæ angustatæ, nigræ \*), articu-

\*) Quoniam antennæ, palpi & pedes tota in hoc genere semper nigra sunt, talem horum partium colorem ubique intellectum afferre omisi etiam in speciebus ubi caput & corpus aliud quam nigrum habent colorem. Tantum in

lo ultimo 2:do fere triplo longiore, seta distinete & longe plumata. Punctum supra antennas griseum. Vibrissæ brevissimæ ad medium epistomatis adscendentæ. Genæ nigræ, leviter albo-pollinosæ. Thorax setosus, glauco-albus, lineis 4 nigris. Cicatrix in fovea subhumerali grisea. Scutellum setosum, glaucum, vittis 3 nigricantibus. Abdomen glauco-album, linea dorsali & maculis irregularibus cæsio-nigris. Alæ pure hyalinæ, immaculatae inermes. Nervus longitudinalis 3:tius mox ante summum apicem excurrens. Area apice saltem quadruplo latior basi. Nervus transv. medius medio inter apicem nervorum longitudinalis 1:mi & auxiliaris oppositus. Squamæ albæ. Halteres nigri, petiolo flavidæ. Pedes nigri.

*Obs.* Varietatem nonnihil minorem, squamis sub alis fuscanis, ad radicem Mullfjellen Jemtlandiæ semel inveni, de cetero varietati a. ut ovum ovo simillimam, & vix specie distinctam.

2. *A. albo-lineata*: ovata, alra, nitida; capite argenteo-micante; thoracis vittis abdominisque tessellis albis; alis aqueis, nervo transverso ordinario modice flexo, paullo ante medium areæ inserto; spinula costæ nulla.  
*♂♀.* (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: oculis arce cohærentibus, linea media gemina nigra tantum angustissima remotis;

*Fem.*: oculis late remotis, vitta media lata nigra; in copula.

Macq. Buff. 2. 286. 2. ♂♀. Meig. Dipt 7. 313. 2. *Musca* Fall. Muscid. 54. 38. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipl. 5. 83. 2. ♂♀. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 662. 2. ♂♀.

junioribus exemplis *A. laminatæ* 117, & canescens 119, pedes subrufescentes, & in *A. myopina* n:o 113, palpi flavi & antennæ basi ferrugineæ, sunt.

Hab. in foliis fruticum, floribus, stercoratis &c., a primo vere usque ad autumnum, per totam Scandinaviam ubique (alpibus Lapponicis tantum exceptis), longe frequentissima, in copula saepe deprehensa. — In regione sylvatica Lapponiae, usque ad radices alpium adscendens, minime deest. (E S:t Sever Galliae a Cel. *Leon Dufour* absque nomine missa).

♂♀. Priore multo minor. Caput ut in præcedente, sed argenteo-micans, nec flavidum, fronte adhuc minus prominente & epistomate minus descendente. Thorax antice præsertim albidus, lineis 4 nigris. Scutellum nigricans. Abdomen breviter ovatum seu rotundatum, ut in priore pictum & setosum. Alæ ut in præcedente, sed nervus transvers, ordinarius paullo minus flexus & nonnihil ante, nec post, medium areæ mediæ insertus. Squamæ albæ. Halteres testacei. — A *Musca Hortorum*, cui habitu & pictura valde similis, magnitudine paullo minore, oculis hirtis, nec nudis, ut & nervo longitudinali 4:to recto longe pone apicem alæ cum nervo costali conjuncto, mox dignoscitur.

B. Squamæ sub alis aut totæ aut saltem margine flavescentes.

a.) Nervus transversus ordinarius flexus.

3. *A. incana*: oblongo-ovata, cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque unica, nigra; alarum basi squamisque flavescentibus; oculis ♂ appropinquantibus. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{1}{4}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 286. 4. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 313. 3. T. 74. f. 6. ♂. — *Anthomyia* Wiedem. Zool. Mag. 1. 1. 81. 32. Meig. Dipt. 5. 81. 3. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 662. 3. ♂♀. *Musca nemorum* Fall. Muscid. 55. 39. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum per hortos, prata & nemora, 1 Jul.—30 Aug., haud infrequenter, a folio, ubi sedem habuit, cito, strenue & breviter avolans, mox ad idem punctum revertens; occurrit in Scania ubique vulgaris ex. gr. ad Lund, Röslånga, Abusa, Lemmeströ skog (D. *Sjörén*), Tranås, Esperöd &c., copiose visa; in Smolandia & Ostrogothia passim; in Ölandia; in Gotlandia ad Westö, Nähr, Furillen, Östergarn, Garde &c., frequens; in Jemtlandia atque in Botnia boreali ad Torneå, raro; in Norvegia ad Thynæs; in Dania ad Hafniam frequenter, D. *Staeger*. (Circa Hamburgum & Travemundiam in multis speciminibus ulriusque sexus a D. *Dahlbom* lecta).

$\sigma\varphi$ . Majuscula. Caput albido-micans. Antennæ & palpi nigra, seta distincte plumata. Oculi in primis in  $\sigma$  distincte hirti; in  $\sigma$  subcohærentes l. anguste distantes, per orbitam oculorum utrinque tenuem albam, & lineam medianam angustam (antice paullo latiorem) nigrum tantum separati; in  $\varphi$  sat late remoti, per orbitam oculorum latiorem albidam & vitram frontalem latam nigrum posterius ante ocellos macula elongato-trigono grisea insignitam, separati. Punctum supra antennas in  $\sigma$  præsertim perspicuum. Thorax cinereus, lineis 4 nigris. Scutellum cinereum. Abdomen cinereum ( $\sigma$ ), aut griseum ( $\varphi$ ), linea dorsali nigra in segmentis 1 & 2 plerumque perspicua, in 3:tio sëpe abrupta & obsoleta. Segmenta: 1:mum subinerme l. ad latera tantum setulosum; 2:dum margine apicali setosum; 3:tium margine apicali & disco setosum; 4:tum fere totum parce setosum. In  $\varphi$  vero hæ setæ multo tenuiores & in segmentis 1 & 2 parum conspicendiæ. Alæ cinereæ, basi in primis nervis flavescentes. Nervi transversi: medius apici nervi long. 1:mi insertus; ordinarius paullo ante medium areæ insertus, subobliquus & modice flexus. Nervus long. 3:tius mox ante summum apicem alæ excurrens. Spinula costæ adest, sed in  $\sigma$  parva & costæ adpressa. Squamæ pallide flavæ, mediocres,

superior inferiore fere duplo brevior. Halteres flavi, Pedes nigri.

4. *A. Lucorum*: oblongo-ovata, cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque maculis totidem aut perspicuis ( $\delta$ ), aut obsoletis ( $\varphi$ ), nigris; alarum nervis transversis infuscatis, squamis flavidis; oculis  $\delta$  arete cohærentibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 3— $3\frac{1}{4}$  lin.).

Macq. Buff. 2. 286. 3.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7. 313. 4. *Musca* Fall. Muscid. 55. 40.  $\delta\varphi$ . *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 85. 4.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 662. 4.  $\delta\varphi$ .

Hab. in floribus Umbellatarum, Salicum, &c., atque in soliis fruticum variarum, per totam Scandinaviam in nemoribus, hortis & pratis, 15 Jun.—8 Sept., vulgaris, in copula capta; scilicet in Scania ubique frequens; in Smolandia, Ostrogothia, Ölandia & Gotllandia (ad Thorsborg, Nähr, Gothem, Fårön, Garde &c.), haud raro; in Jemtlandia usque ad Mullfjellen & Skalstugan copiose; in Dalecarlia; in Lapponiis omnibus per regionem sylvaticam & subalpinam passim; in Norvegia a Thynæs & Suul Værdaliæ in jugo alpino, usque ad Bossekop Finmarkiæ, frequens; in Dania, D. *Dahlbom*.

$\delta\varphi$ . Similis priori, a qua differt: abdominis maculis 4 nigricantibus plus minus perspicuis, alis basi minus flavidis, nervis transversis præsertim in  $\delta$  fuscedine cinctis, ut & oculis in  $\delta$  magis cohærentibus. Abdomen: in  $\delta$  einereum l. glaucescens, maculis 4 trigonis nigris, nempe 2 in singulo segmentorum 2 & 3, cum rudimento maeniarum 2 etiam in segmento 1:mo; in  $\varphi$  griseum, maculis numero & situ ut in  $\delta$ , sed forma irregularibus, micantibus, & præterea plerumque valde obsoletis, linea media dorsali fusca distinctiore. Alæ basi parum flavidæ. Nervi transversi fusi. Oculi in  $\delta$  arete cohærentes, linea tantum gemina seu oculorum or-

bita alba angustissima disjuncti. Reliqua ut in præcedente. — Antennæ in ♀ paullo longiores quam in ♂, & oculi interdum nudiusculi. — Nervus transv. ordinarius intus in medio interdum breviter appendiceo.

*Not.* Secundum observationem Cl. Dahlbomi, femina *Crabronis patellati* feminam hujus speciei occidit & ad nidum secum trahit.

5. *A. plumbea*: oblongo-ovata, cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque unica basali, nigris; alis subimmaculatis, squamis flavescentibus; oculis ♂ arcte cohærentibus. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 7. 311. 5? *Anthomyia* Ejusdem 5. 85.  
5.? ♂. — Zett. Ins. Lapp. 662. 5. ♂♀.

Hab. in Sueciæ & Norvegiæ floribus Salicis & foliis fruticum, 13 Jun.—17 Aug., minus frequens; scilicet in Herjedalia ad Öfver-Hogdal; in Jemllandia usque ad radicem Mullfjellen, frequens; in Botnia boreali ad Öfver-Torneå, D. Portin; in Lapponia Tornensi ad Wittangi & Juckasjervi ad ripam fluminis Tornensis, passim; in Finmarkia ad Bossekop raro. Forte etiam in Suecia meridionali occurrit, licet mihi ibi non obvia.

♂♀. Simillima duabus proxime antecedentibus, sed ab *A. incaea* alis basi minus flavescentibus, oculis in ♂ arctius cohærentibus; ab *A. Lucorum* abdomine vitta dorsali unica, nec punctis 4 fuscis, alarum nervis transversis vix fuscedine cinctis; & ab utraque abdomine præsertim in ♂ magis forte plumbeo l. glaucescente, differt. — Os sat distincte reflexum. Abdominis vitta dorsalis lateribus sinuata segmentum 1 & 2 transit, in ♂ perspicua. Alæ subfuscocinereæ, basi leviter flavidæ. Spinula costæ parva, costæ adpressa. Reliqua ut in 2 prioribus.

6. *A. annosa*: oblongo-ovata, schistaceo-cinerea, thoracis lineis 4, abdominalisque unica dorsali & maculis 4 irregularibus, nigricantibus; alis subimmaculis, nervo transverso ordinario distincte infexo; squamis flavicantibus; fronte in ♀ latissima. ♀. (Long. fere  $3\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 663. 7. ♀.

Hab. in Suecia, 12 Maj.—4 Jul., valde rara, tantum tria individua vidi, unum in prato ad Wadstena Ostrogothiae, alterum ad Johannis Ro prope Torneå Botniæ borealis, a me inventa, & 3:ium ad Kengis Lapponiæ Tornensis a D. Prof. *B. F. Fries* lectum.

♂♀. Similis *A. Lucorum* (4), sed colore lætiore, cano, capite albidiore, fronte (♀) multo latiore, alarum nervis transversis non infuscatis, ordinario distinctius flexo & fere in medio, nec ante medium, areæ inserto, abunde diversa. Caput argenteo-micans, vitta frontali latissima, nigra, leviter cinereo-pollinosa. Antennæ elongatæ, nigræ, seta longe plumata. Oculi rufi, distincte albo-hirti. Os parum reflexum. Palpi exserti & proboscis, nigra. Thorax & scutellum læte cinerea, ille antice lineis 4 nigris. Abdomen cinereum, linea media & maculis 4 (2 & 2 in singulo segmentorum 2 & 3) irregularibus pro situ variantibus, olivaceo-fusco-micantibus. Alæ cinereæ, nervis pallidioribus, transverso medio subinfuscato. Squamæ pallide flavæ. Halteres testacei. Pedes nigri.

7. *A. nivalis*: oblongo-ovata, cinerea, fronte prominente argentea; thoracis lineis 4 obscuris; abdomine griseo, maculis subquadratis bruunceo-infuscatis; alis basi & nervis transversis infuscatis; squamis margine flavis; oculis ♂ appropinquantibus. ♂. (♀). (Long. circiter  $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 663. 8. ♂. ♀.

Hab. in summo alpium Tornensium jugo rarissime; die 12 Jul. 1821 exemplum unicum masculum, unicumque semineum, in ipsa nive ambulantia inveni.

**Mas:**  $2\frac{3}{4}$  lin. long. Affinis & similis *A. Lucorum*(4), sed paullo minor, & differt: fronte paullo magis porrecta, oculis minus arce cohærentibus, per lineam medianam angustam (supra antennas dilatatam) nigram albo-marginatam separatis, thorace antice obsolete lineato (an in detrito?), abdominis maculis in segmentis 2 & 3 majoribus subquadratis brunneis, vestigio etiam macularum ejusdem coloris & numeri in segmentis 1 & 4, ut & alis basi distincte infuscatis, minime flavescentibus. Antennarum seta non longe plumata. Incisuræ abdominis certo situ albescunt.

**Fem.** an hujus?  $2\frac{1}{2}$  lin. long. Tota obscure grisea l. cinerea, thoracis lineis 2 fusco-brunneis, fronte prominente, griseonitente, vitta media fusca. Alæ ima basi, squamis halteribusque pallide flavis, nervis transversis infuscatis. Abdomen vix maculatum. — Similis mari descripto, sed corporis colore magis grisescente, thoracis tantum lineis 2 fuscis, abdomine subimmaculato, fronte grisea nitida, oculis modice remotis, vitta frontali fusca, utrinque griseo-marginata, alis ima basi pallide flavis, ut & nervis transversis tantum leviter infuscatis, differt.

8. *A. obscurata*: oblonga, obscure cinerea (♂), aut cinerea (♀) fronte parum prominente argentea; thoracis lineis 4 nigris; abdomine cinerascente, maculis 6 subtrigonis nigro-brunneis; alis hyalinis subimmaculatis; squamis albidis flavo-marginalis; oculis ♂ appropinquantibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

Var. a. ♂ abdomine cinereo, maculis obscuris distinctioribus.

Meig. Dipt. 7. 314. 12. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 89.  
12. ♂. Zett. Ins. Lapp. 664. 12. ♂.

Var. b. ♂♀ in copula: abdomine griseo, maculis obscuris obsoletis; thorace ♀ cinereo, lineis 4 nigris; fronte ♀ grisea, vitta didyma nigra.

*Anthomyza Sahlbergi* Zett. Ins. Lapp. 664. 13. ♂.

Hab. in foliis fruticum Sueciæ, 15 Jun.—1 Sept., minus frequens; scilicet var. a. ♂: in Scania ad Lund rarius; in Ostrogothia ad Gusum; in Gotlandia & in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarliæ alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad radicem Mullfjellen; in Botnia boreali ad Haparanda; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele, Lulensi ad Quickjock ♂♀ (*Wahlberg*), & Tornensi ad Wittangi & Muonioniska, raro; var. b. ♂ tantum in Lapponia Tornensi a D. *Deutsch* semel inventus, & uterque sexus in alp. Dalecarlicis in copula a D. *Bohemian*. (Ad Hamburgum & Rixdorf var. a. etiam a D. *Dahlbom* lecta).

♂. Affinis & similis *Cyrtoneura meditabundæ* (n:o 11), directio-  
ne nervorum in aliis alia mox dignota. Caput argenteo-mi-  
cans. Frons haud prominens, vitta media modice angusta  
nigrante, per orbitam oculorum albam utrinque marginata  
(in speciminibus Lapponicis frons angustissima & oculi fe-  
re cohærentes). Antennæ angustæ, nigræ, seta distincte plu-  
mata. Os non reflexum. Palpi nigri. Oculi tenuiter hirti.  
Thorax obscure cinerens, lineis 4 tenuibus nigris. Scutellum  
cinereum. Abdomen oblongum, l. subcylindrico-oblongum,  
cinereum, maculis 6 oblongo-trigonis, nempe 2 in segmento  
1:mo minoribus interdum vix ulla, & 2 in singulo segmen-  
torum 2 & 3 majusculis, aut perspicuis in varietate a., aut  
minoribus punctiformibus obsoletis in varietate b. Alæ ci-  
nero-hyalinæ, vix maculatæ, nervis transversis parum in-

fuscatis, horum ordinario plus minus flexo. Spinula costæ adest. Squamæ albidae, margine tenuiter pallide flavæ. Halteres flavi. Pedes nigri.

*Obs.* Specimen feminine: cinereum, vitta frontali latiuscula, thoracis lineis 4, harum lateralibus subinterruptis, abdominis maculis 4 irregularibus certo situ tantum conspicuis, lineaque dorsali, nigris; squamis sub alis albidis; antennarum seta non longe plumata; in ceteris mari descripto simile; an ejus femina? Ad Gusum Ostrogothiae a D. Prof. Wahlberg inventa.

9. *A. dispar*: oblongo-ovata; fronte parum prominente; antennarum seta breviter plumata; nervo transverso ordinario subrecto; *mas*: corpore nigro, epistomate argenteo, abdome cinereo, segmento 1:mo maculisque 4 subquadratis nigris, alis fuscanis; *femina*: corpore cinereo, epistomate concolore, abdome punctis 4 brunneis obsoletis, alis subhyalinis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 7. 314. 11. *Musca* Fall. Muscid. 58. 48. ♂♀. *Spilogaster* Macq. Buff. 2. 296. 12. ♂♀. *Antomyia* Meig. Dipt. 5. 88. 11. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 665. 17. ♂♀.

Hab. in floribus, foliis fruticum, truncis arborum, &c., per totam Scandinaviam, 30 Maj.—10 Sept., ubique vulgatissima, præsertim in Scania copiose, etiam in Lapponiis Suecicis & Norvegicis frequens; in copula multo-ties deprehensa. (E Glogavia a D. Zeller).

♂♀. Ad minores accedit. Maculæ abdominis, seta antennarum breviter plumata, oculi tenuiter puberuli, & in ♂ alæ nigricantes, speciem a prioribus distinguunt. Oculi plerumque fere nudi brunnei, in ♂ tamen (in illæsis) hirtuli, non arete cohærentes; in ♀ mediocriter & paralleliter remoti. Caput ♂ argenteum, macula supra antennas ordinaria triangulari, atra; ♀ cinereum, vitta frontali in vertice divisa,

atra. Palpi filiformes, nigri. Abdomen conicum, in ♂ cinereum, segmento 1:mo toto & maculis 4 quadrato-trigonis nigris, nempe 2 in singulo segmentorum 2 & 3; in ♀ griseum, maculis numero & situ ut in ♂, sed multo minoribus punctiformibus, dilute brunneis, saepe valde obsoletis. Segmentum 4:rum etiam saepe puncto fusco in utroque sexu. Alae ♂ nigræ, margine interiori magis hyalino; ♀ hyalinæ, basi subflavantes. Nervus transv. ordinarius in utroque sexu subrectus seu leviter flexus. Spinula costæ parva. Squamæ albidæ, margine summo pallide flavo. Halteres flavi. Pedes nigri.

Variat mas abdominis maculis 4 nigris subconfluentibus. Variat etiam ♂ alis minus fuscans, cum var. a. passim; similis quoque a D. Zeller sub nomine *Anthom. atrata* Zell. e Glogavia missa.

b.) *Nervus transversus ordinarius rectus* l. subrectus.

10. *A. serva*: oblongo-ovata, cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque linea dorsali & maculis 4 indeterminatis obsoletis, fusco-nigris; alis subhyalinis, immaculatis, squamis flavo-albidis; oculis ♂ cohærentibus. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Macq. Buff. 2. 287. 5. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 314. 6. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 86. 6. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 663. 10. ♂♀.

Hab. in Scandinavia, 20 Jun.—15 Aug., passim; in copula capta; scilicet in Scania ad Lund, Rästen, Esperöd &c., sat frequens; in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogothia ad Lärketorp, Wadstena &c., passim; in Gotlandia ad Näbr & Fårön; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg* copiose; in Dalecarlia; in Lapponia Tornensi

plerumque ad ripas fluminum in Salicetis ex. gr. ad Wittangi & Juckasjervi usque ad lacum Torneåträsk procedens, passim; in Dania haud raro, D. Staeger.

$\delta\varphi$ . Præcedentibus similis & affinis; sed ab *A. incana*, 3, alis basi non flavis & abdomine fusco-submaculato; a *Lucorum*, 4, alarum nervis transversis non infuscatis; a *plumbea*, 5, magnitudine paullo minore, abdominis maculis 4 obsoletis (nec nullis) & oculis  $\delta$  vix tam arcte cohærentibus; ab *annosa*, 6, fronte in  $\varphi$  non latissima; a *nivali*, 7, abdominis maculis multo obsoletioribus, minoribus, alarum nervis transversis non infuscatis, & oculis  $\delta$  non nihil magis cohærentibus; ab *obscurata*, 8, fere iisdem notis ac a *nivali*; a *dispare*, 9, alis non infuscatis &c.; & ab his omnibus nervo transverso ordinario aut omnino recto aut leviter tantum subflexo, præcipue differt. Frons sub prominula. Punctum supra antennas album. Oculi hirti. Antennarum seta modice plumata. Os subexsertum. Thoracis linea 4 nigræ latiusculæ. Abdomen ovatum, cinereum, maculis in segmentis 2 & 3 quatuor nigro-fuscis, parvis, pro situ variantibus & certo situ tantum conspicuis, & linea media in iisdem segmentis interrupta obsoleta nigra. Segmenta 3 & 4 undique setulosa. Alæ subhyalinæ, levissime tantum subfuscane, nervis ut in prioribus directis, sed transverso ordinario ut dictum magis recto. Squamæ albidæ, pallide flavo-marginatæ. Halteres testacei.

11. *A. veterana*: oblongo-ovata, cinerea, thoracis lineis 2 angustis nigris; alis basi & squamis flavescentibus, nervis transversis fuscedine cinctis; oculis  $\delta$  approximantibus.  $\delta\varphi$ . (Long. 3 fere 4 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 662. 6.  $\delta\varphi$ . *Anthomyza basalis* Zett. Ins. Lapp. 663. 11. variet.  $\delta$ .

Hab. in Lapponiæ Succiæ silvis rarissime;  $\delta$  ad Wittangi Lapponiæ Tornensis 14 Jun. 1821 & altera vice

ad lacum Stor-Uman Lapponiæ Umensis 6 Jul. 1832; &  
 ♀ ad Wilhelmina etiam Lapponiæ Umensis 15 Jul. eodem  
 anno (1832) inveni.

*Fem.* Long. fere 4 lin. Affinis & similis *A. incanæ* (3), sed  
 præter magnitudinem paullo longiore differt etiam; capite  
 dilutius cano, fere argenteo-nitente, fronte multo latiore,  
 thoracis lineis anticis nigris tantum 2, angustioribus, abdo-  
 mine subimmaculato, ut & nervis transversis magis infusea-  
 tis & rectis. Ab *A. annosa*, 6, cui frontis latitudine similis,  
 abdominis pictura deficiente & nervis transversis haud in-  
 flexis, mox dignoscitur.

*Mas.* Long. 3 lin. Similis feminæ, sed capite argenteo-micante,  
 oculis paullo approximatis, vitta modice angustata atra  
 utrinque albo-marginata disjunctis, ut & thorace paullo ob-  
 scuriore, differt. Abdomen cinereum, certo situ linea obso-  
 leta fusca.

12. *A. Morio*: ore producta oblongo-ovata, ob-  
 scure cinerea. thoracis lineis 4, abdominisque antico vitta  
 dorsali lata sinuata, nigris; alis subhyalinis, basi fusco-  
 maculatis, squamis flavescensibus; antennarum seta di-  
 stincte plumata; oculis ♂ cohærentibus. ♂♀. (Long. 2½  
 fere 3 lin.).

Hab. in soliis fruticum & graminosis, per partem  
 interiorem Scandinaviæ borealis, 20 Jun.—20 Aug., pas-  
 sim, in copula deprehensa; scilicet in Jemtlandia a mon-  
 te Hofverberget, radicibus alpium Åreskutan & Mull-  
 fjellen usque ad Skalstugan, copiose; adscendit quoque in  
 jugum alpinum Norvegiæ, & ad Kälahög, Höjsjeldbro,  
 Kongsstne & Suul frequenter lecta, in ipsa nive perenni  
 deprehensa; descendit iterum ad radicem jugi, & ad di-  
 versorium Garnæs Værdaliæ parce visa; in Lapponia Lu-

lensi in Wallifjellet ad Quickjock a D. Andersson quoque lecta.

♂♀. Color obscurus (unde pictura haud perspicua), alæ basi fuscæ, squamæ flavæ, os paullo exsertum, & oculi ♂ cohærentes, speciem ab affinibus distinguunt. Caput obscure cinerascens. Punctum supra antennas album. Frons sub prominens. Antennarum seta distincte plumata. Oculi distincte hirti, in ♂ sat arce cohærentes, linea nigra tantum angustissima disjuncti; in ♀ per vittam sat latam atram albo-marginatam separati. Palpi filiformes, nigri. Thorax (præser-tim in ♂) obscure cinereus, nitens, antice dilutior, vittis 4 latiusulis nigris. Scutellum cinereum. Abdomen ovatum, cinereum, subnitens, segmento 1:mo fere toto, 2 & 3 vitta dorsali (in ♂ certo situ dilata & in singulo segmento trigona) nigro-micantibus; præterea ut in priori setosum. Alæ hyalinæ, leviter fuscanæ, radice distincte fuseo-maculatæ; nervi fere ut in *A. serva* (10) directi. Squamæ flavidæ. Halteres testacei. Femora postica non elongata, validiuscula 1. modice erassa. Alarum nervi: transversus medius paullulum ante apicem nervi longitudinalis 1:mi ductus; longitudinalis 3:tius mox ante summum apieem alæ excurrens. — Variat ♀ abdomine detrito nigro nitido.

13. *A. lugubris*: ore producto oblongo-ovata, obscure cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque antico vitta dorsali, nigris; alis hyalinis subimmaculatis, squamis albidis; antennarum seta distincte plumata; oculis ♂ cohærentibus. ♂. (Long.  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 7. 314. 8? *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 87. 8? ♂. (ubi nervo transv. ordinario inflexo deseribitur). — Zett. Ins. Lapp. 664. 15. ♂.

Hab. in Suecia boreali rarissime; ad Lycksele Lapponiae Umensis pauca exempla inveni. In planicie alpium ad Quickjock Lapponiae Lulensis in floribus Angelicæ Arch-

angelicæ uterque sexus mense Julio 1813 copiose visus erit, testante Cel. *Wahlberg*.

♂. Similima priori, a qua vix nisi alis immaculatis, basi scilicet haud fuscatis, & squamis magis albidis, pallidissime tantum flavido-maginatis, differt; forte tamen specie diversæ. — Femina mibi ignota.

14. *A. consobrina*: ore subproducto oblongo-ovata, obscure cinerea, thoracis lineis 4, abdominisque antice vitta dorsali, nigris; alis subhyalinis, basi & nervis transversis infuscatis, squamis albidis; antennarum seta breviter plumata; oculis ♂ cohærentibus. ♂. (Long.  $2\frac{1}{2}$  fere 3 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 665. 16. ♂.

Hab. in Suecia boreali 21 Jun.—15 Jul., rarius; scilicet in Lapponiis Umensi ad Lycksele, & Tornensi ad Juckasjervi, capta.

♂. Duabus proxime antecedentibus iterum ut ovum ovo similis; sed ab *A. Morione* alarum nervis transversis fuscidine leviter cinctis & squamis magis albidis, a *lugubri* alis basi infuscatis, & ab utraque ore nonnihil minus producto & antennarum seta brevius plumata, differt.

15. *A. alpicola*: ore producto ovato-oblonga, cinerea, thoracis vittis 4, abdominisque linea dorsali & maculis 4 indeterminatis obsoletis, fusco-nigris; alis hyalinis, basi leviter fuscatis, squamis albidis; oculis ♂ appropinquantibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in alpestribus per partem interiorem Scandinaviae borealis, 24 Jun.—2 Aug., passim; scilicet in paroecia Undersåker Jemtlandiæ borealis ex. gr. ad Mull-

fjellen, Areskutan & Skalstugan, sat frequens; in Værdalia Norvegiae ad diversorum Sulstuen in jugo alpino situm haud raro; in Lapponia Lulensi ad Quickjock cum *Ar. lugubri* a D. D. *Wahlberg*, *Bohemani* & *Andersson* capta.

$\delta\varphi$ . Valde similis & affinis *A. servæ* (10), magnitudine vero nonnihil minore præsertim angustiore, ore magis exerto, squamis sub alis albidiорibus ut & oculis maris minime cohærentibus sed tantum in fronte approximatis, certe distincta. Halteres obscure testacei. Reliqua ut in *A. servæ*.

*Obs.* Nervus transversus medius apici nervi longitudinalis 1:mi præcise oppositus. Spinula costæ adest. Tibiæ omnes spinosæ. Palpi filiformes.

16. *A. variabilis*: ore fronteque non productis oblonga, nigricans, capite subargenteo; thorace antice griseo, vittis 2 obscureis; abdomine cinereo immaculato; alis basi squamisque albo-flavis; *mas*: oculis arce cohærentibus, femoribus posticis longitudine fere abdominalis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: niger, capite argenteo; thorace nitido, antice vittis 3 flavo-albidis, lateralibus evidentioribus; oculis hirtis arce cohærentibus; abdomine subcylindrico, cinereo l. flavido; ano obtuso; alis leviter fuscans; femoribus posticis longitudine fere abdominalis, gracilibus, rectis;

*Fem.*: tota flavo-cinerea, capite cano; oculis modice remotis subnudis; thorace antice lineolis 2 abbreviatis tenuibus fuscis obsoletis; abdomine ovato, ano acuto; alis cinereis; femoribus posticis abdominali distinete brevioribus, crassitie reliquorum; in copula.

Meig. Dipt. 7. 314. 10. *Musca* Fall. Muscid. 58. 47.

$\delta\varphi$ . *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 87. 9.  $\delta\varphi$ . Zett. Ins. Lapp. 663. 9.  $\delta\varphi$ . (specimina tantum Lapponica ad Wil-

helmina & Stöttingsfjellet, nam individua Norvegica ad Tromsö & Dovre capta ad sequentem pertinent). — *Hydrophoria* Macq. Buff. 2. 300. 12. ♂♀.

Hab. in floribus pratensibus & silvestribus, libenter locis umbrosis, sed vix normaliter in plantis aquaticis, per totam Scandinaviam, 1 Jul.—10 Sept., vulgaris, in copula saepe capta; scilicet in Scania copiose; in Smolandia, Ostrogothia & Ölandia, frequens; in Gotllandia ad Abisko, Garde &c. haud rara; in Lapponiis rarius; in Lapponia tamen Lulensi ad Quickjock in floribus Angeliae frequenter a D. *Wahlberg* lecta; in Norvegia ad Thynæs &c. passim; e Dania a D. *Staeger* communicata.

♂♀. Prioribus angustior, magis oblonga. Frons minime exserta. Antennarum seta longe plumata. Os haud reflexum. Palpi filiformes, nigri. Abdomen postice setosum, basi interdum vestigio obsoleto lineolæ fuscæ. Alarum nervi transversi subapproximati; horum medius apici nervi long. 1:mi suboppositus; ordinarius aperte ante medium areæ mediæ insertus, oblique ductus, exacte rectus. Nervus longit. 3:tius in summo apice (nec mox ante apicem ut in plerisque antecedentibus) excurrentes. Spinula costæ vix ultra, squamæ sat parvæ. Halteres flavi. Tibiæ omnes parce spinosæ. — Cave ne hanc cum *Ar. separare* n:o 104 confundas.

**17. *A. longipes*:** ore fronteque haud productis oblonga, nigricans, capite subargenteo-micante, thorace antice grisecente, vittis 2 obscuris; abdomine cinereo, linea dorsali fusca; alis basi squamisque albo-flavis; *mas*: oculis arete cohaerentibus, femoribus posticis abdomine fere longioribus. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

*Mas* & *femina* ut in præcedente differunt, sed maris femora postica ab domine fere longiora, gracilia, levissime subcurva, nec exacte reeta; in copula.

*Anthomyza variabilis* Zett. Ins. Lapp. 663. 9. var.  
tantum individua ut *Norvegica allata*.

Hab. in floribus Umbellatarum, foliis fruticum, graminosis, per partem interiorem alpestrem Scandinaviae borealis, 27 Jun.—20 Aug., haud raro, in copula plures deprehensa; scilicet in Jemtlandia boreali ad Höfverberget (prope Storsjön), Ristansfors, Åreskutan, Mullsjellen, Stalltjernstugan, & usque ad Skalstugan, sat copiose; transcendit quoque jugum alpinum, & in Norvegia a Suul (Værdaliae), Garnæs, Näs & Thyväas usque ad Tromsö Nordlandiae, lecta; in alpe Dovre etiam a D. Boheman capta; ad Quickjock Lapponiae Lulensis a D. Andersson deprehensa. In Ostrogothia ad Lärketorp semel a me inventa.

♂♀. Valde similis & affinis priori, a qua tamen longitudine sæpe nonnihil majore, fronte leviter (oec minime) sub prominula, nervulis transversis paullulum minus approximatis, ut & præprimis abdominis linea dorsali (in ♂ præsertim perspicua) in segmentis 1, 2 & 3, atque femoribus posticis paullo longioribus leviter curvis, certe distincta. Reliqua ut in variabili.

18. *A. atra*: ore fronteque non productis oblonga, atra, nitida; alis cinereo-hyalinis, basi squamisque albo-flavis; mas: oculis arcte cohærentibus, femoribus posticis longitudine abdominis. ♂♀. (Long. ♂ 2½, ♀ fere 3 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 59. 50. ♀.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; 2 tantum individua vidi in Scania capta, nempe unum, masculum, ad Lund a me inventum, & alterum, feminem, ad Esperöd a D. Fallen lectum.

♂♀. Magnitudo, statura angusta, formatio pedum & oculorum etiam quoad differentiam sexus, atque omnia exacte ut in precedente, a qua tamen colore totius corporis atro nitido certe diversa. — Antennae distincte plumatæ. Oculi in ♂ tenuiter hirti. Thorax, scutellum & abdomen atra. Caput & alæ ut in variabili n:o 16. Pedes & reliqua ut in *longipede*, 17.

19. *A. umbratica*: ore fronteque non productis oblongo-ovata, nigricans, capite argenteo-micante; abdome ovato: aut canescente, linea fusca (♂), aut obscure cinereo immaculato (♀); alis squamisque leviter fuscans (♂), aut alis cinereis squamis albidis (♀); femoribus posticis mediocribus; mas: oculis cohærentibus. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere 2 lin.).

*Mas*: niger, oculis sat arete cohærentibus, hirtis; abdomine cinereo, linea dorsali media subintegra fusca; alis squamisque leviter fuscans;

*Fem.*: obscure glaucescens, immaculata; fronte modice lata nigra, postice macula trigona cinerea; oculis subnudis; alis cinereo-hyalinis, squamis albidis; in copula.

Meig. Dipt. 7. 314. 9. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 88.

10. ♂. Zett. Ins. Lapp. 665. 18. ad partem, scilicet individua in monte subalpino Raschstind Norvegiæ capta, nam Lapponica ad Stor-Uman inventa ad *Ar. hirsutulam* (103) pertinent.

Hab. in Scandinavia, 24 Jun.—29 Aug., passim, in copula; e pupa cylindrica, muda, brunnea exclusa; scilicet in Scania ad Lund, Sylfakra, Esperöd &c., frequens; in Ostrogothia ad Lärketorp, rarius; in Westrogothia, D. *Boheman*; in Gotlandia ad Ruthe & Gothem raro; in Nordlandia Norvegia ad Raschstind; in Dania, D. *Stæ-*

ger. (Sub eodem nomine a D. *Zeller* e Glogavia missa. — Ad Neuenkirchen Germaniae jam 20 Maj. a D. *Dahlbom* lecta).

$\delta\varphi$ . Similis *A. longipedi* n:o 17, sed fere duplo brevior, proportione vero magis ovata, abdominis linea obscura fere ad apicem continuata, femoribus posticis brevioribus &c., vere diversa; ab *A. variabili*, 16, cui quoque similis, magnitudine minore & abdomine linea media fusca notato; affinis tandem *A. vespertinae* (20), cum qua in collectione *Falleni* mixta occurrit, sed abdomine paullo latiore & oculis in  $\delta$  hirtis, nec nudis, ab illa dignoscitur. — Thorax subnitidus, niger ( $\delta$ ), aut schistaceus ( $\varphi$ ); immaculatus. Alae etiam quoad directionem nervorum ut in *A. variabili*, sed basi concordes, nec flavescentes. Tibiae parce spinulosae. Femora postica reliquis paullulum longiora, sed non graciliora. Halteres flavi. Alarum area media apice paullo latior quam medio.

*Obs.* *Aric. nigritella* oculis in majoribus & illæsis individuis masculis omnium tenuissime & tantum microscopice puberulis in subdivisione sequente sub n:o 22 quærenda.

*Phalanx 2:da.* Oculi nudi.

*Sect. Prima.* Oculi in  $\delta$  cohærentes aut saltem appropinquantes.

*A.* Squamæ sub alis mediocre: valvula superior inferiorem non tegens.

\*). Alarum nervus transversus ordinarius reclus.

20. *A. vespertina*: oblongo-ovata, nigra, subnitida, parum griseo-micans; capite cinereo, fronte non prominente; antennis longe plumatis; squamis albidis; *mas*: alis fuscans, oculis arcte cohærentibus; *femina*: alis hyalinis, oculis remotis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Mas.*: oculis arce cohærentibus; thorace nigro; abdomine oblongo, nigricante, nitido, linea dorsali nigra obsoleta; alis nigricantibus, squanis sordide albidis;

*Fem.*: oculis modice distantibus, fronte grisea, vitta lata nigricante; thorace obscure cinereo, subnitido, lineis 4 nigris obsoletissimis; abdomine ovato, nigro, nitido, linea dorsali atra obsoleta; alis hyalinis, nervis subalbidis, squanis albis; in copula.

*Musca* Fall. Muscid. 58. 49. ♂♀. *Anthomyia* Meig.

Dipt. 5. 107. 41. ♂♀. *Hylemyia* Ejusdem Dipt. 7. 315. 13.

Hab. in floribus Umbellatarum & foliis fruticum nec non in graminosis, per hortos, prata & silvas Scandinaviæ meridionalis & mediæ, 2 Jun.—30 Aug. (& feminæ usque ad Septembr.), sat vulgaris, in copula sæpe deprehensa; scilicet in Sæania, Blekingia (*v. Borek*), Smolandia (D. *Ljungb*) & Ostrogothia, frequens; in Gotlandia ad Färön &c. passim; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania, D. D. *Staeger* & *Westermann*. (Ad pagum Zirkow in Rugia, & ad Neuenkirchen jam 15—20 Maj. in utroque sexu a D. *Dahlbom* lecta; e Glogavia a D. *Zeller* communicata).

♂♀. Ad minores accedit. Similis *A. umbratice* (19), sed oculis maris nudis & corpore feminæ magis nigro nitido, mox dignota. Antenarum seta distincte plumata. Abdomen pubescens, postice setulosum. Alarum nervi transversi: medius apici nervi longit. 1:mi oppositus, ordinarius rectus, a margine interiori modice remotus & paullo ante medium areæ mediæ insertus. Nervus longitudinal. 3:tius in summo apice alæ excurrens. Spinula costæ parva costæ adpressa. Halteres testacei. Tibiæ spinulosæ.

21. *A. nigrinervis*: oblongo-ovata, nigra, capite obscuro (♂), aut albicante (♀); fronte haud prominente;

antennis breviter plumatis; squamis albis; *mas*: alarum nervis late infuscatis, halteribus obscuris, oculis cohærentibus, abdomine cinereo, maculis 4 atris; *femina*: alis hyalinis, halteribus pallidis, oculis remotis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Mas*: niger, subopacus; caput obscure griseum; oculi sat arce cohærentes; abdomen oblongo-ovatum, obscure cinereum, segmentis: 1:mo fere toto, 2:doque & 3:tio singulo maculis 2 magnis quadratis per lineam dorsalem cinereum divisus, atris; alæ nigricantes, interstitio nervorum versus apicem plus minus hyalino; halteres nigricantes;

*Fem.*: schistaceo-nigra, subnitida; caput cinereum; oculi modice distantes, vitta frontali atra per maculam cordatam cinereum postice divisa; thoracis dorsum vestigio linearum obscurarum; abdomen ovatum, dorso obsoletissime brunneo-maculatum; alæ cinereo-hyalinæ; halteres pallidi.

Hab. in foliis fruticum Alni &c., per Scandinaviam, 15 Jul.—2 Sept., passim; scilicet in Scania ad Lund & Esperöd haud rara; in Smolandia, D. *Ljung*; in Jemtlandia boreali ad radicem alpium Åreskutan & Mullfjellen; *mas* e Dania sub nomine: "Spilogaster dispar" Meig. Fall. var.? l. nov. sp.? a D. Staeger communicatus.

♂♀. Similis *A. dispari* (9), *umbratica* (19) & *vespertinae* (20), sed differt: a *dispare* oculis in utroque sexu nudis, alarum nervo transv. ordinario exacte recto, & halteribus in ♂ nigricantibus; ab *umbratica* oculis in utroque sexu nudis, maris alis nervis nigredine saturati cinctis, halteribus obscuris, abdominisque maculis 4 atris, nec linea unica dorsali fusca; & a *vespertina* antennis seta breviter tantum plumatis, ut & maris halteribus obscuris abdominisque pictura alia. — Setulosa. Frons parum prominens. Alarum nervi ut in priore directi; spinula costæ vix ulla. Tibiae spinulosæ.

*Obs.* Individua alpina paullo minora sunt, alis ♂ minus intense nigris.

22. *A. nigritella*: sublinearis, alra (♂), aut obscure cinerea (♀); capite cinereo, fronte non prominente; antennis breviter plumatis; squamis albis, alis subhyalinis; *mas*: oculis cohærentibus, halteribus nigris, tibiis posticis unicalearalis. ♂♀. (Long. 1½—1¾ lin.).

*Mas*: ater pilosulus; caput obscure griseum; oculi sat arete cohærentes; abdomen oblongum, subcylindricum, nigricans, segmentis 2, 3, 4 leviter cinereo-micantibus, linea dorsali atra; anus obtusus; alæ leviter fuscaneæ; halteres nigri; femora postica abdome fere longiora, subgracilia; tibiæ omnes pubescentes, posticæ subcurvæ, non spinulosæ, tantum apice intus calcare uno distineto valido;

*Fem.*: obscure cinerea, minus pilosa; caput albido-micans; oculi modice remoti; vitta frontalis lata nigra; abdomen oblongo-ovatum, ano acuto; alæ cinereo-hyalinæ, basi subpallescentes; halteres flavidæ; femora postica mediocriter elongata & crassa; tibiæ omnes parce spinulosæ; in copula.

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 666. 24. ♂♀.

Hab. in floribus Calthæ palustris, foliis fruticum, senestris &c. præsertim Scandinaviæ borealis & Lapponiæ, 24 Jun.—10 Aug., passim frequens, in copula multoties capta; seilicet in Smolandia unum & in Ostrogothia ad Lärketorp tantum dno paria inveni; at in Jemtlandia boreali ad Ristansfors, Mullsjellen, Åreskutan & Skalstugan, sat copiose; in Lapponia Umensi ad Lycksele, Badstuträsk & Wilhelmina, haud raro; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, Studios. Andersson; in alpium Tornensis jugum adscendens in ipsa nive deprehensa; in Norvegia

ad Dovre, Thynæs, Näs & Suul (in jugo alpino), abunde; in inferalpinis Nordlandiæ ex. gr. ad Evenäs, rarius. (E Glogavia a D. Zeller missa).

♂♀. Similis & affinis *A. umbraticæ* (19) & *respertinæ* (20), sed a priore oculis in utroque sexu subnudis, abdomine paullo angustiore; a posteriore antennis seta brevius plumata, alis in ♂ tantum basi infuscatis; & ab utraque magnitudine paullo minore, ut & maris squamis sub alis albis, nec fuscans, halteribus nigris, & præsertim femoribus posticis nonnihil longioribus & tenuioribus, nec non tibiis ejusdem paris in mare non spinulosis, sed dense pubescens, & apice intus seta solitaria distincta armatis. Angustata, subnitida, Nervi ut in *respertina*. Spinula costæ vix nulla. Squamæ parvæ; valvula superiori inferiorem non tegente. — Caveas ne hanc confundas cum *A. hirsutula* infra n:o 103, quæ major & antennis seta pubescentibus, oculis hirtis &c. dignoscitur.

23. *A. duplicata*: oblonga, cinerea; capite albido; fronte parum prominente; antennis longe plumatis; thoracis lineis 4, abdominisque punctis totidem rotundatis, nigris; alis subimmaculatis; nervo transverso ordinario recto; squamis albis; halteribus flavis; mas: oculis arete cohærentibus. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Mas*: corpore cinereo; capite argenteo-micante; oculis sat arete cohærentibus, per orbitas tenuissimas albas tantum angustissime distantibus;

*Fem*: corpore griseo; capite cano; oculis late remotis; vitta frontali didyma nigricante; thoracis lineis fuscis, obsoletis; punctis abdominis brunneis, interdum obsoletis 1. nullis; in copula.

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 92. 17. ♂♀. Zelt. Ins. Lapp. 667. 26. ♂♀. *Spilogaster* Macq. Buff. 2. 296. 9? ♂♀. — *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 26.

Hab. in Scandinavia, 22 Jun.—4 Oct., passim, in copula; scilicet in Scania ad Abusa, Lund, Stäfvie, Esperöd &c., haud rara; in Smolandia, D. *Ljungb*; in Gotlandia ad Furillen, Östergarn, Wamblingbo &c.; in Dalecarlia; in Jemllandia usque ad radicem Åreskutan & Mullsjöllan; in Lapponia Umensi ad Lycksele raro; in Lulensi ad Quickjöck, D. *Andersson*; in Norvegia ad Thynæs & Garnæs Værdalæ paree. (Specimina mascula jam 12 Jun. ad Gryphiam a D. *Dahlbom* lecta, & alia e St. Sever sub nomine: *\*Spilogaster duplicita* Macq. a D. *Leou Dufour* 1814 communicata).

♂♀. Variat magnitudine & colore dominante: cinereo, l. cano, l. griseo. Antennarum seta distincte plumata; an igitur vere *Spilogaster* Macq.? — Punctum supra antennas album. Puneta 2 & 2 in abdominis segmentis 2 & 3, majora l. minora, plerumque rotundata, in ♂ nigra, in ♀ brunnæa. Abdomen subcylindricum (♂), aut oblongo-ovatum acutum (♀); posterius præsertim setulosum. Alæ hyalinæ. Nervi ut in *vespertina* (20) directi; transversus ordinarius sæpissime rectus; interdum leviter infuscatus. Spinula costæ distincta. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, simplices. Femora postica mediocria. Tibiæ extus parce spinulosæ, in junioribus nigro-testaceæ. Tibiæ posticæ in ♂ intus non villosæ, qua nota etiam ab *A. 4-maculata* (87) dignoscitur.

*Obs.* Exempla lapponica plerumque paullo minora & magis glauco-cinerea sunt. — Varietatem Meig. "abdominis punctis tantum 2" non observavi.

24. *A. duplaris*: oblonga, cinerea; capite albido; fronte parum prominente; antennis longe plumatis; thoracis lineis 4, abdominisque punctis totidem rotundatis, nigris; alis subimmaculatis, nervo transverso ordinario le-

viter flexo; squamis albidis; halteribus flavis; mas; oculis subcohærentibus. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Hab. in Scandinaviae fruticibus, 10 Jun.—Jul.—8 Sept., in copula, passim; scilicet in Scania ad Lund, Räften (D. *Dahlbom*), Esperöd &c.; in Gotlandia ad Gothem, Stenkyrka, Furillen, Wamlingbo &c., haud rara; in Dalecarliæ alpibus a D. *Bohemian* in copula capta; in Botnia boreali ad urbem Luleå & ad Råbäcken; in Lapponia Lulensi ad Tjomotis, Mattisudden, Porsi & Quickjock, frequens, D. *Wahlberg*; e Dania sub nomine *Anthomyia duplicata* Meig. quoque missa; in Norvegia ad diversorum Suul in jugo alpino situm semel etiam inventa.

♂. Simillima priori, a qua tamen alarum nervis transversis haud rectis, & præcipue maris oculis tantum approximatis l. appropinquantibus, nec perspicue cohærentibus, differre videtur. Oculi nempe per lineam angustam nigram & orbitas albas nonnihil magis remoti, quam in præcedente. Alarum nervi transversi plerumque leviter infuseati & sæpiissime minus recti, quam in illa. Squamæ albidae. Abdominis puncta 4 nigra variant majora minoraque, rarissime vix ulla. Pedes nigri, genubus l. saltem fractura sæpiissime plus minus luteis. Reliqua ut in priori. — Ab *Aricia 4-maculata* Fall. n:o 87 (nobis), antennarum seta distinctius plumata & tibiis posticis in ♂ intus non villosis, imprimis dignoscitur.

Var. b. ♂. abdominis maculis nigris obsoletissimis, earum tantum vestigio. In Smolandia rariss., D. *Bohemian*.

25. *A. notata*: cana, capite argenteo-inicante; fronte non prominente; antennis breviter plumatis; thoracis maculis 3, scutelli unica basali, abdominalisque 4, nigris;

alis hyalinis, nervis: transverso ordinario recto, longitudinali 1:to versus apicem levissime inflexo; squamis albis; halteribus flavis; *mas*: oculis subcohærentibus. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Mas*: canus. Oculi per vittam frontalem angustatam (ut in *duplari*) atram & orbitas angustas albas disjuneti. Thorax antice maculis 2 majoribus quadratis approximatis nigris, & in medio fascia transversa lata ejusdem coloris, e cuius medio postico lineola nigra versus scutellum excurrit. Scutellum atrum, cano-marginatum. Abdominis subconici segmenta: 1:mum basi inæqualiter nigrum; 2 & 3 singulo maculis duabus majusculis, subtrigonis, atris; 4:tum plerumque lineola longitudinali nigricante;

*Fem.*: cinerea. Oculi modice remoti; vitta frontalis lata di-dyma nigra. Thorax aut plerumque vittis 2 latis abbreviatit brunneis aut maculis 4 brunneis quarum posticis interdum subconfuentibus. Scutellum cinereum, basi macula trigona fusca, cui alia minor ejusdem coloris in thorace opponitur. Abdomen ovatum, cinereum, segmentis: 1:mo maculis 2 transversis, 2:do 3:toque singulo maculis 2 subtrigonis, dilute brunneis; in copula,

*Musca* Fall. Museid. 62. 59. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 90. 11. ♂♀. *Spilogaster* Macq. Buff. 2. 296. 10. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 22.

Hab. in foliis fruticum plerumque in vicinitate aquæ, per Scandinaviam meridionalem & medium, Maj. & Jun. & iterum Aug. Sept., passim, in copula multoties capta; scilicet in Scania ubique vulgaris; in Blekingia, D. v. Borck; in Smolandia, D. Ljuugh; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c., haud rara; in Gotlandia ad Kjellunge & in palude Hellyvig; in Bahusia ad Marstrand; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; sed longius versus

seplentrionem procedens haec tenus non observata; e Dania ♀ sub nomine "*Anthon. maculosa* Meig." missa. (E Glogavia a D. Zeller sine synonymia, & e St. Sever a D. Leon Dufour sub nomine: "*Spilog. notata* Macq.", mihi communicata).

♂♀. Similis priori, sed differt: magnitudine paullo minore, antennis brevius plumatis, thoraeis pictura alia, abdominis maeulis majoribus trigonis, nec rotundatis, alarum nervo transverso ordinario exacte recto, spinula costæ nulla, ut & signaturis corgoris in ♀ dilute brunneis, nec nigris. Ab hac vero & aliis affinibus statim dignoscitur per alarum nervum longitudinalem 4:tum, qui antequam in margine excurrit, omnium levissime infleuit fere ut in *Cyrtoneura cæsia* (5) aut in *meditabunda* (11), cui etiam in variis aliis accedit. Area igitur media apice non omnino tam late aperta ac in *A. duplari*, 24. Alæ hyalinæ, immaculatæ, nervis minime infuscatis; costa tota nuda. Tibiæ parce spinulosæ.

26. *A. carbonella*: oblonga, nigra; capite argenteomicante; fronte haud prominente; antennis breviter plumatis; alis fuscanis; squainis albis; halteribus fusco-testaceis; abdome cinereo, maculis 4 magnis trigonis atris; mas: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Jenitlandiæ alpe Åreskutan, ubi 1—4 Aug. 1810 quinque individua inveni.

♂. Similis *A. vespertinæ* (20) & *nigriventris* (22), sed a priori magnitudine minore, antennis brevius plumatis, a posteriori halteribus (♂) testaceis, nec nigris, tibiis spinulosis (nec puberulis), uniclearatis, & ab utraque abdominis pictura, certe differt. Ab *A. nigrinervi* (21), cui pictura abdominis valde similis, magnitudine minore & halteribus haud obscuris, dignoscitur. Oculi non arete cohærentes, nudi. Thorax & scutellum nigricantia. Abdomen oblongum, subdepressum,

obscure cinereum, segmento 1:mo fere toto, 2:do & 3:to singulo maeulis duabus sat magnis, approximatis, subtrigonis, atris. Alæ fuscanae, margine interiori indeterminate subhyalino. Nervi ut in *vespertina* directi. Spinula costæ nulla. Squamæ albæ. Pedes simplices.

\*\*) Alarum nervus transversus ordinarius flexus.

**27.** *A. ambigua*: oblonga, obscure grisea, capite albo-micante; fronte subprominente; antennis distincte plumatis; thoracis lineis 3, abdominisque unica, nigris; alis subhyalinis, squamis halteribusque sordide albidis; *mas*: oculis subcohaerentibus. ♂. (Long.  $2\frac{3}{4}$  fere 3 lin.).

*Musca* Fall. Museid. 1823. p. 56. 13. ♂. (♀ ibi etiam allata hue non pertinet, sed ad *A. Lucorum* n:o 4 est referenda); genuina. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. Add. 192. 191. *Anthomyia divisa* Meig. Dipt. 1826. 5. 99. 27. ♂. certe. — *Hylemyia* Ejusd. Dipt. 7. 315. 11. *Anthomyza lineatocollis* Zett. Ins. Lapp. 679. 78. ♂.

Hab. in Suecia & Lapponia, Jul. Aug. minus frequens; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd &c.; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele rarissime, & Lulensi ad Quickjock in ripa arenosa ad Randijaur, D. *Andersson*; e pupa cylindrica nuda brunnea in superficie aquæ stagnantis ad Lund Scaniæ 28 Aug. inventa, die 14 sequentis mensis individuum exclusum vidi; ex Hafnia a D. *Staeger* sub nomine: "Anth. divisa" Meig. missa. (Ad Hamburg a D. *Dahlbom* Jul. 1838 capta).

♂. Similis & affinis *A. variabili* (16), a qua tamen oculis nudis, minus cohaerentibus, fronte magis prominula, abdominis linea dorsali obscura, ut & nervo transverso ordinario valde inflexo, abunde distincta. Oculi per lineam frontalem angustam nigram & orbitas albas, paullo l. an-

guste disjuncti. Frons leviter producta. Antennarum seta præcipue latere superiori distincte plumata, apice nuda. Os vix l. parum reflexum. Palpi filiformes, nigri. Thorax obscure griseus, vittis 3 latiusculis nigris. Scutellum plurimque nigricans, subnitidum. Abdomen oblongum, subcylindricum, pubescens, ante incisuras tenuiter setosum; totum griseum aut cinereum, linea dorsali integra perspicua, & incisnris obsolete, nigris. Tuberculum anale non magnum, nigrum; & præterea anus subtus laminis 2 pilosis nigris. Alæ hyalinæ (in majoribus leviter flavidо-fuseanæ), nervis non infuscatis. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem paralleli l. forte levissime divergentes; ille in apice alæ excurrens. Nervi transversi: medius perpendicularis, apici nervi longit. 1:mi oppositus; ordinarius mox ante medium areæ mediæ insertus, obliquus & distincte inflexus. Costa tota nuda; spinula costæ vix ulla. Squamæ non magnæ, albidae, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavidi. Pedes nigri, simplices. Tibiæ extus spinosæ. Pullilli sat magni, albi. — Individua 2 solitis minora, oculis magis cohaerentibus & nervo transv. ordinario minus flexo ad Åreskutan Jemtlandiæ & ad Garnæs Værdaliæ Norvegiae Jul. 1840 inveni, forte hujus, cui in ceteris similia.

*Obs.* Specimen, quod in collectione Falleniana sub nomine "*Musca ambigua* ♀" exstat, minime ad hanc speciem pertinet, sed ad *Aric. Lucorum* 4. Caveas ne *Ar. ambiguam* cum *Ar. frontata* infra n:o 64 confundas. Femina genuina *A. ambiguæ* mihi ignota, nisi specimen femineum: corpore cinereo, capite albido, oculis modice remotis, vitta latiuscula nigra, thoracis lineis subquatuor abdominisque unica, maculisque irregularibus, nigro-fuseis, antennarum seta non longe plumata, de cetero mari descripto simili, a D. Prof. *Wahlberg* ad Gusum Ostrogothiæ captum mihique sub indicio: "*Anthomyza ambigua?*" communicatum, provocare vellem.

28. *A. sordidiventris*: oblongo-ovala, obscure cinnerea, subnitida; capite albicante; fronte sub prominente;

antennis medioociter plumatis; thoracis lineis 4 nigris; abdome griseo, immaculato; alis subhyalinis, squamis halteribusque sordide albidis; mas: oculis subcohærentibus. ♂♀. (Long. 2½ — fere 3 lin.).

Hab. in foliis fruticum & graminosis Sueciae mediæ, 2—20 Jul., rarius; scilicet in Gotlandia ad Gotheni, Nähr (in horto) & Kräcklingbo pauca individua utriusque sexus inveni.

♂♀. *Anthom. (Hylemyiæ) allotallæ* Meig. Dipt. 6. 376. 215.  
affinis & similis videtur, sed alarum costa non ferruginea & vitta frontali maris angustata, nec "latiuscula", distincta. A priori, cui etiam similis, differt: corpore paullo latiore, antennarum seta non tam longe plumata, thoracis lineolis 4 (nec vittis 3) angustioribus, abdome immaculato, ut & alarum spinula costali distinctiori, nervis: transverso ordinario minus flexo, & longitudinalibus 3 & 4 apice divergentibus. — Subnitida. Oculi in ♂ per lineam angustatam nigram, & in ♀ per vittam frontalem didymam atram, disjuncti. Os non reflexum. Thorax obscure cinereus, lineis 4 tenuioribus nigris minus perspicuis. Scutellum obscure cinereum. Abdomen oblongo-ovatum, flavidо-griseo-micans (præsertim in ♀); immaculatum. Anus in ♀ acutus. Alæ hyalinæ, nervis basi ferrugineis. Nervi longitudinales versus apicem sensim divergentes, nempe horum 3:tius mox ante, & 4:tus longe pone apicem alæ excurrentes, unde area media apice latius aperta, quam in priori. Nervus transv. ordinarius, paullo ante medium areæ insertus, minus flexus minusque obliquus, quam in præcedente; interdum leviter infuscatus. Spinula costæ gemina distincta. Squamæ albidae, subflavido-marginatae; valvula inferior superiori major. Halteres flavi. Femora subtus & tibiae præsertim in apice, valide spinosa. — Ab *A. incana* (3), cum qua facile confundi potest, magnitudine paullo minore, antennis minus longe

plumatis, ore minus reflexo, abdomine immaculato, ut & alarum nervo transv. ordinario non nihil minus inflexo, abunde differt.

*Obs.* *Aricia verticina* (n:o 63) &c. antennarum seta breviter plumata l. pubescente in Subdivisione Secunda quærendæ (cfr. Conspectus).

B. Squamæ sub alis parvæ: valvula superior inferiorem tegens. Antennarum seta longe plumata. *Hylemyia* Macq. Meig.

†. Nervus transversus ordinarius rectus. Tibiæ posticæ spinosæ.

29. *A. variata*: oblonga, grisea, opaca; capite cinereo; fronte sub prominula; thoracis lineis subtribus abdominalisque convexi unica dorsali, fuscis obsoletis; alis hyalinis, costa ciliata, spinulaque distincta; nervo transverso ordinario leviter flexo; squamis halteribusque albidis; mas: oculis arctissime cohærentibus. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

Mas: oculis versus verticem intime connexis; thoracis lineis subquinis, lateralibus obsoletis; abdomine subcylindrico, linea dorsali media distincta, & incisuris sœpe, fuscis;

Fem.: oculis modice remotis, fronte cinerea vitta latiuscula nigra antice plerumque macula supra antennas rufa, postice macula cinerea; thorace obsoleto brunneo-lineato; abdome subdepresso, subimmaculato; ano acuto; in copula.

*Musca* Fall. Musc. 59. 51. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 97. 24. ♂♀. Zett. Ius. Lapp. 667. 25. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 315. 8.

Hab. in foliis fruticum, libenter etiam in graminosis, per hortos & prata Scandinaviæ, 4 Maj.—Jun. Jul. Aug.—

**15** Sept., vulgatissima, in copula multoties observata; scilicet in Seania ubique copiose; in Blekingia (*v. Borek*), Smolandia (*Ljungb & Bohemus*), Ostro-Westrogothia & Ölandia, haud raro; in Gotlandia ad Stenkyrka, Thorsborg, Nähr, Gothem, Fårön, Furillen, Eke, Öja, Hoburg &c., frequentissime; in Nericia & provinciis magis borealibus usque ad Skalstugan Jemtlandiae, rarius; in Lapponia mihi non nisi ad Lycksele obvia; in Norvegia ad divisorium Suul in jugo alpino situm, parce; in Dania, D. *Dahlbom*. (Ad Neuenkirchen Germaniae tempore verno frequenter legerunt D. D. *Hornschatz* & *Dahlbom*. E Glogavia sub nomine: *Anth. variata*, a D. *Zeller* quoque communicata).

♂♀. Parva, angusta, opaca, grisea. Pictura corporis, alarum costa (saltem ad medium) distinete ciliata, spinula costalis perspicua, ut & oculi in ♂ arete cohærentes, maculaque supra antennas longe plumatas in ♀ sæpissime flava, speciem ab affinibus facile designant. Frons non longe producta. Antennæ longitudine fere epistomatis. Os haud reflexum. Scutellum cinereum, immaculatum. Abdomen haud depresso, ante incisuras setulosum. Alæ cinereo-hyalinæ, immaculatae. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli, nec versus apicem divergentes; ille in summo apice excurrens. Nervus transv. ordinarius paullo ante medium areæ insertus, parum obliquus, leviter flexus. Squamæ parvæ, albæ, valvula inferior minuta a superiore tecta. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri. Tibiæ spinosæ. — Caveas ne hanc cum *Aricia florali* infra n:o 147 confundas.

**30.** *A. lasciva*: oblonga, nigra, parum cinereo-micans; capite albicante; fronte haud prominula; thoracis lineis 3 nigris; abdomine subdepresso obscure cinereo, linea dorsali atra; alis hyalinis, costa subciliata, spinula

parva; nervo transverso ordinario recto; squamis albis, halteribus pallidis; *mas*: oculis arte cohærentibus. ♂♀.  
(Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: nigricans; oculi arte cohærentes; abdomen oblongum, sublineare, subdepressum, pilosum, obscure cinereum, linea dorsali atra; anus obtusus, inflexus, cinereus;

*Fem.*: cineraceens; oculi modice remoti; frons cana, vitta lata certo situ atro-micante, postice maenula grisea; abdomen oblongo-ovatum, subdepressum, pilosulum, cinereum, linea dorsali nigra; anus acutus; in copula.

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 666. 22. ♂♀.

Hab. in Sueciæ graminosis, Jun. Jul. rarius; in Scania ad Fogelsång & Esperöd quinque paria in capula juneta inveni; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, ♂, D. Wahlberg; in Lapponia Tornensi ad Wittangi rarissime quoque visa. Veneri cupida.

♂♀. Priori valde similis & affinis; sed magnitudine nonnihil minore, colore corporis paullo obseuiore, fronte non prominente, alarum costa subnuda seu parum ciliata, spinula minore, nervo transverso ordinario exaete recto, ut & abdome præsertim in ♂ angustiore magis depresso, linea dorsali nigra integra, certe differt.

31. *A. flavigennis*: oblonga; nigra, nitida; capite albido-micante; fronte haud prominula; alis, squamis halteribusque flavis; nervo transverso ordinario recto; proboscide crassa; *mas*: oculis cohærentibus. ♂♀. (Long. 2 lin.).

*Mas*: niger, oculis postice cohærentibus; abdome angusto, linearis, depresso, piloso; ano obtuso crassiusculo; tarsorum pulvillis longis, albidis;

*Fem.*: nigra, thorace sentelloque cinereo-micantibus; abdome oblongo-ovato, subdepresso, parce piloso; ano acuto;

oculis modice remotis, vitta frontali lata atra; tarsorum pulvillis minutis; in copula.

*Musca flavipennis* Fall. Muscid. 1823. 59. 52. ♂♀.  
genuina. — *Anthomyia crassirostris* Meig. Dipt. 1826.  
5. 107. 42. ♀. *Hylemyia* Macq. Buff. 2. 319. 16. ♂♀.  
Meig. Dipt. 7. 315. 14.

Hab. in *Urtica dioica*, *Pteride aquilina* &c., per prata & silvas Sueciæ meridionalis & mediae, 2 Jul.—4 Aug., passim, in copula; scilicet in Scania in silva umbrosa Faginea ad Lindholmen semel copiose, alibi rarius; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Gotlandia ad Stenkyrka, Martebo &c. passim. (Par in copula ad St. Sever Gallæ captum Nobilissimus D. *Leon Dufour* sub nomine "*Hylemyia crassirostris* Macq." 1814 benigne communicavit).

♂♀. Per colorem nigrum, nitidum, alas flavas & proboscisdem crassam ab affinis facile dignota. Antennæ punctatae longe plumatae. Proboscis in mortuis plerumque dentata. Palpi filiformes. Oculi in viva obscure ferruginei. Thorax leviter cinereo-micans, lineis 3 obscuris, obsoletis. Abdomen leviter cinereo-micans (imprimis in ♀), linea dorsali obscura, obsoleta. Alæ præsertim basi & costa flavæ, cæsiæ ciliata. Spinula adest. Nervi ut in priori directi, sed nervus transv. ordinarius fere in medio areo insertus. Pedes validi, distincte spinosi, nigri.

*Obs.* Nomen triviale Fallenianum antiquitatem habet. Præterea Cel. Meigen, postquam speciei, jam ad *utrumque* sexum cognitæ & publicatæ, nomen novum "*crassirostris*" imposuit, alterum tamen tantum sexum l. c. descripsit.

32. *A. grisea*: oblonga, subcylindrica, opaea, caeca; capite buceato, albido, macula utrinque obscura; thoracis lineis subtribus obsoletis, abdominalisque unica, brun-

neis; alis cinerascentibus, squamis albis, halteribus flavis;  
*Mas.*: oculis subcohaerentibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas.*: corpore angusto, cylindrico; ano obtuso; oculis approximantibus, vitta frontali angustata atra & orbita angusta alba disjuntes;

*Fem.*: corpore oblongo, abdomine oblongo-conico, ano acuto; oculis late remotis, nempe per vittam frontalem subangustatam atram & orbitam latam albam separatis.

*Musca* Fall. Muscid. 57. 4. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 91. 20. ♀. *Hylemyia* Macq. Buff. 2. 319. 11. ♀. Meig. Dipt. 7. 315. 18.

Hab. in primis ad littora maris plerumque locis salubiosis, per Scandinaviam, 18 Jul.—20 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Limhamn, Sandhammar, Esperöd &c., passim; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Westrogothia, D. D. *Gyllenhal* & *Dalman*; in Norvegia ad diversorum Oestre Næs Værdaliæ rarissime, D. *Dahlbom*. Larvæ in larvis Hymenopterorum aculeatorum parasitæ vivunt.

♂♀. Corpore subcylindrico cano & capite buccato ab affinibus praecipue dignoscitur. Caput album, nitens, nudum, macula utrinque juxta oculos subquadrata nigro-micante. Frons distincte porrecta. Antennæ epistomate fere duplo breviores. Palpi cylindrici, nigri, basi flavi. Thoracis dorsum lineis subtribus ferrugincis obsoletis, lateralibus parum perspicuis. Scutellum immaculatum. Abdomen ante incisuras setosum, linea dorsali segmenta 2, 3 & 4 transeunte ferruginea; In ♀ obsoleta. Alæ cinereo-pallescentes, costa parum ciliata, spinula parva. Nervi ut in *A. lasciva* (30) directi. Pedes spinosi, nigri, cinereo-micantes, trochanteribus & fracturis genuum plerumque ferruginantibus.

*Obs.* *Anthomyza leptogaster* Zett. Ins. Lapp. 666. 22., ut

var. b. tibiis obscure testaceis, ad *Anthomyzam coarctatam* infra (n:o 10) potius referenda.

††. *Nervus transversus ordinarius inflexus.* Tibiae præsertim posticæ fortiter spinosæ.

33. *A. hilaris:* oblonga, angusta, cana; capite albidō, macula utrinque obscura; fronte prominente; thoracis linea media postice dilatata, maculisque utrinque 2, scutelli margine laterali abdominisque fasciis 3 sinuatis, atris; alis hyalinis; antennarum seta longe plumata; mas: oculis subcohaerentibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ —3 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 53. 41. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 91. 19. ♂♀. T. 41. f. 9. ♀. Zett. Ins. Lapp. 666. 21. ♂♀. *Hylemyia* Macq. Buff. 2. 319. 13. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 315. 17.

Hab. in truncis arborum viventium, ligno cæso Populi &c., etiam in truncis exsiccatis, per silvas & hortos Sueciæ & Lapponiæ, 4 Jul.—25 Aug. passim; scilicet in Scania ad Lund &c. rarius; in Smolandia, D. D. *Bohemani* & *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Stenkyrka, Lummelund &c. raro; in Helsingia ad Kårböle, D. *Dahlbom*; in Jemtlandia ad Ås, Östersund, Faxelfven &c., frequens; in Lapponia Umeusi ad Åsele & Badstuträsk rarius; mas semper parcius occurrit.

♂♀. Similis priori, a qua vero antennis paullo longioribus, capite minus buccato, thoracis signaturis magis perspicuis, atris (nec brunneis), lateralibus maculiformibus, scutello lateribus nigro, abdominis incisuris atris, ut & alis hyalinis, nervo transverso ordinario distincte infexo, abunde dignoscitur. Caput argenteum. Frons prominens. Oculi mediocres,

in ♂ per lineam frontalem angustam nigrum & orbitas latinusculas modice late separati; in viva ferruginei. Palpi cylindrici nigri. Thoracis maculæ laterales 4, quarum 2 humerales rotundatae, & 2 ante alas oblongæ; linea media postice dilatata, rotunda. Abdomen in ♂ angustum, lineare, pilosum, ano obtuso inflexo; in ♀ conicum, ano acuto; in utroque sexu ante incisuras setosum; singulo segmentorum 2, 3 & 4 basi fascia sinuata atra, & linea media longitudinali obscura certo situ perspicua. Segmentum basale geminatum, unde quinque segmenta exstant. Alarum nervi ut in priori directi, sed transversus ordinarius fere in medio areæ mediæ insertus, obliquus & plerumque valde inflexus. Costa parum ciliata & spinula parva. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes validi, nigri, leviter cincinno-micantes. — Cave ne hauc cum *Anthomyza lata* infra, n:o 7, confundas.

*Obs.* In Meigeni descriptione maris hujus speciei dicuntur: "scutellum immaculatum" & "pedes basi ferruginei." In omnibus vero meis speciminibus, iisque multis, scutellum nigro-marginatum & tibiae totæ nigræ semper deprehenduntur. Nullus tamen de identitate dubito. Forte juvenilia exempla ante oculos habuit Cel. Meigen?

34. *A. festiva*: oblonga, angusta, cana; capite albido; fronte prominente; thoracis linea media æqualiter lata, maculisque utrinque 2, scutelli margine lateralí abdominisque vitta dorsali & incisuris, nigris; alis hyalinis; antennarum seta breviter plumata. ♀. (Long. 3--3½ lin.).

Hab. in truncis arborum viventium, per Succiam medianam, valde rara; tria tantum specimina lustravi: unum in Smolandia ad Skärsjö captum; alterum in Ostrogothia ad Lärketorp 17 Jul. 1833 inventum, & tertium etiam in Ostrogothia ad prædium Sätra 3 Aug. 1824 deprehensum.

♀. Valde similis & affinis priori; sed magnitudine paullo majore, maculis lateralibus obscuris juxta oculos valde obso-

letis vix nisi certo situ in rudimento conspiciendis, antenarum seta densissima sed brevius plumata, thoracis linea dorsali media multo latiore, postice hand dilatata, abdominis incisuris latius nigris, vitta dorsali nigra latiore, distinctiore, ut & alarum nervis transversis leviter subfuscatis, certe diversa. — Palpi atri, clavati. Thoracis dorsum certo situ fusco-subquinque-lineatum appetet, lineolisque aliis 4 ad maculas humerales & vittam medianam sitis, ferrugineo-brunneis, instructum. Reliqua ut in *A. hilari*. (Cfr. etiam *Ar. Histrio* n:o 127).

*Sect. Secunda.* Oculi in utroque sexu distantes.  
*Coenosia Auctorum.*

35. *A. obtusipennis*: oblonga, griseo-cinerea, opaca; fronte parum prominente; thoracis lineolis 4, abdominisque punctis totidem minutis obsoletis, nigricantibus; alis obtusis, hyalinis, nervo transverso ordinario recto; squamis albidis; geniculis summis ferrugineis; antennis longe plumatis. ♂♀. (Long. 3 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 57. 46. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 193. 192. (ut *Coenosia*). — Zett. Ins. Lapp. 666. 20. ♂♀.

Hab. in graminosis & foliis fruticum, per hortos & silvas Scandinaviae, 8 Jul.—24 Aug., minus frequens; sci-jicit in Scania ad Tranås, Esperöd in paroecia Mellby, &c., passim; in Smolandia, D. Boheman; in Lapponia Umensi ad Lycksele, semel; in Norvegia ad Næs Værdalii & Björkvik Nordlandiæ, rarius; e Dania a D. Staeger communicata.

♂♀. Flavescenti cinerea, setosa. Caput canescens. Oculi late (♂), aut latissime (♀) remoti; vitta frontali lata atra, macu-

la verticis grisea. Antennæ epistomate paullo breviores, angustatæ, nigræ, seta longe plumata. Os non reflexum. Palpi subcylindrici nigri. Thorax antice lineis 4 angustis, obscuris. Scutellum immaculatum. Abdomen oblongo-ovatum, griseum, ante incisuras setosum, punctis in segmentis 2 & 3 quatuor parvis, fuscis, obsoletis, interdum parum perspicuis. Anus in ♂ obtusus, inflexus, nigricans; in ♀ acutus, cinereus. Alæ longitudine fere abdominalis, latiusculæ, rotundatae, cinereo-hyalinæ. Nervi ut in *Ar. variata* (29) directi. Nervus transv. ordinarius subrectus. Costa ad medium perspicue ciliata. Spinula costæ distincta. Squamæ mediocres, albidae, valvula superiori inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes sat validi, nigri, geniculis summis in utroque sexu, & tarsorum articulo penultimo in ♂, ferrugineis. — Variat nervis transversis leviter infuscatis; variat etiam junior tibiis anticis obscure piceis.

*Divis. Secunda.* Seta antennarum pubescens (cfr. Conspectus pag. 1371).

*Tribus 1:ma.* Ocoli in utroque sexu nudi.

α. Femora antica subtus in ♂ uni- 1. bidentata.

*Hydrotœa* Macq. Meig.

a.) Nervus longitudinalis 4:tus versus apicem levissime flexus. Frons supra antennas puncto niveo.

36. *A. dentipes*: oblongo-ovata, nigra; capite albicans; thoracis vittis anticis albidis; abdomine cinereo-micante, linea dorsali nigra; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario leviter flexo; squamis albidis; mas: oculis appropinquantibus, femoribus anticis subtus unidentatis. ♂♀. (Long. fere 3 lin.).

*Musca* Fabr. Autl. 303. 95. ♂. Fall. Muscid. 60. 51. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 144. 105. ♂♀. Zett. Ins.

Lapp. 667. 27. ♂♀. *Hydrotæa* Macq. Buff. 2. 303. 1. ♂♀.  
Meig. Dipt. 7. 324. 12. — *Anthomyza anxia* Zett. Ins. Lapp.  
668. 29 est varietas feminea hujus.

Hab. in graminosis, foliis fruticum, lapidibus &c., per hortos, prata & silvas Scandinavie, 20 Maj.—30 Sept., vulgatissima, in copula multoties deprehensa; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westro-gothia & Uplandia, frequentissima; in Ölandia passim; in Gotllandia ad Nähr, Fårön &c., haud rara; in Dalecarlia; in Jemtlandia usque ad Mullsjellet parce: in provinciis borealibus rarius occurrit, & in Lapponia Lulensi ad Quickjock a D. *Bohemian*, atque in Tornensi tantum ad Junosuando & Wittangi a me lecta; in Norvegia ad Christianiam &c. rarius; in Dania frequens. (Ad Neuenkirchen jam 15 Maj., in hortis Gryphicis, & in Helgolandia, a D. *Dahlbom* copiose visa; e St. Sever Galliae a D. *Leon Dufour* etiam missa). Mas sedens pedes posticos fere rectos gerit. Larvae in stercoratis & vegetabilibus putridis mensib. Julio & Aug. inveniuntur.

♂♀. Magnitudo *Muscae domesticæ*. Frons parum prominens. Oculi magni, vitta in ♂ angustata atra, in ♀ lata nigra, disjuneti. Antennæ epistomate duplo breviores, latiusculæ, seta longa, basi incrassata ibique breviter pubescente. Os non reflexum. Palpi nigri, extrorsum subincerassati. Thorax niger, parum nitidus, antice vittis 5 obsoletis albidis. Abdomen ovatum, pubescens, apice setulosum, totum glauco-cinereum, maculis fusco-micantibus, linea media nigra, in ♂ evidenter. Anus obtusus (♂), aut acutiusculus (♀). Alæ levissime fuscaneæ (♂), aut hyalinæ (♀). Nervi longitudinales 3 & 4 non exakte paralleli, sed hic versus apicem non-nihil inflexus; ille in summo apice alæ excurrentes; hinc area versus apicem levissime coarctata. Nervi transversi: me-

dius apiei nervi long. 1:mi praeise oppositus; ordinarius paullo ante medium areæ insertus, leviter flexus. Costa mutica. Spinula nulla. Squamæ mediocres, ciliatae, albæ, valvula superiori inferiorem non tegente. Halteres albidi, clava obseura. Pedes nigri. *Mas*: femoribus anticis versus apicem subtus spina unica, brevi, subinflexa, armatis; tibiis ejusdem paris intus leviter incisis; femoribus intermediis basi subtus dense villosis.

**37.** *A. palæstrica*: oblonga, nigra; capite albicante; thorace antice obscure cinerascente, vittis 3 nigris; abdomine cinereo, linea dorsali nigra; alis squamisque fuscans, nervo transverso ordinario flexo; *mas*: oculis appropinquantibus, femoribus anticis subtus unidentatis. ♂. (Long. fere 3 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 135. 93. ♂. *Hydrotæa* Meig. Dipt. 7. 324. 6.

Hab. in foliis fruticum Sueciæ meridionalis, 10 Jun. —15 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c. haud rara. In Sueciæ provinciis superioribus mihi non obvia. (E Glogavia a D. Zeller sub eodem nomine communicata).

♂. Simillima priori, a qua tamen alis magis fuscans, nervo transverso ordinario distinete flexo, squamis dilute bruneis, nec albis, ut & abdomine cinereo, linea media nigra perspicua, sed præterea maculis fusco-micantibus nullis ornato, certe distincta. Caput omnino ut in præcedente. Thorax niger, subnitidus, antice certo situ obscure cinerascens, vittis 3 latis nigris. Abdomen oblongum, cinereo-cinnatum, linea dorsali integra, nigra. Alæ fuscans, basi fusco-flavescentes. Pedes exaete ut in prioris mare.

**38.** *A. bispinosa*: oblongo-ovala, cærulescenti nigra, nitida; capite albicante; abdominis segmentis basi

albo-micantibus, linea dorsali nigra; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario recto; squamis albidis; *mas*: oculis cohærentibus, femoribus anticus subtus bidentatis. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Lapponiis Lulensi & Tornensi rarissime; tria tantum individua lustravi, unum scilicet ad Muonio-niska d. 17 Aug. 1821 a me inventum; alterum e Grönlandia per D. Westermann communicatum; & tertium in Lapponia Lulensi ad Quickjock mense Julio 1843 a D. Boheman lectum.

♂. *Ar. dentipedi* (36) valde similis & affinis, sed magnitudine paullo minore, oculis nonnihil magis cohærentibus, colore corporis magis in cœruleum vergente, thorace antice vix albo-vittato, abdome cœrulecente tantum segmentorum basi & lateribus glanco-albido, alarum nervo transverso ordinario recto, ut & femoribus anticus subtus versus apicem dentibus duobus brevibus obtusis armatis, intermediis subtus totis æqualiter, nec basi fasciculatim, villosis, vere distincta. Ab *Aricia meteorica* (39) & *irritante* (40), quibus etiam similis, nervis longitudin. 3 & 4 non exakte parallelis &c., & ab *Ar. spinipede* n:o 93, oculis nudis, nec hirtis, &c., mox digneatur. Halteres nigri, basi fusi. Pedes pilosi.

♀, a me non visa, a D. Wahlberg in janua templi Quickjucken-sis in unico exemplo capta erit.

b.) Nervus longitud. 4:us rectus. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

\*). *Mas*: femoribus anticus subtus bidentatis.

39. *A. meteorica*: ovata, halteribus nigris; *mas*: thorace atro, abdome obscure cinereo, linea dorsali nigra, tibiis posticis intus nudis; *femina*: obscure cinerea, thorace nigro-vittato. ♂♀. (Long. 1½—1¾ lin.).

*Mas*: pilosus; oculis arete cohærentibus; thorace & scutello atris, opacis; abdomen obscure cinereo, linea dorsali atra; alis squamisque fuscanis; halteribus nigris; femoribus antieis subtus versus apicem bispinosis; tibiis anticis basi coaretatis;

*Fem.*: parce setosa; oculis modice remotis; vitta frontali latiuscula nigra; orbita oculorum anguste alba; corpore obscure cinereo, thorace antice lineis angustis nigricantibus obsoletis; alis hyalinis, basi & squamis flavido-albis; halteribus fuscis; pedibus nigris simplicibus; in copula.

*Musca* Linn. Fn. Su. 1849. ♀. Fabr. Antl. 306. 110. Panz. Fn. Germ. I. 19. ♀. Fallén Muscid. 64. 63. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 137. 96. ♂♀. Zelt. Ins. Lapp. 668. 32. ♂♀. *Hydrotæa* Macq. Buff. 2. 306. 12. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 324. 9. *Musca vaccarum* De Geer. Ins. 6. 85. 14. T. 5. f. 1.

Hab. in foliis fruticum & graminosis; mares choreas in aëre ducunt; feminæ equos & alia animalia infestant; larvæ ex intestinis hominum sæpe proventæ; occurrit per totam Scandinaviam sub tota æstate ubique longe frequentissima; in ipsis alpibus nivalibus Lapponiae usque ad terminum vegetationis adscendens. In copula sæpe deprehenditur. *Mas* sub nomine *\*Hydrot. velutina* var. *minor*? e Dania missa. (E Neuenkirchen a D. Dahlbom, atque e Glogavia & Reinerzi a D. Zeller, communicata).

♂♀. *Musca domestica* minor. Oculi magni. Frons non prominens. Antennæ epistomate paullo breviores, angustatæ, seta breviter pubescenti, basi parum incrassata. Os non reflexum. Palpi cylindrici, nigri. Abdomen ovatum, postice setosum. Alarum nervi transversi: medius apici nervi long. 1:mi oppositus; ordinarius longe ante medium areæ mediæ angustatæ insertus, parum obliquus; rectus 1: levissime subflexus. Nervus longitudinalis 3:tiis in summo

apice alæ descendens. Costa mutica; spinula nulla. Squamæ mediocres valvula superiore inferiorem non tegente. Pedes parce spinulosi, femoribus in ♂ longiusculis. Tibiæ posticæ rectæ, intus nudæ.

40. *A. irritans*: ovata, halteribus flavis; *mas*: thorace nigro, abdomine cano, linea dorsali nigra, tibiis posticis intus nudis; *femina*: obscure cinerea, subimmaculata. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Mas*: pilosus; oculis arcte cohærentibus; thorace scutelloque nigris, subnitidis, abdomine læte cinereo, linea media nigra; alis squamisque leviter fuscaneis; halteribus testaceis; femoribus antieis versus apicem bispinosis, posticis elongatis, tibiis anticis basi bis incisis, posticis subincurvis, intus a basi ultra medium nudis;

*Fem.*: parce setosa; oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula fusca; orbita oculorum cana; corpore cinereo, thorace vestigio linearum fuscuarum; alis hyalinis, basi & squamis albidis; halteribus flavis; pedibus nigris simplicibus; in copula.

*Musca* Fall. Muscid. 62. 58. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 134. 91. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 668. 30. ♂♀. *Hydrotaea* Macq. Buff. 2. 306. 13. Meig. Dipt. 7. 324. 4.

Hab. in graminosis & floribus, per prata & silvas totius Scandinaviæ, Jun.—Sept., ubique longe frequentissima, in copula multoties lecta; viatores etiam tenaciter persequitur, valde molesta, præsertim femina, quæ præterea in Vaccis nigris sæpe copiose observata. (Ad Hamburgum a D. *Dahlbom* frequenter visa; & e Kilia a D. *Wiedemann* etiam communicata).

♂♀. Simillima priori, sed magnitudine plerumque paullo majore, & præterea maris thorace minus atro, abdomine latiore & cano (nec obscure cinereo), alis squamisque le-

vius fuscans, halteribus clava tantum subfuscis, tibiis anticis magis incisis, pedumque posticorum femoribus longioribus, angustioribus, tibiis subarcuatis; atque *feminæ* corpore subimmaculato, vere distincta. — Punctum album supra antennas in utroque sexu adest.

Var. b. ♂♀. in copula; oculis, præcipue maris, breviter & tenuissime hirtis; de cetero varietati a. ut ovum ovo similis, minime diversa. In Scania ad Lund & Esperöd, atque in Ölandia, passim. (Ad Hamburgum cum varietate genuina a D. *Dahlbom* captæ).

\*\*). *Mas*: femoribus anticis subtus unidentalis; oculis arte cohærentibus.

41. *A. velutina*: ovata, aterrima; capite obscure cinereo; abdomine cinereo-micante, linea dorsali nigra; alis leviter fuscans, basi squamisque brunneo-flavis; halteribus nigricantibus; pedum posticorum femoribus subelongatis, parum arcuatis, tibiis leviter curvatis, intus nudis. ♂. (Long. 2½ lin.).

*Hydrotæa* Rob. Desv. n:o 13. Macq. Buff. 2. 305.

10. ♂. Meig. Dipt. 7. 325. 18. ♂.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; in Scania semel lecta; e Dania sub nomine: "*Hydrotæa meteorica*" Meig. Fall." missa. (E *Glogavia* etiam communicata).

♂. *Ar. meteorica* 39, paullo major, magnitudine nempe *A. irritantis*. Differt præterea a *meteorica* ab domine latiore, cano, nec obscure griseo, ab *irritante* thorace nigro velutino, halteribus nigris, nec testaceis, femoribus posticis modice elongatis & mediocriter angustis, tibiis anticis basi coarctatis, nec bituberculatis, & ab utraque femoribus anticis subtus versus apicem dente tantum uno parvo brevi armatis. Caput omnino ut in *meteorica*. Alarum nervi etiam ut in illa directi, sed nervus transvers. ordinarius leviter flexus.

**42.** *A. curvipes*: ovata, nigricans; capite albido; abdome flavo, linea dorsali nigra; alis leviter fuscanis, basi, squamis halteribusque flavidis; pedum posticorum femoribus elongatis, basi angustis, tibiisque arcuatis, his medio intus penicillatis. ♂. (Long. 2½ lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 90. 121. ♂. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 136. 95. ♂. *Hydrotaea* Macq. Buff. 2. 305. 7. ♂. Meig. Dipt. 7. 321. 8. T. 71. f. 20. ♂.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel inventa.

♂. Magnitudo, statura & summa *A. irritantis* (40) similitudo, sed oculis fere majoribus, in fronte antice longius cohærentibus, abdome late ovato flavo-pellucido, linea tantum dorsali & apice ani obscuris, pedibus posticis adhuc longioribus, tibiis ejusdem paris intus in medio fasciculo pilorum nigrorum, ut & femoribus anticis subtus unidentatis, differt.

**43.** *A. scambus*: ovata, atra; capite nigricante; abdome obscure griseo, linea dorsali nigra; alis subhyalini, squamis albidis, halteribus nigris; pedum posticorum femoribus elongatis, basi angustis, tibiisque valde, arcuatis, bis medio intus seta erecta. ♂ (♀). (Long. circiter 2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 668. 31. ♂.

Hab. in Suecia boreali rarissime; in Lapponia Umensi ad Lycksele individuum unicum 1832 inveni; in floribus Ranunculi ad Skalstugan Jemtlandiae d. 16 Jul. 1840 specimen quoque legit Cel. D. Dahlbom.

♂♀. Priori iterum valde similis; sed vere differt: capite thoraceque nigrioribus, abdome minus inflato, obscure griseo,

nee flavo, alis vix l. parum fuscans, squamis albidioribus, halteribus nigris, nee flavis, tibiis posticis magis arena in medio seta elongata erecta apice inenrva & parte posteriori (a seta ad apicem tibiæ) intus distincte ciliata. Antennæ parvæ, epistomate duplo breviores. Frons & distinete pilosa. Abdomen griseum aut cinereum, linea media nigra; præsertim postice sat dense pilosum. Tibiae antice basi intus incisæ. Femora postica longa, arcuata intus subouda, extus pilosa.

♀ similis mari descripto, sed tota atra & dorsum oenlis motis, halteribus testaceis, pedibus simplicibus; forte hujus femina; in Jemtlandia ad Åreskutan & Mulfjellet 24 Jul.-4 Aug. 1840 rarissime.

41. *A. armipes*: ovata, capite late cinereo; puncto supra antennas albo; alis subhyalinis, squamis albidis, halteribus nigricantibus; *mas*: thorace nigro, abdomine cinereo, linea dorsali obscura; pedibus posticis modice elongatis; femoribus subtus in medio seta erecta; tibiis subrectis intus in medio penicillatis; *femina*: cinerea, subimmaculata, pedibus simplicibus. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 75. 86. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 138. 98. ♂♀. *Hydrotæa* Macq. Buff. 2. 305. 8. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 321. 11.

Hab. in Scandinavia meridionali passim; in copula sæpe capta; scilicet in Scania ad Lund, Rästen, Lindholmen &c., haud infreuenter; in Dania, D. *Staeger*. (E Glogavia a D. *Zeller* sine synonymia communicata). Autumno & hieme larvæ in stercore bovino antiquo sæpe inventæ. Imagines jam mense Majo declarantur.

♂♀. Valde similis & affinis *Ar. meteoricæ* (39), & *irritanti* (40), sed a priore abdomine *maris* latius cinereo, alis squamisque parum fuscans, pedibus posticis aliter vestitis,

thoraceque feminæ subimmaculato; a posteriore magnitudine minore, halteribus obscuris, nec flavis, tibiis antieis basi coaretatis, nec tuberculatis, pedumque posticorum vestitu; & ab utraque femoribus antieis subtus in ♂ uni-, nec bidentatis, certe distincta. — Seta antennarum subnuda. Oculi in ♂ cohærentes; in ♀ modice distantes, vitta frontali nigra, cinereo-micante, opaca, macula verticis subnitida. Abdomen ovatum, tenuiter pilosum. *Mas:* pedes postici subelongati, femoribus subangustatis, subtus in medio seta tenui erecta, apice pilosulis, tibiis rectiusculis, intus in medio fasciculo pilorum, & postice (inter fasciculum pilorum & apicem tibiae) ciliatis & pilosulis. — Variat ♂ femoribus posticis subtus in medio setula gemina.

*Obs.* Specimina Falleniana ("♂ & ♀ in copula semel juneta") paullo minora sunt & nitidiora (forte detrita), præsertim femina; sed in essentialibus nihil differunt ab exemplis utriusque sexus majoribus, quæ in Scania & Dania haud raro colliguntur. — Cum *Ar. occulta* n:o 95, quæ oculis hirtis gaudet, non confundenda.

45. *A. glabricula*: ovata, nigra, nitida; epistomate cinereo; alis subhyalinis; squamis albidis; halteribus nigricantibus; femoribus antieis in ♂ subtus unidentatis, pedibus posticis in utroque sexu simplicibus. ♂♀. (Long. fere 1 lin.).

*Musca* Fall. Museid. 75. 87. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 155. 126. ♂. (♀ l. c. allata ob "frontem obscure cinereum" ad aliam speciem forte referenda). — Zett. Ins. Lapp. 687. 117. var. a. ♂♀. — *Hydrotæa* Macq. Buff. 2. 305. 11. Meig. Dipt. 7. 324. 13.

Hab. in Scandinaviæ fruticibus & floribus, 24 Jun.— 15 Aug., passim; in copula; seilicet in Scania ad Lund, Rästen, Tranås, Esperöd &c., haud rara; in Ostrogothia ad Wadstena, minus frequens; in Lapponia Umensi ad

Wilhelmina, parce; in Nordlandia Norvegica ad Björkvik, & in iuferalpinis Finmarkiae ad Bossekop, raro.

$\delta\varphi$ . Minuta, tota nigra, nitida. Ocoli in  $\delta$  longe & arete cohærentes; in  $\varphi$  modice remoti, interstitio frontali toto nigro nitidissimo. Frons non prominula. Punctum supra antennas in utroque sexu niveo, in  $\delta$  præsertim perspicuo. Autennæ breviuseulæ, seta subnuda. Epistoma obseure cinereum. Alarum nervi ut in prioribus directi, & transversi perpendiculares, recti & paullo approximati. Squamæ albidae. Halteres nigri. Abdomen breviter ovatum, parum setulosum. Pedes medioeres, femoribus anticis in  $\delta$  subtus unispinosis, tibiis basi leviter coaretatis. Femora & tibiae postica in utroque sexu recta. — Cum *Lauzanüs*, *Madizis* & *Agromyzis* non confundenda.

*Obs.* *Anthom. glabricula* var. b. & e. Zett. Ins. Lapp l.c. non ad hanc speciem pertinent, sed var. b. ad *Aric. stygiam* (175), & var. e. ad *Aric. occitam* (95) referendæ.

#### B. Femora antica in utroque sexu mutica.

*Subdiv. I:ma.* abdomine aut nigro aut cinereo; subimmaculato aut linea tantum dorsali plus minus dilatata l. sinuata instructo, sed nullis maculis discretis ornato.

*†.* Nervus transversus ordinarius rectus aut subrectus.

**46.** *A. leucostoma*: ovala, cœrulecenti atra, immaculata, nitida; epistomate maculaque supra antennas albis; alis albido-hyalinis, nervis pallidis, squamis fuscis; *mas*: oculis cohærentibus, tibiis posticis incurvis, intus pilosis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Wied. Zool. Magaz. I. I. 82. 34.  $\delta\varphi$ . Fall. Muscid. 61. 56.  $\delta\varphi$ . *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 160. 136.

$\delta\varphi$ . Ejusd. 7. 326. I. Zett. Ins. Lapp. 667. 28.  $\delta\varphi$ . *Ophyra* Macq. Buff. 2. 308. I.  $\delta\varphi$ . T. 17. f. 5.

Hab. in foliis fruticum, per Scandinaviam, 10 Jun.—28 Sept., vulgaris, in copula saepe deprehensa; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostrogothia, Ölandia (ad Borgholm), Nericia & Uplandia, frequens; deinde rarescit, & in provinciis magis borealibus nibi tantum rarissime obvia; in Norvegia meridionali ut ad Christianiam, D. *Dahlbom*; in Dania non raro, D. *Staeger*. (E Kilia a D. *Wiedemann*, atque e Rixdorf & Moabite prope Berlinum a D. *Dahlbom*, qui eandem etiam ad Gryphiam frequenter legit, communicata. E St. Sever Galliae plura specimina a D. *Leon Dufour* etiam missa). Larvae in stereore degunt.

$\delta\varphi$ . Similis *Ar. dentipedi* (36), sed differt: magnitudine paullo minore, colore corporis magis cærulecenti, immaculato, macula supra antenas nivea majore, alarum nervis pallidioribus, longitudinalibus 3 & 4 parallelis, squamis fuscanis, femoribus antieis muticis, maris oculis magis cohærentibus, licet non aretissime, tibiis postieis ( $\delta$ ) areuatis & intus villosis, nt & *feminæ* interstitio frontali non albo-marginato. — Oculi maximi, ferruginei. Frons minime prominens. Antennarum nigrarum seta subnuda seu brevissime tantum puberula. Epistoma infra oculos non descendens; argenteomieans. Abdomen breviter ovatum, in  $\delta$  pubescens. Alæ nudæ. Costa mutica; spinula nulla. Area media non lata. Nervi transversi: medius apici nervi longit. 1:mi oppositus, ordinarius paullo ante medium areæ insertus, subperpendicularis, subrectus I. leviter inflexus. Halteres obscuri I. nigri. Pedes medios; parum spinosi; nigri. — Variat  $\varphi$ : alis basi squamisque flavo-albidis, ad Talvig Finmarkia Norvegicæ d. 2 Aug. 1821 semel capta. Zett. Ins. Lapp. p. 668; sed hæc varietas forsitan ad *Ar. spinipedem* infra no 93, potius referenda?

47. *A. piligera*; oblonga, nigra, undique pilosa; epistomatis lateribus obscure cinereis; ore reflexo; abdomine cinerascente, vitta dorsali nigra; alis hyalinis, squamis albis, halteribus obscuris; mas: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia media & boreali, 20 Jul.—1 Aug., valde rara; scilicet in Gotlandia ad Storugns prope Kapelshamn; & in Jemtlandia ad radicem alpium Åreskutan & Mullfjellen pauca individua inveni.

♂. Pilositas totius corporis & pedum sat densa speciem mox ab affinibus distinguit. Tota fere nigra, subnitida. Frons parum prominula. Antennæ breves, seta sat distincte pubescente. Oenli majusculi. Epistoma breve, lateribus certo situ albido-mieans, ore reflexo. Thorax antice nigricans, lineis atris parum perspicuis. Abdomen oblongum, parum convexum, obscure cinereum, segmentis æque longis, 1:mo fere toto reliquisque linea dorsali, incisurisque tenuiter, nigris. Linea vero hæc certo situ dilatata apparet, unde quasi macula late trigona in singulo segmento observatur. Alæ hyalinæ, præsertim basi subfuscane. Costa parum ciliata; spinula nulla. Nervi longitudinales: 3:tius in apice paullo latior, quam in medio sit. Nervi transversi subperpendiculares, recti, horum medius apici nervi long. 1:mi exacte oppositus, ordinarius psullo ante medium areæ insertus. Squamæ albæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres nigri. Pedes medioeres, nigri, pilosi, sed vix spinulosi. Pulvilli mediosores, albi.

48. *A. fuscinervis*; elongata, nigricans, subnitida; epistomatis lateribus obscure albo-micantibus; fronte parum prominula; alis hyalinis, nervis flavedine cinctis; costa basi ciliata; squamis pallidis, halteribus testaceis, clava obscura. ♀. (Long. 2—2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Authomyza* Zett. Ins. Lapp. 671. 44. ♀. *Anthom.*  
*lanceolata* Zett. Ins. Lapp. 672. 45. ♀. varietas.

Hab. in foliis fruticum, præsertim per Scandinaviam borealem, 1 Jul.—29 Aug.; scilicet in Scania ad Esperöd semel; in Smolandia ad Skärsjö rar.; in Dalecarliæ alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia boreali ad Rätan, Hofverberget, Ristansfors usque ad radicem Åreskutan & Mullsjönen, frequens; in Lapponia Umensi sylvatica ad Åsele atque Lycksele, & Tornensi ad Kengis & Kare-suando, parce; in Norvegia boreali ex. gr. ad Thynæs raro. (Ex Yläne Finlandiæ a D. Prof. *Sahlberg* communicata).

♀. Affinis & similis priori, sed differt: vestitu corporis parcis setoso, nec dense piloso, antennarum setæ pubescentia subtiliore, abdome lanceolato, cinerascente-nigro unicoloore, alis magis flavescentibus, costa præcipue a basi ad medium ciliata, squamis subflavidis, ut & pedibus spinulosis. — Oculi modice remoti, vitta frontali lata, atra, postice grisea. Orbita oculorum cinerascens. Os parum reflexum. Anus acutus. Spinula costæ alarum haud distineta. Squamæ parvæ, valvulis subæqualibus. Halterum petiolus obscure testaceus. — An femina sequentis?

49. *A. obscuripennis*: oblonga, nigra, subnitida; epistomatis lateribus obscure albo-micantibus; fronte pa-rum prominula; alis nigricantibus, costa basi subciliata; squamis albidis; halteribus nigris; abdome cinerascente, linea dorsali nigra; mas: oculis appropinquantibus. ♂. (Long. 2 lin.).

*Authomyza* Zett. Ins. Lapp. 672. 47. ♂.

Hab. in Scandinavia præsertim boreali cum priori, 3 Jul.—4 Aug., passim; scilicet in Scania ad Esperöd semel

capta; in Jemtlandia boreali ad Åreskutan, Mullsjellen & Stalltjernstugan, sat frequens; in Lapponia Umensi ad Stensele rar., D. *Dahlbom*; in Norvegia ad Dovre, D. *Bohemani*; ad Thynæs & Sæul Værdaliae, in fenestris passim. (E Glogavia a D. *Zeller* missa).

♂. Simillima priori, cuius mas forte est, sed in copula non capta. Differt a praecedente praeter differentiam sexus etiam alis nigris, nec flavidis, ut & abdomine linea media nigra obsoleta, nec immaculato. Antennæ mediocres, non validæ. Oculi subappropinquantes, interstitio frontali nigro disjuncti. Os subreflexum. Alie totæ æque nigrieantes. Abdomen fere ut in *Ar. piligera* (47), sed sublineare, subconvexum. Anus subtus tuberculatus. Tibiae spinulosæ. In specimine scanico alæ subflavientes & costa tota breviter ciliata, de cetero lapponicis simillimo, nec specie diverso.

50. *A. inuncta*: ovato-oblonga, nigro-cinerascens, subnitida; epistomatis lateribus argenteo-micantibus; fronte parum prominula; thoracis lineis 4 obscuris; alis hyalinis, costa vix ciliata; squamis albidis; halteribus flavis. ♀. (Long. 1½—1¾ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 672. 48. ♀.

Hab. in Scandinaviae borealis fruticibus, 27 Jun.—11 Jul., valde rara, tria tantum specimina lustravi, nempe unum in Jemtlandia ad radicem Mullsjellet, alterum in Lapponia Umensi ad Lycksele, & tertium in fenestra ad divisorium Sæul in jugo alpino Norvegico situm, capta.

♀. Ab *Ar. fuscinerei* (48,) cui valde similis, magnitudine paullo minore, statura nonnihil magis ovata, colore obscure cinerascente, thoracis lineis subquatuor nigrieantibus, interstitio frontali forte paullo augusto, orbita oculorum albidiore,

alis cinereo-hyalinis parum flavidine tinetis, costa nudior, spinula minuta, ut & halteribus flavis, dignoscitur. Antennarum seta pubescens. Squamæ sub alis parvæ, albidae, valvula superiore inferiorem haud tegente.

**51. *A. æneiventris*:** oblongo-ovata, nigro-cinerascens, subnitida; capite grisecente; fronte parum prominula; thoracis lineis 4 obscuris; abdomine æneo-mican- te; alis subhyalinis, nervis transversis infuscatis, costa pa- rum ciliata; squamis albidis, halteribus flavis. ♀. (♂?) (Long. 2 lin.).

Hab. in Dalecarlia, in alpes adscendens, a D. *Bohe- man* detecta mihique in 2 speciminiibus ad describendam communicata; etiam ad Quickjock Lapp. Lulensis a D. *Wahlberg* capta.

♀. Similis priori; sed magnitudine paullo majore, alarum nervis transversis fusedine einetis, ut & abdomine ovato, nitido, leviter æneseente, certo situ cinereo-nicante, imprimis dignota. Caput griseum, nitidum. Frons modice lata; vitta latiuscula nigra macula postica cinerea. Os non reflexum. Antennæ mediocres, nigræ, seta distinete pubescente, seu fere breviter plumata. Thorax obscure cinerens, vittis 4 nigris, lateralibus indeterminatis. Abdomen apice acutum. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis transversis rectissimis, distinete infuscatis, maculaque ad exitum nervi long. primi fusca, obsoleta. Spinnæ costæ parva. Nervi long. 3 & 4 versus apicem paullo divergentes. Squamæ non magnæ, albidae, valvula superiore inferiorem minime tegente. Pedes nigri, tibiis spinulosis.

Var. b. ♀. paullo major, oculis tenuissime hirtis. An hujus? in Lapponia Lulensi ad Quickjock a D. *Bohem an* inventa.

♂. Similis varietati a. feminæ descriptæ, sed oculis cohærentibus, antennarum seta breviter puberula, ut & fronte non prominente, differt. An ejus mas?? Abdomen ovale, subdepressum, nitidum, nigrum, incisuris tenuiter, maculisque lateralibus indeterminatis, cinereis. Alæ hyalinæ, leviter fuseanæ, basi, nervis transversis maculaque ad exitum nervi long. 1:mi, obscuris. A D. D. Boheman & Wahlberg in Lapponia Lulensi ad Quickjock Jul. 1843 reprehensus.

52. *A. nigriventris*: ovato-oblonga; thorace cinereo, opaco, fusco-trilineato; epistomate argenteo; fronte vix prominula, vitta altra in medio polita; abdomine nigro, nitido; alis hyalinis, nervis fuscedine cinctis, costa basi ciliata; squamis albidis; halteribus flavis. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$  fere 2 lin.).

Boheman in litt. 1843.

Hab. in graminosis locis humidis in Lapponia Lulensi, ubi in convalle Quickjockensi & in palude Betula na na repleta prope latus superius Iacus Saggat-träsk a D. Prof. Boheman 8 Jul.—10 Aug. 1843 lecta mihique communicata; etiam in Norvegiæ alpibus ab Eodem inventa.

♀. Oblonga, parce setosa. Oculi mediocres, modice remoti. Intestinum frontale atrum, velutinum, macula media elongato-cordata, nigra, nitidissima. Antennæ mediocres, nigræ, seta subtilliter puberula. Orbita oculorum & epistoma perpendicularē, argentea. Setæ oris paucæ. Palpi atri. Thorax griseus, ante lineis 3 angustis, brunneis. Scutellum griseum. Abdomen oblongo-ovatum, nigrum, nitidissimum. Alæ breviusculæ, fuseo-hyalinæ. Nervi ut in *Ar. fuscinervi* (48) directi, sed crassiores & fuscedine (neē flavedine) perspicua cincti, in primis transversi. Nervus longitud. 2:dus apice ad costam umbra fusca cinctus. Costa basi ciliata; spinula adest,

Squamæ mediocres, albidae, valvula superiore inferiorem non tegente. Pedes nigri, parce pilosi & spinulosi.

53. *A. argyrata*: oblonga, nigra, parum cinereo-micans; capite argenteo; fronte leviter prominula, vitta atra; alis subhyalinis, basi, squamis halteribusque flavidis; costa parum ciliata; mas: oculis appropinquantibus. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza argyrocephala* Zett. Ins. Lapp. 670. 37. ♂.

Hab. in inferalpinis maritimis Nordlandiae Norvegiae rarissime; ad Björkvik 14 Jul. 1821 in unico specimine deprehensa.

♂. Similis *Ar. fuscinervi* (48). Setosa, sed parum pubescens, nigra, levissime cinereo-micans. Caput argenteum. Frons subprominula. Oculi per orbitam tenuissimam albam & vittam frontalem angustatam atram, disjuncti. Os non reflexum. Antennæ nigræ, seta capillari breviter & tenuiter puberula, basi infima subincerassata. Abdomen conicum, aro subcompresso, anum feminarum mentiente. Alæ cinereo-hyalinæ, basi pallide flavæ. Nervi ut in *A. fuscinervi* directi. Costa parum ciliata. Spinula vix ulla. Squamae parvæ, flavo-albidæ, ciliatæ, valvulis subæqualibus. Halteres flavi. Pedes spinosi.

Obs. Sub nomine *Anthom. argyrocephala* Dom. Meigen Dipt. 5. 145. 107. aliam speciem descripsit, ergo nomen nostrum recentius in *argyratam* mutavimus.

54. *A. maculifrons*: oblonga, cinereo-grisea, vix maculata; fronte sub prominula, argenteo-cinerea, nitida, macula supra antennas lutea; alis hyalinis, basi, squamis halteribusque flavidis; costa parum ciliata; mas: oculis subapproximatis. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 672. 46. ♀ (immo<sup>re</sup>to, nam specimen masculum est).

Hab. in alpe Dovre Norvegiæ, a D. *Bohemani* inventa.

♂. Setosa. Affinis *Ar. murinæ* 144. Antennæ mediocres, articulo ultimo brevissime pubescente; 2:do duplo longiori. Seta brevissime puberula. Frons subangustata. Oculi subappro- pinguentes, per vittam frontalem angustatam atram, lateribus distinete albido-marginatam, sejuncti. Macula supra antennas determinata, fulva. Os haud inflexum. Thorax inæqualis, læte cinereus, certo situ subfuscō-maculatus. Scutellum cinereum. Abdomen ovato-subcompressum, griseum. Alæ ut in priori, longiusculæ, squamis parvis halteribusque flavis. Pedes nigricantes, spinosi.

55. *A. lividiventris*: oblonga, nigricans, opaca; epistomate cinereo; ore fronteque non prominentibus; abdomine flavescenti-cinereo; alis subhyalinis, costa nudiuscula, basi, squamis halteribusque flavis; mas: oenlis cohærentibus, abdomine conico, ano infexo, nigro. ♂. (Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

Var. a. ♂. 2 lin. long., alis subfuscānis, nervis fuscedine leviter cinelis.

Var. b. ♂.  $1\frac{1}{2}$  lin. long. alis hyalinis, nervis fuscedine non cinetis; an individua juvenilia?

Hab. in Lapponia Lulensi mense Julio forte rara; utraque varietas ad Quickjock capta, sed var. a. a D. *Bohemani*, & var. b. a D. *Andersson*, mihi communicatae.

♂. Statura & affinitas prioris. Oculi sat magni, arete cohærentes. Vitta frontalis supra antennas triangularis, atra, cinereo-marginata. Antennæ longiusculæ, subangustatæ, nigrae, seta breviter pubescente, basi incrassata. Frons haud prominula. Palpi subfiliformes, nigri. Thorax nigricans,

subnitens (an detritus?), humeris cinerascentibus. Scutellum nigricans. Abdomen cylindrico-conicum, opacum, pilosum, totum flavescens pallinosum. Anus tuberculo duplice, posteriori inflexo; totus niger, nitidus, leviter cinereo-micans. Alae ima basi ferrugineæ. Nervi longitudinales 3 & 4 leviter versus apicem divergentes; transversus ordinarius sat longe ante medium areæ mediæ insertus, subobliquus, rectus. Squamæ mediocres, fulvescenti flavæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes simplices, spinulosi, nigri. Pulvilli sat magni, albi.

56. *A. squalens*: oblonga, obscure cinerea, opaca; capite late cinereo, nitido; fronte distincte prominente; thoracis lineis 2 angustis, abdominalisque unica obsoleta, fuscis; alis subhyalinis, nervis transversis infuscatis; costa, basi subciliata; squamis albidis; halteribus flavis. ♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 669. 36. ♀.

Hab. in Lapponia 2. Jun.—12 Jul. rarius; scilicet in Lapponia Umensi ad Lycksele, & in alpium Tornensium jugo, a me pareissime lecta.

♀. Oblonga, cinerea, setosa. Oculi sat late remoti, vitta frontali lata, opaca, nigra, cinereo-micante. Antennæ mediocres, nigrae, seta breviter plumata, basi incrassata. Frons porrecta. Epistoma subperpendiculare, & orbita oculorum late, canescens. Os haud reflexum. Thorax cinereus, lineis 2 anticus mediis fuscis, & 2 lateralibus interruptis ejusdem coloris. Scutellum cinereum. Abdomen oblongum, apice acutum, ano compresso; totum cinereum, interdum vestigio obsoleto macularum & lineæ mediæ fuscarum. Haec vero signaturæ plenimque vix observandæ. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis transversis leviter infuscatis. Nervi ut in *Ar. fuscinervi* (48) directi, sed transversus ordinarius perspicue longius a margine interiore alæ remotus. Costa ad

basin breviter ciliata. Spinula distincta. Squamæ mediocres, albidae, valvula superiore inferiore non tegente. Pedes spinulosi. Affinis *Ar. latipenni* infra 118, sed epistomate non retuso. Cum *Ar. longula* infra n:o 179, non confundenda.

Var. b. ♀. paullo robustior, tota nigricans, thorace subvittato, alis basi squamisque flavicantibus; an specimen detritum hujus? In silva Wittangi Lapponiae Tornensis d. 15 Jun. capta. Zett. Ins. Lapp. l. e. var. b. ♀.

**57. *A. cinerea*:** oblonga, cinerea, opaca; capite laete cinereo, nitente; fronte distinete prominente; thorace tenuiter fusco-lineato; abdominis linea dorsali obscura; alis cinereis, basi, squamis halteribusque flavis; costa basi ciliata; mas: oculis cohærentibus. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$  lin.).

Var. a. ♂♀. fronte supra antennas nigra immaculata.

*Musca* Fall. Muscid. 70. 75. ♂. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 199. 203. ♂. Zett. Ins. Lapp. 671. 41. ♀. *Musca flavicans* Panz. Fn. Germ. 54. 18. ♀.

Var. b. ♂♀. in copula; vitta frontali nigra, macula supra antennas flava.

*Musca cinerea* Fall. Muscid. l. e. ♀. *Anthomyia* Meig. l. e. ♀. Zett. l. e. ♀. *Musca floralis* Fem. Fall. Muscid. 71. 76.

Hab. in floribus Chrysanthemi leucanthemi, Umbellatarum &c., per hortos & prata Scandinaviae, 22 Jun.—29 Aug., passim, feminæ frequentiores; scilicet var. a. in Scania ad Lund, Tranås, Esperöd &c., non rara; in Smolandia; in Ostrogothia ad Wadstena; in Gotlandia ad Garde raro; in Dalecarliæ alpibus, D. Boheman; in Jemt-

landia usque ad radicem Åreskutan & diversorum Skalstugan, vulgaris; in Lapponia Umensi ad Wojmsjön, Tresunda & Wilhelmina, passim; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. *Andersson*; in Norvegia ad Næs Værdaliæ & in inferalpinis Nordlandiæ ad Rasehtiud, rarius; in Dania; var. b.: in Scania ad Lund, Fogelsång, Tranås & Esperöd; in Ostrogothia ad Wadstena; in Jemtlandia ad Åreskutan; in Lapponia ad Wilhelmina. (Utraque varietas a D. *Zeller* e Glogavia missa, & varietatem b. sub nomine: "*Anth. gnava* Bouch." & "*Anthomyia fusca* Bouch." 2 specimina seminea ab Eodem quoque obtinui).

$\sigma\varphi$ . Magnitudo, statura & color ut in *Ar. latipenni* infra 118, cui valde affinis, sed abdomine angustiore, epistomate forte minus retuso, fronte magis porrecta, antennis angustioribus, thoracis lineis 2 approximatis, fuscis, ut & alii minus flavicantibus, differt. Cinerea. Frons præsertim in  $\varphi$  prominens. Oculi obscurè ferruginei, in  $\sigma$  sat magni, cohaerentes; in  $\varphi$  parvi, sat late distantes, vitta frontali aut nigra immaculata, aut macula supra antennas plus minus distincta notata. Antennæ mediocre, nigræ, seta brevissime puberula, basi tenuiter incrassata. Thorax cinereus ( $\sigma$ ), aut lète cinerens ( $\varphi$ ), lineis 2 angustis, in  $\sigma$  obscuris, in  $\varphi$  dilute brunneis; plerumque obsoletis. Rudimentum lineæ 3:tiæ in medio dorsi sæpe observatur. Abdomen cinereum; in  $\sigma$  lineare, subdepressum, linea media fusca, incisuris setosis; in  $\varphi$  lanceolato-oblongum, subimmaculatum, parum setosum. Alæ subflavidæ, præsertim nervis pallidæ. Nervi fere ut in *Ar. fuscinervi* 48, directi, sed longitudinales 3 & 4 subparallelis. Spinula costæ adest. Squamæ parvæ, sordide albo-flavidæ, valvulis subæqualibus. Halteres flavi. Variat etiam  $\varphi$  antennarum seta distincte pubescente, & fronte nonnihil minus prominula; alias var. a. simillima, e Gusum Ostrogothiæ sub nomine: "*Anth. cinerea?*" missa a D. Prof.

*Wahlberg.* Forte hujus? Individuum simillimum, fronte supra antennas macula flava, in Scania ipse legi.

58. *A. brunneilinea:* oblonga, obscure cinerea, opaca, undique setosa; capite plumbeo; fronte leviter prominente; ore non reflexo; thoracis lineis subquinis, abdominisque linearis depresso unica, brunneis; alis cincisis, basi, squamis halteribusque flavidis, costa subciliata; *mas:* oculis subappropinquantibus, ano tuberculato. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Sueciæ meridionalis hortis & pratis, 6 Jul. — 12 Sept., rariss; scilicet in Scania ad Lund (in Paradislykan); in Gotlandia ad Nähr; in Westrogothia ad Höberg, D. *Gyllenhal.*

♂. Similis *Ar. piligeræ* (47), sed colore minus obscuro, oculis remotioribus, ore non reflexo, corporis setis paullo fortioribus, thoracis lineis 5 dilute brunneis, abdomine magis linearis & subdepresso, linea dorsali fusca simplici, alis leviter flavicantibus, costa subciliata, ut & halteribus flavis, nec obscuris, abunde distineta. Ab *Ar. florali* n:o 147, cui etiam similis, antennarum seta distinctius pubescente &c., differt. Palpi subfiliformes, nigri. Vitta frontalis subangustata nigra, orbita oculorum albescente. Nervi longitudinales 3 & 4 parallelis. Spinula costæ adest. Squamæ sub alis parvæ, flavidæ-albidæ, valvulis æqualibus. Anns ater, nitidus, & tubercula subtus 2, pilosa. Thoracis lineæ interdum obsoletæ. Pubescens in antennarum seta distincta, subferruginea. Pedes distincte spinosi. — In specimine Gotlandico macula parva supra antennas fulva. — Cum *Ar. antiqua* (180), cui abdominis pictura similis, oculis non arete coherentibus &c., differt.

59. *A. ignobilis:* oblonga, nigricans; capite argenteo-micante; fronte leviter prominente; ore non reflexo;

abdomine cinereo, linea dorsali nigra; alis hyalinis, costa nuda; squamis albidis; halteribus flavis; *mas:* oculis appropinquantibus, ano tuberculato. ♂. (♀). (Long. 1½—2 lin.).

Hab. in Botnia boreali, ubi ad Råbäcken paroeciae Öfver-Luleå in copula a D. *Wahlberg* lecta; in Dalecarlia, D. *Bohemian*.

♂. A priori, cui similis, differt præcipue: thorace obseuriorre, abdome subcylindrico, alis hyalinis, nec flavieantibus, ut & costa mutica. Corpus quoque nonnihil minus valide setosum, quam in præcedente. Caput exaete ut in priori. Thorax obscure cinereus, dorso vittis subtribus latis nigris. Scutellum nigricans. Abdomen obscure griseo-cinereum, segmento 1:mo toto, reliquisque linea media, nigris. Anus ut in priori. Alarum nervi quoque ut in illa directi, transverso ordinario levissime subflexo. Squamæ parvæ, albidæ, valvulis subæqualibus. Pedes mediocres, parce setosi. — *Femina* a me non lustrata.

60. *A. pullula:* oblonga, cinerea, opaca; capite albidente; fronte parum prominente; ore vix reflexo; thoracis lineis subtribus, abdominisque unica, fuscis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, costa ciliata; squamis halteribusque albidis; *mas:* oculis cohærentibus, abdome subcylindrico, uno infexo, atro, nitidissimo. ♂♀. (Long 1—1¼ lin.).

*Anthomyia longula* Meig. Dipt. 5. 103. 36. ♂♀.  
(excl. syn. Fall. quod ad *Aricium longulum* nob. n:o 179 pertinet). *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 315. 16. Macq. Buff. 2. 321. 23. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali & media rarissime;

in Scania ad Esperöd locis aridis d. 10 Aug. unicum par  
deprehensum; in Ostrogothia ad Lärketorp mas semel;  
in Dania ad Dyrhaven d. 17 Jul. 1842 a D. Staeger  
capta mibique in utroque sexu sub nomine: "A. longula  
Fall." missa.

$\delta\varphi$ . Simillima *Ar. brunneilineæ*, 58, a qua tamen corpore duplo  
I. triplo minore, multo minus setoso, alarum nervis trans-  
versis fuscedine cinctis, & oculis maris sat arte cohærentibus,  
mox distinguitur. Caveas quoque ne cum *Ar. longula*  
(179)  $\delta$  *parvula* (219), quoad nervos transv. infuscatos simili-  
bus, confundas. Caput plumbeum. Oculi in mare postice  
arte cohærentes, macula supra antennas triangulari nigra;  
in femina late remoti, vitta frontali lata grisea, & orbitis  
canis. Thoracis lineolæ 3 brunnescentes, in  $\varphi$  præsertim  
obsoletæ. Abdomen maris ut in *brunneilinea* constructum  
& coloratum, at linea dorsali nigra, subinterrupta. Abdo-  
men feminæ conicum, hæte griseo-cinereum, maculis 4 fuscis  
in serie dorsali positis. Alæ & squamæ ut in *brunneilinea*,  
sed nervi transversi infuscati. — Cum *Ar. cinerosa* (61),  
*cinerella* (227) & *pareula* (219,) non confundenda. — Abdo-  
men maris in mortuo subdepressum.

61. *A. cinerosa*: oblonga, nigricans, leviter cine-  
reо-micans; epistomate albido; fronte vix prominente;  
ore non reflexo; abdomine linearí subdepresso linea dor-  
sali nigra ( $\delta$ ), aut conico immaculato ( $\varphi$ ); alis flavescenti-  
bus, costa ciliata, spinula distincta; squamis halteribus-  
que albidis; mas: oculis subcohærentibus.  $\delta\varphi$ . (Long.  
1½ lin.).

*Anthomyza cinerella* Meig. Dipl. 5. 100. 30?  $\delta\varphi$ .  
(exclus. syn. Fall.). — *Hylemyia* Ejusdem 7. 316. 35?

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; mas sub  
nonine "Anthon. cinerella Meig." e Dania a D. Staeger

communicatus; femina mihi ignota. Ante plures annos specimen masculum sub nomine: "A. *flavipennis* n. sp." ex Hæfnia quoque missum.

♂. Similis *Ar. piligeræ* (47) & *pullulæ* (60), sed ab illa magnitudine paullo minore, ore non exerto, alis flavidis, halteribus albido-marginalibus &c., & ab hac magnitudine duplo majore, thorace immaculato, alis flavidis, nervis transversis non infuscatis, ut & oculis non arte cohærentibus, certe & facile dignoscitur. — Tota subnitida, pilosa & præsertim abdomine ad incisuras, & pedibus, setosa. Caput rotundatum. Antennæ mediocre, seta breviter pubescente. Proboscis crassiuscula. Palpi breves, filiformes. Thorax & sentellum griseo-cinerea, immaculata. Abdomen lineare, depresso, obscure cinereum, linea dorsali e maculis 4 subcohærentibus conflata, nigra. Squamæ sub alis parvæ, ciliatæ, albidae, valvulis subæqualibus. Halteres flavi. Pedes nigri.

♀. Similis mari, teste D. Meigen; sed capite lète cinereo, fronte lata, ferrugineo-flava, albido-marginata, abdomineque breviter conico immaculato, differt; mihi de cetero latet, nisi specimen feminineum, alis flavis, fronte cinerea, vitta lata nigra albo-micante, abdomine nigro-nitente, in prato ad Östergarn Gotlandiæ d. 16 Jul. captum, hue referre vellem.

*Obs.* Antennarum seta breviter plumata in specie Meigeniana dicitur; in nostra autem tantum breviter pubescentia est. — *Musca cinerella* Fall. jam 1825 a Cel. Auctore descripta, alia est species sub n:o 227 quærenda. Hinc ratio mutatio nominis. — Similis *Ar. flavipenni* n:o 31, sed antennarum seta subanda, nec plumata, mox dignota.

62. *A. sulciventris*: antennis breviusculis oblonga, nigra, capite argenteo-micante; fronte parum prominente; ore subreflexo; abdomine transversim sulcato, segmentis basi & vitta dorsali nigris; alis hyalinis, costa nuda, squamis albis, halteribus flavis; mas: oculis cohærentibus, abdome ovali, subdepresso. ♂. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Gotllandia & Jemtlandia boreali rarissime; ad Kräklingbo, & ad radicem Mullsjellet, 16 Jul. 1841 & d. 27 Jul. 1840 exempla descripta deprehendi. (E Glogavia a D. Zeller, & e Neuenkirchen & Eldena a D. Dahlbom etiam communicata).

♂. Similis *Ar. transversali* (149), sed antennis multo brevioribus, seta in medio distinctius pubescente, ore magis exerto, thorace obscuriore, abdomine transversim quadrisulcato, segmentis basi fascia transversa, & certo situ vitta dorsali longitudinali, nigris, nec incisuris albis, nervis longitudinalibus 3 & 4 parallelis, nec versus apicem leviter divergentibus, ut & squamis albidiioribus, vere distincta. Thoracis vittæ 3 nigrae in fundo obscuro vix distinguenda. Styli ventrales 2 prope anum parvi, nigri. Abdomen sat dense pubescens. Alæ levissime fuscanae, nervo transv. ordio. paullo ante medium areæ insertus, subobliquus, rectus. Squamæ parvæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Pedes pilosi, tibiis posticis intus nudi, sed extus setis 3—4 longioribus instructi. Valde affinis & similis *Ar. humerellæ* infra n:o 228, sed magnitudine nonnihil majore & valvula squamarum superiore inferiorem minus tegente, diversa videtur.

††. Nervus transversus ordinarius inflexus.

**63. *A. verticina*:** oblonga, cinerea, opaca; capite cano; fronte distinete prominente, postice brunnecente, vitta antice nigra; ore parum reflexo; thoracis lineis 3 brunneis; abdominis vitta dorsali maculisque irregularibus, obscuris; alis cinereo-hyalinis, basi, squamis halteribusque flavescientibus, costa subciliata, spinulaque mediocrei. ♀. (♂). (Long. 2 $\frac{1}{4}$  — 3 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 665. 19. ♀.

Hab. in floribus Salicium Botniæ borealis & Lapponiæ

Tornensis verno tempore passim; ad pagos Pello, Kengis & Junosuando, 4—9 Jun. 1821 a me capta; in Lapponia Lulensi ad Tjomotis prope Quickjock in paludibus Cari-cibus repletis initio Augusti 1813 uterque sexus deprehensus erit, ut mihi in litteris narravit D. *Wahlberg*.

♀. Tota cinerea, opaca. Caput canum, subfuscatum. Oculi non magni, late distantes, vitta frontali nigra. Orbita oculorum frontalis sat late cinerea, postice (a medio frontis ad occiput) brunnea, setosa. Seta antennarum latere superiore parce & breviter subplumata. Os parum reflexum. Palpi nigri, subclavati. Thoracis lineæ 3 dilute brunneæ, obsoletæ. Abdomen ovato-oblongum, subdepressum, vitta media subinterrupta nigra, & certo situ maculis indeterminatis fusco-micantibus. Nervi alarum transversi: medius obliquus, ordinarius etiam obliquus, valde inflexus & fere in medio l. mox ante medium areæ insertus. Nervi longitudinales: 3 & 4 subparallelis l. vix visibiliter ad apicem divergentes, horum 3:tus in apice l. mox ante summum apicem alæ excurrens; 5:tus non usque ad marginem extensus. Squamæ mediocres, valvula superiore inferiorem non tegente. — *Mas* mihi ignotus.

64. *A. frontata*: oblonga, obscure cinerea, opaca; capite canescente; fronte distincte producta, postice brunnea; vitta antice nigricante; ore reflexo; thoracis vittis 3, abdominisque linea unica dorsali maculisque indeterminatis obsoletis, nigris; alis hyalinis, costa parum ciliata, spinula parva; squamis albis; halteribus testaceis; *mas*: oculis coherentibus, uno nigro, nitido. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Authomyza* Zett. Ins. Lapp. 669. 35. ♀.

Hab. in Sueciæ borealis & Lapponiæ alpibus, 10 Jul.—6 Aug., passim; scilicet in Dalecarlia, D. *Bohemian*;

in Jemtlandia in alpibus Åreskutan & Mullsjelien, haud raro, in summa alpium caenumina adscendens, in ipsa nive ambulans saepe deprehensa; in alpe Walli ad Quickjock Lapponiae Lulensis legit & in multis speciminibus feminis 1813 mihi communicavit Studiosus D. *Andersson*. Feminæ frequentiores, mares parciores, hi in floribus Salicis glaucæ etiam capti. (E Grönlandia exemplum per D. *Westermann* quoque obtinui).

$\sigma\varphi$ . Simillima priori, a qua tamen magnitudine paullo minore, colore obscuriore, ore antice magis reflexo, alarum costa minus ciliata, spinulaque minore, squamis albidiioribus &c., præcipue differt. Ab *Ar. ambigua*, n:o 27, cui etiam valde affinis, fronte paullo magis prominula, ore magis porrecto, oculis in  $\sigma$  magis cohærentibus, ut & ano majore, nigro, nitido, differt. — Setulosa. Frons antice (supra antennas) nigra, certo situ cinereo-mieans. Antennarum seta latere superiore subplumata. Thorax obscure cinereus, vittis subtribus indeterminatis nigris. Sentellum nigricans. Abdomen obscure glauco-cinereum, linea media distincta nigra, & præterea aut incisuris in  $\sigma$  tenuissime, aut maculis in  $\varphi$  irregularibus valde obsoletis certo tantum citu conspiciendis, fuscis. Anus in  $\sigma$  majusculus, rotundatus, superne per incisuram medianam quasi geminus, totus ater, nitidissimus, breviter atro-villosus, subtus stylis 2 brevibus curvatis obusis pilosis appendiculatus. Alæ in utroque sexu hyalinæ, levissime fuscaneæ, nervis ut in priori directis. Squamæ ut in præcedente, sed albæ, nec flavidæ. Halteres testacei, in  $\sigma$  præsertim fuscescentes. Pedes simplices, setosi, nigri. Cetera ut in priore.

65. *A. decrepita*: ovato-oblonga, cinerea, opaca; capite argenteo-micante; fronte subprominente, vitta nigra; ore haud reflexo; thoracis vittis subtribus fuscis; alis cinereo-hyalinis, basi squamisque sordide flavescentibus,

costa parum ciliata, spinula parva; halteribus flavis; mas: oculis approximatis, ano subcompresso, cinereo. ♂. (Long. 3 $\frac{1}{8}$ —lin.).

Hab. in Smolandia rarissime; specimen tantum unicum lustravi.

♂. Læte cinerea. Oculi magni, per vittam medianam modice latam atram & orbitas angustas albidas paullo disjuncti. Frons non multo prominula. Seta antennarum in medio breviter pubescens. Palpi extrorsum suberassiores. Thorax canus, vittis fuscis & brunneis indeterminandis alternantibus. Abdomen ovatum, convexum, apice compressum (ut in feminis vulgariter), totum cinereum, vitta media fusa obsoletissima. Alarum nervi transversi: medius perpendicularis, ordinarius mox ante medium areæ insertus, leviter flexus. Area media ad apicem paullo latior, quam in medio. Squamæ medioeres, ciliatæ, valvulis subæqualibus. Pedes nigri, spinulosi. Ungues pulvillique elongati.

66. *A. brunnescens*: oblonga, brunneo-nigricans, opaca; capite obscure grisecente; fronte subprominente; ore haud reflexo; abdome oblongo, subdepresso, griseo, vitta dorsali nigra; alis squamisque fuscanis, costa parum ciliata, spinula minuta; halteribus flavis; mas: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca floralis* var.  $\beta$ . mas Fall. Muscid. 71. 76.

Hab. in Suecia meridionali passim; 2 Jul.—4 Aug.; in Scania ad Lund Esperöd &c.; in Ostrog. ad Wadstena; in Gotllandia ad Ejsta. (Etiam e Glogavia sine synonymia a D. Zeller communicata. Ad Hamburgum a D. Dahlbom capta).

♂. Ab *Ar. frontata*, 64, cui similis, differt: fronte multo minus porrecta, oculis arctius cohærentibus, antennarum se-

ta subtiliter tantum puberula, ore minus exerto, thoracis dorso nigro-brunnecente vix vestigio vittarum cinerascentium, scutello nigro-brunnecente, abdomine magis depresso, griseo (nec glauco-cinereo), linea media nigra, ano minore griseo, opaco (nec nigro nitido), alis magis fuscaneis, nervo transverso ordinario leviter tantum flexo, ut & squamis obscurioribus, longius ciliatis, valvulis subæqualibus. Oculi in viva rosi. Reliqua ut in *A. frontata*.

**67. *A. villipes*:** oblonga, cinerea, opaca; capite argenteo-mieante; fronte prominente; ore parum reflexo; thoracis lineolis 3 obsoletis, abdominalis linearis subdepressi linea dorsali incisurisque, nigris; alis subhyalinis, costa vix ciliata, spinula parva; squamis albidis; halteribus flavis; *mas*: femoribus posticis pubescentibus, basi villosis, oculis cohaerentibus, ano parvo. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Smolandia rarissime; duo tantum specimina vidi. (E Glogavia vero plura individua mascula a D. Zeller absque synonymia missa possideo).

♂. Simillima iterum priori, sed magnitudine nonnihil minor, fronte ut videtur paullo magis exserta, thorace cinereo (nec brunneo), obsolete fusco-trivittato, abdomine angustiore, incisuris perspicuius nigris, alis minus fuscaneis, nervo transverso forte paullo magis inflexo, squamis albidiорibus, valvulis exacte æqualibus, ut & præsertim femoribus posticis totis pubescentibus (nec spinulosis), basi extus distinete nigro-villosis ad apicem setulosis, vere differt. Oculi postice cohærentes. Frons supra antennas triangularis, nigra, ciuereo-mieans. Antennarum seta breviter pubescens. Anus parvus, rotundatus, niger, nitidus, leviter cinereus. Venter prope apicem stylis 2 brevibus pilosis. Pedes nigro-picei; antiei: femoribus præsertim subtus setulosis, sed non spinosis, tibiis subnudis; intermedii: femoribus breviter pubescentibus, subtus & ad apicem setulis paucis, tibiis parce

setosis; postici: femoribus ut supra descriptis, tibiis parce spinulosis.

*Subdiv. 2:da:* abdomine cinereo, maculis determinatis, discretis, plerumque trigonis, nigris. *Limnophora* Macq.

*Turma 1:a.* Alarum nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem alae leviter divergentes; hinc area media apice paullulum latior quam medio.

*α.) Nervus transversus ordinarius sat procul ante medium areæ insertus.*

\*. Alarum costa subnuda & spinula minuta l. nulla.

†). Antennæ breviusculæ h. e. epistomate multo breviores, articulo ultimo 2:do circiter duplo tantum longiore.

68. *A. compuncta:* ovala; capite cinereo; fronte sub prominente; ore non reflexo; abdomine griseo, maculis 4 subtrigonis, mediocribus, distantibus, nigris; squamis sordide albidis; *mas:* oculis subappropinquantibus, thorace nigricante, vittis 4 atris, alis fuscans; *femina:* oculis late remotis, thorace cinereo, linea dorsali brunnea, alis cinereo-hyalinis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{3}{4}$ — sere 3 lin.).

*Anthomyia* Wied. Zool. Mag. I. 80. 30. 3. Meig. Dipt. 5. 147. III. ♂♀? (exclus. Syn. Fall.). *Limnophora* Macq. Buff. 2. 311. 5?

Hab. in Scandinavia meridionali & media, minus frequens; scilicet in Gotlandia in Nährsholme 22 Jul. 1819 unicūm par copulatum inveni; e Dania, ubi in

Amager Jul. Aug. a D. *Staeger* frequenter capta, mihi quoque in utroque sexu ut *Anth. compuncta* Meig. missa.

♂♀. *Musca domestica* paullo major. Frons leviter prominuta. Seta antennarum longa, capillaris, subnuda, basi indeterminate incrassata. Palpi cylindrici, pilosi. Spinula costae nulla. Nervus transv. ordinarius subrectus. Halteres flavi. Pedes nigri, spinulosi. *Mas:* oculi per vittam subangustatam atram & orbitam tenuem albidam paullo disjuncti. Thorax nigricans, vittis 4 atris. Pectus nigro-cinerascens. Scutellum nigricans. Abdomen ovatum, pilosum, griseum, segmento 1:mo fere toto maculisque in segmentis 2 & 3 quatuor mediocribus, subtrigonis, brunneonigris. Alæ fuscaneæ. *Femina:* oculi per vittam latam nigram postice maculam oblongo-cordatam cinereum includentem, & orbitam cinereum, late disjuncti. Thorax griseus, vitta media distincta brunnea, & antice rudimento lineolarum 4 brevissimarum omniumque tenuissimarum nigrarum. Scutellum griseum. Abdomen ovatum, convexum, griseum, punctis 4 subrotundatis discretis brunneis in segmentis 2 & 3. Alæ cinereæ.

69. *A. trigonifera*: ovata, nigricans; capite albidio; fronte parum prominente; sela antennarum subnuda; ore non reflexo; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subflexo; squamis albidis; pedibus pilosis; *mas:* oculis subcohaerentibus, abdomine ovato, subdepresso, cinereo, maculis 4 majusculis, trigonis, approximatis, annoque, nigris.  
♂. (Long. fere 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 669. 33. ♂.

Hab. in Lapponia septentrionali rarissime; e Grönlandia a D. *Westermann* individuum quoque obtinui.

♂. Priore multo minor. Abdominis forma ovata, subdepressa, maculisque nigris triangularibus magnis approximatis, ano

atro, nitido, pedibus pilosis I. tenuiter setosis (nec valide spinosis), ut & nervo transverso ordinario subincurvato, nec recto, ab affinibus dignoscitur. Oculi in vertice non arcte cohærentes. Vitta frontalis angusta nigra. Palpi nigri, filiformes, extrossum suberassiores. Thorax nigricans, antice obscure cinerascens, lineis indeterminatis nigris. Abdomen pubescens, posterius pilosum, sed vix setosum, totum griseum, segmento 1:mo toto, maculis in segmentis 2 & 3 quatuor sat magnis, exakte trigonis, in medio approximatis per lineam dorsalem tantum angustam cinereum divisis, anque inflexo nitido, nigris. Alæ hyalinæ, vix fuscaneæ. Squamæ mediocres, sordide albidæ, brevissime ciliatæ; valvula superior inferiorem tantum ad dimidium tegens. Halteres slavi. Pedes nigri, femoribus validis, muticis.

**70. A. Sororeula:** ovata, nigricans; capite cinereo; fronte parum prominente; seta antennarum breviter puberula; ore non reflexo; alarum nervo transverso ordinario recto; pedibus pilosis; *mas*: oculis subcohærentibus, thorace nigricante, abdomine ovato, subdepresso, cinereo, maculis 4 mediocribus, trigonis, subapproximatis, nigris, alis squamisque subfuscaneis; *femina*: oculis remotis, thorace cinereo, lineis 3 brunneis, abdomine ovato, cinereo, maculis 4 trigonis discretis fuscis, alis hyalinis, squamis albidis. ♂♀. (Long. fere 2 lin.).

Hab. in Scandinavia præsertim boreali, 4 Jul.—4 Aug., minus frequens; scilicet in Smolandia ad Skärsjö, rarissime; in Jemtlandia boreali: ad Åreskutan, Mullfjellen ibique in regionem nivalem adscendens, & Skalstugan, passim; in Norvegia ad Thynæs & Garnæs Værdaliæ rarius.

♂. Simillimus priori, sed antennarum seta magis puberula, abdominis maculis nonnihil minoribus præsertim posticis, ano minore, non reflexo, cinereo, nec nigro, alis magis fu-

scansis, nervo transv. ordinario recto, ut & squamis levissime brunneo-flavidis, differt. Frons obscura. Thorax niger, vittis 3 atris.

♀. Caput canum, oculis modice remotis, vitta frontali atra maculam cordatam cinereum postice includente. Punctum supra antennas album. Thorax cinereus, lineis 3 brunneis. Abdomen ovatum convexum cinereum, maculis 4 trigonis discretis brunneis. Alae cinereo-hyalinæ, squamis albidis. Reliqua ut in mare. — Sub nomine *Ar. sororia* hæc species olim divulgata.

**71. *A. depressula*:** ovata, nigricans; capite obscure cinereo; fronte parum prominente; seta antennarum distincte pubescente; ore non reflexo; alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto; squamis albis; pedibus pilosis; *mas*: oculis coherentibus, abdome ovali, subdepresso, cinereo, maculis 4 majusculis, trigonis, subapproximatis, nigris. ♂. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Svecia in primis boreali rarissime; in Helsingia ad Arbrå 21 Aug.; in alpe Nullfjellet Jemtlandiae 27 Jul. 1840 specimina duo legi. In Smolandia etiam mense Jul. ad Skärsjö a D. Ljungb. bis captam vidi. In Scania ad Lund quoque semel deprehensa.

♂. Parva. Similis & affinis *Ar. trigonifera* 69, a qua magnitudine duplo minore, antennarum seta distincte pubescente, alarum nervo transv. ordinario recto, perpendiculari, præcipue dignoscitur. Oculi coherentes. Thorax & scutellum nigra. Maculae 2 minores nigrae etiam in segmento abdominis 4:to adsunt. Alae levissime fuscanæ. Squamæ albæ. Halteres sordide albi. Reliqua ut in *A. trigonifera*. A sequente antennarum seta breviter subplumata, nec nuda, & ab *Ar. contractifronte* (74) magnitudine minore & ab domine maris subdepresso, nec cylindrico, in primis differt. — Pedes setosi, piceo-nigri.

**72.** *A. didyma*: oblongo-ovata, cinerea; capite argenteo-micante; fronte vix prominente; seta antennarum nuda; ore non reflexo; thoracis lineis 3 brunneis obsoletis; abdominis subdepressi maculis 4 medioeribus, trigonis, nigris; alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto; costa nuda; squamis albis; *mas*: oculis arete cohaerentibus; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali atra maculam obcordatam einereum postice includente. ♂♀.  
(Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 1837. p. 683. 100 ♂♀.

Hab. in Scandinaviæ borealis arenosis & floribus Salicium, 10 Jun.—17 Aug. passim, in copula; scilicet in Gotlandia ad Stenkyrka, rarissime; in Dalecarliæ alpibus; in Jemtlandia ad diversorum Rätan & montem Hofverberget, nec non Åreskutan & Mullsjellet rarius; in Lapponiis: Uimensi ad Åsele, Stensele, Tresunda, & alpem Brattiksfjell (usque in regionem nivalem adscendens), haud raro; Lulensi ad Jockmock & Qwickjock, D. Andersson; Tornensi ad Juckasjervi; in Norvegia: in alpe Dovre, D. Boheman; ad Suul Værdaliiæ, D. Dahlbom; in inferalpinis Nordlandiæ ad Giebostad, & Finmarkiæ ad Bossekop, ipse; e Dania sub nomine *Musea triangula* Fall. ♂ a D. Staeger missus.

♂♀. Parva. Similis tribus proxime antecedentibus, sed a *trigonifera* magnitudine minore, nervo transverso ord. recto; a *Sororecula* magnitudine etiam minore, maris oculis arectius cohaerentibus, orbitis argenteis, thorace magis cinereo, alis hyalinis, squamis halteribusque plerumque albidiioribus; & a *depressula* antennarum seta nuda, nec subplumata, & thorace cinereo, nec nigricante, satis differt. Feminæ vero harum specierum ægre dignoscuntur & vix nisi cum conju-

ge suo habitantes 1. in copula deprehensæ ad suos veros mares referri possunt.

*Obs.* Species, quam Cel. Meig. in Dipt. 7. 317. 27. ♂. sub nomine *Hylemyia didyma* anno 1838 descripsit, alia omnino est, cum nostra non confundenda.

*Obs.* Ut haec atque species 69, 70, & 71 a quibusdam sequentibus de cetero valde similibus distinguantur, ad abdomen (præsertim in ♂) depressulum, nec convexum, probe est attendendum. — Variat ♂ abdominis linea dorsali media tenui brunnea. Variat quoque ♂ obscurior, abdominis maculis dilatatis subconfluentibus. — *Ar. 7-notatae* (80) valde etiam similis *Aricia didyma*.

**73.** *A. brunneisquama*: ovata, capite cano; fronte subprominente; seta antennarum subnuda; ore parum reflexo; abdomine subdepresso, griseo, maculis 4 mediocribus, trigonis, distantibus, nigris; squamis sub alis brunneoscentibus; *mas*: oculis subcohærentibus, thorace nigricante, vittis 4 atris, alis fuscans; *femina*: oculis late remotis, thorace cinereo, lineis dorsalibus subtribus brunneis, alis hyalinis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  fere 2 $\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi; ad Tjomotis prope Qwickjock a D. Andersson 1843 in copula deprehensa; in Dalecarlia, D. Boheman; in Jemtlandia ad Ristansfors, Skalstugan & Mullsjellen usque in regionem nivalem alpium adseendentem, in copula junetam 24 Jul.—6 Aug. inveni; in Norvegiae alpibus raro.

♂♀. Simillima *Ar. compunctæ* (68), magnitudine tamen paullo minore, squamis sub alis magis flavo-brunneis, oculis maris magis approximatis (minime autem arce cohærentibus), alis plerumque distincte fuscans, & feminæ thoracis lineis subtribus, nec unica, brunneis, vere differt. Ab *Ar. litorea*, (83), cui quoque similis, alarmi nervis transversis non infu-

seatis, & squamis brunneis, nec albidis, dignoscitur. Antennæ nigrae, seta microscopicè puberula, basi incrassata, Punctum utrinque ad os certo situ nigrum. Alæ ima basi flavæ, l. fuseæ. Os subtus nigro-pilosum. Palpi subclavati, atri. Abdomen ovatum, setulosum. Nervi transv. subapproximati: ordinarius rectus, superpendicularis. Pedes nigri, pilosi, parce setosi. *Mas:* vitta frontalis angusta nigra; orbita oculorum tenuissima, albida; abdomen 1:mo segmento toto maculisque 4 nigris; anus obtusus; genitale parum inflexum; alæ nigricantes; *femina:* vitta frontalis lata nigra, postice maculam cordatam griseam includens; punctum supra antennas cinereum; abdomen maculis 4 brunneis; anus acutus; alæ hyalinæ.

**74. *A. contractifrons:*** ovato-oblonga, subcylindrica; capite albido; fronte haud prominente; seta antennarum pubescente; ore non reflexo; abdomine cinereo, maculis 4 medioeribus, trigonis, distantibus, nigris; alis hyalinis, squamis albis; *mas:* oculis subcohærentibus, thorace nigricante; *femina:* oculis remotis, thorace cinereo, lineis 3 brunneis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$  fere 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 683. 97. ♀. — *Anthomyza arctica* Ins. Lapp. 669. 34. ♂♀. varietas.

Hab. in foliis fruticum & graminosis, per Scandinaviam præsertim borealem, 21 Jun.—Jul. Aug. — 2 Sept., passim frequens, in copula multoties deprehensa; scilicet in Scania ad Lund rarissime; in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena, parce; in Gotlandia ad Öja &c. rarius; in Herjedalia ad Ösver-Hogdal &c. freq.; in Dalecarlia; in Jemtlandia tota & in primis ad Hosverberget, Ås prope Östersund, Åreskutan, Mullfjellen & Skalstugan, copiosissime, in summa caerulea (4000 ped. supra mare) alpium sæpe adscendens, &

in nive ambulans; in Bottnia boreali rarius; in Lapponiis: Umensi, Lulensi (ad Qwickjock) & Tornensi, passim; in Norvegiæ inferalpinis ex. gr. ad Thynæs, Næs, Suul & Kälahög, Værdaliæ, ad Björkvik Nordlandiæ, & ad Skaaddavaara Finmarkiæ, vulgatissima. (E Grönlandia per D. Wester-mann missa).

♂♀. Frons haud prominens, seta antennarum pubescens, os non reflexum, alæ hyalinæ, nervi transversi subapproximantes, perpendiculares, recti, squamæ albæ, ut & maris abdomen conico-cylindricum, sunt præcipue notæ, quibus simul sumtis hæc species ab affinibus dignoscitur. *Ar. didyma*, 72, præterea paullo major. Antennæ præsertim in ♂ breviusculæ, nigræ, seta basi leviter incrassata. Palpi subfiliiformes, atri. Os subtus non dense pilosum. Alarum costa parum ciliata. Squamæ sub alis non magnæ, albæ l. albidæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres pallide flavi. Pedes mediocres, validiusculi, pilosi & setulosi, nigri. ♂: oculi plus minus cohærentes, vitta frontali postice angusta, antice latiore, tota atra, orbitis argenteis. Thorax nigricans l. obseure cinereus, indeterminate fusco- l. atro-lineatus. Humeri cinerei. Scutellum nigricans. Abdomen cinereum l. einereo-glaueum, apice setosum, segmentis: 1:mo toto, 2:do & 3:ti maculis 4 trigonis plus minus approximatis, nigris. In segmento 4:to sœpe etiam apice macula nigricans. Anus rotundatus, inflexus, niger, einereo-micans. Alæ leviter subfuscanae, nervis transversis non late distantibus. ♀: tota læte cinerea, thorace lineis 3 dilate brunneis. Oculi modice remoti, vitta frontali nigra, maculam posticam oblongo-obcordatam nigram includente. Punctum supra antennas albidum. Abdomen ovatum, apice acentum, postice setosum, maculis 4 majusculis subtrigono-rotundatis brunneis. Alæ hyalinæ, nervis basi albieantibus, transversis paullo magis quam in ♂ remutis. — E Lapponia Luleasi etiam specimina minora utriusque sexus obtinui. Variat, mas: oculis plus minus

cohærentibus, abdominis maculis nigris majoribus 1. minoribus; *femina*: maculis abdominis brunneis aut plerumque discretis, aut interdum dilatatis subconfluentibus; & *uterque sexus*: antennarum seta plus minus distincte pubescente. Has vero varietates in copula promiscue junctas comprehendit.

**75.** *A. fumipennis*: oblonga, subcylindrica, capite albido; fronte haud prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; abdomine cinereo, maculis 4 medioribus, trigonis, subapproximatis ( $\delta$ ), nigris; alarum costa subciliata; squamis albis; *mas*: oculis cohærentibus, thorace nigro, alis nigricantibus.  $\delta$ . (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali ad diversorium Skalstugan in jugo alpino situm, passim, mense Jul. 1810 captum.

$\sigma$ . Simillima priori, sed antennarum seta brevius puberula fere nuda, alis totis distincte fumatis, costa breviter ciliata, ut & abdominis maculis nigris magis approximatis, per lineam angustam cinereum tantum disjunctis, distert. In abdominis segmento 4:to macula nigra etiam sæpe adest. Reliqua ut in præcedente.

**76.** *A. vana*: oblonga, subcylindrica, capite cano; fronte haud prominente; seta antennarum distincte pubescente; ore parum reflexo; abdomine cinereo, nigro-1-maculato; alatum costa subnuda, nervo transverso ordinario levissime flexo; squamis albis; *mas*: oculis subcohærentibus, thorace nigricante, abdome maculis 1 medioribus, trigonis, subapproximatis, nigris, alis leviter fuscauis; *femina*: oculis late remotis, thorace cinereo, obsolete brunneo-3lineato, abdome maculis 1 rotundatis, brunneis, alis hyaluis.  $\delta \varphi$ . (Long. 2 lin.).

Hab. in Ölandia & Gotllandia, ubi tria paria copulata mense Julio 1819 inveni; in pratis ad Öja & Wamlingbo Gotlandiae etiam utrumque sexum 5—7 Jul. 1811 deprehendi.

♂♀. Duabus proxime praecedentibus valde similis & affinis, sed ab *Ar. contractifronte* maris abdominis maculis magis approximatis, alis fuscis; a *fumipenni* antennarum seta distinctius pubescente, costa alarum parum ciliata; & ab utraque magnitudine nonnihil majore, nervo transv. ordinario non exactissime recto, differt. — Antennae breviusculæ, in ♀ nonnihil longiores. Frons in ♀ lata, cinerea, certo situ vitta nigricante didyma. Abdominis puncta 4 in ♀ remota, rotundata, parva, brunnea, & siepe etiam lineola ejusdem coloris in segmento 4:to. Cetera ut in *contractifronte* & *fumipenni*.

**77.** *A. trianguligera*: oblonga, subcylindrica, epistomate albido; fronte haud prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; ab domine cinereo, maculis subquatuor mediocribus, trigonis, subapproximatis, nigris (♂), aut brunneis (♀); alarum costa subciliata, squamis albis, flavidо-marginatis, halteribus flavis; *mas*: oculis appropinquantibus, thorace nigro, alis nigricantibus; *femina*: oculis remotis, cinerea, thoracis lineis 3 brunneis. ♂♀. (Long. 1<sup>3</sup> fere 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 680. 82. ♂♀.

Hab. in Scandinavia borealis fruticibus, locis alpestribus, 1 Jul.—2 Aug., passim, in copula aliquoties deprehensa; scilicet in Ostrogothia ad Gusum, teste D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Mullsjellen & Stalltjernstugan; in Lapponia Umensi ad lacum Skirträsk in paroecia Stensle rarissime; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. *Wahlberg*; in Norvegia: ad Levanger & Thynæs atque

in Værdalia ad diversorium Kongsstue in jugo alpino situm, parce; etiam in Norvegia a D. Bohemus capta.

♂♀. Simillima *Ar. fumipenni* (75), a qua vix differt nisi oculis in mare paullulum distantibus, & squamis sub alis pallide flavo-marginatis. *Mas*: vitta frontali angustata, nigra. Orbita oculorum tenuissima, alba. Abdomen oblongum, cylindricum, cinereum, segmentis: 1:mo toto, 2:o & 3:tio maculis in singulo duabus, majusculis, anguste trigonis, approximatis, & 4:to macula oblonga l. simplici l. gemina, nigris. Reliqua ut in *Ar. fumipenni*. *Femina*: paullo major, tota cinerea, vitta frontali didyma, nigra; thoracis lineis dorsalibus 3 abdominalisque maculis 4 (in segmentis 2 & 3) majusculis, trigonis, approximatis, lineaque in segmento 4:to obsoleta, dilute brunneis.

78. *A. triangulifera*: oblonga, subcylindrica, epistomate albido; fronte parum prominente; seta antennarum nuda; ore reflexo; abdome glauco, nigro- (♂), l. olivaceo-maculato (♀); alis hyalinis, costa nuda, squamis albis, halteribus obscuris; *mas*: oculis cohærentibus, thorace nigro, abdominalis cylindri maculis 6 magnis, trigonis, approximatis, nigris; *femina*: oculis remotis cinerea, thoracis lineis 3, abdominalisque maculis 4 majoribus, confluentibus, brunneis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 680. 83. ♂♀.

Hab. in floribus Salicium Scandinaviæ borealis, 28 Jun. 8 Jul.—12 Aug., minus frequens, in alpium nivem perennem interdum adscendens, in copula capta; scilicet in Jemtlandia ad Mullsjellet rarius; in Lapponia Umensi parce; in Lapponia Lulensi ad Tjomotis atque in alpe Snierack prope Quickjock, D. Prof. Wahlberg, qui sub nomine "Anthom. pulchella" specimen masculum 1843 mecum

communicavit; in Norvegia ad divisorium Suul in jugo alpino situm a D. *Dahlbom* 1840 deprehensa; & inter Alten & Kautokeino Finmarkiae occidentalis unicum par in copula junctum 1821 a me lectum. ♀ rarissime obvia.

♂♀. Ab antecedentibus affinibus ut quoque a sequente halteribus nigrantibus & ore reflexo mox & facile dignoscitur. Antennæ breves, validæ, nigræ, seta nuda, fere ad medium incrassata. Palpi subcylindrici, nigri. Oculi in viva ferruginea. Alæ aqueæ. Squamæ parvæ, albæ. Pedes nigri, pilosuli, sed vix spinulosi. *Mas:* pilosus, epistomate argenteo. Oculi cohærentes, orbita tenuissima alba, macula supra antennas nigra. Thorax niger, rudimento linearum atrarum. Abdomen oblongum, cylindricum, glaucum, segmentis: 1:mo toto, 2 & 3 maculis in singulo duabus magnis, trigonis, & 4:to maculis 2 anguste trigonis, atris; maculis omnibus dorso approximatis, per lineam medianam angustam glancam divisis. Anus rotundatus, inflexus, niger, opacus. Halteres nigri. *Femina:* capite cinereo. Oculi late remoti, fronte sub prominente, vitta didyma nigra. Thorax obscure cinereus, fusco-lineatus. Abdomen ovatum, glauco-cinereum, segmentis: 1:mo fere toto, 2 & 3 maculis in singulo duabus, magnis, trigonis, ad marginem lateralem angulo extensis & in medio dorsi subconfluentibus, olivaceis. Anus acutus. Halteres fusi.

Var. b. ♂. oculis non cohærentibus, sed anguste distantibus; alias var. a. simillima; in summo cæcumine alpis Åreskutan, 1 Aug. semel lecta.

**79.** *A. trigonata:* oblongo-ovata, obscure cinerea, capite argenteo; fronte non prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; thorace fusco-vittato; abdome subdepresso, cano, maculis 6, trigonis, distantibus, nigris; alis hyalinis, nervis leviter infuscatis, costa sub-

ciliata; squamis albis; halteribus flavis; *mes.*: oculis subcohærentibus. ♂. (Long. 2. lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 680. 81. ♂.

Hab. in Scandinavia boreali rarissime; in Lapponia Tornensi ad pagum Pello in palude, 4 Jun. 1821 a me inventa; in Norvegia ad Dovre a D. *Bohemus* capta; & in Lapponia Lulensi ad Quickjock Jul. 1843 in unico individuo a D. *Wahlberg* lecta.

♂. Valde similis & affinis *Ar. trigoniferæ* (69), & *Sororculæ* (70), sed ab illa alarum nervo transv. ordinario rectissimo, perpendiculari, ab hac alis squamisque non fuseanis, & ab utraque abdominis maculis subsenis (nec 4), magisque discretis, præcipue differt. Ab *A. contractifronte* (74) ejusque affinibus magnitudine paullo majore abdomineque maris subovato & (in mortua) subdepresso differt. Antennæ medioeres, nigræ, seta breviter puberula, distincte biauriculata, basi incrassata. Oculi magni, fere cohærentes, tantum orbitis oculorum tenuibus argenteis disjuncti. Frons convexa, maenla supra antennas triangulari nigra. Seta mystacina ceteris setis oris parum validior. Thorax nigricans, lineis 5 obscurioribns, lateralibus minus perspicuis. Abdomen canum, (in viva convexum) segmentis: 1:mo fere toto, 2 & 3 maculis in singulo duabus sat magnis, trigonis, liberis, & 4:to maculis 2 minoribus, atris. Anus rotundatus, inflexus, niger, leviter cinereo-micans. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis fuscedine leviter subcinetis. Squamæ medioeres, albæ. Pedes piceo-nigrieantes, pilosi, sed non fortiter setosi. — Variat abdominis linea dorsali media tenui brunnea. — Variat etiam alis hyalinis in alpibus Dalecarliensis a D. *Bohemus* lecta.

80. *A. 7-notata*: oblongo-ovala; fronte non prominente; seta antennarum nuda; ore non reflexo; abdome subdepresso, cinereo, 7-maculato; squamis sub alis

albidis, halteribus flavis; *mas*: oculis coherentibus, capite argenteo, thorace nigricante, abdominis maculis trigonis atris, alis fuscaneis; *femina*: oculis remotis, capite cinereo, thorace griseo, brunneo-lineato, abdominis maculis trigonis brunneis, alis hyalinis. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

*Mas*: caput argenteo-micans. Oculi sat arete coherentes.

Thorax nigricans, lineis atris. Abdomen ovatum, subdepressum, cinereum, maculis 7 majusculis, trigonis, atris, nempe duabus in singulo segmentorum 1, 2 & 3, approximatis, per lineam tantum angustam cinereum in medio disjunctis, & 7:ma in segmento 4:to. Anus inflexus, niger, nitidus, leviter cinereo-micans. Alæ nigricantes, margine interiori subhyalino;

*Fem*: tota cinerea. Oculi modice remoti. Vitta frontalis didyma, nigra. Thoracis lineæ subtres, brunneæ, obsoletæ. Abdomen ovatum, maculis numero, magnitudine, forma & situ ut in ♂, sed colore brunneis & magis obsoletis. Alæ cinereo hyalinæ; in copula.

Var. a. ♂♀. squamis sub alis in utroque sexu albis.

Var. b. ♂ (in copula cum ♀ var. a.) squamis sub alis fuscaneis.

*Anthomyza didyma* var. b. ♂. Zett. Ius. Lapp. 683. 100.

Hab. var. a. in Jemtlandia boreali ad Mullfjellen & Skalstugan 15--30 Jul., passim; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. *Bohemian*; var. b. in Lapponia Umensi ad Åsele in fine mensis Junii semel a me, & ad Quickjock a D. *Bohemian*, capta.

♂♀. Simillima *Ar. didymæ* (72), sed differt: seta antennarum brevissime puberula, nec omnino nuda, abdominis 1:mi segmenti pictura obscura per lineam medianam cinereum divisa, unde 1:mum par macularum exstat, ut & maris thorace aliquae nigrioribus. Ab *Ar. sumipenni* (75), cui quoque val-

de similis, magnitudine nonnihil minore, & abdomine in ♂ magis ovato & subdepresso, nec subcylindrico, praecipue dignoscitur. Alae non latæ. Nervi transversi non late remoti, horum ordinarius perpendicularis, recissimus. Costa saltem in ♂ vix ciliata. Squamæ mediocre, valvula superiore inferiorem non tegente. Reliqua ut in *Ar. didyma*.

81. *A. vitticollis*: oblonga, obscura, capite griseo; fronte prominente, brunnea; seta antennarum nuda; ore reflexo; thoracis lineis 4 atris; abdomine glauco, maculis 4 magnis, trigonis, olivaceis; alis hyalinis, costa nuda; squamis albis; halteribus nigris. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab in Jemtlandia Boreali, 28 Jun.—30 Jul., rarius; nempe ad divisorium Skalstugan in jugo alpino situm, & ad alpes Mulfjellen, ubi in regionem nivalem adscendit, in ipsa nive ambulans, deprehensa.

♀. Similis *Ar. frontatae* (64), sed thoracis lineis 4, nec 3, nigris, antennarum seta nuda, nec subplumata, abdominis pictura alia, alarum nervo transverso ordinario recto, nec inflexo, & halteribus obscursis, nec flavis, facile dignoscitur. Similis quoque *Ar. litoreæ* (83), & *marginali* (126), ab illa vero antennis brevioribus, thorace alter pieto, alarum nervis non infuscatis, &c., & ab hac colore obscuriore, abdominis maculis discretis, nec in fasciam confluentibus, alarum nervis transversis non fuscedine cinetis, ut & costa nuda, nec ciliata, præcipue differt. — Oculi parvi, late remoti. Frons brunnea, vitta didyma, nigra. Antennæ breves, nigrae, articulo ultimo latiusculo, seta nuda, fere ad medium incrassata. Epistoma sordide griseum. Thorax nigro-brunneus, opacus, vitta humerali cinerea, & lineis 4 dorsalibus, nigris. Scutellum totum nigro-brunneum. Abdomen ovatum, apice acutum, totum canum, segmentis: 1mo toto, 2 & 3 maculis in singulo duabus, magnis exakte trigonis ad marginem lateralem extensis & in medio per lineam angustam

cinereum separatis, olivaceis. Alæ hyalinæ, parum fuscanae. Squamæ non magnæ, albæ. Halteres nigrieantes.

82. *A. dorsata*: oblonga, opaca, capite griseo l. livido; fronte prominente, brunnea; seta antennarum submuda; ore reflexo; thorace nigro-brunneo, vitta laterali glauca; abdomine cinereo, maculis magnis subconfluentibus olivaceis; alis subhyalinis, nervis transversis subinfuscatis, costa subciliata; squamis halteribusque sordide albidis. ♀. (Long. 2—2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in regione nivali alpium Lapponicarum, 22 Jul.—1 Aug., rarius; in summis cacuminibus alpium Åreskutan Jemtlandiæ, & Kälahögar Värdaliae Norvegiae mihi paree obvia.

♀. Valde similis priori, a qua tamen thoracis disco non nigro-lineato, abdominis pictura olivacea subcontinua, nec maculas discretas perspicuas formante, alarum nervis transversis leviter infuscatis, costa subciliata, ut & squamis sordide albidis, halteribusque testaceis, nec obscuris, differt. *Ar. marginali* infra no 126, adhuc similior, sed magnitudine nonnihil majore, corpore minus cylindrico, epistomate fusco-cinereo, nec argenteo, ore magis reflexo, thoracis disco latius & obscurius nigro-brunnescente, abdominis maculis lateralibus obscure cinereis, nec albidis, alarum costa brevius ciliata, spinula minore, squamis sordide albidis, nec niveis, &c., dignota. — Seta antennarum mediocrium breviter puberula. Palpi subcylindrici, nigri. Vitta frontalis lata, brunnea, opaca. Scutellum nigro-brunneum, macula media dilatiori. Abdomen ovatum, parum pilosum, obscure cinereum, segmentis: 1:mo toto, 2 & 3 macula magna triangulari fasciæformi, per lineolam medium rudimentalem cinereum haud perspicue divisa, obscure olivacea. Vestigium maculæ fusca in segmento anali etiam adest. Alæ levissime fuscanae, nervo transv. ordinario perpendiculari, recto. Pedes nigri, pilosi. — Variat in singulo segmentorum 2 & 3

maculis duabus parvis, subrotundatis, late brunneis, valde obsoletis & certo tantum situ observandis. — Similis etiam & affinis *Ar. squalenti* 56, & *morienti* 115, sed a priori capite griseo l. sordide cinereo-flavido, a posteriori, cui capitum colore simillima, antennis brevioribus minusque validis, thoracis disco brunneo, alis vix flavidis, nervis longit. 3 & 4 versus apicem leviter divergentibus, nec parallelis, squamis albidis, valvula superiore inferiorem non tegente nec squamis subfuscatis valvula inferiore superiorum tegente), & ab utraque abdomine plus minus maculato, dignoscitur.

*Obs.* *Mares* desunt pro verum locum speciebus 77 & 78 determinando. An harum mares oculis hirtis gaudent?

††.) Antennae longiusculae h. e. epistomate paullo tantum breviores, articulo ultimo 2:do fere triplo longiore.

83. *A. litorea*: oblonga, grisea, capite argenteo; fronte subprominente; seta antennarum pubescente; ore reflexo; thoracis vittis 3, abdominisque maculis 4, trigonis, brunneis; alis hyalinis, nervis transversis subinfuscatis, squamis albidis, halteribus flavis; *mas*: oculis appropinquantibus. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Mas*: oculis appropinquantibus, per vittam frontalem angustalam nigram & orbitam albidam paullo disjunctis, abdomine oblongo, subdepresso, cinereo, segmentis: 1:mo fere toto, 2 & 3 maculis quatuer medioribus, trigonis, nigris;

*Fem.*: oculis modice remotis, fronte grisea, vitta media didyma nigra, abdomine ovato, griseo, maculis 4 trigonis, aut discretis, aut confluentibus, brunneis interdum obsoletis, in copula.

*Musca* Fall. Muscid. 63. 60. ♂♀. typica. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 90. 13? (tibiis in nostris nigris, nec testaceis). — Zett. Ins. Lapp. 670. 38. ♀. *Coenosia* Meig. Dipt. 6. pag. 334?

Hab. in fruticibus & graminosis, plerumque in vicinitate aquæ, per Scandinaviam, 7 Jun.—5 Sept., passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Tranås, Esperöd, &c., haud infrequenter; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in Jemtlandia ad Östersund & Skalstugan; in Lapponia Umensi ad Åsele & Stöttingsfjellet; in Norvegia ad Thynæs, Garnäs, Suul & Kongsstue in jugo alpino, non raro; e Dania a D. *Staeger* communicata.

♂♀. Antennæ angustatæ, longiusculæ, picta corporis brunnea saepe dilatata & confluens, alarum nervi transversi fuscedine leviter (interdum in ♀ levissime) cincti, speciem ab affinibus præprimis distinguunt. Antennarum seta plus minus pubescens, basi graciliter incrassata. Epistoma perpendicularare, apice reflexum. Proboscis in mortua saepe subpendula. Palpi elongati subcylindrici nigri, apice subcrassiores. Thoracis vittæ 3 brunneæ: media angustior, laterales latiores maculaformes, omnes postice plerumque coherentes. Scutellum obscure griseum, saepe macula lateralí brunnea. Abdominis segmentum ultimum etiam saepe macula fuscæ notatum. Alæ (♂) levissime fuscanæ. Nervi transversi non approximati, horum ordinarius sapis non exactissime rectus. Costa vix ciliata. Squamae mediocres. Pedes setulosi.

*Obs.* Ab *Ar. notata* n:o 25, cum qua in collectionibus commixta interdum occurrit, magnitudine paullo majore, picta thoracis alia, seta antennarum pubescente, nec breviter plumata, alarum nervis: transversis fuscedine leviter plerumque cinctis, longitudinalibus 3 & 4 versus apicem levissime divergentes, nec 4:0 ad apicem levissime inflexo, costa feminae basi subciliata, nec nuda, & maris oculis nonnihil magis disjunctis, &c., satis superque dignoscitur. — Neque cum *Ar. maculigera* infra, n:o 90 confundenda.

84. *A. 5-lineata*: oblonga, cinerea, capite argenteo; fronte parum prominente; seta antennarum subnuda; ore vix reflexo; thoracis lineis 5 brunneis; abdomine nigro-nitente; alis hyalinis, nervis transversis distincte infuscatis; squamis albidis, halteribus testaceis. ♀. (Long. 2—2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 671. 42. ♀. *Anthom.* *litorea* var. b. ♀. Zett. I. c. 670. 38. est varietas hujus.

Hab. in Lapponia Tornensi ad Muonioniska, & in Finmarkia Norvegica ad Bossekop, rarissime; 4—17 Aug. 1821 tria specimina mihi obvia.

♀. Similis praecedenti; sed ore minus reflexo, thoracis lineis 5 (nec 3), liberis, nec postice cohaerentibus, abdomine obscuriore, nitido, & alarum nervis transversis magis approximatis distinctisque fuscedine cinctis, facile dignoscitur. — Oculi modice remoti, vitta frontali duplicata atra. Punctum supra antennas albidum. Seta antennarum brevissime puberula, basi subin-  
crassata. Thorax glaucus, lineis 5 late brunneis. Sentellum cinereum. Abdomen ovatum, tectum nitidum, glabriculum, nigrum, maculis scilicet ordinariis brunneo-nigris ita dilatatis, ut maculae seu fasciae cinereæ tantum ad latera obsolete conspiciantur. Nervus transv. ordinarius perpendicularis, non exactissime rectus. Costa basi leviter subciliata; spinula minuta. Halteres fusco-testacei. — Vix varietas detrita sequentis.

85. *A. maculipennis*: oblonga, grisea, capite cinereo; fronte haud prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; abdomine flavidо-griseo-nitente, obsolete brunneo-maculato; alis hyalinis, nervis transversis late infuscatis; squamis albidis, halteribus fuscis, mas: oculis cohaerentibus. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali forte rarissima; ♀ ad Quickjock Lapponiae Lulensis in parietibus ligneis domi

Sacerdotis, a Studio D. *Andersson* Jul. 1813 lecta mis-  
bique in duobus exemplis communicata; ♂ in Dalecarlia,  
D. *Boheman.*

♂♀. Priori valde similis & affinis; sed magnitudine non nihil  
minore, thorace griseo subimmaculato, abdome cinereo (♂),  
aut olivaceo-griseo-nitente (♀), & nervis transversis latius fu-  
scendine cinctis, dignola. — Caput griseo-cinerascens. Oculi in  
♀ modice remoti, vitta frontali nigra didyma; aut in ♂ co-  
hærentes. Epistoma perpendicularare, apice non reflexum. Palpi  
cylindrici, nigri. Antennæ elongatæ, angustatæ, nigrae, apice  
inferno rotundatæ, seta longa, capillari, breviter puberula, basi  
leviter incrassata. Thorax griseus subimmaculatus, antice ve-  
stigio linearum 4 nigrarum valde abbreviatarum. Scutellum  
griseum. Abdomen ovalum, nitens, in ♂ maculis 6 conico-trian-  
gularibus, nigris, aut in ♀ maculis 4 dilute brunneis valde ob-  
soletis. Alaæ cinereo-hyalinæ, nitentes, nervis transversis late  
infuscatis, perpendicularibus, rectis. Costa basi breviter subci-  
liata; spinula parva. Squamae albidae, pallide flavo-marginatae.  
Halterum clava fusca. Pedes nigri, parce setulosi.

86. *A. surda*: oblonga, nigricans; fronte subpro-  
minente; seta antennarum subnuda; ore subreflexo; ab-  
domine ovali, subdepresso, griseo, maculis 4 trigonis,  
nigris; alis hyalinis, squamis albidis, halteribus flavis;  
*mas*: oculis appropinquantibus. ♂. (Long. fere 2 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; duo tantum specimi-  
na mascula vidi, unum; sub nomine: "Limnophora (*An-*  
*thomyia*) triangula Meig. non *Musca* eadem Fall." ex  
Hafnia a D. *Staeger* missum; & alterum sub nomine:  
"*triangulifera*" a D. *Wahlberg* e Gusum Ostrogoth. com-  
municatum.

♂. Similis & affinis *Ar. trigoniferae* 69. & *Sororeculæ* 70. sed  
fronte paullo magis prominente, ore subreflexo, oculis noni-

hil magis distantibus, ut & antennis paullo longioribus, praeceps distincta. Frons sub prominula, nigro-micans, vitta inter oculos angustata atra. Antennæ & seta ut in priori. Epistoma in medio cinereum. Setae oris plures. Palpi subfiliformes, nigri. Thorax nigricans, lineis atris parum conspiciendis. Scutellum nigricans. Abdomen pilosum, griseum, segmento 1:mo fere toto, 2 & 3 maculis in singulo duabus, trigonis, approximatis, nigris. Macula minor in segmento ultimo etiam adest. Anus subinflexus, obscurus. Alæ hyalinæ, nervis transversis subapproximatis, perpendicularibus, rectissimis. Costa brevissime ciliata; spinula nulla. Pedes nigri, pilosi.

*Obs.* Si hæc *Anthom. triangula* Meig. Dipt. 5. 148. 112. etiam esset, nomen tamen mutandum, nam *triangula* Fall. typica alia est species, infra sub n:o 92, allata.

\*\*. Alarum costa subciliata & spinula distincta.  
Antennæ longiuseculæ.

87. *A. 4-maculata*: oblonga, cinerea, capite argenteo; fronte vix prominente; seta antennarum breviter subplumata; ore non reflexo; thoracis lineis subbinis fuscis; abdominis maculis 4 minusculis, discretis, nigris (♂), aut brunneis (♀); alis hyalinis, nervis transversis subinfuscatis; mas: oculis subochærentibus, tibiis posticis intus villosis. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 63. 61. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 92. 16. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 670. 39. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 24. *Musca cornuta* Fabr. Autl. 298. 71. (teste Meig.).

Var. b. ♀. ab domine immaculato. Fall. l. e. var. β.

Hab. in foliis fruticum, var. a.: per Scandinaviam totam, 1 Jun.—20 Aug., passim; in copula; scilicet in Scania frequens; in Smolandia, D. *Ljungb*; in Ostrogothia

ad Gusum &c. rarius; in Bahusia ad Marstrand; in Up-landia ad Holmiam; in Gotllandia ad Ejsta, Wamblingbo, &c.; in Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad radicem alpium Åreskutan & Mullsjellen, usque ad Skal-stugan procedens; in Lapponia Umiensi ad Lycksele rarius; in Lulensi ad Quickjock, D. *Wahlberg*; in Norvegia; ad Thynäs & Levanger passim, in inferalpinis maritimis Nord-landiae ad Dyrön & Finmarkiae ad Bossekop. parce; in Dania haud rara, D. *Staeger*; var. b: in Scaniæ paroecia Tranås ad Esperöd rarissime.

$\delta^2$ . Cinerea, opaca, setosa. Frons parum prominens. Antennæ elongatae, nigrae, seta basi incrassata. Palpi cylindrici, nigri. Thorax lineis subquadrator fuscis, quarum lateralibus abbreviatis, obsoletis. Alæ cinereo-hyaline, nervis transversis plus minus infuscatis, herum ordinario subobliquo, & non exakte recto. Costa subciliata; spinula gemina. Squamae medieores, albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, sat valide setosi. *Mas:* caput argenteum. Oculi per orbitam albani disjuncti. Frons supra antennas triangularis nigra, puncto albo. Abdomen ovale, sub-convexum, pilosum, totum lâte cinereum, tantum maculis 2 & 2 (in segmentis 2 & 3) mediocribus, remotis, subtrigonis, nigris.  $\delta^3$  interdum etiam maculis 2 obsoletis fuscis in segmento Iimo. Anus parvus. Tibiae posticæ intus breviter villosæ. *Femina:* caput canum. Frons lata, vitta duplicita, nigra. Abdomen ovalum, minus pilosum, cinereum, maculis 4 subrotundatis, brunneis. Tibiae posticæ intus non villosæ. — Cum *Ar. duplicata* 23. & *duplicata* 24, haec species non confundenda.

88. *A. borealis*: oblonga, cinerea, capite argenteo; fronte parum prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; thoracis lineis subbinis fuscis; abdominis maculis 4 minusculis, discretis, subtrigonis, nigris; alis subhyalinis, basi & nervis transversis infuscatis; *mas*:

oculis appropinquantibus, tibiis posticis intus non villosis.  
♂. (Long. 2–2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 679. 80. ♂.

Hab. in Lapponia Umensi rarius; ad Lycksele & Åsele initio meusis Junii inventa.

♂. Magnitudo & summa praecedentis similitudo; sed antennarum seta subnuda seu breviter tantum puberula, oculis (♂) nonnihil magis distantibus, per vittam scilicet frontalem angustam atram & orbitam albam paullo disjunctis, alis basi plerumque fuscatis, nervo transverso ordinario paullo magis inflexo, ut & tibiis posticis fortiter quidem setosis, at intus non villosis, dignota. Variat alarum basi & nervis transversis parum infuscatis.

89. *A. solitaria*: oblonga, subcylindrica, lète cinerea, capite argenteo; fronte sub prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; abdominis maculis 6 brunneis; alis albo-hyalinis; mas: oculis subappropinquantibus. ♂. (Long. 1½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 677. 72. ♂.

Hab. in Lapponia Suecia Umensi rarissime; ad novacolum Nästansjö d. 13 Jul. 1832 individua duo a me inventa; horum alterum in collectione Nobilissimi D. *Führæi* jam conservatur; in Lapponia Lulensi ad Jockmook pone medium Augusti 1813 etiam specimen unicum masculum a D. *Wahlberg* lectum.

♂. Parva. Per distantiam oculorum (vix vero tam longe ut in *Coenosiis* auctorum), corpus cylindricum, thoracem subimmaculatum, alas subalbidas &c., ab affinis dignata. Costa ciliata, spinula parva quidem, tamen præsente, antennis longiuscu-

lis &c., ab *Arici contractifrons* (74) ejusque similibus distinguitur. Oculi ut in priori remoti. Seta antennarum brevissime puberula, basi subincassata. Abdomen cylindricum, distincte setosum, canum, macularum tribus paribus brunneis obsoletis. Alarum nervi transversi sat dissiti, perpendicularares, horum ordinarius levissime flexus. Squamae albæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres pallidi. Pedes nigri, setosi. — Statura & similitudo *Anthomyzæ 8-punctatæ* (110), *6-notatae* (96) earumque affinum, sed pedibus totis nigris ab illis mox dignota.

$\beta$ ) Nervus transversus ordinarius fere in medio l. mox ante medium areæ insertus. Costa subnuda; spinula minuta.

90. *A. maculigera*: oblongo-ovata, cinerea, capite albicante; fronte haud prominente; seta antennarum subnuda; ore non reflexo; thoracis vittis 3, scutelli linea laterali, abdominalisque maculis 4 trigonis, brunnescentibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario levissime flexo. ♀. (Long.  $2\frac{1}{3}$  lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; in Scania ad Espérod in paroecia Mellby tria exempla inveni; in fruticibus Salicis ad Storsand in paroecia Öfver-Luleå Bottniae borealis, medio mens. Junii 1813 quoque capta erit, teste Cel. *Wahlberg*.

♀. Simillima *Ar. lioreæ* (83), sed antennarum seta brevius puberula, ore non reflexo, alarum nervis transversis haud infuscatis, horumque ordinario leviter infexo & paullulum longius a transv. medio remoto, præcipue dignota. Frons lata, vitta disyma atra. Anteana elongata. Thorax cinereus, antice vestigio lineolarum 4 mox abbreviatarum nigrarum, & in dorso vittis 3 latiusenlis brunneis, media antice abbreviata, omnibus postice plerunque coherentibus. Scutellum cinereum, macula

utrinque brunnea. Abdomen ovatum cinereum, maculis 4 majusculis, trigonis, discretis, brunneis. Squamæ sub alis halteresque, aliada. Pedes nigri, parce setosi.

**91. *A. abbreviata*:** oblonga, cinerea (♀), aut nigricans (♂); capite cano; fronte subprominente; seta antennarum breviter puberula; ore non reflexo; thoracis vittis 3, media subtriplicata, lateralibus abbreviatis, abdominisque maculis 4 trigonis, brunnescensibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario subrecto. ♂♀. (Long. 2–2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 671. 43. ♂♀.

Hab. in Scandiravia boreali, 14 Jun.—28 Jul., passim; in copula; feminae in ligno nuper caeso saepè deprehensæ; scilicet in Jenitlandia ad diversorium Forsa (ad radicem alpium Mullsjellen situm), & Skalstugan, haud infreenter; in Lapponia Umeensi ad Wilhelmina & Umenäs, passim; in Lapponia Tornensi ad Wittangi in silvis rarius; in Norvegia ad Suul Värdaliae parce, D. Dahlbom.

♂♀. Similis priori, fronte vero nonnihil prominula, antennarum seta forte paullo distinctius puberula, thoracis signaturis in ♀ aliis, scutello immaculato, alarum area media ad apicem nonnihil latiore, ut & nervo transverso ordinario magis recto, differt. **Mas:** obscurior. Caput albicans. Oculi subcohærentes, vitta angusta nigra. Thorax nigricans, lineis 3 obscurioribus. Scutellum nigricans. Abdomen oblongum, pilosum, obscure cinereum, maculis trigonis nigris. Alæ subfuscaneæ. Squamæ albæ. Halteres lavi. Pedes pilosi. **Femina:** cinerea. Frons lata, vitta didyma, nigra. Thoracis vittæ 3, quarum laterales interruptæ, maculaformes, media subintegra, angustior, lineiformis, antice e dualibus lineolis tenuissimis juxta positis nigris cincta, inde triplex videtur; omnes late brunneæ, postice ples-

rumque confluentes. Abdomen ovatum, parce pilosum, maculis 4 majusculis, subtrigonis, brunneis, aut determinatis, discretis, aut plus minus dilatatis. In segmento basali macula 2, & in anali, unica, brunneæ, saepe etiam observantur. Alæ subhyalinae. Squamae & halteres ut in ♂. Pedes nigri, parce setosi.

**Turma 2:da.** Alarum nervi longitudinales 3 & 4 paralleli; hinc area media apice & medio æque lata. Oculi in utroque sexu remoti.

**92. *A. triangula:*** oblongo-ovata, cinerea, capite albicante; fronte haud prominente; antennis longiusculis, seta subnuda; ore non reflexo; thoracis vittis 3 subconfluentibus, abdominalisque maculis 4 trigonis, brunneis; alis hyalinis, costa nuda; oculis in utroque sexu distantibus. ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

**Musca** Fall. Muscid. 71. 82. ♂♀. originaria secundum museum Cel. *Fallenii*. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 118. 112? ♂♀. — & 7. 327. 55? — Zett. Ins. Lapp. 685. 107. ♂♀. *Limnophora* Macq. Buff. 2. 311. 8?

Hab. in graminosis & foliis fruticum, per hortos, prata & pascua Scandinaviae meridionalis & mediae, 2 Jul.—16 Sept., passim; in copula pluries deprehensa; in fenestris etiam ♀ mense Decembris forte errabunda visa; in Scania ad Abusa, utrumque Esperöd, &c., sat frequens; in Smolandia; in Ostrogothia ad Gusum atque in Westrog. ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Gotlandia ad Gothem, Kyrkbinge-näs &c., non raro; in provinciis borealibus rarissime occurrit, ex. gr. in Dalecarliae alpibus, D. *Böhman*; e Dania a D. *Staeger* ♀ communicata. (E. *Glo-gavia* a D. *Zeller* missa).

♂♀. Per nervos longitudinales 3 & 4 usque ad marginem alae paralleliter continuatos, ut & oculos etiam in ♂ remotos, ab

antecedentibus affinibus facile dignoscitur. Corpore subovato, nee cylindrico, & pedibus nigris queque a *Coenosiis* genuinis auctorum discrepat. Parva, magnitudine *Ar. didymæ* (72). Cinerea. Antennæ nigrae, seta brevissime puberula, basi tenuiter incrassata. Palpi subfiliformes, nigri l. fusi. Thoracis dorsum vittis 3 brunneis, postice confluentibus, unde discus brunnens, vel ut Fallén dicit: "thorax dorso fusens, vitta laterali (h. e. humerali) albida." Scutellum immaculatum. Abdomen ovatum, maculis in singulo segmentorum 2 & 3, duabus trigonis sat magnis approximatis nigris l. brunneis, in fundo griseo plus minus perspicuis. Segmenta 1 & 4 sèpe etiam maculata. Alæ hyalinæ, nervo transv. ordinario ante medium areæ inserto, perpendiculari, subrecto seu levissime tantum flexo. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ proportione mediocres, albæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes nigri, parce pilosi, in juvenilibus picei. Oculi maris paullo propiores quam in ♀, fronte in utroque sexu cinerea, vitta didyma, atra. — Cum *Ar. riparia* (197) non confundenda.

*Obs.* Synonyma Meigeni & Macquarti dubia mihi videntur, quia hi Auctores suam *triangulam* "thorace nigro" describunt, quæ nota nostræ non competit. Ad directionem nervorum longitud. 3 & 4 in alis probe attendas ut speciem distingues.

*Not.* Sub nomine "*Anthom. pacifica* Meig." in Amager prope Hafniam inventum, D. Staeger individuum feminine communi- cavit, quod quoad directionem nervorum in alis nostræ *Ar. triangulæ* accedit, sed per magnitudinem multo majorem, os reflexum &c., abunde diversum, nostræ *Ariciæ trianguliferæ* (78) ore reflexo quadammodo appropinquans. Vix vero *Anth. pacifica* Meig. Dipt. 5. 149. 113. cum: "Fühler-borste deutlich behaart", seu ejusdem *Hylemyia pacifica* 7. 315. cum: "Fühler- borste gefiedert" esse potest, dum antennarum seta in speci- mine misso tantum subtilissime puberula occurrit. Mihi igitur potius nova species videtur, cui nomen *Ar. scrupulosa* proponerem, & haec diagnose & descriptione designarem:

**92. b. *A. scrupulosa*:** oblongo-ovata, cinereo-griseo,

epistomate albicante; fronte leviter prominente; antennis mediocribus. seta nudiuscula; ore reflexo; thoracis linea dorsali unica abdominalisque maculis 4, brunneis; alis hyalinis, costa nuda, squamis albis. ♀. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Dania, ubi in Amager 6 Sept. 1842 a D. Staeger detecta.

♀. Oculi per frontem cinereum & vittam didymam nigram sat late distantes. Antennae medioeriter longae, nigrae, seta subnuda seu breviter puberula. Punctum supra antenas niveum. Os infra oculos descendens, distincte exsertum. Palpi subcylindrici, atri. Thoracis linea dorsalis media brunnea. Scutellum immaculatum. Abdomen ovatum, griseum, in segmentis 2 & 3 maculis quatuor majusculis, discretis, transversim trigonis, brunneis. Ala cinereo-hyalinae, nervis longitudin. 3 & 4 subparallelis, transversis medioeriter remotis, horum ordinario perpendiculari, recto, paullo ante medium areæ inserto. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ mediocres, albæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem fere ad dimidium tegente. Halteres pallidi. Pedes cinereo-nigri, parum setulosi.

*Tribus 2:da.* Oculi saltem in mare hirti (in semiperunque nudi).

A. abdomine in utroque sexu nigro aut cinereo.

a.) pedibus in ♂ dentatis aut aculeatis. Oculi (♂) cohærentes. *Hydrotæa* Macq.

93. *A. spinipes*: oblongo-ovata, coeruleo-nigra, nitida; ore non reflexo; epistomate, puncto supra antenas, macula humerali fasciisque abdominalis (♂) interruptis, albidis; alis hyalinis, halteribus testaceis; mas: senioribus anticis subtus bidentatis, posticis subtus in medio spinula erecta; femina: abdomine atro, ano plumbeo. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 61. 55. ♂♀. vera. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 672. 49. ♂♀. *Musca ciliata* Fabr. 305. 109 (teste Meig.). — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 159. 131? ♂♀. — *Hydrotæa* Maeq. Buff. 2. 306. 15. ♂♀. T. 17. f. 4 ♂. — Meig. Dipt. 7. 324. 1?

Hab. in foliis fruticum Betule, Alni &c., libenter in vicinitate aquæ, per Scandinaviam, 2 Jan.—4 Sept., passim frequens; scilicet in Scania, vulgaris; in Smolandia & Ostrogothia, haud infrequenter; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; deinde rarius occurrit & in Lapponia tantum ad Muonionjska mihi obvia; e Dania sub nomine: "Anth. ciliata Meig." a D. *Staeger* communicata. (E Grönlandia a D. *Westermann*).

♂♀. Antennæ breviusculæ, validæ, seta microscope puberula.

Frons non prominens. Os non exsertum. Palpi subcylindrici, pilosi. Macula supra antennas distincta alba. Macula humeralis alba. Alæ cinereo-hyalinæ, costa omnino nuda; spinula nulla. Nervi: longitudinales 3 & 4 paralleli, transversus ordinarius paullo ante medium areæ insertus, oblique ductus, leviter subflexus. Squamæ sat magne, albæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem minime tegente. Halteres testacei. *Mas:* oculi fere cohærentes, distincte hirti, vitta frontali angusta atra leviter disjuncti. Abdominis segmenta 2, 3 & 4 basi fascia interrupta alba. Pedes elongati: antici, femoribus extus villosis, apice subtus bidentatis; intermedii, femoribus apice setis 2 elongatis curvis; pestici pilosi, femoribus subtus in medio spinula brevi erecta, tibiis spinulosis. *Femina:* oculi modice remoti, nudi, fronte atra. Abdomen atrum, segmento ultimo conico, plumbeo. Pedes simplices.

*Obs.* Caveas ne hanc cum *Ar. dentipede*, 36, *bispinosa*, 38, & *leucostoma*, 46, confundas. *Anth. spinipes* var. ♂. Zett. Ins. Lapp. 672. 49. est varietas *Aric. leucostomæ*. Synonyma Meigeni dubia mihi videntur, quia Clar. Auctor speciem suam

*Anthom ciliatam* I. e. "œulis nudis" describit. — Femina sub nomine: "Auth. bimaculata Meig." Dipt. 5. 160. 135. e Dania mihi quoque communicata.

94. *A. cyrtoneurina*: oblonga, nigra; ore non reflexo; epistomate punctoque supra antennas albidis; abdomine ( $\delta$ ) cinereo, linea dorsali nigra; alis subfuscaneis ( $\delta$ ); squamis brunneis; halteribus obscuris; *mas*: femoribus anticis subtus bidentatis.  $\delta$ . (Long. 2 fere  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Dania; circa Hafniam mens. Sept. & Octob. ab oculatissimo D. Staeger frequenter lecta mibique in pluribus speciminibus benigne communicata.

$\sigma\varphi$ . Valde similis & affinis mari præcedentis; sed magnitudine plerumque paullo minore, colore corporis magis atro, nec in cœruleum vergente, puncto albo supra antennas minore, abdomine cinereo, vitta dorsali nigra, alis leviter fuseanis, nervis longit. 3 & 4 non exakte parallelis, sed horum 4:to versus apicem fere ut in genere *Cyrtoneura* leviter infexo, squamis paullo minoribus, brunnescensibus, posterioribus minus elongatis, femoribus intermediis setis ad apicem destitutis, posticisque subtus inermibus, nec spinula armatis, facile dignota. Magnitudine variat. — Ab *Aric. dentipede*, 36, *bispinosa* 38, &c. œulis distincte hirtis mox distinguitur. Seta antennarum basi incrassata; non usque ad medium breviter pubescens. Reliqua ut in priori.

95. *A. occulta*: oblongo-ovata, nigra; ore non reflexo; epistomate punctoque supra antennas albidis; alis hyalinis; squamis albidis; halteribus obscuris; *mas*: femoribus anticis subtus bidentatis, posticis subtus basi spinula erecta, abdomine cinereo, linea media nigra; *femina*: pedibus simplicibus, abdomine nigro, macula vertieis nigra nitida.  $\delta\varphi$ . (Long.  $\delta$   $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$ ,  $\varphi$   $1$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 133. 90. ♂. *Hydrotæa* Macq. Buff. 2. 305. 9. ♂. *Lasiops* Meig. 7. 324. 2. *Anthomyza glabricula* var. e. ♀. Zett. Ins. Lapp. 687. 117.

Hab. in foliis fruticum, per Scandinaviam in primis meridionalem & medium, 15 Jul.—10 Sept. mihi obvia, passim, in copula multoties observata; scilicet in Scania ad Lund, Räften (D. *Dahlbom*), Abusa in Röl, utrumque Esperöd, &c., frequens; in Smolandia ad Skärsjö, passim; in Ostrogothia ad Wadstena, rarius; in alpibus Dalecarlicis, D. *Bohemian*, in Jemtlandia ad Skalstugan; in Dania ad Hafniam, D. *Staeger*; in alpe Stöttingsfjellet Lapponiae Umensis, rarissime; ♂ in Lapponia Lulensi ad Quickjock a D. *Wahlberg* quoque captus. (In Germania jam mense Majo provenit).

♂♀. Simillima *Ar. armipedii* (44); sed oculis (♂) hirtis mox dignota. Similis quoque duabus proxime antecedentibus, sed ab *A. spinipede* colore corporis nigro, halteribus nigris, a *cyrtoneurina* alarum nervis: longitudinalibus 3 & 4 parallelis, transverso ordinario perpendiculari, recto, squamis albis, & ultraque magnitudine multo minore & femoribus posticis in ♂ subitus ad basin spinula brevi erecta, præcipue differt. — Antennarum seta subnuda. Punctum supra antennas parvum, album. *Mas*: oculi magni, distincte hirti, cohærentes, linea tantum angusta atra disjuncti. Thorax ater. Abdomen glauenum, linea media nigra. Alæ levissime fuscane. Squamæ medioeres. Femora antica, ni fallor, subtus bidentata. Tibiae intermediae ad apicem intus subvillosæ. *Femina*: nigra subnitida, levissime cinereo-micans. Oculi modice remoti, nudi, fronte nigricante. Alæ hyalinæ. Squamæ parvæ. Pedes simplices. — *Femina* cum *femina Ar. aëreæ* (217) non confundenda.

96. *A. aculeipes*: oblonga, nigricans; epistomate obscure cinereo; ore reflexo; alis hyalinis; squamis albi-

*dis*; *mas*: tibiis posticis basi spina elongata obliqua, abdome cinerascente, vitta dorsali nigra, halteribus obscuris; *femina*: pedibus simplicibus, abdome obscure cinereo, halteribus testaceis. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 671. 58. ♂♀.

Hab. in fruticibus ut & floribus Ranunculorum, Calthæ, Geranii sylvatici &c., ♀ interdum in lapidibus sedens; per Scandinaviæ borealis prata, nemora & alpestria, 21 Jun. — 1 Aug., passim copiose, in copula sæpe deprehensa; scilicet in Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*, in Jemtlandia boreali ad Skalstugan, alpes Mullfjellen & Åreskutan usque ad regionem nivalem (1000 ped. supra mare) adscendens, vulgatissima; in Lapponia Lulensi in alpe Walli ad Quickjock, etiam ad Tjomotis & Jockmock, D. D. *Wahlberg* & *Bohemian* frequens; in Norvegia ad Suul, Kongstue & Kälshögar Värdaliae, haud parée, sed ad Björkvik Nordlandiae rarissime.

♂♀. Per epistoma breve, os distincte exsertum, antennarum setam breviter sed distincte pubescentem, alarum nervos longit. 3 & 4 non exacte parallelos, sed versus apicem leviter divergentes, cestam basi subciliatam, nec nudam, spinulam parvam præsentem, nec nullam, squamas parvas, & in primis tibias posticas in ♂ spina longa armatas, ab affinibus hujus subdivisionis abunde dignoscitur. — Subnitens. Frons band prominens. Punctum supra antenas parvum, album. Antennæ mediocres, nigrae. Palpi breves, subcylindrici, nigri. Alarum area media ad apicem fere paullo latior quam in medio. Nervi longitudinalis 3:tius in summo apice alee excurrens, transversus ordinarius ante medium areæ insertus, perpendicularis, rectus. *Mas*: pilosus. Oculi magni, sat arete cohærentes, distincte hirti. Thorax & scutellum nigra. Abdomen oblongum, subdepressum, postice in primis setosum, totum obscure cinereum,

vitta media inaequali obscuriore. Pedes nigri, nitidi, parce setosi. Tibiae posticæ in medio subcurvatae, ante medium intus spina elongata (longitudine fere tibiae), oblique porrecta, basi valida, apice subulata, tota nigra nitidissima, apice hamulata, et ante apicem latere exteriori albo-puberula, arinatae. Alæ levissime fuscaæ. Squamæ mediocres. *Femina*: setosa, nigra, subnitida, tota et in primis abdomine ovato-conico cinereo-*l.* griseo-micans. Thorax lineis 2 obscuris, obsoletis. Oculi modice remoti, vitta frontali lata nigricante; orbita oculorum cinnerea. Alæ hyalinae. Squamæ parvæ. Pedes simplices.

*Obs.* Variat ♀ monstrosa: alarmi nervo longit. 4:to ad apicem abbreviato. Åreskutan 1 Aug.

*Obs.* *Anth. aculeipes* var. b. ♀. Zett. Ins. Lapp. *l. e.* non ad hanc speciem, sed ad *Ar. hirsutulam*, 103, pertinet.

b.) pedibus in utroque sexu inermibus.

\*). Alarum nervos transversus ordinarius flexus.  
Frons prominens.

**97.** *A. subfuscinervis*: oblonga, nigricans, capite albido; thoracis vittis abdominalisque maculis cinereis; alis subhyalinis, nervis subinfuscatis; *mas*: oculis approximatis. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 673. 50. ♂. *Anthom.* *vicina* Zett. *l. e.* 673. 51. ♀.

Hab. in Scandinavia boreali, 4 Jun.—20 Jul., minus frequens, juxta paludes mihi plerumque obvia; scilicet in Jemtlandia ad Skalstugan parce; in Lapponia Tornensi ad Pello &c. rarius; in Värdalia Norvegiae ad Saul, Kongsstue & Höjmfeldbroe in jugo alpino situm, passim.

♂♀. Similis quodammodo *Ar. dentipedi* (36), sed oculis in utroque sexu hirtis et forte paullo magis remotis, fronte ut vide-

tur nonnihil magis prominente, thoracis vittis subquinis abdominisque maculis lateralibus albo-micantibus, alarum nervis & basi infuscatis, ut & femoribus maris mutieis, satis superque distineta. Tota obscure ænea, subnitida, certo situ ænescenti micans, setosa. Caput subargenteo-micans. Facies prominula. Antennæ breviusculæ, nigræ, seta distincte pubescente. Punctum supra antennas album. Os subexsertum. Palpi elongati, subfiliiformes, nigri. Thoracis linea 4 nigra. Abdomen ovatum, cinereo-micans, linea dorsali obscuriore, obsoleta. Alæ cinereo-hyalinæ, basi subferrugineæ, nervis omnibus fuscedine leviter cinctis. Nervi: transversi sat remoti, horum ordinarius nonnihil ante medium areæ insertus, in medio plus minus inflexus; longitudinales 3 & 4 versus apicem nonnihil divergentes, hinc area in apice paullo latior quam in medio; longitudinalis 3:ius mox ante apicem summum alæ excurrens. Costa basi leviter subciliata; spinula minuta. Squamæ mediocres, sordide albidae, seu albæ flavo-marginatae, valvula superiore inferiorem minime tegente. Halteres testacei. Pedes nigri, simplices, setosi, tibiis spinulesis. *Mas:* oculi distincte hirti, approximali, sed non cohærentes, vitta angusta nigra disjuncti. — *Femina:* oculi tenuiter hirti, modice remoti, vitta frontali lata, didyma nigra et orbita cinerea sejuncti.

Var. b. ♀. Simillima var. a., palpis tantum paullo crassioribus diversa; forte hujus? In Norvegia ad Christiania Jul. 1814 in uno individuo a D. Dahlbom inventa.

**98. *A. turpis:*** oblonga, nigricans, capite albido; thoracis vittis abdominalisque maculis cinereis; alis hyalinis, nervis haud infuscatis; *mas:* oculis cohærentibus. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ius. Lapp. 673. 52. ♀. *Authom. inconspicua* Zett. I. e. 673. 53. ♂.

Hab. in Scandinavia Septentrionali rarius; scilicet ♂ d. 19 Jun.—12 Jul. ad cataraetam Pulkapola Lapponiæ

Tornensis, & in alpium Tornensium jugo, captus; atque ♀ ad Umenäs Lapponiae Umensis 8 Jul. deprehensa; e pupa cylindrica, brunnea nitida nuda, sub cortice Pini ad Lycksele capta, imago quoque d. 21 Jun. egressa.

♂♀. Simillima praecedenti, a qua non differt nisi alis hyalinis, nervis non infuscatis, ut & maris oculis magis cohærentibus abdominisque cinerei vitta dorsali inæquali certo situ maculiformi. In mare thorax obseurior & halteres fusciores, quam in femina.

99. *A. fulvisquama*: ovato-oblonga, olivaceo-cinerea (♀), capite griseo; thoracis vittis 4 obseuris; alarum basi squamisque fulvescentibus, nervis transversis infuscatis; mas: oculis cohærentibus. ♂♀. (Long. 3½ lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi ad Tjomotis prope Quick-jock mense Julio, D. Boheman, qui individuum unicum femineum unicunque masculum ad describenda mihi communicavit.

♀. Similis duabus proxime praecedentibus, sed magnitudine panno majore, corpore toto magis olivaceo-griseo, nec cinereo, antennis longioribus, fronte magis prominente magisque brunnescente, alarum nervis transversis fuscedine distinctiore cinctis, ut & alis basi, squamisque totis, magis fulvescentibus, vere diversa. Ab *Ar. incana* (3), & *Lucorum* (4), quibus etiam sat similis, corpore magis griseo, abdomine immaculato, fronte productiore & superne brunnea, squamis sub alis magis coloratis, ut & præsertim antennarum seta minime plumata, sed breviter tantum pubescente, differt. Caput griseum, nitens. Frons lata. Antennæ longæ, angustatæ, nigrae. Palpi filiformes, nigri. Oculi nudi. Pedes nigri.

♂. Similis feminæ descriptæ, ejus mas sine dubio est, sed oculis subcohærentibus hirtis, thorace magis cinereo, abdominis segmento 2:do maculis 2 subtrigonis nigris, uno parvo infexo,

nigro, ut et femoribus posticis longioribus, dignoscitur. Femora intermedia subtus in medio fasciculo pilorum nigrorum. Nervus transv. ordinarius distincte flexus et infuscatus. Caput albo-micans. Oculi non arcte cohærentes.

**100. *A. luteisquama*:** oblongo-ovata, obscure cinerea, capite albidente; thoracis vittis subquatuor nigris; abdomine griseo, maculis in segmento 2:do 2 subtrigonis, nigris; alarum basi squamisque fulvescentibus, nervis transversis subinfuscatis; *mas*: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 3 lin.).

Hab. cum priori; a D. Boheman detecta, mihiique in unico specimine ad describendum missa.

♂. Simillima præcedenti, a cuius vero mare certe differt: magnitudine nonnihil minore, oculis arctius cohærentibus, thorace scutelloque obscurioribus, alarum nervo transverso leviter tantum flexo leviterque infuscato, pedibus posticis brevioribus, ut et femoribus intermediis subtus non fasciulatim pilosis.

\*\*). Alarum nervus transv. ordinarius rectus 1. subrectus. Frons haud prominens. Oculi maris cohærentes.

†. Abdomen in ♂ subconicum.

**101. *A. hirtula*:** antennis breviusculis hirsuta, nigricans; capite cinerascente; ore subexerto; abdomine obscure cinereo, linea dorsali fusca; alis hyalinis; squamis albis; halteribus testaceis; *mas*: tibiis posticis subcurvis, breviter erecto-villosis, apice adpresso setosis. ♂. (Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 673. 51. ♂.

Hab. in Suecia septentrionali & Lapponia rarissime; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. Wahlberg; in

alpium Tornensium jugo d. 12 Jul. 1821 typica inventa: deinde in Jemtlandia ad Mullsjellet d. 27 Jun. 1840 lecta.

♂. Oblonga, nigricans, subopaca, tota hirta et setosa. Oculi magni, intime cohærentes, distincte hirti. Antennæ breves, seta breviter pubescente, non ad medium incrassata. Epistoma breve, obscurum, lateribus certo situ argenteo-micans, apice leviter subreflexum. Os subtus pilosum. Palpi elongati, subcylindrici, nigri. Thoracis lineæ in fundo obscuro vix conspiendiæ. Abdomen depresso-conicum, cinereum, segmentis certo situ: 1:mo toto reliquisque macula apicali et linea dorsali nigricantibus; postice in primis sat dense et longe setosum. Alæ hyalinæ. Nervi: longitudinales 3 et 4 subparallelis, horum 3:tius in summo apice excurrentes; transversus ordinarius sat longe ante medium areæ insertus, perpendicularis, rectissimus. Costa nuda, spinula nulla. Squamæ parvæ, albæ, valvulis subæqualibus. Pedes toti pilosi, nigro-picei, femoribus posticis elongatis. Tibiæ posticæ levissime curvatae, pube l. villositate erecta undique vestitæ, extus pilis aliquot longioribus et apice setis 2 l. 3 levibus metatarso adpressis iunctæ.

*Obs.* Par copulatum, quod in Ins. Lapponicis l. c., in alpium Tornensium jugo captum, refertur, non luc, sed ad *Ar. nigritellam* n:o 22, pertinet. — Femina hujus speciei mihi ignota, nec nisi duo specimina mascula possideo.

102. *A. innocua*: antennis longiusculis hirsuta, nigricans (♂), aut flavido-grisescens (♀); capite cinereo-micante; ore non exerto; abdome cinereo, linea dorsali nigra (♂), aut griseo immaculata (♀); alis halteribusque fuscanis (♂), aut alis hyalinis, halteribus flavis (♀); squamis sordide albidis; mas: tibiis posticis subrectis, breviter erecto-villosis, apice adpresso setosis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 674. 56. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum, graminosis, floribus Calthæ

palustris, &c., per Scandinaviam præsertim borealem, 24 Jun. – 29 Aug., passim copiose, in copula multoties capta; scilicet in Helsingia ad Storbyn in paroec. Färela, rarius; in Jemtlandia tota a diversoriis Rätan & Åsarne usque ad alpes Areskutan & Mullsjellen, vulgaris; in Botnia boreali ad Luleå, D. *Bohemian*; in Lapponia Umensi ad Lycksele, Stensele, Storuman &c., passim; in Lapponia Lulensi ad Quickjöck, D. *Andersson*; in Norvegia ad Thynäs, Näs, Garnäs & Kong Carl Johans Klev (in jugo alpino situm) Värdaliae, frequentissime; ut & in inferalpinis Nordlandiae ex. gr. ad Giebostad, passim.

$\delta\varphi$ . Affinis & similis priori; sed maris corpore forte paullo magis cylindrico, antennis forte nonnihil longioribus, ore non exerto, alis leviter fuscatis, nec hyalinis, halterum clava obscura, nec flava, ut et tibiis posticis rectis, differt. *Femina*: tota cinerea 1. subflavido-grisea, immaculata. Oculi modice distantes, orbita cinerea, vitta latiuscula nigra, maculam cinereum postice includente. Antennæ et palpi nigra. Thorax antice lineolis 2 tenuissimis, brevissimis, nigris. Abdomen ovatum, acutum, parum setosum. Alæ hyalinæ, parum fuscatae, basi pallescentes. Halteres flavæ. Pedes nigricantes, parce pilosi, tibiis posticis spinulosi.

103. *A. hirsutula*: antennis longiusculis hirsuta, nigricans ( $\delta$ ), aut griseo-crenata ( $\varphi$ ); capite cinereo-micante; ore non exerto; abdome cinereo, linea dorsali nigra ( $\delta$ ), aut griseo immaculato ( $\varphi$ ); alis halteribusque fuscatis ( $\delta$ ), aut alis hyalinis, halteribus flavis ( $\varphi$ ); squamis albis; *mas*: tibiis posticis subcurvatis, breviter erecto-villosis, apice calcare recto valido.  $\delta\varphi$ . (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 673. 55.  $\delta\varphi$ . (exceptis speciminibus Norvegicis, quæ ad priorem speciem referenda).

Hab. cum priore Jun.—Aug., frequens, e septentrio-  
ne longius, quam illa, versus meridiem descendens, in co-  
pula pluries capta; scilicet in Scania rarissime, D. Philos.  
Doctor von Borck; in Smolandia, D. *Ljung* rarius; in  
Medelpadia ad diversorum Kjällsta parce; in alpibus Da-  
lcarlicis, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad Berge (in  
Alsen), Rätan, Åsarne, Ristansfors, Åreskutan & Mullsjö-  
len, vulgaris; in Lapponia Umensi ad lacum Stor-Uman  
rarius; in Lapponia Lulensi ad Quiejkock, D. D. *Wahl-  
berg* & *Andersson*; in Norvegia ad diversoria Näs &  
Suul, sat frequens. (E Glogavia a D. *Zeller* mas-  
missus).

♂♀. Simillima priori ut ovum ovo, nec feminas ambarum speci-  
erum discernere valeo, nisi squamas sub alis in illa magis  
sordide albidas dicere vellem; sed mas *Ar. hirsutula* tibiis  
posticis apice intus spinula l. calcare brevi, validiusculo, rectis-  
simi, oblique porrecto h. e. paullo a metatarso elevato, nigro,  
a mare *Ar. innocua*, qui in apice tibiarum posticarum setulis  
2 (quarum una altera breviore) capillaribus brevibus incurvis  
seu metatarso adpressis gaudet, certe distinguitur. Tibiae  
posticae maris saltem in individuis lapponicis etiam pilos 2—3  
in latere exteriore habens, quemadmodum ut in praecedente.  
Ab *Ar. nigritella*, 22, cui quoque valde affinis, magnitudine  
majore, antennarum seta pubescente, nec subplumata, ut &  
maris oculis distinctius hirtis, dignoscitur.

**104. *A. separ.***: antennis mediocribus hirsuta, nigri-  
cans (♂), aut griseo-*serens* (♀); capite cinereo-micante; ore  
subexerto; abdome, cinereo linea dorsali nigra (♂),  
aut griseo immaculata (♀); alis subhyalinis, squamis al-  
bidis; halteribus flavis; mas: tibiis posticis curvatis, bre-  
viter erecto-villosis, apice adpresso setosis. ♂♀. (Long. ♂  
2½, ♀ 2 lin.).

*Anthom. variabilis* Zett. Ins. Lapp. 663. 9. ad partem; nempe specimina quædam e Lapponia Suecica hue referantur.

Hab. in Lapponiae fruticibus, per regionem silvaticam, 16 Jul.—2 Aug., passim, in copula ter capta; scilicet in Lapponia Umensi ex. gr. ad Stöttingsfjellet, D. *Dahlbom*, ad Wilhelmina, ipse; in alpe Walli Lapponiae Lulensis ad Quickjock, D. *Andersson*.

♂♀. Valde similis *Ar. variabilis*, 16, *umbraticea*, 19, earumque affinibus, sed ore nonnihil magis producto, & antennarum seta non longe plumata, sed tantum distincte pubescente, præcipue differt. Ab *Ar. innoena*, 102, magnitudine paullo majore, ore subexerto, ut & halteribus in utroque sexu flavis, dignoscitur. — Alarum nervi ut in *Ar. hirtula*, 101, directi, at longitudinales 3 & 4 non exacte paralleli, sed versus apicem leviter divergentes. Spuamæ parvæ, sordide albidae, valvulis subæqualibus. *Mas*: thorax niger, lineis 2 atris. Abdomen ovale, pilosum, cinereum, linea media in segmentis 2 & 3 nigra. Anus rotundatus niger. Segmentum ultimum ventrale subelevatum, apice emarginatum, bidentatum. Alæ subfuscanae, imo basi parum ferrugineaæ. Pedes postici elongati, tibiis undique villosis & extus pilosis, apice pilis 2 brevibus metatarso adpressis, vestitis. *Femina*: grisea immaculata. Alæ levissime fuscanae. Pedes simplices, tibiis posticis spinulosis.

**105. *A. subrostrata*:** antennis breviuseculis hirsuta, nigricans ♂, aut cinerea ♀; capite argenteo-micante; ore exerto; abdome, cinereo linea dorsali incisurisque nigricantibus ♂, aut griseo immaculato ♀; alis hyalinis, squamis albis; halteribus nigris ♂, aut flavis ♀; *mas*: tibiis posticis incurvis, breviter erecto-villosis, apice adpresso setosis. ♂♀. (Long. ♂  $2\frac{1}{2}$ , ♀ 2 lin.).

Hab. in alpibus Scandinaviae, 15 Jul.—4 Aug., rarius;

scilicet in Jemtlandiae alpibus Åreskutan & Mullsjellet; in Norvegia in alpe insigui Kålahög Värdaliae in ipsa nive reptantem utrumque sexum inveni.

♂♀. Similis omnino praecedenti, sed antennis forte paullulum brevioribus, seta minus pubescente, ore magis producto, alis magis hyalinis, basi concoloribus, squamis albidioribus, ut & in mare abdominis segmentis apice certo situ indeterminate nigro-marginatis, halteribus nigris, nec flavis, tibiisque posticis paullo magis incurvis, mox dignota. Neque cohabitant.

††. Abdomen in ♂ ovatum, subdepressum.

106. *A. leucogaster*: antennis mediocribus, nigra (♂); capite argenteo-micante; ore fronteque non productis; abdomine cano, segmentis: 1:mo toto, 2:doque maculis duabus approximatis, nigris; alis hyalinis, squamis albis; halteribus testaceis; mas: oculis subcoharentibus. ♂. (Long. 1½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 674. 57. ♂.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; mihi non obvia, sed a D. *Frigelio* inventa mihiique in uno specimine communicata.

♂. Parva, ovata, obtusa, abdominis colore & pictura facile dignoscenda. Oculi maximi, tenuissime puberuli, fere cohærentes, per lineam nigram angustissimam et orbitam tenuissimam argenteam tantum sejuncti. Frons convexa, minime prominens. Antennarum seta brevissime puberula. Epistoma & os minime producta. Proboscis subretracta. Palpi cylindrici, nigri. Os subtus breviter pubescens. Thorax et scutellum parce setosa, nigra. Abdomen ovatum, parce & depresso pilosum, albidum, segmento 1:mo toto, & 2:do in medio maculis 2 rotundatis, basi subcoharentibus, nigris. Alæ hyalinæ, ner-

vis ut in *Ar. separe* 104, directis. Squamæ mediocres, albæ, valvula superiore inferiorem minime tegente. Pedes mediocres, simplices, nigri, tibiis posticis subnudis, extus brevissime pubescentibus, & pilis aliquot instructis.

**107. *A. depressiuscula*:** antennis longiusculis, nigra (♂), aut obscure cinerea (♀); capite argenteo-micante; fronte parum prominula; ore non producto; abdomine, cinereo maculis 4 magnis subtrigonis nigris (♂), aut griseo maculis 4 brunneis obsoletis (♀); alis subhyalinis, squamis albis; halteribus flavis; *mas*: oculis approximatis. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 674. 59. ♂♀.

Hab. in inferalpinis Nordlandiæ Norvegiae rarissime; ad Giebostad d. 22 Jul. 1821 unicum par in copula junctum legi.

♂♀. Similis *Ar. depressulae* (71), sed magnitudine triplo l. quadruplo majore, antennis paullo longioribus, abdominis maculis majoribus, ut & maris oculis nonnihil magis distantibus hirsutisque, nec nudis, abunde dignota. Ab *Ar. innocua*, 102, cui etiam similis, differt: abdominis depresso pictura, squamis albidioribus, ut & in ♂ oculis appropinquantibus, nec cohærentibus, halteribus flavis, nec nigris, & tibiis posticis tantum extus pubescentibus & parce pilosis, nec undique villosulis. Frons perparum prominula. Seta antennarum brevissime puberula. Alarum nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes, horumque 3:ius non in ipso apice, sed mox ante summum apicem alæ excurrentes; transvers. ordinarius perpendicularis, rectus, fere in medio l. tantum paullulum ante medium areæ insertus. *Mas*: abdomen obscurum, segmento 1:mo toto, maculisque (in segmentis 2 & 3) 4 subtrigonis, maximis, approximatis, atris; ano depresso. Alæ subfuscæ. *Femina*: abdomen griseum, maculis 4 mediocribus subrotundatis, l. subconfluentibus, brunneis, obsoletis. Alæ hyalinæ.

Thorax lineolis 3 approximatis, tenuibus, et juxta illas utrinque unica latiori, brunneis.

**108. *A. tristiola*:** antennis mediocribus, nigricans, capite obseuro; fronte sub prominula; ore haud exerto; abdominiis incisuris obscure cinereis; alis hyalinis; squamis albis; halteribus fuseis; *mas*: oculis subcohærentibus. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 675. 70. ♂.

Hab. in Suecia boreali rarissime; unicum marem ad Lycksele Lapponiae Umensis 1 Aug. 1832, unicamque feminam in alpe Åreskutan 1 Aug. 1840, inveni.

♂♀. Priori similis, sed duplo minor, & abdomine nigricante, fasciis 3 angustis cinerascentibus, ut & in ♂ alis hyalinis & oculis magis cohærentibus, dignoscenda. Ab *Ar. didyma* n:o 72. abdominis pictura & maris oculis hirtis, præcipue differt. Frons leviter prominula. Seta antennarum subnuda. Thorax lineis subtribus atris in fundo obseuro parum conspiciendis. Abdomen ovale depresso. Alæ hyalinæ, nervis ut in *Ar. separa*, 104. Pedes simplices, pilosi, nigri, tibiis posticis subnudis seu tantum extus parcissime setosis. *Femina*: caput cinereum, vitta frontali atra, didyma. Oculi nudi. Punetum supra antennas album. Thorax disco nigro-brunneus, humeris cinereis. Abdomen cinerascens, segmentis: 1:mo toto, reliquisque fascia apicali lata nigro-brunnea.

**109. *A. pubipes*:** antennis mediocribus, nigricans, capite abdomineque cinereis, hoc linea dorsali nigra; ore fronteque non productis; alis hyalinis, squamis albidis; halteribus obseuris; *mas*: oculis cohærentibus, pedibus pilosis, tibiis posticis subvillosis. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali rarissime; duo tantum specimina 16—21 Jul. inveni, unum ad radicem Mullfjel-

let Jemtlandiæ, & alterum in Norvegia ad Kongsstue  
Værdaliæ in jugo alpino.

♂. Similis *Ar. hirtula* 101, & *innocua* 102, sed a priore ore non exerto, halteribus nigricantibus nec testaceis, a posteriore alis magis hyalinis, et ab utraque abdomine maris ovali depresso, nec convexo, differt. A duabus proxime praecedentibus abdominis pictura, oculorum connectione magis intima, ut & tibiarum posticarum pubescencia distinctiore, facile dignoscitur. Antennarum seta distincte pubescens. Palpi subfiliformes. Os subtus villosum. Thorax cinereo-nigricans, lineis 2 nigris. Abdomen pilosum. Alæ subangustatæ, leviter fusca-næ, nervis ut in *Ar. separe*, 104, directis. Pedes nigri, pilosi, tibiis posticis validiusculis, distincte pubescentibus et extus parce pilosis.

110. *A. cinereiventris*: antennis mediocribus, nigra subnitida, capite, puncto supra antennas, abdomineque, cinereis, hoc linea dorsali nigra; ore fronteque non productis; alis hyalinis, squamis albis; halteribus flavis; mas: oculis cohærentibus, tibiis posticis breviter pubescentibus. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad divisorium Skalstugan, in jugo alpino situm, individuum unicum masculum d. 16 Jul. 1810 legi.

♂. Simillima priori, a qua tamen oculis tenuius hirtulis, puncto supra antennas albo perspicuori, antennarum seta tantum brevissime puberula, thorace paullo obscuriore, alarum nervo transv. ordinario nonnihil longius a medio remoto h. e. fere in medio l. mox (nec longe) ante medium areæ inserto, halteribus flavis, nec nigris, ut & tibiis posticis brevius pubescentibus, differt.

B. ab domine in utroque sexu flavo.

111. *A. semicinerea*: obscure cinerascens, antennis, abdominis flavo-subpellucidi incisuris, pedibusque, nigris;

alis hyalinis; *mas.*: oculis arte cohærentibus, ano fusco.  
*♂♀.* (Long. 2 lin.).

*Anthomyia* Wied. Zool. Magaz. I. p. 84. 37. ♀.  
 Meig. Dipt. 5. 108. 43. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 670. 40. ♂♀.  
*Hydrophoria* Maeq. Buff. 2. 301. 14. ♂♀. *Hylemyia* Meig.  
 Dipt. 7. 315. 5. *Musca hyalinata* Fall. Muscid. 64. 62. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum, floribus, interduum etiam in fenestris obvia, per totam Scandinaviam, 20 Maj.—15 Sept., vulgatissima, in copula saepe capta; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Gotlandia (ad Ruthe, Fårön, Gothem, Martebo &c.), Nericia, Uplandia, Dalecarlia (ad Rörshyttan, Uppbo &c.), Helsingia (ad Kårböle), & Jemtlandia (ad Säther &c.), ubique frequens; deinde rarescit, & in Lapponiis Suecicis non nisi paree occurrit; in Norvegia a Thynæs & Næs Værdaliae usque ad Alteidet Finmarkiae mihi passim obvia; in Dania a D. Staeger pluries inventa. (E Glogavia in utroque sexu a D. Zeller missa).

*♂♀.* Oblongo-ovata, cinerea, pilosa. Caput albicans, ore fronte que minime porrectis. Antennæ longiusculæ, nigro-cinereæ, seta distincte pubescente seu subplumata. Palpi nigri. Thorax vix nigro-lineatus, rudimento tantum linearum 3 obscurarum. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis ut in *Ar. separe* 104, directis, Costa nuda. Spinula nulla. Squamæ ut in *Ar. sulciventris*, 62. Halteres flavi. Pedes simplices, pitosi, nigri, tibiis postieis nudiusculis, tantum pilis aliquot longioribus instructis. *Mas.*: oculi magni, arte cohærentes, tenuiter hirtuli, puncto supra antennas albo. Thorax obscurior. Abdomen flavo-subpellucidum, incisuris anguste, & segmento anali toto, nigricantibus; linea dorsali brunnea. *Feminæ*: oculi modice distantes, mediocre, nudi, fronte cinerea, macula supra anteunas nigra aut ferruginea. Thorax cinereus. Abdomen ovalum, acutum, fla-

vo-ferrugineum, aut immaculatum, aut plerumque incisuris tenuiter nigricantibus. — Invenit variat pedibus piecis, quam caveas ne cum *Anthomyza bicolor* 157, confundas. Ab *Anthomyza mutata* n:o 147, antennis seta subplumata (nec nuda) &c. facile dignota.

*Divis. Tertia.* Seta antennarum nudinseula aut nuda.

*Phalaen Ima.* Corpus saltem maris subcylindricum. Caput interdum subinflatum. Frons porrecta. Species mediocriter magnæ.

A. Alarum nervus transversus ordinarius rectus.

\*). Oculi in utroque sexu distantes.

112. *A. denticauda*: lète cinerea, capite argenteo; alis, squamis halteribusque albidis; oculis modice remotis; ano maris subtus valide bidentato. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ies. Lapp. 675. 61. ♂♀.

Hab. in floribus Salicium, præsertim locis paludosis, per Sueciam borealem & Lapponiam, 29 Maj.—25 Jun.—15 Jul., passim; scilicet in Botnia boreali ad Luleå in florib. Salicis Lapponum, D. *Wahlberg*; ad ÖfverTorneå, ipse; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele rarius; in Lulen-si ad Quickjock, D. D. *Wahlberg* & *Bohemus*; in Tornensi ad Pello, Wittangi & Juckasjervi, sat frequens. Femina parere occurrit.

♂♀. Angustata, linearis, subcylindrica. præsertim mas; setosa, cana (♂), aut cinerea (♀). Caput argenteum. Frons distincte porrecta. Antennæ epistomate multo breiores, nigricantes, seta nuda, basi incrassata. Epistoma subperpendiculare, nudum, apice parum reflexo. Oculi nudi, in utroque sexu fere æqualiter, paralleliter, & non late distantes, per orbitas albas

& vittam frontalem latiusculam nigricantem sejuncti. Palpi subcylindrici, pilosi, nigri. Thorax dorso vestigio linearum 2 fuscarum. Abdomen maris cylindricum, segmento ultimo ventrali dentibus 2 validis, nigris, nitidis, arcuatis armato; feminæ oblongo-ovatum, muticum. Alæ ♂ albae, ♀ cinereæ, costa in utroque sexu perparum ciliata, spinula minuta. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; transversus ordinarius mox ante medium areæ insertus. Squamae non magnæ, albae, ciliatae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albi. Pedes nigricantes, setosi, tibiis posticis sat fortiter spinosis. Variant specimenia juvenilia antennarum articulo 2:do femoribusque piecis.

**113. *A. myopina*:** cinerea, capite albido, antennarum basi rufescente, macula supra antennas fulva, paipis flavis; thoracis vitta brunnea; ab domine nigro; alis cinereis, costa subinermi; squamis albidis; halteribus obscuris; oculis late remotis; ano maris incurvo. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere 2 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 65. 66. ♂♀. *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 222. 28. ♂♀. *Cordylura* Ejusdem 7. p. 335. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 677. 70. ♂♀. *Myopina reflexa* Macq. Buff. 2. 389. I. ♂♀. Tab. 18. fig. 9. ♂.

Hab. in humidis, etiam in arenosis ad littora maris, ripas lacuum & margines stagnorum, rarius in floribus Salicis; per Sueciam & Lapponiam, 10 Maj.—19 Aug., passim, in copula; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd &c., haud raro; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Ostrogothia ad Wadstena & lacum Wettern, sat frequens; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Bottnia occident. ad Skellefteå, D. *Böhman*; in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. *Andersson*; in Lapponia Umensi ad Lycksele, Wilhelmina, Tre-

sunda & lacum Wojmsjön, passim. Circulatim currit fere modo *Lispæ*.

♂♀. Affinis priori, sed in multis diversa. Caput albo-corneum, buccatum fere ut in *Myopa*. Frons latissima, porrecta, macula supra antennas magna, fulva. Antennæ magnæ, latae, nigricantes, articulo 2:do rufo, seta nuda, ad medium incrassata. Sete mystacinæ paucæ, atrae. Os subreflexum, subitus subnudum. Palpi subfiliformes, flavi, in ♀ fuscæ. Oculi parvi, subrotundi, nudi. Thorax cinereus, vitta dorsali brunnea, in ♀ subtriplicata. Scutellum cinereum. Abdomen nigrum nitidum, in ♂ subcylindricum, pilosum, ano infexo & lamellis 2 in segmento 3:to ventrali; feminæ ovatum. Alæ albido-hyalinæ, nervis ut in priori directis, sed 3 & 4 longitudinalibus fere parallelis, transversis interdum leviter fuscanis. Costa submutica. Spinula vix observanda. Squamæ parvæ, sordide albidae, valvulis subæqualibus. Halteres testacei, clava obscura. Pedes validi, nigri, in ♂ præsertim piles. In mare quoque tibiae posteriores intus breviter subvillosæ, & metatarsus posticus basi subtus subdilatatus.

III. *A. scoparia*: obscure cinerea, capite flavescenti albo, macula supra antennas fulva, palpis nigricantibus; abdome nigro; alis cinereis, costa subciliata; squamis halteribusque sordide albidis; oculis late remotis; mas: ano infexo, senioribus posticis intus fasciculo pilorum, tarsis posticis brevibus, crassis. ♂ (♀). (Long. 2 lin.).

Wahlberg in litt. 1813.

Hab. in Lapponia Lulensi, ubi in littore arenoso humido fluvii Kama (Kamajock) ad Quickjock mense Jul. 1813 a D. Studioso Andersson lecta, per Cel. Prof. Wahlberg mecum in uno individuo masculo communicata. Vietus & mores præcedentis.

♂. Priori affinis & similis; sed differt: magnitudine nonnihil robustiore, capite præsertim inferius magis flavescente, palpis an-

tennisque totis nigris, thorace paullo obscuriore, vitta dorsali nulla, alarum costa præsertim basi magis ciliata, spinula mediori præsente, tarsis posticis brevioribus & validioribus, metatarso basi non dilatato, & in primis femoribus posticis intus in medio fasciculo denso pilorum nigrorum elongatorum, versus basin femorum sensim decessentium armatis. De cetero caput & reliqua omnino ut in præcedente.

♀. similis mari, sed minus obscura, fasciculo pilorum femorum nullo, a D. *Wahlberg* capti, a me non visa.

**115. *A. morieus:*** obscure grisea ♂, aut flavidogrisea ♀, capite concolore, macula supra antennas parva flava; ore exerto; palpis nigris; alis leviter fuscanis, costa ciliata, spinula distincta; squamis halteribusque flavidis; oculis sat late remotis; *mas:* ano tuberculatum inflexo, pedibus simplicibus. ♂♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad diversorium Forsa juxta radicem Mullijellet d. 27 Jun. 1840 unicum par inveni; in Norvegiae alpe Kälahög in jugo alpino sita marem & feminam 22 Jul. ejusdem anni etiam collegit D. *Dahlbom.*

♂♀. Similis & affinis *Ar. myopinæ* 113; sed capite thoraceque obscuriore, hoc non vittato, fronte angustiore, macula supra antennas flava multo minore, antennis & palpis totis nigris, alis subfuscans, costa magis ciliata & spinula distinctiore, squamis magis sordidis, halteribus flavis, nec obscuris, ut & in mare ab domine obscure griseo, opaco, linea tantum dorsali nigricante, nec toto nigro nitido, segmento 3:lio ventrali mucico, nec lamellato, pedibus simplicibus, nec metatarso postico dilatato, tibiis posticis spinosis, sed non villosulis, &c., abunde differt. A priori, cui etiam similis, colore capitis obscuro, ore magis reflexo, ab domine griseo vitta media obscura, ano

rotundato, halteribus totis flavis, nec clava sordida, ut ♂ semoribus posticis pilis aliquot sparsis, nec in fasciculum densum congestis, facile dignoscitur. — Alarum nervi longitudinales 3 & 4 subparallelē ut in *Ar. myopina*. Squamæ parvæ, ciliatæ, sordide flavidæ. Tarsi postici modice elongati, non incrassati. — Usque in alpium nivem perrennem circiter 4000 ped. supra mare individua hujus speciei adscendunt.

\*\*). Oculi in mare approximati aut cohærentes.

Squamæ sub alis parvæ, valvulis subæqualibus h. e. superiore inferiorem tegente.

a. Alæ immaculatæ.

†. uervis longitudinalibus 3 & 4 parallelis.

**116. *A. buccata*:** antennis brevibus grisea, capite buccato albescente; abdome lineola dorsali nigra; alis subhyalinis, costa mutica, nervo transverso ordinario obliquo, subrecto; oculis in utroque sexu subcohærentibus; **mas:** abdome mutico, ano rotundato, cinereo, opaco. ♂♀. (Long. 2—2 $\frac{3}{4}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 65. 65. ♂. ♀ ibid. allata ad *Ar. albescentem* no 130, pertinet. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 116. 108. ♂♀. Ejusd. 7. 326. 11. *Limnophora* Macq. Buff. 2. 312. 12. ♂♀.

Hab. in floribus *Chrysanthemi leucanthemi* &c., etiam in graminosis, per prata, nemora, versuras agrotum &c., Scandinavie meridionalis & mediæ, 26 Jun.—28 Jul., passim frequens; scilicet in Scania ad Lund, Kjelby (D. Dahlbom), Esperöd in paroecia Tranås, &c., haud raro; in Ostrogothia ad Lärketorp, Egebylund, passim; in Ölandia pluribus locis; in Gotlandia ad Sanda, Öja, Gothem

&c., non paree; in Westrogothia ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Norvegia ad Thynäs in paroecia Skogn frequens.

♂. Caput buccatum, antennæ breves seta brevissime pubescente, oculi in utroque sexu subcohaerentes, ale angustatae, costa nuda, spinula nulla, nervus transversus ordinarius ante medium areæ insertus, distincte obliquus, levissime subflexus, ut & abdomen maris non appendiculatum, annusque parvus, rotundatus, griseus, opacus, sunt notæ, quibus hæc species ab affiniis facile dignoscitur. — Antennæ nigrae, apice rotundatae, seta basi incrassata. Oculi in ♂ fere cohaerentes, in ♀ perparum distantes. Palpi subfiliformes, nigri. Abdomen ante incisuras setosum, in ♂ subcylindricum, in ♀ oblongum apice acutum. Alæ cinereo-hyalinae, basi pallidiores. Squamæ parvæ, ciliatæ, albidae, valvulis subæqualibus. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, femoribus cinereo-micantibus, tibiis spinosis. — Variat ♂ thorace leviter brunneo-lineato. Cfr. *Ar. albescens* n:o 130).

**117. *A. laminata*:** antennis breviusculis cinerea, capite canescente; abdome lineola dorsali fusca; alis subhyaliniis, costa mutica, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; *mas*: oculis appropinquantibus, ano subtus bilamellato. ♂. (Long. 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 675. 62. ♂.

Hab. in Lapponia Tornensi varissime; ad Juckasjervi 23 Jun. 1821 semel inventa.

♂. Oculi paullo distantes, alarum costa subnuda, nervus transv. ordinarius perpendicularis (nec obliquus), rectissimus, ut & venter maris ante apicem lamellis 2 longitudinaliter parallelis rotundatis nigris instructus, speciem distinguunt. A priori, cui de cetero similis, capite minus buccato, oculis paullo magis remotis, antennarum seta nuda, nec puberula, colore corporis cinereo, nec griseo, nervo transv. ordinario perpendiculari (nec obliquo), exakte recto, nec leviter flexo, ut & appendice ven-

trali, mox dignota. Frons exserta, grisea, vitta media angusta nigra. Os margine antico leviter reflexum. Thorax obsolete fusco-lineatus. Abdomen lineare, cinereum, linea dorsali fusca obsoleta; totum pubescens, vix nisi apice setosum. Anus cinereus. Alarm costa vix ciliata. Tibiae rufo-piceae, an in juniore!

**118. *A. latipennis*:** antennis longiusculis cinerea, capite albicante; ore fronteque sub prominulis; thorace vittis 2, abdomineque unica, fusca; alis flavidis, costa ciliata, spinula distincta, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; *mas*: oculis subcohærentibus, ano tuberculato, atro, nitidissimo, stylis 2 suffulto. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  —  $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Mas*: cinereus, thorace obsoleto fusco-bivittato. Oculi fere cohærentes, orbita angustissima alba & vitta frontali angustissima antice latiori atra, sejuncti. Antennæ mediocriter latæ. Alæ modice latæ, leviter flavescentes. Abdomen subcylindricum. Anus tuberculis 2 (uno post alterum) rotundatis, atris, nitidissimis, pilosis. Segmentum 3:tiū ventrale apice stylis 2 validis, subconicis, versus apicem vergentibus, nigris, pilosis, armatum;

*Fem.*: grisea, thorace brunneo-bivittato. Oculi modice distantes, per orbitam albam & vittam latiusculam atram disjuncti. Antennæ validæ, puberulæ, apice rotundatae. Alæ latiusculæ, distincte flavæ. Abdomen oblongum, apice acutum, griseum, certo situ fusco-zonatum.

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 676. 75. ♀.

Hab. in foliis fruticum Betule, Pini sylvestris &c., per Scandinaviam medium & præsertim borealem, 24 Jun.—5 Aug., minus frequens; nempe in Gotlandia ad Ruthe semel; in Jemtlandia ad radicem Mollsjellet 2 mares & 2 feminas inveni; in Lapponia Umensi ad Wil-

helmina rarissime; in Lapon. Lulensi ad Quickjock & Jockmock, ♀, D. D. *Wahlberg & Boheman*; in Finmarkia occidentali Norvegica ad Bossekop in unico specimine a me deprehensa; e Dania a D. *Staeger* sub nomine: *\*Anthom. varicolor* Meig.\* missa.

♂♀. Frons minus porrecta, antennarum seta extus brevissime puberula, thorax bivittatus, alæ flavedine tinctæ, costa ciliata, spinula distincta, ut & maris anus ater, nitidus, speciem præcipue designant. Margo oris subreflexus. Palpi subcylindrici, nigri. Nervus transv. ordinarius mox ante medium areæ inseritus. Squamæ parvæ, ciliatae, albæ, valvulis subæquis. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, sat fortiter spinosi. — Ab *Ar. silvestri* 137, magnitudine paullo minore, alarum nervis: ordinario perpendiculari & magis recto, longitudinalibus 3 & 4 parallelis, nec apice leviter divergentibus, spinula costæ longiore, squamis albis, nec flavis, ut & oculis in ♀ remotioribus, differt.

**119. *A. canescens*:** antennis mediocribus lâte cinerea, capite albicante; ore fronteque sub prominulis; macula supra antennas fulva (♀); alis, squamis halteribusque albidis, costa ciliata, spinula mediocri, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto. ♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Authomyza* Zett. Ins. Lapp. 676. 67. ♀.

Var. b. ♀. oculis paullulum minoribus, hinc epistomate, ut videtur, nonnihil latius infra illos descendente.

*Anthom. pallipennis* Zett. Ins. Lapp. 676. 66. ♀.

Hab. in ripis arenosis fluminum Sueciae borealis, 20 Jun.—7 Sept., valde rara; scilicet var. a. in Bottnia occidentali ad Umeå; in Lapponia Umensi ad Lycksele; & in Lapponia Tornensi ad Juckasjervi capta; var. b. etiam in Lapponia Tornensi ad Karesuando inventa.

♀. Tota cana, opaca, setosa. Oculi modice remoti. Frons modice prominens, vitta antice fulva, postice obscura maculam verticis cordatam cinereum includente. Orbita oculorum sat lata, cinerea. Antennæ nigrae, seta subtiliter puberula, basi leviter incrassata. Epistoma apice leviter reflexum. Palpi subfiliformes, nigri. Os subtus parce pilosum. Thorax vestigio lineolæ lète brunneæ. Abdomen oblongum, canum, certo situ rudimento lineolæ dorsalis fuscæ; apice acutum. Alæ albescentes, nervis ut in priori directis. Squamæ parvæ, ciliatae, albæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albi. Pedes rufescēti nigri, setosi. Similis *Ar. florali*, 147, sed colore latiore, macula frontali fulva, alis albidioribus &c. distincta.

120. *A. scatophagina*: antennis breviunculis cinerascens, capite argenteo; fronte distinete prominenti; ore subexerto; macula supra antennas parva lutescente; alis squamis, halteribusque albidis, costa mutica, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; mas: oculis subcohaerentibus, ano inflexo, cinereo, ventre lamellis pilosis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Mas*: cylindricus, cinereus, capite argenteo, oculis ovalibus, approximatis, per orbitas elevatas, angustas, argenteas, & lineam medianam angustam nigram, leviter disjunctis. Abdomen cylindricum, incisuris albescētibus; vel simavis segmentis certo situ basi fasciola utrinque abbreviata nigro-cinerea parum observanda, ornatis. Anus tuberculatus, cinerens, tuberculo inflexo, supra plano, pubescente, rima longitudinali versus apicem latiuscula. Venter concavus, segmento 3:to apice valvulis 2 rotundatis, pilosis, nigricantibus. Alarum costa subnuda, spinula nulla. Tibiae posticæ intus rigide pubescentes, tarsis breviunculis;

*Fem.*: oblonga, cana, capite concolore, oculis parvis, rotundatis, modice remotis, per orbitas latas cinereas & vittam frontalem mediocrem obscuram sejunctis. Abdomen oblongum, ano

simplici. Alarum costa brevissime subciliata, spinula minuta. Tibiae posticæ intus subnudæ: in copula.

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 677. 69. ♂♀.

Hab. in silvis, at præsertim in ripis arenosis humidis fluminum Lapponiarum septentrionalium, 4 Jun.—13 Aug., passim frequens, in copula aliquoties capta; scilicet in Botnia boreali inter Luleå & limitem Lapponiæ Lulensis, ut & ad Quickjock, D. Prof. Boheman (sub nomine *A. arenaria* communicata); in Lapponia Tornensi ad Pello, Wittangi & Juckasjervi, haud raro; in Norvegia: in Finmarkia occidentali ad Alten, atque in Finmarkia orientali ad Kautokeino, rarissime.

♂♀. Species pulchra & per caput buccatum argenteo-micans, alas albidas, costam subinermem ut & constructionem ani maris, facile dignota. Similis priori, sed fronte epistomateque multo magis porrectis, antennis nonnihil brevioribus, seta nuda, oculis minoribus, macula frontali fusco-lutea multo minore, alarum costa nudiore &c. abunde differt. Seta antennarum basi distinete incrassata. Thorax vix lineatus. Abdomen pubescens sed vix setosum. Pedes plerumque obscure rufescentes. Cetera ut in priori. — Variat rarius alarum nervis fuscedine leviter cinctis, ut in specimine Kautokeinoënsi.

121. *A. arenosa*: antennis breviusculis eana, capite argenteo; fronte distinete prominente; ore subexerto; macula supra antennas mediocre, lutescente; alis, squamis halteribusque albidis, costa subciliata, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; mas: oculis cohaerentibus, ano infexo, cinereo, ventre lamellis pilosis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in cumulis altis, *Olle Hau* dictis, ex arena marina factis, in promontorio boreali insulæ Fårön Gott-

landiae, mense Julio sat frequens, in copula capta, nec alibi a me inventa. (Ad Moabite prope Berolinum d. 16 Jul. 1842 in utroque sexu legit D. Dahlbom).

*♂♀.* Simillima priori, sed ab illa praecipue differt: magnitudine paullo minore, colore corporis magis albido & canescente, alarum costa in primis in ♀ subciliata, nec nudiuscula ut & maris oculis magis coherentibus, & abdomine basi subdepresso, nec subcylindrico. *Mas:* oculi per orbitas angustas elevatas leviter sejuncti. Haec orbitae in fronte confluentes, nec per lineolam nigram separatis ut in priori. Macula supra antennas minuta flava. Abdomen canum, linea dorsali obscura, certotantum situ visibili; totum lineare, basi depresso, apice subclavatum, ano & valvulis ventralibus ut in priori. Pedes ut in praecedente. *Femina:* a femina priori vix differt, nisi, ut dictum, magnitudine nonnihil minore, colore albidiore, macula frontali flava perspicniore, alarum costa subciliata, spinula distinctiore ut & geniculis summis, & si mavis tibiarum imbas, ferruginantibus. (Cfr. *Ar. albula* nob. 226).

122. *A. unistriata:* antennis medioeribus late cinerea, capite argenteo; fronte distinete prominente; ore vix exerto; thoracis abdominisque linea dorsali brunnea; alis albo-hyalinis, costa nuda, nervo transverso ordinario subrecto; squamis halteribusque sordide albidis; *mas:* oculis subcoherentibus, ano cinereo, ventre non lamellato. ♂. (Long. 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 677, 71. ♂.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; locis arenosis ad pagos Pello & Wittangi 4—10 Jun. 1821 duo exempla inveni.

*♂.* Priori affinis & similis, sed magnitudine paullo majore, colore corporis magis cinereo, antennarum seta brevissime pubescente, nec nuda, oculis paullulum sejunctis, orbitis scilicet

per lineolam tenuissimam nigrum disjunctis, macula frontali flava nulla, thoracis lineola dorsali lata brunnea obsoleta, abdome cylindrico, linea media fusca integra, ano parvo cinereo haud inflexo, lamellis ventralibus nullis, alarum nervo transv. ordinario levissime flexo, nec exacte recto, ut & costa nudiuscula, spinula nulla, facile dignota. Abdomen ante incisuras pilosum ut in prioribus. Femora nigro-cinerascentia.

123. *A. hilarella*: antennis longiusculis late grisea, capite concolor; fronte parum prominente, ore non reflexo; macula supra antennas medioeri, fulva; alis, squamis halteribusque cinereo-albidis, costa subciliata, spinula medioeri, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in insula Gotlandia, ubi ad Westö (in parœc. Hall), Stenkyrka & in insula Furillen tria individua 21--30 Jul. 1811 invenimus D. Dahlbom & ipse.

♀. *Ar. arenosæ* (121) valde similis & affinis; sed antennis paullo longioribus, seta distinctius pubescente, fronte minus exserta, colore corporis late flavid-griseo, nec cano, ut & alis cinereis, nec albidi, facile dignota. Antennæ & pedes tota nigra. Thorax & abdomen immaculata. Reliqua ut in femina *Ar. arenosæ*.

††. nervis longitudinalibus 3 & 4 versus apicem levissime divergentibus.

124. *A. trapezina*: antennis longiusculis obscure cinerea (♂), aut cinerea (♀), capite albicante; ore fronteque subprominulis; thoracis vittis subtribus abdominalisque serie dorsali macularum trapezinorum nigris; alis subfuscato-hyalinis, costa subciliata, nervo transverso ordinario subperpendiculari, recto; mas: oculis cohærenti-

bus, ano infexo, cinereo, ventre lamellis pilosis. ♂♀.  
(Long. 2—2½ lin.).

Hab. in Suecia, præsertim boreali, 24 Jun.—16 Aug., minus frequens; nempe in Scania meridionali ad Östra Torp a me semel inventa; sed in Jenitlandia boreali passim, ex. gr. ad Åreskutan, Mullfjellen & Skalstugan haud raro visa; in Dalecarliae alpibus a D. *Bohemus* capta; in Lapponia Lulensi ad Tjomotis in uno specimine masculo versus finem Junii 1813 a D. *Wahlberg* capta. (E Glogavia a D. *Zeller* missa).

♂. Ab *Anthom. melanura* Meig. 5. 172. 153, cui valde similis videtur, abdominis maenlis, nec vitta dorsali, nigris, ano cinereo, nec atro, ut ♂ alarum nervo transv. ordinario subperpendiculari, nec subobliquo, differt. Setosa, caput nigrum, argenteo-micans. Oculi non intime cohærentes. Frons modice prominens. Epistoma breve, apice subreflexum. Antennæ epistomate nonnihil breviores, validiusculæ, nigrae, seta breviter puberula, basi incrassata. Proboscis sæpe pendula palpique mediocres, nigra. Thorax cinereus, vittis dorsalibus 3 nigris, quarum media evidenterior, integra. Vestigium etiam vittæ lateralis nigrae utriusque observatur. Abdomen lineare, subcylindricum (dorso tamen subplatum), pubescens, ante incisuras pilosum, totum cinereum, segmento singulo in medio maenla basali sat magna subquadrata, nigra. Certo situ etiam incisuræ nigro-micant. Anus inflexus cinereus opacus, incisura media atra nitidissima. Venter pubescens, segmento 3:to apice hians laminam 1. valvulam rotundatam nigrum pilosam utrinque emitens. Alæ leviter subfuscæ, nervis ut in *Aricia latipenni* 118, directis, longitudinalibus vero 3 & 4 non exactissime parallelis, sed ad apicem paullulum magis (licet perparum) distantibus quam in medio. Costa breviter subciliata, spinula parva. Squamæ & halteres sordide alba. Pedes nigri pilosi, tibiis spinulosi. — (Cfr. *Ar. odontogaster* n:o 129).

♀ similis mari, sed corpore latius cinereo, fronte modice lata,

vitta media modice lata parallela nigra, thoracis lineis brunneis obsoletis, ut & abdomine lanceolato minus piloso, maculis fuscis obsoletissimis vix nisi certo situ in rudimento conspicendi dignata.

**125. *A. lepturoides*:** antennis medioeribus cinerea, capite albicante; ore fronteque sub prominulis; abdomine linea dorsali nigra; alis subfuscato-hyalinis, costa submutica, nervo transverso ordinario sub perpendiculari, recto; *mas*: oculis subcohærentibus, ano tuberculato atro nitidissimo. ♂. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime, nempe in Suecia media, D. *Marklin*, ad Holmiam, D. *Wahlberg*, qui marem sub nomine: *A. similifrons*, misit; in Lapponia Lulensi, D. *Andersson*. (E Finlandia a D. Prof. *Sahlberg* quoque communicata; ad Neuenkirchen Germaniae a D. *Dahlbom* 15—20 Maj. lecta).

♂. Simillima priori, per antenas tamen paullulum breviores, setam nudam, oculos forte nonnihil magis disjunctos, thorace subimmaculatum, abdomen tantum linea, nec serie macularum, nigra, versus apicem subangustatum, nec totum lineare, anum bituberculatum, atrum, nitidissimum, stylis 2 suffultum, ut & alarum costam parum ciliatam, spinulam nullam, vere diversa. Ab *Ar. latipenni* (118), cui structuram coloremq[ue] ani stylisque ventrales simillima habet, thorace non vittato, alis hyalinis, nec flavis, costa subnuda, spinula vix nulla, &c., mox dignoscitur. Ab *Ar. sepia* (148) alarum costa nuda, ut & spinula nulla, prieipue differt.

b Alarum nervi transversi fuscedine cincti.

**126. *A. marginalis*:** antennis breviusculis læte cinerea, capite argenteo; fronte sub prominente; vertice, thoracis disco, scutello abdominalisque maculis trigonis

magnis, brunneis; alis hyalinis, costa subciliata; nervis transversis infuscatis, horum ordinario perpendiculari, recto; *mas*: oculis subcohaerentibus, ano haud inflexo, ventre non appendiceo. ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin.).

*Mas*: caput argenteum. Oculi approximati, per orbitas in fronte fere coenentes, angustas albas, leviter distantes. Thoracis discus parum infuscatus, vitta media latiore brunnea, obsoleta. Halteres obscuri. Abdomen oblongo-cylindricum, ano parvo cinereo, ventre appendicibus nullis;

*Fem.*: caput albo-cinereum. Oculi per orbitas albidas & vittam frontalem latam fuseam, modice remoti. Vertex brunneus. Thoracis discus subfuscus, lineis 3 distinctioribus brunneis. Halteres dilutiores. Abdomen oblongo-ovatum, apice acutum.

*Musca* Fall. Muscid. 66. 67. ♂♀. originaria, — *Anthonomyia* Meig. Dipt. 5. 196. 198. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 676. 68. ♂♀.

Hab. in arenosis, per Scandinaviam medium & borealem, 22 Jul.—15 Aug., minus frequens; scilicet in Westrogothia in silva Kinneskogen a D. *Gyllenhal* detecta; in Lapponia Tornensi ad Karesuando a me haud parce inventa; in Norvegia ad radicem alpium Kälahögar in jugo alpino Värdaliae specimen unicum a D. *Dahlbom* lectum. — Mores *Lispæ*.

♂♀. Species pulchra, & thoracis disco leviter & dilute brunneo, abdominis pictura, alarum nervis transversis infuscatis, squamis medioribus niveis, ut & aris maris non appendiculata, ab affinibus distincta. Pictura fere *Ar. dorsatæ* n:o 82, *litoreæ* 83, & *5-lineatæ* 84, sed variis notis diversa, ut ex comparatione apparet. Antennæ præsertim in ♂ breviuseulae, nigrae, seta nuda, basi leviter incrassata. Epistema apice parum reflexum. Palpi filiformes, nigri. Abdomen in ♂ præcipue poste- ce setulosum, in ♀ subnudum, in utroque sexu albo-cinereum.

segmentis: 1:mo fere toto, 2 & 3 singulo basi macula magna late transversa trigona, brunneis, hac per lineolam medium tenuissimam albidam interdum divisa. Alarum nervi: transversus ordinarius distincte ante medium areæ insertus; longitudinales 3 & 4 fere paralleli. Spinnula costæ medioocris. Pedes simplices parce pilosi & setulosi; nigri.

B. Alarum nervus transversus ordinarius inflexus.  
Costa inermis.

α.) Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes.

127. *A. Histrio*: antennis elongatis albo-cinerea, capite argenteo; fronte prominente; thoracis vittis tribus, abdominisque linea dorsali & incisuris, ni ris; alis hyalinis; mas: oculis subcohaerentibus, ano nigrante. ♂♀. (Long. 3 fere 4 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 676. 64. ♂♀.

Hab. in ligno recenter secato atque in truncis arborum viventium præsertim Pini, per Scandinaviam medium & borealem, 2 Jul.—31 Aug., passim; scilicet in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Wadstena rarius, ipse; in Helsingia ad diversoria Kårböle & Lösvik; in Jemtlandia ad Faxelfven, Ås & Östersund; in Lapponia Umensi ad Stensele & Umeås; in Norvegia: ad Garnäs Värdalæ; atque ♀ ova in trunco Pini recenti depositura ad Bossekop Finmarkiae occidentalis 7 Aug. 1821 visa.

♂♀. Valde similis & affinis *Ar. festivæ* (n:o 34); sed antennarum seta brevissime, aut breviter pubescente, nec subplumata, praeter alias notas distineta. — Sat magna, elongata, angustata, abdome versus apicem attenuata; setosa, pulchra. Antennæ longiusculæ, lineares, subnudæ, nigrae, seta biarticulata, bre-

vissime puberula (in ♀ pubescente), basi incrassata. Os margine parum reflexum, apertura sat magna. Palpi subcylindrici, nigri, pilosi. Thorax vittis 3 nigris, media antice subgeminata, lateralibus latioribus subinterruptis. Scutelli margo lateralis parum fuscens. Abdomen linea dorsali distincta, & incisuris tenuiter, nigris; ante incisuras setosum. Ala hyalina, nervis transverso ordinario obliquo & distincte inflexo, longitudinalibus 3 & 4 apice sat perspicue divergentibus. Costa haud ciliata, spinula vix ulla. Squamæ mediocres, ciliatæ, albæ, valvula superiore inferiorem tegente. Pedes simplices, cinereo-nigri, pilosi, tibiis posticis præsertim spinosis. *Mas:* oculi fere cohærentes, per orbitas angustissimas albas & vittam frontalem nigram tenuissimam antice latiorem disjuncti. Anus parvus, bisegmentatus, nigricans, subnitidus. Segmentum ventrale 3:ium stylis 2 minoribus, ventri adpressis, nigris, pilosis. Pulvilli elongati, albi. *Femina:* oculi modice distantes, per orbitas mediocres albas & vittam frontalem latam atram remoti. Abdominis linea dorsalis & incisuræ, sat lata, nigra. Anus acutus. Pulvilli parvi, albidi.

128. *A. unilineata:* antennis breviusculis cinerea, capite albescente; fronte prominente; abdominis linea dorsali nigra; alis subhyalinis; *mas:* oculis approximatis, ano cinereo; *femina:* oculis appropinquantibus. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 675. 63. ♂♀.

Hab. in arenosis præsertim ad ripas fluminum, etiam in terra nuda ad sepes, vias, &c., locis soli expositis, per Sueciam & Lappiam, 5 Maj—Jun.—15 Jul., passim; scilicet in Sænia circa Lund & Kjellby (*Dahlbom*) tempore vernali sat frequens; in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljungh*; in Bottnia boreali ad Skellefteå, Ersnäs, Galix, Karungi, Pello & Kengis, haud raro; in Lapponia Ume-

si ad Lycksele &c. passim; in Lapponia Tornensi ad Juekasjervi, paree.

♂♀. Affinis & similis priori; sed magnitudine minore, fronte magis porrecta, antennis nonnihil brevioribus & latoribus, colore corporis cinereo, nec glaucescente, thorace subimmaculato, abdomine paullulum latiore, incisuris vix nigris, alis cinereo-hyalinis, nec aqueis, nervo transverso ordinario minus obliquo minusque flexo, oculis ♂ magis, ♀ vero minus remotis, ut & ano maris inflexo cinereo, nec nigricante, abunde dignota. — Pilosa & distincte setosa, opaca. Epistoma albo-nitens, macula intra antennarum basin & oculos magna, nigro-micante; apice non reflexum. Antennae nigrae; apice rotundatae, microscopice puberulae, seta brevissime pubescente. Oculi mediores, ovales, brunnei, in utroque sexu non late remoti, vitta frontalii medioriter angusta, nigra, disjuncti, in ♂ tamen propiores. Thorax antice vestigio lineolarum 2 tenuissimarum nigrarum. Pedes nigro-cinerei. Reliqua ut in precedente. — Ab *Ar. buccata* (116), cui de cetero valde similis, fronte nonnihil latiore, nervis: transverso ordinario minus obliquo, & longitudinalibus 3 & 4 non exakte parallelis &c. dignoscitur. — Variat ♂ abdominis incisuris late brunneis.

*Obs.* Feminæ ad nidos Andrænarum inventæ, in quarum larvis larvæ hujus speciei *Ariciæ* verisimiliter parasitæ vivunt, observante D. Professore *Wahlberg*.

129. *A. odontogaster*: antennis longiusculis obscure cinerea, capite angenteo; fronte subprominente; abdominis linea dorsali subinterrupta, nigra; alis subhyalinis; mas: oculis subcohaerentibus, ano infexo, cinereo, ventre lamellis pilosis. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Ostrogothia ad Lärketorp, ubi duo paria in copula juneta ante plures annos inveni.

♂♀. Simillima *Ar. trapezinæ* n:o 124, a qua tamen magnitudine paullo majore, ore nonnihil minus prominulo, alis magis cine-

reo-hyalinis, basi leviter flavicantibus, nec totis fumato-hyalinis, nervis: transverso ordinario distinctius flexo, longitudinalibus 3 & 4 versus apicem leviter divergentibus, nec exacte parallelis, ut & abdominis linea dorsali nigra angustata abrupta, nec maculas subquadratas formante, vere differt. — Oculi in ♂ anguste distantes, in ♀ per orbitas albidas & vittam frontalem haud latam, nigras, modice remoti. Thorax lineola dorsali utrinque abrupta, dilute brunnea. Abdomen subcylindricum, lineare, supra subplatum, linea dorsali interrupta nigra, in segmentis 1, 2 & 3 perspicua, in 4:to evanescente. Anus, ventris appendices, alae, squamae, halteres, pedes &c. omnino ut in *Ar. trapezina*.

β.) Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

130. *A. albescens*: antennis medioeribus albo-cinerea, capite buccato, argenteo-micante; abdominis lineola dorsali fusca; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordinario obliquo, inflexo; *mas*: oculis appropinquantiibus, ano cinereo; *femina*: oculis modice remotis. ♂♀ (Long. 1½ sere 2 lin., raro ultra).

*Musca buccata* Fem. Fall. Muscid. 65. 65. ♀. certissime. — *Anthom. albula* Meig. Dipt. 5. 102. 35. (exclus. syn. Fall.). *Hylemyia albula* Meig. Dipt. 7. 315. 15.

Hab. in arenosis & sabulosis, etiam in foliis fruticum, per Succiam meridionalem & medium, 2–30 Jul., 1 Sept., sat vulgaris; scilicet in Scania ad Lund, Kjeflinge, Fogelsång (D. Dahlbom) &c., frequens; in Smolandia, D. Boheman; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c. non parce; in Westrogothia, D. Gyllenhal; in Uplandia ad Holmiam, D. Wahlberg; sed supra hanc provinciam haud visa; femina sub nomine: \**Musca albula* Fall.\* ex Haf-

nia a D. Staeger missa. (E Glogavia a D. Zeller plura specimina ex utroque sexu communicata). Plura quoque exempla capta in horto Gryphico Senatoris Krey, ubi apud *Diodontum pallipedem* (Hymenopteron e familia Pemphredonidarum) parasitice vivunt, observante eximio nostrae naturae serutatore Dahlbom..

♂♀. Similis *Ar. buccatæ* (116); sed magnitudine plerumque multo minore, colore corporis multo magis albescente, alis albidiioribus, nervo transverso ordinario magis flexo, ut & oculis in ♂ paullo remotioribus, & in ♀ multo magis distantibus, mox dignoscenda. Facies longe prominens. Punctum supra antennas album. Antennæ nigrae, seta pubescente. Oculi sat parvi, ferrugineo-brunnei. Thorax interdum linea dorsali late brunnea. Alarum costa omnino nuda. Pedes nigri, femoribus cinerascentibus. Anus maris parvus, rotundatus, cinereus, opacus. Venter vix appendicetus. — *Mas:* oculi appropinquantes, vitta dorsali angustata obscure cinerea; *femina:* oculi modice remoti, per orbitas cinereas & vittam cinerascentem antice certo situ atro-micantem disjuncti.

*Phalanx 2:du.* Corpus ovatum aut oblongum.

A. Oculi saltem maris hirti. Seta antennarum elongata, nuda, capillaris, basi incrassata. Alarum nervi longitudinales 3 & 4 subparallelis aut versus apicem levissime divergentes. Costa nuda, & spinula nulla. Squamae mediocres, valvula superiore inferiorem (saltem in ♀) non tegente. Pedes simplices. *Lasiops* Meig.

131. *A. glacialis:* antennis breviusculis nigricans, capite cinerascente, ore fronteque subprominulis; thorace atro-trivittato; alis hyalinis, nervo transverso ordinario levissime flexo; squamis sordide albidis; halteribus fusco-

testaceis; oculis in utroque sexu subcohærentibus; *mas*: abdomine obscuriore & longius piloso, ano obtuso; *femina*: ano subacuto. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Wahlb. in litt. 1843. *Anthom. hirticeps* Zett. Ins. Lapp. 679. 77. ♂. (non ♂, sed ♀).

Hab. in summis alpibus nivalibus Lapponiae mense julio & initio Augusti rarius; scilicet in Lapponia Lulensi ad Quickjock (in cacumine alpis Walli), D. D. *Wahlberg & Andersson*; in ipso alpium Tornensium jugo 3 specimina feminea d. 10—12 Jul. 1821 ipse collegi.

♂♀. Nigro-cinerascens, opaca, pilosa. Oculi sat magni, distincte hirti, subcohærentes, linea frontali nigra angusta, antice dilata-ta, sejuncti; feminæ parum quam maris remotiores. Frons mo-dice prominens. Antennæ breviuseculæ, articulo ultimo 2:do vix duplo longiore, totæ nigræ, sat latæ. Palpi subcylindrici, atri, pilosi. Thorax vittis 3 atris, in fundo obscure cinerascen-te minus perspicuis. Abdomen subovatum, segmento ultimo in ♂ obtuso, in ♀ acuto; tuberculo anali inflexo, intra seg-mentum anale convolutum in mortuis saepe inclusio, parum conspiciendo. Alæ subhyalinæ, basi nigro-fuscae. Nervi: lon-gitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; transver-sus ordinarius leviter flexus, interdum subrectus. Squamæ ci-liatæ, valvulis subæqualibus. Tarsorum pulvilli mediocre, al-bi. — In copula a D. *Wahlberg* capta.

132. *A. innocens*: antennis breviuseculis nigricans, capite cinerascente, ore fronteque subprominulis; thorace atro-trivittato; abdomine cinereo, linea dorsali nigra; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subrecto; squamis al-bis; halteribus nigris; *mas*: oculis cohærentibus, ano subobtuso. ♂. (Long. 2—2½ lin.).

Hab. in foliis fruticum, 28 Jun.—14 Sept., minus frequens; scilicet in Scania a Grönby rarissime; in Ostro-

gothia ad Wadstena semel; in Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad radicem alpis Åreskutan duo specimina inventa; in Lapponia Luleusi ad Randijaur &c., D. *Wahlberg*. (E Glogavia a D. Zeller missa).

♂. Priori simillima, sed magnitudine nonnihil minore, fronte minus prominente, oculis arctius cohærentibus, alis basi non infuscatis, nervis longitudinalibus 3 & 4 subparallelis, squamis albidiорibus, valvula superiore inferiorem non tegente, halterum clava nigra, ut & abdомine ovali (nec ovato), cinereo, linea dorsali angusta incisurisque tenuissime, nigris, certe distineta. Ab *Anthom. cunctante* Meig. 5. 133. 89., cui etiam similis videtur, antennarum seta nuda, nec puberula, corpore opaco, nec nitido, & abdомine cinereo, nec nigro, differt. — Forte ♂ *Ariciae decoloris* n:o 136!

*Obs.* Nomen triviale innocuo mari tribui, nulla habita ratione ad feminam ignotam, quae forsitan infesta est.

133. *A. semipellucida*: antennis longiusculis nigra, capite cinerascente, ore fronteque non prominulis; abdомine ferrugineo-subpellucido, linea dorsali incisurisque nigris; alis fuscans, nervo transverso ordinario recto; squamis albidis; halteribus flavis; mas: oculis intime cohærentibus, uno subrotundato. ♂. (Long. 1<sup>3</sup>—2 lin.).

Hab. in foliis fruticum, per Scandinaviam borealem, 2 Jun.—4 Sept., minus frequens; scilicet in Dalecarlia ad St. Tuna rarissime; in Jemtlandia boreali ad Åreskutan & Skalstugan, passim; in Norvegia ad diversorium Suul Værdaliae in jugo alpino situm, parce.

♂. Similis iterum precedenti, sed magnitudine paullo minore, oculis arctius cohærentibus & tenuissime tantum hirtulis, antennis paullo longioribus, & angustioribus, puncto supra annas albo, ore fronteque minime prominentibus, thorace nigro immaculato, abdомine ovali, flavo-rubo, subpellucido,

temiter nigro-piloso, linea dorsali incisurisque anguste nigris, segmento ultimo cinereo-micante, alis fuscanis, ut & halteribus flavis, mox dignoscitur. Tibiae in junioribus testaceæ. — Affinis videtur *Anth. apicali* Meig. 6. 375. 214. ♂, sed antennarum seta nuda seu microscopice tantum puberula, nec "breviter plumata", thorace opaco, nec "nitido", ut & abdominis apice fusco, albo-micante, nec "nigro", differt. — Variat ab domine rufo, leviter albo-micante.

**134. *A. depressiventris*:** antennis longiusculis nigra, capite cinereo, ore fronteque non prominulis; ab domine ovali depresso cinereo, linea dorsali interrupta nigra; alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto; squamis albidis; halteribus flavidis; *mas*: oculis intime cohærentibus, ano subrotundato. ♂. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in summo cæcumine alpis Åreskutan Jemtlandiæ, altit. circiter 4000 ped. supra mare, rarissime, 2 tantum individua d. 1 Aug. 1810 a me deprehensa; in Lapponia Lulensi ad Quickjock etiam a D. Wahlberg Jul. 1843 inventa.

♂. Simillima omnino priori, a qua tamen magnitudine nonnihil minore, alis hyalinis, nec infuscatis, & præsertim ab domine magis depresso & (in mortuis) transversim ruguloso, toto cinereo, nec rufescente, linea dorsali in segmentis 1, 2 & 3 interrupta, nigra, differt. Oculi omnium tenuissime puberuli. Squamæ sub alis albidæ, valvula superiore inferiore non tegente.

**135. *A. hirticeps*:** antennis mediocribus obscure cinerea, capite argento-micante, fronte subprominula; alis elongatis, hyalinis, nervo transverso ordinario recto; squamis albidis; halteribus nigricantibus. ♀. (Long. fere 3 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 67. 69. ♀. (secundum specimen

originarium) — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 197. 200. ♀. Zett. Ins. Lapp. 679. 77. ♀. ♂ ibidem allatus ad *Ariciam glaciolem* n:o 131 pertinet). — *Lasiops* Meig. Dipt. 7. 324. 1.

Hab. in Suecia meridionali rarissime, in Scania semel inventa.

♀. Obscure cinerea, opaca, setosa. Oculi mediocre, distincte hirti, per orbitas angustas albas & vittam frontalem latam atram sejuncti. Antennæ nigrae, validæ, articulo ultimo 2:do duplo longiore. Epistoma subperpendiculare. Palpi subcylindrici, nigri, pilosi. Thorax dorso vestigio linearum nigrarum. Scutellum immaculatum. Abdomen ovatum, apice acutum. Alæ abdome fere duplo longiores, hyalinæ, ima basi albescentes. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem levissime divergentes; transversus ordinarius fere in medio 1. mox ante medium areæ insertus, subperpendicularis, omnino rectus. Squamae albidæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres obscuri. Pedes nigri, modice setosi.

136. *A. decolor*: antennis brevibus validis obscure cinerea, capite argenteo-micante, ore fronteque subprominulis; thorace lineis 4 nigris; alis mediocribus, hyalinis, nervo transverso ordinario subrecto; squamis albidis; halteribus nigris antibus; *femina*: oculis nudis. ♀. (Long. 2 fere 2½ lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 68. 70. ♀. vera. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 198. 201. ♀. Zett. Ins. Lapp. 679. 81. ♀.

Hab. in graminosis & foliis fruticum, per Scandinaviam, 26 Jun.—12 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Lund, Räften (D. *Duhlbom*), Esperöd &c., passim; in Gotlandia in Lausmyr semel; in Jemtlandia ad Skalstugan parce; in Lapponiis: Lulensi ad Quickjock,

D. Andersson; in Tornensi rarissime. (E Glogavia a D. Zeller sine synonymia communicata).

♀. Valde similis priori, sed magnitudine paullo minore, antennis nonnihil brevioribus, oculis nudis (in individuis bene servatis tantum microscopice l. tenuissime puberulis), fronte minus prominente, epistomate subretuso, nec perpendiculari, vitta frontali griseo-micante, nec atra, thoracis lineis magis perspicuis, ut & alis minus elongatis, certe distincta. Caput cinerascens. Antennarum articulus ultimus obovatus, apice obtusiusculus. Thoracis linea 2 mediæ, angustæ, approximatæ, & 2 laterales nonnihil latiores, interruptæ; nigrae. Scutellum & abdomen ovatum pubescens, cinerea, omnino immaculata. Alarium nervus transversus ordinarius interdum leviter flexus. Reliqua ut in præcedente.

*Obs.* An ♀ *Ar. innocentis* 132? Sed thorax cinereus lineolis 4 nigris (nec nigricans lineolis 3 atris), scutellum cinereum (nec nigrum), ut & abdomen immaculatum (nec linea dorsali incisurisque nigris ornatum), obstare videntur. Neque feminam *Ar. glacialis* (131) esse, facile in suspicionem venire potest, nam ab hæc iisdem notis ac ab *innocente* discrepat, & præterea fronte minus prominente atque halteribus nigricantibus, nec testaceis, differt. Marem, licet hactenus ignotum, oculis hirtis gaudere ex analogia opinor, unde speciem in hac subdivisione ad interim locavi \*).

\*) Postquam supra allatam observationem annotavi & manuscrip-  
tum jam typis mandavi, amicus meus Prof. *Wahlberg* nuper-  
rime mihi scripsit, se *Aric. innocentem* ut marem & *decolor*  
ut feminam in Lapponia Lulensi ad Randijaur & Mattis-  
udden in copula junetas deprehendisse, feminamque ibi copio-  
sissimam & in auribus viatoris sese occultare conantem, veluti  
*Culicium* genus valde molestam atque irritantem invenisse. Om-  
ne igitur dubium remotum videtur *Ar. innocentem* & *decolor*  
ejusdem esse speciei, quæ, priori nomine deleto, antiquum  
Fallenianum "decolor" etiam retinere debet.

B. Oculi in utroque sexu nudi.

*Tribus 1.* Majores, aut mediæ, aut minores.

*Manipulus 1:mus.* Squamæ sub alis parvæ, valvula superiore inferiorem tegente.

\*). Nervus transvers. ordinarius rectus aut subrectus.

α. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter aut levissime divergentes.

**137.** *A. silvestris*: antennis mediocribus obscure cinerea, capite argenteo-micante; fronte subprominente; ore vix reflexo; thoracis vittis obsoletis abdominisque linea dorsali nigris; alis subhyalinis, basi squamisque sordide flavidis; oculis in utroque sexu approximatis; ano in ♂ atro, nitido. ♂♀. (Long.  $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 70. 71. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 198. 202. Zett. Ins. Lapp. 678. 73. ♂♀. *Chorthophilæ* species Macq.

Hab. in foliis fruticum & graminosis, libenter locis paludosis, per prata & silvas Scandinaviæ, 1 Jun.—2 Aug., passim; valde rapax; nempe in Scania ad Esperöd &c., rarius; in Ostrogothia ad Lärketorp; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Gotlandia ad Nähr, Thorsborg, Hellvig &c. sat frequens; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Fanbyn, Mullfjellet, Åreskutan & Skalstugan, haud parce; in Lapponiis: Umenensi ad Lycksele, Stensele & Åsele, in Lulensi ad Quickjock, D. *Andersson*, in Tornensi, D. *Frigelius*; in Norvegia ad Thynæs, Næs, Garnæs & di-

vessorium Kongsstue in jugo alpino situm; in Dania, D. *Staeger*.

$\delta\varphi$ . Sat magna, angustata. Cinereo-nigricans, setosa. Caput albicans. Frons minus porrecta. Oculi approximati, in  $\varphi$  perparum remotiores, in utroque sexu per vittam frontalem angustatam atram (raro in junioribus antice, fulvo-maculatam) & orbitas tenues albas sejuncti. Antennae nigrae, seta subpuberula. Epistoma subperpendiculare. Os haud prominens. Palpi cylindrici, nigri. Thorax cinerens, dorso certo situ vittis 3 nigricantibus, quarum media duplicita, lateralibus indeterminatis. Abdominis linea media & puncta pro insertione setarum nigra. Anus maris tuberculatus, ater, nitidus. Alæ sat magnæ, nervo transv. ordinario subrecto, interdum leviter flexo. Squamæ longe ciliatae. Halteres pallidi. Pedes nigri, tibiis fortiter spinosis. — Specimina Laponica plerumque paullo minora sunt & alis basi minus flavidis. — Caveas ne hanc cum *Aricia latipennis* (118), & *Anthomyza conica* (18), confundas.

138. *A. Billbergi*: antennis mediocribus nigra, nitida, setosa, capite argenteo; fronte parum prominenti; ore subreflexo; thorace antice leviter cinereo-mieante; abdomine apice acuto; alis flavido-hyalinis, costa nudiuscula, squamis albicantibus; oculis in utroque sexu non late remotis; mas: tarsorum antecorum articulis 2 & 3 subdilatatis.  $\delta\varphi$ . (Long. 2— $2\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 678. 75.  $\delta\varphi$ . (exclus. var. b.). *A. ethiops* Zett. l. e. 683. 98.  $\delta$ .

Hab. in floribus Salicis glaucæ & foliis fruticum Sueciæ mediae & borealis, rariss, mense junio in copula capta; scilicet in Smolandia, D. *Bohemian*; in Ostrogoth. ad Gusum, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad radicem Åreskutan; in Bottnia boreali ad Råbäcken, D. *Bohemian*;

in Lapponiis: Umensi ad Lycksele, Lulensi ad Quickjock & lacum Randijaur, & Tornensi ad Juckasjervi.

♂♀. Corpus oblongum, nigrum, nitidum, setosum, antennarum seta nuda, basi incrassata, oculi appropinquantes, alae sublavidæ, inermes, ut & tarsorum anticorum maris articuli 2 & 3 subdilatati, sunt præcipue netæ, quibus species dignoscitur. Frons leviter prominula, in ♂ medice lata & fere subangusta, in ♀ nonnihil latior, vitta in utroque sexu atra, opaca. Humeri præsertim cinereo-micant. Abdomen in utroque sexu ovato-lanceolatum, subdepressum, apice acutum. Alæ in primis basi flavicantes, costa nuda. Nervus transv. ordin. rectus, mox ante medium areæ insertus. Nervi long. 3 & 4 ad apicem leviter divergentes. Halteres flavi. Pedes nigri, toti distinete setosi.

139. *A. atricauda*: antennis mediocribus obscure cinerea, setosa, capite argenteo-micante; fronte parum prominente; ore vix reflexo; thoracis dorso brunnescente, abdominis linea dorsali nigra; alis hyalinis, basi sordide flavidis, squamis albidis, costa nuda; mas: oculis cohærentibus, ano atro, uitido. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Botnia boreali rarissime; in palude ad pagum Pello paroeciae ÖfverTorneå d. 4 Jun. 1821 specimen descriptum juveni.

♂. Similis *Ar. lepturoides* (125), sed ab domine sublanceolato (nec linearî), subdepresso, oculis arctius cohærentibus, fronte minus prominente, antennarum seta nonnihil longius a basi (nec imo tantum basi) incrassata, thoracis disco dorsalibrunnescente, ut & nervis longitudinalibus 3 & 4 versus apicem forte minus divergentibus fere parallelis, differt. Os leviter reflexum. Antennæ sat validæ, nigræ. Alæ sordide hyalinæ, basi leviter flavidæ. Squame & halteres albida. Pedes nigri, setosi.

**140.** *A. articulata*: antennis subelongatis cinerea, capite albicante; ore fronteque non prominulis; pedibus nigris, trochanteribus geniculisque summis flavis; alis flavido-hyalinis, squamis albidis, costa subciliata. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scandinavia boreali **15 Jul.**—**4 Aug.**, rarius; scilicet in Jemtlandia ad radicem alpium Åreskutan & Mullfjellen, atque in Norvegiae jugo alpino ad Kong Carl Johans Klev & ad Kongstue Værdaliae, **6 specimina 1810** inveni.

♀. Per antennarum elongatarum & angustarum setam distincte pubescentem & pedum articulos ferrugineos ab attinibus dignota. Oblonga, parva, grisea. Frons modice lata, vitta lata, nigro-brunnea. Antennæ longiusculæ, angustæ, nigræ, angulo apicali superiori subacuto. Facies minime prominens. Palpi subfiliformes, nigri. Thorax antice lineolis **2** remotis, brunneis. Abdomen oblongum, sublanceolatum, vix nisi postice parce setosum. Nervi: longitudinales **3** & **4** subparallelis; transv. ordinarius subperpendicularis & subrectus (*i.e.* levissime flexus), paullo ante medium areæ insertus. Squamæ sordide albae. Halteres flavi. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, parce setosi, trochanteribus & tibiarum ima basi flavis.

**141.** *A. anilis*: antennis elongatis cinerea, capite plumbeo; ore fronteque distincte prominentibus; thoraci lineis **3** læte brunneis; abdominis segmentorum **1**, **2**, **3** singulo basi maculis tribus trigonis, ultimoque toto, atris, nitidis; alis subbrunneostributis, squamis albidis, costa ciliata; *femina*: tarsis anticis articulo ultimo oblongo. ♀. (Long.  $2-2\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 92. ♂? (erit ♀).

Hab. in Svecia boreali rarissime; ad radicem alpis Mullfjellet juxta diversorum Forsa **27 Jun.** individuum unicum inveni; in Dalecarlia & in Lapponia Lulensi ad

Quickjock a D. *Bohemian* quoque deprehensa, mibique communicata; in Lapponia Umensi ad Lycksele a me 1832 detecta.

♀. Antennis validis non incumbentibus, alarum costa ciliata spinulaque distincta, ut & abdominis pictura, praeceps a reliquis differt. Caput plumbeum, nitidum. Frons modice lata, vitta lata, atra. Antennæ obliquæ, nigrae, articulo ultimo longo, valido, supra tenuissime puberulo, apice truncato. Seta triarticulata? nuda, basi incrassata. Epistoma declivum, apice distinete reflexo. Palpi leviter clavati, nigri. Thorax cinereus, lineis 3 brunneis. Abdomen oblongum, cinereum, parce setosum, apice acutum. Segmenta: 1, 2 & 3 cinerea, basi in singulo maculis 3 subtrigonis, basi coherentibus, atris, nitidis; 4:um triangulare, totum atrum, nitidum. Alæ cinereo-fuscanæ, basi subflavidæ l. albidae, nervis long. 3 & 4 versus apicem divergentibus, ordinario perpendiculari, recto, fere in medio areæ inserto. Squamae & halteres albidae. Pedes nigri. — Caveas ne hanc cum *Ar. latipenni* (118) confundas. Afinis etiam *Ar. cuneicorni* (143).

142. *A. mœrens*: antennis sublongiusculis subcylindrica, nigra, nitida, capite argenteo-micante; ore fronteque prominentibus; thoracis humeris albidis; alis flavidohyalinis, costa subnuda, squamis albidis; mas: oculis coherentibus, uno nigro, nitido. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Var. a. ♂♀. *Mas.* Undique sat dense pilosa, nigra, nitida. Oculi coherentes. Antennarum articularis ultimus sat magnus, latus, secundo parum longior, seta capillari nuda, non ad medium incrassata. Abdomen conico-cylindricum, totum nigro-subvillosum, nigrum, nitidum, supra leviter cinereo-micans, linea dorsali nigra. Anus tuberculatus, niger nitidus, lamellis 2 verticalibus parvis nigris nitidis suffultus. Alæ cinereo-hyalinæ, basi subflavidæ. Nervi ut in *Ar. Billbergi* (138) directi. Squamae albæ, ciliatæ. Halteres flavi. Pedes simplices, setosi; in junioribus saepè rufescentes.

**Fem.** Oculi non late remoti, vitta frontali atra, utrinque albo-marginata. Anus compressus. Alias mari descripto similis. Tarsi simplices.

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 681. 88. var. a. ♂♀.

Var. b. ♂: oculis magis remotis (minus tamen quam in *Ar. Billbergi*), per vittam atram angustatam sejunctis.

Zett. l. c. var. b. ♂.

Var. c. ♂♀ in copula. ♂: oculis arce cohærentibus; ♀: griseo-nigricans, oculis mediocriter remotis; in ceteris var. a. similis, forte hujus.

Zett. l. c. var. c. ♂♀.

Hab. var. a. ♂: in Lapponia Umeensi rarissime, in Tornensi passim, ex. gr. in silva Wittangi & ad Torne-träsk, 15 Jun. - 10 Jul., atque in jugo alpino Norvegiae in alpe Kälahög Värdaliae 22 Jul. 1810 capta; ♂ ♀: in ripa arenosa fluminis Tornensis ad Juckasjervi d. 22 Jun., & ad Giebostad Nordlandie Norvegiae 22 Jul., lecta; var. b. ad Kengis Lapp. Tornensis 10 Jun. inventa; atque var. c. in floribus Salicis ad Juckasjervi 21 Jun., ♂ in copula mense Aug. ad Calix Bottniae borealis semel deprehensa.

**Obs.** *Anth. angulicornis* Zett. Ins. Lapp. 681. 89. ad *Dialytam erinaceam* pertinet.

**143. *A. cuneicornis*:** antennis longiusculis cuneatis grisea, capite argenteo-micante; ore fronteque distinete prominentibus; thoracis lineis 3, abdominisque nitidi segmentorum maculis basalibus, fuscis obsoletis; alis subflavido-cinereis, costa parum ciliata, squamis albidis; **femina:** tarsis antieis articulo ultimo oblongo. ♀. (Long. 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 90. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; in palude sylvatica ad Juckasjervi 21 Jun. 1821 in uno specimine inventa.

♀. Antennarum forma, frons & os distincte porrecta, ut & tarsorum antecorū articulus ultimus (in ♀) oblongus, dilatatus, speciem præcipue denolant. Griseo-cinerea. Frons lata, vitta lata, altra. Orbita oculorum albida. Antennæ incumbentes, nigrae, articulo ultimo valido, cuneato, apice truncato, seta nuda, fere ad medium incrassata. Thoracis linea 3 brunneæ. Abdomen oblongo-ovatum, subdepressum, parum pilosum, nitens, cinereum, segmentis basi maculis indeterminatis, obsoletis, & certo situ linea dorsali, fusca. Alæ basi leviter flavescientes. Nervi: longitudinales 3 & 4 fere paralleli, transversus ordinarius fere in medio areæ insertus, subperpendicularis, rectus. Halteres pallidi. Pedes nigri, pubescentes, sed parum & parce tantum pilosi. Affinis & subsimilis *Ar. anili* (141).

144. *A. murina*: antennis medioeribus oblonga, murina, setosa, capite argenteo; fronte minus prominente, ore non reflexo; abdominis linea dorsali fusca; alis cinereo-hyalinis, ima basi squamisque albidis, costa parum ciliata; mas: oculis non arete cohærentibus. ♂. (Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 91. ♂.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; ad Lycksele semel inventa; specimen quoque ad radicem alp. Åreskutan Jemtlandiae borealis 21 Jun. 1840 legi.

♂. Læte cinerea, opaca, setosa. Antennæ nigrae, articulo ultimo non lato, 2:do duplo longiore, seta nudiuscula, l. breviter puberula, basi incrassata. Thorax certo situ subfuscoc-lineatus. Abdomen subconicum, ante incisuras pilosum, linea dorsali fusca, valde obsoleta. Anus compressus; vix casu? Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem divergentes, transversus

ordinarius subobliquus, levissime flexus, nec exactissime rectus. Halteres albidi. Pedes rufesceni nigri (an in juniore?), leviter cinereo-micantes, setosi, tarsorum antecorū articulis 2 & 3 leviter incrassatis seu dilatatis. Spinula costae parva. Ab *Ar. maculifronte* (54) vix nisi oculis paullo magis approximatis, & macula supra antennas flava haud perspicua, differt.

**145. *A. senilis*:** antennis breviuseculis oblongo-ovata, cinerea, immaculata, capite albescente; ore fronteque subprominentibus; alis cinereis, basi squamisque albis, costa subnuda; *femina*: oculis non late distantibus. ♀. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 91. ♀.

Hab. in Lapponia Umensi; ad Lycksele 1832 in uno specimine lecta.

♀. Tota late cinerea, opaca, setosa. Caput argenteo-micans, nitens. Frons sub prominula, non lata, cinerea, vitta angustata, nigra. Os reflexum. Palpi subfiliformes, nigri. Antennae mediocres, nigræ, seta nuda, ima basi distincte incrassata. Abdomen ovatum, subdepressum, basi apiceque coarctatum, segmentis 2, 3 & 4 apice setosis. Alæ ima basi albescentes. Nervi: longitud. 3 & 4 versus apicem levissime divergentes, transv. ordinarius mox ante medium areæ insertus, rectus. Halteres albidi. Pedes nigri, setosi, leviter cinereo-micantes. Tarsi antici articulo ultimo ovato, perparum dilatato.

Var. b. ♀. paullo minor, thorace lineis 5 brunneis obsoletissimis, fronte nonnihil latiore & paullulum magis prominula; de cetero var. a. similis; in Salice ad Torneå 8 Maj in uno specimine capta; an hujus? Vel forte potius varietas sequentis.

**147. *A. brevicornis*:** antennis brevissimis, nigricans (♂), aut cinerascens (♀); capite albicante; ore fronteque distincte prominentibus; thoracis lineis 3 obscuris; alis subhyalinis, squamis albis, costa nuda; mas: hirsutus,

oculis arte cohærentibus, abdomine linearι, depresso. ♂♀.  
(Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 683. 99. ♂♀.

Hab. in floribus Salicis capræ & cinereæ, in petris etiam saepe sedens, cum *Ar. florali* interdum hospitium quærens, tempore vernali (Maj. Jun.) in primis vigens, in Lapponia serius (27 Jul.—2 Aug.) deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Abusa &c., passim; e Smolandia 1835 a D. *Bohemani* missa; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*, & ad Upsaliam, D. *Marklin*; in Bottnia boreali ad Haparanda frequens; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Åsele rarius; in Lappon. Lulensi ad Quickjock, 1843, D. *Andersson*.

♂♀. Similis sequenti, sed antennis nonnihil brevioribus & oculis ♂ arctius cohærentibus præcipue dignota. Antennæ epistomate brevi multo breviores, nigræ, articulo ultimo valido, subquadrato 2:do vix duplo longiori, seta nuda, fere ad medium incrassata. Facies ante oculos distinete porrecta, ore reflexo. Palpi exserti, clavati, pilosi. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparalleli, transv. ordinarius paullo ante medium areæ insertus, perpendicularis, rectus. Halteres testacei. Pedes simplices, nigri. *Mas:* obscure cinereus, totus distinete hirsutus. Caput supra subdepressum, oculis arte cohærentibus, antice macula frontali trianguli, nigra. Thoracis linea 3 nigræ. Abdomen angustum, lineare, depresso, linea dorsali nigra. Anus parvus, ater, nitidus. *Femina:* cinerea, parce pilosa. Frons modice lata, cinerea, vitta mediocri, atra, certo situ cinereo-micante. Thoracis linea 3 fusca, obsoletæ. Abdomen oblongo-ovatum, subdepresso, linea dorsali fusca, valde obsoleta.

*Obs.* E duobus speciminibus feminineis a Cel. *Wahlberg* ex Holmia missis, alterum paullo majus, & fronte paullo latiore, vitta media atra magis lata, sed in reliquis cum specie genuina conveniens, vix diversa.

**147.** *A. floralis*: antennis subelongatis, nigricans ♂, aut cinerascens ♀; capite albicante; ore fronteque modice prominentibus; maris thoracis lineis 3, abdominis que unica dorsali & incisuris, nigro-fuscis; alis in utroque sexu hyalinis leviter fuso-flavidis, squamis albidis, costa subciliata; *mas*: oculis subcohærentibus, abdomine lineari, subdepresso. ♂♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Mas*: obscure cinereus. Oculi approximati, non vero arete cohaerentes, per vittam frontalem angustam nigram disjuncti. Thorax lineis 3, plus minus latis, obscuris. Abdomen lineare, angustum, subdepressum, linea dorsali distineta, incisurisque tenuiter, nigro-fuscis. Segmenta subquina ad marginem apicalem pilosa. Anus parvus, subinxetus, niger, nitidus, leviter cinereo-micans. Nervus transv. ordinarius paullo ante medium areæ insertus. Pulvilli subelongati, albidi;

*Fem.*: cinerea, subimmaculata. Oculi modice remoti, per orbitas cinereas & vittam frontalem modice latam, atram, certo situ cinereo-micantem sejuncti. Abdomen oblongo-ovatum, deprimis pubescens, linea media brunnescente; apice acutum. Nervus transv. ordinari, mox ante medium areæ insertus. Pulvilli parvi, albidi.

*Musea* Fall. Museid. 71. 76. ♂. (sub qua vero plurrens latent species). *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 165. 143? & 7. 327. 33? — Maeq. Buff. 2. 337. 15? Zett. Ins. Lapp. 684. 102. ♂♀.

Hab. in floribus & foliis fruticum, per Scandinaviae hortos & silvas, 27 Jun.—4 Aug., passim; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c., sat frequens; in Gotlandia ad Gothem & Martebo; in Jemtlandia ad Skalstugan; in Bottnia boreali ad Luleå, D. Boheman; in Lapponia Umensi ad Lycksole; in Norvegia ad Thynæs & Garnæs Værdaliæ, utque ad Suul in jngio alpino situm, adseen-

dens; in Dania, D. Staeger. (Sub nomine: "Anthonom. ruricola Bouche" e Silesia a D. Zeller ♂ missus).

♂♀. Similis *Ar. cinerea* n:o 57, sed plerumque paullo minor, & fronte nonnihil minus prominente, squamis sub alis albido-ribus, saltem non flavidis, ut & maris oculis minus arete cohaerentibus, thorace obscuriore & tri- (nec bi-) vittato, praeципue dignata. Oblonga. Antennæ mediocre, non latæ, nigrae, sela pubescente. Palpi filiformes, nigri, pilesi. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallel, seu versus apicem omnium levissime subdivergentes, transversus ordinarius rectus l. subrectus. Costa breviter ciliata, spinula medioeri. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri.

*Obs.* *Musca floralis femina* Fall. l. c. ad *Ariciam cinereum* nobis n:o 57; & *Musca floralis* var.  $\beta$ . *mas* Fall. ad *Ar. brunneoscentem* nob. n:o 66, pertinet.

148. *A. sepia*: antennis mediocrebus nigricans, subnitens, capite albicante; ore fronteque subprominentibus; thorace obscure cinereo, opaco; alis brevibus, leviter fuscatis, basi nigricantibus, squamis albidis, costa subciliata; *mas*: oculis subcohaerentibus, abdomine subcylindrico, ano inflexo, nigro, nitido, stylis 2 sussulso. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Anthonymia* Meig. Dipt. 5. 152. 121. ♂♀. & 7. 326.

9. *Chortophila* Macq. Buff. 2. 327. 15. ♂♀.

Hab. in Scandinavia meridionali rarius; in Scania ad Lund & Sandhammar prope Ystad exempla quædam 10 Jul.—14 Aug. inveni; e Dania ex Hafnia a D. Staeger specimina in utroque sexu sub nomine allato mihi benigne communicata. (In Germania ad Neuenkirchen a D. Dahlbom 15—20 Maj. 1842 parce lecta).

$\sigma\varphi$ . Similis *Ar. trapezinæ* n:o 124; sed magnitudine duplo minore, antennis proportione brevioribus & validioribus, seta subnuda, ano maris nigro, nec cinereo, &c., differt. Frons & os leviter prominula. Caput albidum, nigro-mieans. Oculi in ♂ fere cohærentes, per lineam angustissimam nigram tantum disjuncti, in ♀ modice remoti, nempe per orbitas cinereas & vittam frontalem mediocriter latam nigram sejuncti. Palpi subfiliformes, pilosi, nigri. Thorax obscure cinereus, subimmaculatus. Abdomen nigricans, postice saltem subnitens; in ♂ lineare, subcylindricum, segmentis margine apicali pilosis, singulo in medio certo situ macula magna, subquadrata, nigro-mieante; ano rotundato, tuberculo sat magno, inflexo, nigro, nitido, & segmento ventrali antepenultimo stylis s. laminis 2 verticalibus nigris pilosis appendiculato; in ♀ ovalum, cinereo-nigrum, subnitidum, postice setosum, apice acentum. Alæ breviuseulæ, hyalinæ, præsertim ad basin & costam atque juxta nervos infuscatae. Nervi: longitudinales, 3:ius (in summo apice alæ excurrentes) & 4:ius subparalleli; transversus ordinarius ante medium areæ insertus, perpendicularis, rectus. Costa subciliata; spinula mediocris. Squamae parvæ, albidae. Halteres flavi. Pedes nigri, setosi, tarsis simplicibus. Cum *Ar. lepturoides* (125), quæ alarum costa nuda gaudet, non commiscenda. (Cfr etiam *Ar. curvicauda* 234).

*Obs.* Cel. Dahlbom mecum communicavit individua quædam mascula, ad Gryphiam 12 Jun.—6 Jul. 1842 inventa, quæ a descripto hujus speciei mare tantummodo magnitudine paullo minore, abdome magis depresso, densius pubescente, nigro, parum nitido, ut & alarum costa parum ciliata, differunt. Forte specie propria, cui nomen *Ar. denigrata* proponerem. Talia vero intra Scandinaviam adhuc non observavi.

**149. *A. transversalis*:** antennis medioeribus nigricans, capite albicante; ore fronteque minus prominentibus; abdome obscure cinereo, serie macularum dorsaliuum nigrarum, incisuris albescentibus; alis fumato-hyalin-

nis, squamis albidis, costa subnuda; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine linearι, depresso, ano cinereo. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali, 4 Jul.—4 Aug., minus frequens; scilicet in Jemtlandia boreali ad radieem Åreskutan, Mullsjellen & Skalstugan, passim; in Norvegia ad Thynæs in paroecia Skogn, raro.

♂. Similis *Ar. trapezinæ* (124); sed magnitudine nonnihil minore, ore fronteque minus prominulis, oculis (♂) arctius cohærentibus, alarum costa nudiore, spinula nulla, nervis longit. 3 & 4 versus apicem paullo magis divergentibus, abdominis maculis dorsalibus nigris minoribus, ut & incisuris tenuiter cinereo-albescētibus, certe distincta. A priori, cui etiam similis, magnitudine majore, oculis (♂) magis cohærentibus, alarum costa subnuda, nervis long. 3 & 4 magis divergentibus, abdomine magis depresso, undique & densius pilosulo, postece non nitido, ano minore, cinereo, ut & appendicibus ventralibus vix ullis, differt. Antennæ mediocres l. sublongiusculæ, seta brevissime puberula. Palpi levissime clavati, nigri. Thoracis vittæ 3 nigrae in fundo obscuro vix perspicuae. Abdomen cinereum, & supra & subtus villosum (*nec setosum*), vitta dorsali sat distincta, latiuscula, fusca l. nigra, per segmentorum marginem apicalem tenuem albidum ad incisuras abrupta. Alæ leviter subfuscanae, nervo transverso ordinario ante medium areæ inserto, subobliquo, subrecto. Squamæ mediocres sordide albidae. Halteres flavi. Pedes ut in præcedente. (Cfr. *Ar. sulciventris* n:o 62).

150. *A. pictiventris*: antennis elongatis validis nigricans, capite argenteo-micante; ore fronteque prominentibus; abdomine glauco, vitta dorsali nigra; alis subhyalinis, squamis albis, costa nuda; *mas*: oculis subcohærentibus, abdomine linearι, depresso, ano parvo, nigro, nitido. ♂. (Long. saltem 2 lin.).

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; ad Lycksele in uno specimine capta, olim cum *Ar. florali* a me commixto.

♂. Similis priori, a qua tamen antennis majoribus, ore fronte que magis exsertis, oculis remotioribus, abdominis pictura, alarum nervis transversis magis approximatis, &c., facile distinguatur. Oculi appropinquantes, per orbitas angustas albas & vittam frontalem angustatam (antice sublatiorem) nigram tamen sejuncti. Antennæ sat longæ & latæ, nigræ, seta nuda, fere ad medium incrassata. Os margine antico longe reflexum. Palpi subfiliformes, elongati, nigri. Thorax & scutellum nigricantia, opaca, humeris leviter cinerascentibus. Abdomen subvillosum, glaucum, segmentorum singulo 1, 2, 3 in medio macula longitudinali oblongo-ovata, & ultimo fere toto, nigris; anus parvus, bituberculatus, inflexus, niger, nitidus; segmentum ventrale 3:ium lamellis 2 parvis, verticalibus, nigris, pilosis. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis: long. 3 & 4 subparallelis, transverso ordinario fere in medio 1. mox ante medium areæ insertus, subobliquus, rectus. Halteres flavi. Pedes pilosi, nigri, tarsis simplicibus.

**151. *A. flaviceps:*** antennis mediocribus nigricans, capite fulvescente; fronte sub prominente, ore haud reflexo; abdome cinereo, linea dorsali nigra; alis hyalinis, squamis albis, costa nuda; mas: oculis coherentibus, abdome sublineari, depresso, ano cinereo. ♂. (Long. saltem 2 lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad radieem alp. Mullfjellet d. 24 Jul. 1810 a Cel. D. Dahlbom detecta.

♂. Simillima *Ar. transversali* (149); an ejus varietas juvenilis? Differt vero capite & præserlim fronte supra antennas fulvis (excepto epistomate in medio cano), abdominis linea dorsali

nigra angustiore, ut & alis magis pure hyalinis. Reliqua ut in *transversali*.

152. *A. lineariventris*: antennis mediocribus obscure cinerea, capite albicante; fronte parum prominentia, ore non reflexo; abdomine glauco, vitta dorsali nigra; alis subhyalinis, squamis albis, costa basi subciliata, spinula mediocri; *mas*: oculis subcohærentibus, abdomine lineari, depresso, ano cinerascente. ♂ (♀). (Long. 1½—1⅔ lin.).

Hab. in Jemtlandia ad Skalstugan 20 Jul., rarius; in Lapponia Lulensi, ubi ad Quiekjock a D. Andersson in pluribus exemplis lecta; in Norvegia ad Suul & Kongsstuen in jugo alpino Værdaliae sitos 12—16 Jul. 1810 a me quoque semel capta.

♂. Affinis & similis *Ar. florali* (147); sed nonnihil minor, & corpore magis cinereo l. glauco, ore fronteque paullo minus prominentia, antennarum seta fere nuda seu breviter puberula, palpis forte nonnihil brevioribus, abdominis angusti incisuris non nigricantibus, ut & alarum costa magis ciliata, dignota. Thorax cinerens, vix rudimento linearum 4 fuscarum. Abdomen valde angustum. Anus subclavatus, niger, leviter griseomicans. Venter bistylatus. Alæ subfumato-hyalinæ, nervis ut in *florali* directis, at longitudinal. 3 & 4 forte nonnihil magis divergentibus (saltem non exactissime parallelis). Squamæ, halteres & pedes ut in *florali*.

♀ an hujus! Similis mari descripto, sed oculis modice remotis, per orbitas scilicet mediocriter latas albas & vittam frontalem modice latam atram sejunctis, thorace latius cinereo, abdomine oblongo-ovato, cinereo, linea dorsali fusca obsoleta, apice acuto, ut & alarum costa fere tota ciliata, dignota. Ad Quiekjock cum mare inventa. (Cfr. etiam *Ar. ciliatocosta* n:o 155).

153. *A. sepiella*: antennis mediocribus nigricans, capite albicante; ore fronteque parum prominentibus; ab-

domine obscure cinereo, linea dorsali fusca; alis subfuscato-hyalinis, squamis albis, costa nuda; *mas*: oculis cohaerentibus, abdome angustato, subcylindrico, ano parvo, nigricante. ♂. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Lapponia septentrionali Lulensi, 27 Jun.—12 Aug.; scilicet ad Quickjock a D. D. Boheman & Andersson 1843 lecta.

♂. Similis *Ar. sepiae* (148), sed oculis magis cohaerentibus, corpore tenuius & mollius piloso, nec setoso, alis longioribus, costa nuda, abdome toto opaco, linea dorsali angusta, obsolete, ut & ano (♂) minore, stylis vix ulla suffulto, vere diversa. Antennarum seta nuda, basi incrassata. Palpi breves, pilosi. Thorax ad latera obscure cinerascens. Abdomen angustum versus apicem adhuc sensim fere angustius. Alae leviter fumatae, margine interiori hyalino, ima basi nigricantes. Nervi ut in *Ar. sepiae* directi, sed longitudinales 3 & 4 versus apicem divergentes. Squamæ, halteres & pedes ut in *sepiae*, sed tibiæ parcissime pilosæ, nec spinulosæ.

154. *A. angustiventris*: antennis medioeribus grisea, capite cano; ore fronteque haud prominentibus; abdome linea dorsali obseura; alis cinereo-hyalinis, squamis albis, costa subnuda; *mas*: oculis cohaerentibus, abdome angusto, linearie, ano parvo, grisescente. ♂. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Gotlandiæ graminosis ad Rnthe, Westö, Nähr, insularum Furillen & Fårön, rarius, 15—28 Jul. 1841 inventa.

♂. Similis iterum *Ar. florali* (147); sed magnitudine paullo minore, ore fronteque vix prominulis, abdominis incisuris non infuscatis, alarum costa non ciliata, ut & oculis maris arctius cohaerentibus, dignota. Frons subdepressa, macula triangulari supra antennas parva, gilva l. nigra. Seta antennarum distincte pubescentia. Epistoma albicans. Palpi parvi. Thorax subtus

cinerens, supra griseo-brunneus. Scutellum brunneo-griseum. Abdomen valde angustum, depresso, pilosum, griseum, opacum, linea dorsali angusta, continua, nigricante. Anus inflexus, mediocris 1. parvus, cinereus. Venter non appendiculatus. Alæ elongatae, nervis ut in *florali* directis. Spinula costæ parva adest. Pedes nigri, spinulosi, tarsis simplicibus.

♀. Mari similis, tota grisea, oculis modice remotis, vitta frontali mediocri, nigra, postice cinerea, abdomine oblongo, apice acuto; in insula Färön Gotlandiae 24 Jul. capta; an hujus?

**155. *A. ciliatocosta:*** antennis mediocribus cinerea, capite cano, fronte subprominente, ore non reflexo; alis cinereo-hyalinis, squanis albis, costa ciliata, spinula medioeri, *femina:* macula supra antennas flava. ♀. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi ad Quickjöck 27 Jun.—12 Aug. 1813 a D. Audersson lecta.

♀. Parva, oblonga, griseo- 1. glauco-cinerea, subimmaculata. Frons modice lata. Oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem mediocriter latam, atram, antice breviter luteam sejuneti. Seta antennarum breviter pubescens, basi incrassata. Palpi breves, retracti, nigri. Abdomen oblongum, apice acuminatum. Alæ longinsculæ, leviter flavidocinereæ, nervis: longitud. 3 & 4 versus apicem levissime subdivergentibus fere parallelis, transverso ord. paullo ante medium areæ inserto, subperpendiculari, recto. Squamæ minutæ, albæ. Halteres pallide flavi. Pedes nigri. Tarsi simplices. — *Ar. lineariventris* 152 est forte mas hujus!

β. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

†). Squamæ sub alis in ♂ nigricantes.

**156. *A. spathulata:*** antennis breviusculis, nigra ♂, aut cinerea ♀, capite argenteo-micante; ore fron-

teque subprominentibus; alis squamisque nigricantibus (♂), aut albescientibus (♀); costa nuda; *mas*: oculis subcohærentibus, abdomine spathulato. ♂♀. (Long. circiter 2 lin.)

*Mas*: ater holosericeus; epistoma plumbeum, nitens; oculi per lineam frontalem angustatam atram antice albo-micantem disjuncti; abdomen spathuliforme, depresso, subvillosum, cineratum, segmentis: 1:mo fere toto, 2 & 3 in medio macula magna, trapezina totum segmentum fere occupante, certo situ conspicua, atris; anus minutus; Alæ fumatae, ima basi dilutiores; squamæ minutæ, nigrae; pedes pilosuli, intermedii: femoribus subtus, & tibiis versus apicem subincrassatis intus villoso l. ciliatis;

*Fem.*: tota cinerea, immaculata, opaca, parum pilosa; caput canum; frons in medio impressa; oculi modice remoti, per orbitas latiusculas albidas & vittam frontalem subangustatam nigram antice fuseam, l. albam disjuncti; abdomen ovalum, subnudum, subnitens; alæ cinereo-hyalinæ, basi pallescentes; squamæ parvae, albidae; pedes simplices, parum pilosi, tibiis parce spinulosis.

Hab. in foliis fruticum præsertim Alni, floribus Calthæ &c., in copula sæpe visa; per Sueciam borealem & Lapponiam, 21 Jun.—9 Aug., passim; seilicet in Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia ad Faxelfven & Åreelfven, in alpibus Åreskutan & Mullfjellen usque ad nivem perennem adscendens, ad Stalltjernstugan & Skalstugan, sat frequens; in Lapponia Luleensi ad Quickjock, D. D. *Wahlberg* & *Andersson*; in Dovre Norvegiae, D. *Bohemian*.

♂♀. Per abdominis formam & squamarum sub aliis colorem obscurum in ♂, & vittam frontalem nigram antice albam in ♀, ab aliis hujus Tribus facile dignota. Facies ante oculos non longe prominula. Seta antennarum subnuda l. tantum brevissime puberula, basi incrassata. Alarum nervus transv. ordinarius subrectus & subperpendicularis, sat longe ante medium areæ insertus. Halteres flavo-albi. Reliqua ut in diagnosi.

††). Squamæ sub alis in utroque sexu albæ.

*Decas 1:ma.* Alarum costa nuda.

**157.** *A. striolata*: antennis medioeribus cinerascens, capite albicante; ore fronteque subprominentibus; thoracis lineis subtibus abdominisque lauci unica dorsali subinterrupta, nigris; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, subrecto; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine linearis, incisuris nigris; *femina*: macula frontali flava. ♂♀. (Long. 2 lin.).

*Mas*: schistaceo-cinerens. Oculi arce cohærentes. Macula supra antenas nigra, interdum parva, flava. Thoracis vittæ subquinæ, quarum laterales obsoletæ. Abdomen lineare, modice latum, depresso, cinereum, linea dorsali (per incisuras quasi sub-interrupta), incisurisque plus minus angustis, nigris. Anus rotundatus, parvus, indexus, cinereus;

*Fem.*: cinerea l. grisea. Oculi mediocriter distantes, per vittam frontalem modice latam, nigram, postice griseam, antice flavam, & orbitas cinereas sejuneti. Thorax lineis 3 fuscis l. brunneis. Abdomen ovatum, cinereum, linea dorsali subinterrupta, nigricante; saepe obsoleta, in copula.

*Musca* Fall. Muscid. 71. 77. ♂. — *Anthomyza* Meig. Dipt. 5. 173. 156? ♂. & 7. 327. 46? — Zett. Ins. Lapp. 681. 103. ♂♀.

Hab. in paludosis, atque etiam in arenosis, per Scandinaviam, 20 Maj.—28 Aug., passim, in copula multoties deprehensa; e pupa cylindrica, nuda, rufa, egrediens semel visa; scilicet in Scania ad Lund, Silfakra, Esperöd &c., sat frequens; in Blekingia, D. v. Borek; in Ostrogothia raro; in Herjedalia ad Öfver-Hogdal; in Jemtlandia usque ad Åreskutan, Mullfjellet & Skalstugan, non

parce; in Lapponiis: Umiensi ad Lycksele, & Tornensi ad Kengis & Juckasjervi; in Norvorgia ad Alstahaug, Thynäs & Snul usque ad Evenäs & Lyngen Nordlaudiæ, frequens. (In Helgolandia a D. *Dahlbom* quoque capta; & e Glogavia a D. *Zeller* communicata).

$\delta\varphi$ . Antennæ subelongatae, nigrae, seta tenuiter pubescente. Frons & os parum prominentia. Palpi subfiliformes, nigri, pilosi. Alæ cinereo-hyalinæ, in  $\delta$  vix levissime subfuscatae. Costa nudiuscula, spinula parva. Nervus transversus ordinarius non longe ante medium areæ insertus. Squamae albidae, ciliatae. Halteres flavi. Pedes nigri, pilosi, tibiis spinulosis, tarsis simplicibus, unguibus pulvillisque in utroque sexu non magnis. — Fronte minus prominula, maris oculis arctius cohærentibus & feminæ macula frontali flava, ab *Ar. florali* (147) præcipue differt.

*Obs.* An nostra *Ar. striolata* identica sit cum Meigeni *Anthom. striolata* (5. 173. 56.  $\delta$ ), aut *Anth. fugace* (5. 174. 157.  $\delta\varphi$ ), pro certo dicere non possum, cum diagnoses & descriptiones harum duarum specierum Meigeniarum fere æquo jure in nostram quadrant.

**158. *A. candens*:** antennis mediocribus cana, capite albido; ore fronteque prominentibus; abdominis linea dorsali obscura; alis albido-hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, recto; *mas*: oculis cohærentibus, abdome linearis, sublavato, ano cinereo; *femina*: macula frontali flava.  $\delta\varphi$ . (Long. 1 $\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Hab.* in Scania ad Lund & in litore maris ad Ralunda, Esperöd & Skanör, Aug. Sept. rarius. (In Helgolandia uterque sexus a D. *Dahlbom* Jul. 1838 sat copiose lectus).

$\delta\varphi$ . Tota cana, setosa. Antennæ nigrae, seta pubescente, basi incrassata. Margo oris distincte reflexus. Palpi parvi, subfiliformes,

apice nigri, pilosi. Squamæ sub alis albae. Halteres pallidi. Abdominis linea dorsalis interdum obsoleta. *Mas:* oculi postice sat arete cohaerentes. Thorax immaculatus. Anus rotundatus, cinereus, apice inflexo nigricante. Pulvilli longiusculi, albi. *Femina:* oculi per orbitas cinereas latiusculas & vittam frontalem postice cinereum, in medio nigram, antice sat late flavam sejuneti. Thorax sape vestigio vittarum 3 dilute brunnearum. Abdomen ovatum, apice acutum. Pulvilli parvi. — Similis *Ar. cinereæ* n:o 61.

**159. *A. dissecta:*** antennis medioeribus obscure cinerea; ore fronteque subprominentibus; thoracis vittis tribus abdominisque unica dorsali interrupta, & incisuris, nigris; alis subfumatis (♂), nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; *mas:* oculis subcohaerentibus, abdome lineari, plano, ano nigro. ♂. (Long. fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 176. 160. ♂. (& **7. 327. 79** inter pedibus totis flavis gaudentes relata). *Chortophila* Macq. Buff. 2. 324. 2. ♂.

Hab. in Dania; sub nomine: *Anthom. dissecta* Meig. a D. Staeger communicata.

♂. Obscure cinerea, opaca, setosa. Caput obscure argenteum. Oculi non arete cohaerentes. Vitta frontalis nigricans, antice latior. Antennæ nigrae, seta breviter puberula. Frons modice prominula. Os leviter reflexum. Palpi subfiliformes, nigri, pilosi. Thorax dorso vittis 3 nigricantibus. Numeri cinerei, sed vix albidi. Abdomen pilosum. Anus parvus, rotundatus, subinfexus, niger, nitidus, appendicibus 2 parvis, nigris, pilosis suffultus. Alæ leviter fuscanae. Nervus transv. ord. ante medium areæ insertus. Squamæ sordide albidae. Halteres flavi, basi obscuriores. Pedes nigri, spinulosi. Pulvilli minusculi, albi.

**160. *A. platura:*** antennis medioeribus cinerascens, capite albido; ore fronteque leviter prominentibus; tho-

racis vittis 3 abdominisque unica dorsali, nigris; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, subrecto; seta antennarum nuda; *mas*: oculis cohaerentibus, abdomine sublineari, plano, ano cinereo; *femina*: macula frontali flava. ♂♀. (Loug. 1½ fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 171. 152. ♂♀. & 7. 327. 42. Macq. Buff. 2. 343. 41. ♂♀.

Hab. in Scandinaviæ fruticibus & floribus, Jun.—Aug., vulgaris, in copula deprehensa; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd &c. copiose, verno tempore sole sereno lapidibus insidens saepe capta; in Svecia media rarius; in Gotlandia ad Slitö (19 Jul. 1811 uterque sexus frequens); in Jemtlandia ad radicem Mullsjellen & usque ad Skalstugan, frequens; in Dalecarlia, D. *Bohemian*; in Lapponia Umensi in ripa lacus Wojnsjön parvae; in Lapp. Lulensi ad Quickjock, D. *Andersson*; in jugo alpino Norvegiæ ad Kålahög rar. (In Helgolandia; atque ad Moabite. D. *Dahlbom*).

♂♀. Ore fronteque parum prominentibus, antennarum seta subnuda, alarum costa nuda spinulaque nulla, nervo transv. ord. perpendiculari &c., species ab affinibus dignoscitur. Antennæ, palpi subfiliformes & pedes, nigra. Thoracis vitta 3 in ♀ parum perspicuae. *Mas*: abdominis pubescentis linea dorsalis nigra distincta; incisuræ tenuiter brunneæ. Anus parvus, leviter inflexus. Alæ levissime fuscanae. Squamæ sordide albidae. Halteres flavi. Pulvilli parvi, albi. *Femina*: oculi remoti, vitta frontali antice plus minus late flava. Abdomen conicum. Alæ hyalinæ. Squamæ halteresque albida. Pulvilli minuti.

161. *A. intersecta*: antennis breviusculis nigricans, capite cinerascente; ore fronteque parum prominentibus; thoracis vittis 3 abdominisque unica dorsali, atris; alis

hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo; pedibus piceis; seta antennarum nuda; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine sublineari, plano, ano nigro, nitido ♂. (Long. fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 175. 159? ♂. & 7. 327. 18?

Hab. in Suecia rarissime; 2 tantum individua vidi, unum in Suecia inferiori, alterum in silva Sangits Bottniae borealis, captum.

♂. Antennæ breves, validiusculæ, nigræ, apice brevissime puberulae, seta non ad medium incrassata. Oculi postice arcte cohærentes. Palpi ut in priori. Thorax setosus, vittis atris sat latis. Abdomen lineare (non tamen angustum), depresso, pilosum, nigricans, vitta dorsali atra. Anus parvus. Alæ hyalinæ, costa nuda & spinula nulla. Nervus transv. ord. ante medium areæ insertus, subobliquus, non exactissime rectus. Squamæ albæ. Halteres pallidi. Pulvilli parvi, albi.

*Obs.* Præter magnitudinem paullo minorem ("1½ lin."), & alas cinereas ("Flügel graulich"), nec hyalinas, species Meigeniana nostræ simillima videtur.

162. *A. muscaria*: antennis brevibus nigricans pilosa, capite obscure cinereo (♂), aut cinereo (♀); ore fronteque distincte prominentibus; thoracis vittis subtribus abdominalisque unica dorsali incisurisque, atris; alis hyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari; seta antennarum nuda; *mas*: undique pilosus, oculis cohærentibus, abdomine linearis, angusto, plano, ano, nigricante. ♂♀. (Long. fere 2 lin.).

*Stomoxys* Fabr. Antl. 282. 11? *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 170. 150? ♂♀. & 7. 327. 10? Macq. Buff. 2. 342. 40? ♂♀.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in petris ad Lund Scaniæ mense Majo in copula semel capta; specimen unicum etiam e Dania a D. Staeger sub synonymia allata ante plures annos missum.

♂. Pilositas totius corporis, brevitudo antennarum, prominentia frontis & epistomatis apicis, ut & abdominis (♂) angustitas, speciem denotant. Tota nigro-cinerascens. Oculi magni postice arce coherentes. Frons antice triangularis. Antennarum nigrarum articulus ultimus brevis, rotundatus, seta basi incrassata. Epistoma breve, in medio retusum, lateribus certo situ obscure argenteo-micans. Palpi elongati, subelavati, nigri, pilosi. Proboscis exserta, capitulo brevi. Thoracis vitta subquinæ altræ in fundo nigro-cinereo minus perspicua. Abdomen angustum, depresso, cinereum, linea dorsali & incisuris tenuiter, nigris. Anus parvus, niger, nitidus, cinereo-micans, stylis 2 ventralibus parvis, conicis, nigris, pilosis suffultus. Alæ ut in priori, at nervus transv. ord. fere perpendicularis. Squamæ, halteres & pedes ut in præcedente. — Individuum masculum sub nomine: "Auth. tempestiva n. sp." quoque e Dania obtinui. — Affinis *Ar. brevicorni* (146).

♀. Magis cinerea minus pilosa, capite albido, vitta frontali mediocre nigra, postice cinereo-maculata, sed macula antica flava nulla; oculis parvis, subrotundis; corpore obscure cinereo; abdome ovato, subconvexo, linea dorsali nigra.

*Obs.* Auctoritate D. Meigeni synonymon *Fabricii* allegavi; quod tamen dubium videtur, dum species "antennis plumatis" a *Fabricio* describitur. — Sub nomine *Auth. brevicornis* in collectione mea olim designata.

**163. *A. vetula*:** antennis brevibus validis cinerea, capite albicante; ore fronteque prominentibus; thoracis lineis subtribus abdominalisque unica dorsali, fuscis, obsoletis; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, recto; seta antennarum nuda. ♀. (Long. 2 lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 93. ♀.

Hab. in Suecia boreali rarissime; 2 tantum exempla inveni, unum nempe in fenestra ad villam Johannis Ro Bottniae borealis d. 12 Maj 1821, & alterum in stereore ad Wittangi Lapponiae Tornensis d. 10 Jun. ejusdem anni.

♀. Similis priori; sed paullo major, robustior, vitta frontali nigra latiore, corpore griseo l. dilutius cinereo, pictura nigra obsoletiori, abdomine ovato, alis subcinereis &c., differt. Cinerea opaca. Frons exserta, antennae, epistoma & palpi omnino ut in priori. Oculi parvi, rotundati, longe remoti, vitta frontali latissima nigra cinereo-micante, albido-marginata. Proboscis parum exserta. Thoracis linea subquinæ, fuscæ, laterales præsertim valde obsoleta. Abdomen ovatum, pilosulum, apice acutum, linea dorsali obscura, in segmentis 3 & 4 evanescente. Alæ imæ basi albescentes. Squamæ albæ. Halteres fusco-albidi. Pedes nigri.

164. *A. Naso*: antennis mediocribus nigricans pilosa, capite obscure cinereo; ore fronteque longe prominentibus; thoracis vittis subtribus atris; alis subhyalinis, basi nigris, nervo transverso ordinario subobliquo, recto; seta antennarum nuda; mas: oculis cohærentibus, abdome elliptico, plano, ano hamo inflexo. ♂. (Long. 2— $2\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionaliori rarissime; in ligno recenter secato ad divisorium Dörarp Smolandiae 3 specimina d. 1 April. 1832 inveni.

♂. Corpore nigricante undique sat dense piloso, fronte distinetè porrecta, nigro-micante, alis basi (vix ad dimidium segmenti costalis 1:mj) nigris, abdomine oblongo-ovali, depresso ut & tuberculo anali inflexo hamo conico distincto incurvo nigro terminato, a reliquis facile distinguitur. Oculi magni, sat arete cohærentes. Antennæ validæ, nigrae, seta basi crassa.

Epistoma breve, in medio retusum & cinereum. Palpi mediocres, nigri, pilosi. Thoracis vittæ atræ in fundo nigricante haud perspicuae. Metathorax glaucus. Abdomen cinerascenti nigricans, pictura lineæ dorsalis incisurarumque atra in fundo obscuro parum manifesta. Alæ levissime fuscane, segmento costali 1:mo subdilatato. Squamæ mediocres, albæ, ciliatæ, valvulis subæqualibus. Halterum clava obscura. Pedes simplices nigri. — Forte ad novum genus referenda. At ♀ mihi ignota.

**165. *A. fusciceps*:** antennis longiusculis grisea, capite fuso-rufescente; ore fronteque subprominentibus; thoracis vittis 3 obsoletis abdominalisque unica dorsali, nigris; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, subrecto; seta antennarum subtiliter puberula; mas: oculis coherentibus, abdome oblongo, depresso, ano parvo, cinereo, tibiis posticis intus ciliatis. ♂. (Long. fere 2 lin.).

Hab. in Dania; ex Hafnia sub nomine: *Anth. ruficeps* Meig.\* specimen descriptum a D. Staeger 21 Oct. 1812 missum obtinui.

♂. Grisea, mediocriter pilosa, opaca. Caput rufescens (an in juniore!), epistomate in medio cinereo. Oculi sat magni, postece arte coherentes. Frons parum prominula. Antennæ elongatae, subangustatae, nigræ, seta brevissime puberula, basi inerasata. Os parum reflexum. Palpi mediocres, nigri. Proboscis exserta. Thoracis lineæ 3 fuscae, quarum laterales rudimentariæ, media distinctior. Abdomen anguste ellipticum, plenum, griseum, vitta media atra e maculis 4 subtriangularibus conflata. Appendices ventrales nullæ. Squamæ sub alis & halteres albida. Pedes nigricantes. Tibiae posticæ intus pubescentes, erecta ciliatæ. Pulvilli parvi, albidi.

*Obs.* Vix *Anth. ruficeps* Meig. quæ "thoracem nigricantem, abdominalis incisuras & 1:um segmentum totum atra" habebit; hæ vero notæ in nostram speciem non quadrant. — Individuum

masculum 24 Apr. ad Lund captum, nuperrime e nymphā egressum, subsimile nostrae *A. fuscicipiti*, sed thorace obscuriori, nervo transv. ord. multo magis obliquo, tibiis posticis intus nudiusculis, dignotum; an *Anth. ruficeps* Meig. genuina??

166. *A. obscura*: antennis longiusculis nigra opaca, capite cinereo; ore fronteque leviter prominentibus; thorace antice vittis inchoantibus griseis; abdomine cinerascente, vitta dorsali ineisurisque nigris; alis brunneoscentibus, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; squamis flavidis; seta antennarum breviter puberula: mas: oculis cohaerentibus, abdomine linearī, plano, ano parvo nigrieante. ♂. (Long. 2 lin.).

Macq. Buff. 2. 336. 15. ♂.

Hab. in Scandinavia rarius; in Lapponia Lulensi ad Quickjoeck mense Jul. 1813 a D. Andersson lecta; ex Hafnia sub nomine allato a D. Staeger 1812 missa.

♂. Corpus obscurum, antennæ longiusculæ, alæ fumatae & squamæ flavescentes speciem præsertim denotant. Oculi sat magni, postice cohaerentes. Frons parum prominula, nigro-micans, vitta supra antennas triangulum formante in specimine Quickjockensi nigrum, in Hafniensi fulvum. Antennæ nigrae, seta basi incrassata. Palpi mediocres, nigri. Proboscis exserta. Thorax niger, summo antico maculis 4 indeterminatis cinereis initium vittarum todidem indicantibus. Pleurae cinereæ. Scutellum atrum. Abdomen modice latum, lineare, depresso, mediocriter pilosum, griseo-cinereum, linea dorsali & segmentis certo luminis situ fascia basali, fusco-nigris. Anus parvus, niger, cinereo-micans. Alæ ima basi, squamæ & halteres, flavæ. Pedes nigri, spinulosi, tibiis posticis intus subnudis. Pulvilli parvi. Alarum nervus transv. ordin. fere in medio 1. mox ante medium areæ insertus; hinc haec species *Anthom. brunneipennis* Macq. Buff. 2. 337. 18. valde quoque affinis videtur.

**167.** *A. trapezoides*: antennis mediocribus obscure cinerea, capite argenteo-nicante; ore fronteque modice prominentibus; thoracis lineolis 3 abdominisque maculis trapezinis nigricantibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; seta antennarum subnuda; *mas*: oculis subappropinquantibus, ab domine linearis, plano, ano parvo, nigro, nitido. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scandinavia rarissime; duo tantum specimina inveni, unum in prato ad Östergarn Gotlandiae 16 Jul. 1811, & alterum ad Thynäs in paroecia Skogn Norwegiae 4 Jul. 1810 lectum.

♂. Similis *Ar. trapezinæ* (124), sed nervis long. 3 & 4 parallelis ab illa præcipue distincta. A prioribus hujus subdivisionis: oculis mediocribus, oblongis, non coherentibus, sed per vittam frontalem nigram & orbitas tenues albas sejunctis, facile dignoscitur. Antennæ validiusculæ, nigrae, seta subnuda seu temiter puberula, basi inerassata. Thoracis lineæ 3 fuscæ, obsoletæ. Abdomen modice latum, mediocriter pilosum, cinereum, segmento singulo basi macula magna trapezina fusca certo si in conspicua, sed alio situ tantum lineolam formante. Alæ levissime fuscane, costa brevissime subciliata, spinula minuta. Squamae albæ. Halteres flavi. Pedes nigri. Tibiae spinulosæ, posticæ intus nude. Pulvilli parvi. — In specimine Gotlandico nervus transversus ordinarius in medio nervulo appendiceo præditus.

**168.** *A. lucidiventris*: antennis longiusculis validis obscurea, capite argenteo-nicante, ore fronteque paullo prominentibus; thoracis vitta laterali cinerea; ab domine ovato, aeneo-nigro, nitido; alis hyalinis, nervo transverso ordinario in medio areæ inserto, perpendiculari, recto; seta antennarum subnuda. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi, ubi ad Quickjock mense Jul. 1843 a D. Andersson lecta.

♀. Per antennas sat validas, subcuneiformes, oblique porrectas, nec incubentes, thoracis discum dorsalem obscurum, subnigentem, vittam lateralem a capite ad alas indeterminatam cinereum, abdomen aeneo-micans, valde nitidum, ut & alarum nervum transv. ord. fere in medio areae insertum, a ceteris mox dignoscitur. Oculi per vittam latam atram & orbitas mediores, cinerascentes, sejuncti. Antennae atræ, seta fere nuda, basi incrassata. Os parum prominens. Palpi elongati, subelativati, atri, parce pilosi. Proboscis exserta. Pleuræ cinereæ. Abdomen ovatum, basi apiceque paullo angustius, supra subconvexum, parce pilosum l. fere nudum. Alæ vix fuscaneæ, nervo costali atro, brevissime subciliato; spinula adest. Squamae albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, subnitidi.

*Not.* Observante nuper Professore Wahlberg est *Ar. barbiventris* n:o 204 ♂, & *Ar. lucidiventris* ♀, ejusdem speciei.

169. *A. florilega*: antennis mediocribus cinerea, capite albicante; ore fronteque subprominentibus; thoracis lineis 3 obsoletis abdominisque unica distinctiori, fuscis; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, reecto; seta antennarum subnuda; mas: oculis cohærentibus, abdome linearis, angusto, depresso, ano parvo, cinereo. ♂. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in floribus Umbellatarum, foliis fruticum, graminosis &c., per Scandinaviam mense Julio, passim; scilicet in Sænia ad Esperöd, Tranås &c.; in Ostrogothia ad Lärketorp raro; in Gotlandia ad Gothem &c., parce; in Lapponia Umensi ad Lycksele semel; in Norvegia ad Thynæs, rar. (In Umbellatis ad Reinberg prope Gryphiswaldiam jam 30 Maj. 1842 a D. Dahlbom lecta).

♂. Parva. Similis *Ar. florali* (147); sed magnitudine duplo minore, fronte minus prominula, antennis pallidioribus, seta nudiore, thoracis lineis brunneis obsoletioribus interdum vix conspicuis, oculis maris arctius coherentibus, abdomine magis depresso &c., mox dignota. Abdomen valde angustum, lineare, planum, cinereum, linea dorsali subcontinua, nigro-brunnea. Alarum costa nuda. Squamæ albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, pilosuli. Pulvilli non magni. — Variat: macula supra antennas aut plerumque nigra, aut flavida, thorace sub-immaculato, aut saepius lineis 3 brunneis obsoletis, abdominis incisuris immaculatis, aut raro tenuissime brunneis, ut & alis subhyalinis, aut flaveline leviter subtinetis.

*Obs.* Specimina quædam hujus speciei, cujus ♀ adhuc mihi non rite cognita, in collectione mea ut "varietates γ. & δ. *Muscæ floratis*" dígito Celeberrimi Falleni designata conservantur. — Individua feminea similia mari descripto, sed tota griseo-cinerea, abdomine ovato, acuto, vitta frontalí modice lata atra, marginibus & postice cinerea, puncto supra antennas albo, in Scania ad Skarhult 14 Jul. 1843 capta, an hujus?

**170. *A. strigilata*:** antennis medioeribus glauco-cinerea, capite albicante; ore fronteque parum prominentibus; thoracis lineolis 3 late brunneis; abdominis maculis strigiformibus triplici serie dispositis fuscis, lateralibus obsoletissimis; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, subrecto; seta antennarum nuda; *femina*: vitta frontalí lata, atra. ♀. (Long. sere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 681. 101. ♀.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; in individuo unico ad Lyksele capta.

♀. Ovata, cana, opaca, parum pilosa. Oculi modice remoti. Frons vix prominula. Antennæ nigrae, seta basi leviter incrassata. Palpi nigri. Abdomen ovatum, obscure cinereum, vitta

media nigra e maculis oblongis conflata. Alæ cinereo-hyalinæ, nervo transv. ord. nonnihil obliquo & levissime subflexo. Costa nuda. Squamæ parvæ, albæ. Halteres albidi. Pedes nigri.

**171.** *A. rotundiventris*: antennis mediocribus nigra, capite obscure cinerea; ore fronteque haud prominentibus; abdominis rotundati incisuris tenuissime cinereis; alis subhyalinis, nervis transversis perpendicularibus, rectis, subapproximatis; *mas*: oculis cohærentibus, ano non inflexo. ♂. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Norwegia media rarissime; ad diversorium Thynæs prope urbem Levanger in paroecia Skogn d. 3 Jul. 1840 in uno specimine lecta.

♂. Per corpus atrum, opacum, frontem convexam non prominulam. abdomen rotundato-ovatum, minus depresso, ut & alarum nervos transversos exakte perpendicularares, rectos & subappropinquantes, h. e. nervum transv. ordinari. sat longe ante medium areæ insertum, a reliquis primo intuitu abunde dignota. Oculi magni. Metathorax glauens. Abdomen atrum, certo situ incisuris & linea dorsali omnium tenuissime cinereis, unde eodem luminis situ maculae 8 maximæ, quadratae oriuntur. Alæ levissime fumatae. Costa nuda. Squamæ subbrunnescentes l. sordide albidae, vix ciliatae. Halteres pallidi. Pedes nigri, pilosuli, sed parum spinulosi. Pulyilli non magni, albi.

*Obs.* Squamæ sub aliis mediocriter magnæ, elevatae, divergentes; valvulae tamen æquales videntur, ita ut in insecto vivo superior inferiorem tegere possit.

**172.** *A. albinervis*: antennis mediocribus cinerea, capite cano; ore fronteque minime prominentibus; abdome obscuro, nitente; alis cinereis, nervis basi albis, transverso ordinario perpendiculari, recto; seta antennarum subnuda; *femina*: oculis, sat magnis mediocriter re-

motis, vitta frontali modice lata, atra. ♀. (Long. fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia rarius; in Scania ad Esperöd & Sandhammar d. 10—11 Aug. 1838 in duobus exemplis deprehensa; in prato ad Östergarn Gotlandiae 16 Jul. 1841 etiam semel capta; tandem ad Quickjock Lapponiae Lulensis a D. Andersson mense Julio 1843 lecta.

♀. Colore corporis glanco-cinereo, fronte non convexa, abdomine nitente, ut & alarum nervis praesertim basi albis, præcipue distinguitur. Frons mediocriter lata, vitta modice lata nigra. Ovata. Antennæ incumbentes, sublongiusculæ, nigræ, seta subtiliter puberula, basi tenuiter incrassata. Oculi majusculi. Palpi nigri. Thorax convexus, immaculatus. Abdomen oblongum, subconvexum, parum pilosum, nigricans, nitidum, leviter cinereo-micans, apice acutum. Nervi transversi mediocriter remoti, h. e. ordinarius paullo ante medium areæ insertus. Costa nuda. Squamae parvæ, albæ. Halteres albidi. Pedes validiusculi, spinulosi, nigricantes, fractura geniculorum puncto albo.

**173. *A. pluvialis*:** antennis longiusculis cæna, capite argenteo-micante; ore fronteque parum prominentibus; thoracis punetis 5, abdominis segmentorum baseos 3, scutellique 2 lateralibus, atris; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, recto; seta antennarum subnuda; mas: oculis coherentibus, ano atro, nitido, ventre appendiculato. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere  $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Linn. Fu. 1841. Degeer Ius. 6. 27. 6. Fabr. Antl. 301. 98. Fall. Muscid. 68. 71. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 163. 141. ♂♀. & 7. 327. 30. Macq. Buff. 2. 340. 30. ♂♀. T. 17. f. 13 (non bona). Zett. Ius. Lapp. 680. 85. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum, truncis arborum, parietibus,

fenestris &c., per totam Scandinaviam a mense Majo usque ad Septemb., vulgatissima; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, Gottlandia (ad Öja, Hoburg, Malms &c.), Nericia, Upplandia (ad Holmiam), Dalecarlia (ad Uppbo), mihi frequenter obvia; deinde passim occurrit ut ex. gr. in Jenitlandia; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele & Tornensi ad Kengis & Wittangi; in Norwegia ad Thynæs & Dovre; in Dania frequens. (In Germania ad Neuenkirchen, atque ad Rixdorff, Johannis Thal & Rudower prope Berolinum, in multis speciminibus a D. *Dahlbom* lecta mihiique communicata. E Glogavia a D. *Zeller* quoque missa).

♂♀. Per colorem corporis late cinereum & picturam punctatam atram mox dignota. Antennæ nigrae, seta basi tenuiter incrassata. Os leviter reflexum. Abdomen trifarium atro-punctatum; hinc novem numerantur maculae atrae præter segmentum I: non fere totum nigrum. Alæ basi albantes. Costa nuda. Squamae mediocres, ciliatae, niveæ. Halteres albidi. Pedes nigri, setulosi. *Mas*: pilosus; oculi sat arce cohærentes. Scutellum atrum, puncto apicis ant linea media canis. Abdomen angustatum, maculis nigris saepè coherentibus, ano sat magno, atro, nitidissimo. Venter versus apicem stylis 1. appendicibus 2 nigris munitus. Pulvilli mediocres. *Femina*: subnuda. Oculi mediocriter remoti. Vitta frontalis modice lata, atra, macula stemmatum cinerea. Maculae atrae corporis distinctiores. Scutellum canum, punctis lateralibus atris. Abdomen ovatum, apice acutum, ventre inermi. Pulvilli minuti. — In individuis majoribus nervi long. 3 & 4 non exactissime paralleli, sed versus apicem levissime divergentes. — Abdomen detritum in ♀ nigrum subnitidum.

174. *A. praticola*: antennis longinclusis cana; capite argenteo-micante; ore fronteque parum prominentibus; thoracis lineola in ♂, abdominisque punctis triplici

serie dispositis in utroque sexu, atris; alis albo-hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, recto; seta antennarum nuda; *mas*: oculis cohaerentibus, ventre appendicibus 2 munito. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyia pratincola* Panz. Fn. Germ. 108. 12. *A. pratinicola* Meig. Dipt. 5. 162. 140. ♂. & 7. 327. 29. t. 74. f. 24. ♂. Macq. Buff. 2. 341. 31. ♂♀.

Hab. in Dania Sept., teste D. Staeger; mihi in Scandinavia non obvia; sed plura specimina utriusque sexus e Silesia a D. Zeller obtinui. In museo D. Ljungh par quod in copula junctum captum asservatur forte ab exteris missum.

♂♀. Similis priori, sed magnitudine minore, thorace maris macula nigra tantum unica, & feminæ immaculata, præcipue dignota. *Mas*: oculis postice cohaerentibus, lineola tenuissima albida tantum sejunctis. Macula frontis albae triangularis supra antenas, cana. Thorax glauco-cinereus, postice macula oblonga atra. Scutellum atrum. Abdomen ellipticum, canum, segmento 1:mo basi lineolaque postica, atris, reliquis trifariam nigro-punctatis. *Femina*: frons vitta ferruginea. Thorax & scutellum cinerea, immaculata. Puncta abdominis parva. — Cfr *Ar. albicincta* no 216.

*Obs.* Nomina: *pratincola* & *pratinicola* per lapsum calamiorata.

175. *A. stygia*: antennis longiusculis nigra nitida, epistomate albicante; ore fronteque non prominentibus, haec in ♀ nigra nitida, vitta angustissima, cana; alis flavis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1^2$  lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 155. 127. ♀. & 7. 326. 7. *Ophyra* Macq. Buff. 2. 309. 5. ♀. *Anthomyza glabricula* var. b. ♀. Zett. Ins. Lapp. 687. 117.

Hab. in Suecia boreali rarissime; tantum 4 individua inveni, unum in Jemtlandia boreali ad diversorium Skalstugan 16 Jul. 1810, alterum in Lapponia Uunensi ad Wilhelmina 20 Jul. 1832, 3:tiū in Stöttingsfjellet ejusdem Lapponiae 1 Aug. 1832, & tandem 4:tum ad Giebostād in inferalpinis Nordlandiae Norvegiae 22 Jul. 1821, capta; in Pinetis ad Lackalänga prope Lund Scaniae exemplar unicum die 16 Jul. 1830 quoque deprehendit D. *Dahlbom*.

♀. Per frontem non prominulam, parce pilosam, nigram nitidam vitta media tenui albida, corpus nigrum nitidum, & alas flavas, a reliquis dignoscitur. Similis *Ar. leucostomæ* (46) & *fuscinervi* (48), sed a priori corpore nigro, nec cærulescenti atro, puncto supra antennas albo nullo, squamis sub alis minoribus, alis magis flavidis, &c., a posteriori fronte nitida vitta media angustissima cinerea (nec fronte opaca vitta lata atra), & ab ultraque magnitudine minore, halteribus pallide flavis &c., distincta. Ab *Anthomyia carbonaria* Meig. Dipt. 5. 154. 124. ♀, cui quoque valde similis videtur, vix nisi vitta frontali albida (nec atra h. e. "mit tiefschwarzer glanzloser Stirnstrieme"). Oculi mediocres, modice remoti. Frons subconvexa, polita. Antennæ validæ, nigricantes, seta subnuda, basi graciliter & indeterminate incrassata. Epistoma breve, in medio cinereum, ad oculos album. Palpi nigri, sublavati. Thorax convexus, omnium levissime cinereo-subpollinosus. Abdomen oblongo-ovatum, parum pilosum. Alarum costa brevissime subciliata; spinula nulla. Nervus transv. ord. paullo ante medium areæ insertus. Squamae parvæ, albae, valvulis subæqualibus h. e. superiore inferiore fere omnino tegentem. Halteres flavi. Pedes nigri, parce setulosi.

**176. *A. subpellucens*:** antennis longiusculis nigricans (♂), aut cinerea (♀), opaca, capite albicante; ore fronteque minime prominentibus; abdome fasciis tribus

interruptis flavis; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario subobliquo, recto; seta antennarum subnuda; *mas:* oculis subcohaerentibus, pedum intermediorum femoribus subtus fasciculo pilorum & tibiis intus tuberculatis. ♂♀. (Long. ♂ 2, ♀ 1½ lin.).

*Anth. canicularis* v. b. Zett. Ins. Lapp. 681. 86. ♀

Hab. in Scandinavia boreali, 16 Jun. – 8 Aug., passim, in copula; scilicet in Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*; in Jemtlandia boreali ad Undersåker, Forsa & Mullsjellet, haud raro; in Norwegia ad Næs, Garnæs & Kong Carl Johans Klev (in jugo alpino situm), frequens, D. *Dahlbom* & ipse; in Nordlandia ad Hamnvigen, raro; in alpe Dovre, D. *Bohemian*.

♂♀. Affinis & similis *Ar. caniculari* (infra n:o 188), sed armatura pedum intermediorum in ♂, & squamis sub alis minoribus, valvula superiore inferiorem tegente in utroque sexu, vere dignota; ab *Anthom. ornata* Meig. Dipt. 5. 191. 188, eni pictura abdominis quoque similis videtur, pedibus totis nigris, nec femoribus flavis, differt. Pilosa. Antennæ nigrae, seta subtiliter pubescente. Alæ leviter fuscanae, basi pallidiores, nervo transv. ord. fere perpendiculari, mox ante medium areæ inserto. Costa subtiliter subciliata. Squamae ciliatae, sordide albidae. Halteres pallide flavi. Pedes nigri, setulosi. Pulyilli parvi. *Mas:* oculi magni, non arte cohærentes, per vittam frontalem angustissimam atram & orbitas tenuissimas albas, leviter (& angustius quam in *caniculari*) sejuncti. Antennæ elongatae (& paullo longiores quam in ♀). Thorax niger, vittis obscurioribus parum distinguendis. Abdomen spathulatum, subdepressum, subnitens, nigrum, segmentis 3 mediis maculis laterilibus 6, quarum 2 posticis minoribus. Anus non inflexus. Nervus transv. ord. subobliquus. Pedes intermedii: femoribus subtus ciliatis, versus apicem tuberculo parvo, fasciculo pilorum vestito; tibiis validis, intus ciliatis, basi subcoaretatis, nu-

dis. *Femina*: oculi medioeriter distantes, per vittam frontalem modice latam, nigram l. fuscam, & orbitas modice angustas, cinereas remoti. Thorax cinereus, immaculatus. Abdomen oblongo-ovatum, cinereum, subnitens, fasciis 1 vel 2 (raro 3) flavis, subintegris, antica latiore. Nervus transv. ordinarius subperpendicularis. Pedes simplices.

**177. *A. armata*:** antennis longiusculis nigra, capite albiente; ore fronteque minime prominentibus; abdome cinereo, serie dorsali macularum trigonarum migrorum; alis subhyalinis, nervis transversis subapproximatis, horum ordinario perpendiculari, subrecto; seta antennarum subuuda; *mas*: oculis magnis, coherentibus, pedum intermediorum femoribus subtus, tibiisque basi coaretatis intus, ciliatis. ♂. (Long. fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 139. 99. & 7. 326. 20.  
♂. Macq. Buff. 2. 331. 3. ♂.

Hab. in Dania, a D. Staeger communicata; mibi etiam in reliqua Scandinavia mense Julio passim obvia; in copula saepe capta; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c. non raro; in Ostrog. ad Lärketorp rar.; in pratis Gotlandiae ad Östergarn &c.; in Norwegia ad Thynæs semel. (Sub nomine *Homalomyia macrophtalma* Bouchè e Silesia a D. Zeller ♂ missus). ♂♂ in umbra arborum choreas dueunt, dum ♀♀ homines infestant.

♂. Similis *Ar. matutinatae* (190) & *scalaris* (189). Caput argenteomicans. Oculi magni, brunnei, aeneo-submicanentes, supra sat arete & longe coherentes, linea angustissima nigra albo-marginata vix sejuncta. Antennæ nigrae. leviter cinereo-micanentes. Epistoma breve, infra oculos minime descendens. Thorax niger. Abdomen oblongo-ovatum, subdepressum, cinereum, singulo segmentorum 1, 2 & 3 macula dorsali media trigona

nigra. Anus minutus, niger, nitidus. Alæ leviter fuscatae, basi nervis albidis; costa nuda. Squamae albidae, valvula superiore inferiorem haud tegente. Halteres flavi. Pedes nigri, nitentes; intermedii: femoribus subtus breviter pilosis seu hispidis, tibiis a basi fere ad medium coaretatis, deinde a medio ad apicem subincassatis, intus breviter ciliatis. Tibiae posticae intus pilis sat longis, tenuibus vestitae.

♀. Similis mari, sed tota nigricans, subnitida, vitta frontali lata, atra, abdomine ovato, pedibus simplicibus.

**178. *A. sociella:*** antennis longiusculis nigra ♂, aut cinerascens ♀; capite argenteo; ore fronteque minime prominentibus; abdomine cinereo, vitta dorsali sub-interrupta nigra; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; seta antennarum nuda; mas: oculis cohærentibus, abdomine depresso, piloso, femoribus intermediis subtus hispidis. ♂♀. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Stæger in litt. 21 Oct. 1812. ♂♀.

Hab. in Dania, Cel. D. Stæger, qui individuum masculum sub nomine allato mihi ad describendum benignè communicavit.

♂. Similis priori, a qua tamen magnitudine nonnihil minore, oculis vix tam arce cohærentibus, thorace minus nigro, seu leviter cinereo-micante, abdominis maculis dorsalibus nigris angustioribus seu parum trigonis, alis basi haud albescentibus, nervis transversis modice distantibus, tibiis intermediis subsimplicibus, ut & tibiis posticis intus nudis, vere dignoscitur. Femora intermedia subtus hispidula, & spinis longioribus armata, prope apicem subito coaretata. Reliqua ut in priori.

♀. "abdomine cinerascenti micante", Staeg. l. c., a me non visa.

*Decas 2:da.* Alarum costa ciliata.

†. Nervi transversi infuscati.

**179. *A. longula:*** antennis longiusculis oblonga cinerea, capite albido; ore fronteque minus prominentibus; thoracis lineis duabus remotis, abdominisque unica dorsali interrupta, fuscis; alis subhyalinis, nervis transversis infuscatis; *mas:* oculis coherentibus, abdomine cylindrico, ano cinereo; *femina:* macula frontali flava. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 72. 79. ♂♀. originaria. — (Non *Anthomyia eadem* Meig. Dipt. 5. 103. 36 & *Hylemyia* 7. 315. 16; nec *Hylemyia* Macq. Buff. 321. 23, quae ad *Ariciam pullulam* nob. n.o 60, pertinet).

Hab. in Sveciae meridionalis plantis silvaticis, D. Fallén; in Scaniae littoribus marinis ad Rastlunda & Esperöd mense Julio mihi raro obvia.

♂♀. Per colorem corporis cinereum, thoracis lineas 2 (nec 3) remotas brunneas, antennarum setam tenuissime puberulam, nec distincte pubescentem, alarum nervos transversos fuscedine cinctos, ut & costam totam praesertim in ♀ ciliatam, ab aliis subsimilibus facile dignoscitur. — Antennæ mediocres, nigricantes. Frons & os parum I. leviter tantum prominentia. Palpi nigri. Nervus transv. ord. subperpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus. Alæ cinereo-hyalinæ. Squamæ albidae. Halteres flavi. Pedes simplices, spinosi, nigri. *Mas:* cinereus. Caput argenteo-micans. Oculi arete coherentes. Antennæ longiusculæ. Abdomen cylindricum, pilosum, linea dorsali interrupta brunnea; postice subangustatum, ano mediori, infexo, cinereo. Costa breviter ciliata, spinula parva. Pulvilli sat magni, albi. *Femina:* cana. Caput albidum. Oculi parvi, sat late distantes, per vittam frontalem modice latam nigram, antice flavam, postice cinereum, & orbitas proportione sat latas, canas, sejuncti. Antennæ mediocres. Abdomen ovo-to-oblongum, apice acutum, totum griseum, pubescens, vestigio lineole dorsalis interruptæ, brunneæ. Costa distinete ciliata;

spinula distineta. Pulvilli parvi. (Cfr *Ar. pullula* supra n:o 60, & *parvula* infra n:o 219).

††. Nervi transversi non infuseati.

**180. *A. antiqua:*** antennis elongatis cinereis, setosa, capite albicante; ore fronteque subprominentibus; thoracis lineis tribus, abdominisque unica dorsali, fuscis; alis cinereis, nervo transverso ordinario subobliquo, recto; seta antennarum tenuiter pubescente; *mas:* oculis cohærentibus, abdomine sublineari, subdepresso, ano cinereo; *femina:* macula frontali rufa. ♂♀. (Long. fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 166. 115. ♂♀. & 7. 327. 34.

Hab. in Suecia præsertim meridionali Jun.—1 Aug., passim; e pupa cylindrica, nuda, flava utriusque sexus specimina d. 17—29 Maj. 1836 egressa; larvæ sordide albæ, subpellueidæ, utrinque serie punctorum nigrorum ornatae, in fungis terrestribus putridis in Pinetis ad Läckalänga & Kjessinge prope Lund Scaniæ d. 19 Sept. 1835 a Celeb. D. *Dahlbom* inventæ, quæ mox in pupas nominatas, sub hieme in terra conservatas, abierunt; in Gotlandia ad Furillen & Gothem; in Jemtlandia ad Faxelven, Åreskutan, Skalstugan & Mullfjellet plures feminæ Jun. 1810 legi; in Norwegia ad Thynæs. (In Helgoland, D. *Dahlbom*).

♂♀. Similis *Ar. florali* (147), sed fronte paullo minus prominente, nervis longit. 3 & 4 parallelis, transverso ord. paullo minus oblique ducto, ut & maris oculis arctius cohærentibus, thoracis lineis brunneis temnioribus, nec vittis latinsenlis, abdomine magis depresso, incisuris non nigris, & tandem feminæ macula frontali antica rufescente l. fulva, satis superque dignata. Ab *Ar. brunneescente* (66) thorace aliquæ haud brunneis differt. Antennæ, palpi breves, & pedes, nigra. Thoracis lineæ

3 dilute brunneæ. Nervus transv. ord. mox ante medium areæ insertus, subrectus l. in ♂ levissime subflexus. Tibiæ spinosæ. *Mas:* oculi sat magni. Abdomen lineare (non multo angustum), subdepressum, linea dorsali subintegra, tenui, nigricante. Alæ levissime subfuscaneæ, costa breviter ciliata; spinula parva. Pulvilli magni, albi. *Femina:* oculi minores, late remoti, per vittam frontalem modice latam, rufam l. castaneam, cerlo situ cinereo-micantem, postice griseam, & orbitas proportione sat latas, cinereas, sejuncti. Thorax saepè subimmaculatus. Abdomen oblongo-ovatum apice acutum, rudimento lineolæ dorsalis interruptæ, fuscæ. Costa distincte ciliata; spinula distincta. Pulvilli parvi. — Feminae seniores corpore magis obscure cinereo, vitta frontali in medio nigra, a feminis *Ar. striolatæ* (157) agre dignoscuntur, nisi alarum costam distinctius ciliatam probe observes. Pedes in juvenilibus picci. *Mas* ab *Ar. brunneolineæ* (58), cui abdominis pictura simillimus, oculis cohærentibus, nec subremotis, mox dignotus.

Var. b. *pruinosa*, ♀. Similis var. a., sed thorax & abdomen magis grisea l. flavescenti cinerea. — In Scania & Jemtlandia cum var. a. rarius inventa. — In alpibus Dalecarlicis & Lapponia Lulensi ad Quickjock, a D. *Bohemus* deprehensa. (In Germania ad Neuenkirchen prope Gryphiam d. 15—20 Maj. a D. *Dahlbom* captata).

**181. *A. arrogans:*** antennis medioeribus cinerea, capite cano; ore fronteque prominentibus; epistomate inferne rufo; abdominis linea dorsali fusa; alis cinereis, nervo transverso ordinatio subperpendiculari, recto; seta antennarum subnuda; *femina:* ab domine sublanceolato, macula frontali flava. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scania rarissime; 2 specimina in Salice viminali ad Lund die 24 Maj. 1830 ab oculatissimo nostro *Dahlbom* inventa.

♀. Similis *Ar. fuscicipiti* (165); sed præter differentiam sexus, differt etiam ore fronteque magis porrectis, corpore cinereo,

nee griseo, thorace vix vittato, alis albido-cinereis, ut & costa magis ciliata, spinula distincta. Caput canum, nitens, subbuccatum seu facie sat distincte prominula. Oculi parvi, sat late remoti, vitta frontali modice lata, rufo-flava, postice cinerea. Antennæ validæ, nigræ, seta basi incrassata, in medio tenuissime puberula. Regio circa os rufescenti flava. Palpi subfiliformes, nigri. Thorax vestigio linearum 3 dilute brunnearum. Lineola 2 approximatæ, abbreviatæ, valde tenues, nigræ in thoracis antico observantur. Abdomen oblongo-lanceolatum, cinereum, opacum, linea dorsali fusca, in altero specimine vix observanda. Alarum costa breviter, sed distincte, ciliata, spinula distincta. Nervus transv. ord. non longe ante medium areæ insertus. Squamæ parvæ, albidae. Halteres flavi. Pedes nigro-picci, pilosi, tibiis parce spinosis.

**182. *A. melanogaster:*** antennis breviuseulis cana; ore fronteque prominentibus; abdome atro, nitido; alis albidis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; tibiis basi rufis; seta antennarum nuda; *femina:* vitta frontali flava, abdome ovato. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime, in unico tantum exemplo deprehensum.

♀. Similis *Ar. nigriventri* (52); sed thorace cano, immaculato (nec griseo, nec fusco-trilineato), antennis brevioribus, fronte magis prominente, cana, vitta subangustata, flava, postice cinerea (nec vitta latinsula, atra, in medio polita), alis albis, nervis pallidis, nec infuscatis, costa breviter ciliata, spinula parva, squamis parvis, valvulis æqualibus, ut & tibiis basi rufescientibus, abunde ab illa dignota. Antennæ validæ & palpi nigra. Oculi parvi, rotundati. Nervus transv. ord. ante medium areæ insertus. Halterum petiolus teslaceus, clava multilata.

**183. *A. seminitida:*** antennis mediocribus obscure **cinerea**, capite albido; ore fronteque vix prominentibus;

abdomine ovato, acuto, atro, nitido; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, subrecto; seta antennarum nuda; *femina*: vitta frontali nigra. ♀. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel capta.

♀. Priori similis, sed magnitudine nonnihil minore, colore cinereo, nec cano, alis magis hyalinis, vitta frontali pedibusque totis nigris, ut ♂ in primis ore fronteque hand prominulis, vere distincta. Oculi modice remoti, vitta frontali latiuscula, nigra. Antennae validæ, nigræ, seta basi indeterminate & graciliter incrassata. Palpi breviusculi, subfiliformes, nigri. Thorax vestigio vittarum 3 fuscarum. Abdomen totum nigrum, nitidissimum. Alarum costa breviter & tenuiter ciliata; spinula parva. Nervus transv. ord. fere perpendicularis & fere rectus. Squamae minutæ, albæ. Halterum petiolus testaceus, clava mutilata. Pedes nigri, pilosi, tibiis spinulosi.

\*\*). Nervus transversus ordinarius inflexus.

**181.** *A. conifrons*: antennis mediocribus, cinereo-nigricans (♂), aut griseo-scens (♀); epistomate argenteo; fronte modice prominente, atra; ore leviter reflexo; thoracis vittis 3, abdominisque unica, atris; alis hyalinis, basi nigris (♂), nervis longitudinalibus versus apicem divergentibus, costa ciliata; seta antennarum nuda; *mas*: oculis subcohaerentibus, abdomine subcylindrico, ano nigro, appendicibus ventralibus bidentatis. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scandinavia boreali, 27 Jun.—12 Aug. minus frequens; scilicet in Jenitlandia ad Skalstugan; in convallis Lapponiae Lulensis ad Quickjock (♂), D. Boheman;

in jugo alpino Norwegiae ad diversorium Suul Wærdaliae,  
D. Dahlbom.

♂. Per antennarum selam nudam, alas basi nigras, costam ciliatam, nervos long. 3 & 4 versus apicem divergentes, transversum ordin. obliquum & modice intlexum, ut & abdomen conico-subcylindricum, anumque intlexum, atrum, nitidum stylis 2 ventralibus atris, nitidis, in medio dente instructis suffultum, a confinibus facile dignoscitur. Vitta frontalis atra, opaca, postice angustissima, anterius dilatata. Antennæ suboblique prorectæ, nec exakte incumbentes, subcuneiformes, validæ, nigræ, seta basi incrassata. Palpi elongati, subfiliformes, nigri, pilosi. Abdomen pilosum, vitta dorsali nigra subinterrupta. Incisura certo silt tenuiter nigræ. Alarum costa mediocriter ciliata, spinula mediocri. Squamæ mediocre, ciliatæ, flavido-albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, pilosi & spinulosi, pulvillis sat longis, albis.

♀. Similis mari, sed tota grisea, vitta frontali latiuscula, anten-  
nis, palpis pedibusque, nigris. Caput flavido-album, nitens. Tho-  
racis vittæ 3 brunnecentes. Abdomen ovatum, vitta media  
fuscæ vix conspicienda. Alæ basi ferruginantes. Pulvilli parvi.  
Forte hujus!

**185. *A. octoguttata:*** antennis longiusculis nigra,  
opaca, epistomate albescente; ore fronteque haud promi-  
nentibus; abdome maculis lateralibus 8 quadratis glau-  
cis; alis squamisque leviter fuscânis, nervis longitudinali-  
bus 3 & 1 parallelis, transverso ordinario subobliquo, le-  
viter flexo, costa nuda; seta antennarum nuda; mas:  
oculis coherentibus, abdome linearî, depresso, ano par-  
vo, nigro, nitido. ♂. (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Gotlandia rarissime; in monte Thorsborg  
14 Jul. 1811 specimen descriptum inveni.

♂. Similis *Ar. florali* (147) & *striolatae* (157), sed ab illa ore  
fronteque minus prominulis, nervis long. 3 & 4 parallelis, costa

nuda, squamis subfuscans &c., & ab hac magnitudine minore, thorace nigriore, squamis fuscans &c., differt. Oculi magni, arete & sat longe cohaerentes. Frons antice angusta, nigra. Antennæ nigrae, seta basi graciliter incrassata. Epistoma cinereum, apice non reflexum. Palpi breviusculi nigri. Thorax & scutellum brunnescenti nigra. Metathorax cinereus. Abdomen glaucum, pilosulum, linea dorsali sat lata, regulari, continua, & fasciis 4 (harum una ad basin & 3 ad incisuras) sat latis, rectis, nigris; hinc exstant ad latera maculae utrinque 4, quadratae, glaucae. Nervus transv. ordinarius sat longe ante medium areæ insertus. Squamæ mediocre, ciliatae. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, hirti, vix spinulosi. Pulyilli non magni. Ab *Ar. radicum* infra (196) squamarum valvula superiore inferiorem omnino tegente præprimitis differt.

**186. *A. obtusa:*** antennis medioeribus validis cinerea, capite albo, nitido; ore fronteque distinete prominentibus; thoracis lineis abdominalisque maculis micantibus fuscis, obsoletis; alis cinereo-hyalinis, nervis longitudinalibus 3 & 4 parallelis, transverso ordinario subobliquo, leviter flexo, costa nuda; seta antennarum nuda; mas: oculis approximatis, abdome subovato. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 682. 95. ♂.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; ad Lycksele unicum exemplum inveni.

♂. Statura corporis obtusa. Cinerea, opaca, paree setosa. Caput argenteo-micans, subbuccatum. Oculi non magni, oblongi, non arete cohaerentes, sed per vittam frontalem tenuissimam nigram & orbitas angustas albas, anguste remoti. Facies ante oculos distinete prominens. Antennæ nigrae, seta basi incrassata. Epistoma infra oculos sat longe descendens. Palpi breviusculi, nigri, pilosi. Thoracis lineæ 3, brunneæ, media tantum perspicua. Scutellum immaculatum. Abdomen ovatum, subconvexum, canum, maculis indeterminatis certo luminis situ fusco-micantibus; linea dorsali fusca distinctiore. Anus cine-

reus, subcompressus (an casu?). Nervus transv. ordinari. fere in medio areæ insertus. Squamæ medios, ciliatæ, albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, cinerascentes, pilosi, tibiis spinulosos. Pulvilli parvi.

*Manipulus 2:dus.* Squamæ sub alis medios 1. parvæ; valvula superiore inferiorem haud tegente.

\*. Nervi transversi infuscati. (Magna).

**187. *A. longicornis:*** antennis elongatis nigriceps ( $\delta$ ), aut cinerea ( $\varphi$ ); capite argenteo; ore fronteque prominentibus; thoracis lineolis 2 approximatis, nigris; alis subhyalinis, basi, squamis halteribusque flavis, nervo transverso ordinario iulexo, infuscato; *mas:* oculis appropinquantibus, aro parvo, cinereo; *femina:* oculis late remotis, vitta frontali lata, nigra, aro acuto.  $\delta\varphi$ . (Long. 2½ fere 3½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 678. 74.  $\delta\varphi$ .

Hab. in silvis Scandinaviae borealis, 17 Jun.—2 Aug., minus frequens; scilicet in Jemtlandia, ubi feminæ in ligno abietino recenter secano ad Forsa prope radieem Mullsjellet mense Julio deprehensa; in silva ad Wittangi Lapponiae Tornensis uterque sexus Junio inventus; in Norwegia ad diversorium Søul Wærdaliæ, in jugo alpino situm, unicum specimen masculum legit D. Dahlbom.

$\delta\varphi$ . Per magnitudinem magnam, antennas longas, lineares, subangustatas, caput subbuccatum, albidum, alarum basin squamasque fulvescentes, nervos transversos distincte infuscatos, herum ordinarium distincte inflexum &c., a confinibus facile distinguitur. Facies prominens, argentea. Antennæ nigrae, seta tenuiter puberula, basi incrassata. Os antice leviter prominens. Palpi elongati, cylindrici, nigri, pilosi. Thorax lineolis anticis 2 angustis approximatis, nigris. Abdomen ovatum, convexum, cinereum, certo situ maculis obscure micantibus. Ala-

rum nervus transversus ordin. paullo ante medium areæ insertus. Squamarum valvula superior inferiorem vix ad dimidium tegens. Halteres flavi. Pedes nigri, spinosi. *Mas:* obscurior. Oculi paullo remoti, per vittam frontalem modice angustam, nigram & orbitas tenues albas, non late sejuncti. Costa breviter ciliata. Pulvilli magni, albi. *Femina:* plerumque major, magis cinerea. Oculi late remoti, per vittam frontalem latam, nigram & orbitas modice angustas cinereas disjuncti. Costa ciliata, spinula distincta, nigra. Pulvilli parvi, albi.

\*\*. Nervi transversi non infuscati. (Minores aut parvæ).

a). Abdomen basi flavo-subpellucidum.

188. *A. canicularis:* antennis longiusculis obscure cinerea, capite albido; fronte vix prominente; thorace sublineato; alis hyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, subrecto, squamis albis; *mas:* oculis subcohaerentibus, abdome elliptico, maculis anticis flavo-diaphanis; *femina:* oculis sat late remotis, abdome ovato, basi interdum fascia testacea. ♂♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.).

*Musca* Linn. Fn. Su. 1841. ♂. Schrank Austr. 462. 938. ♂. Fabr. Antl. 303. 97. ♂. Fall. Muscid. 69. 72 ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 143. 101. ♂♀. & 7. 326. 22. Macq. Buff. 2. 331. 5. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 681. 86. ♂♀.

Hab. a primo vere usque ad serum autumnum, per totam Scandinaviam, alpibus Lapponicis tantum exceptis, vulgatissima; in copula multoties capta. Heres lucis umbrosis sub arborum frondiferarum coma, atque etiam in cubiculis mense caniculari meridie & vespere choreas agunt. In fenestris quoque frequens. ♀ vivaciter currens, ♂ ægre serpens. 2 l. 3 generationes anno exstant. *Larvæ*

in vegetabilibus putridis etiamque in caseo antiquo vivunt. *Ova* oblonga, nivea. (Sub nomine: "Anthonomia hilaris Duf." specimina mascula e St. Sever Galliae a D. Leou Dufour missa).

$\delta\varnothing$ . Oblonga. Antennæ nigrae, seta nuda, basi incrassata. Os non reflexum. Palpi nigri. Abdomen depresso, pubescens, haud pilosum. Nervi: longitudinales 3 & 4 paralleli; transversus ordinari. perpendicularis, subrectus, interdum leviter flexus; costa nuda; spinula nulla. Squamae albæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes simplares, inermes, paree pilosi, nigri, summa geniculorum flexura testacea. Pulvilli parvi. *Mas*: caput album. Oculi magni, subcohærentes, tantum per orbitas tenues albas disjuncti. Thorax dorso saepe brunnescens, vittis 3 obscuris, obsoletis. Abdomen ovale, cinereum, linea dorsali incisurisque utrinque abbreviatim, nigricantibus, segmentis 2:do, 3:to & interdum etiam basi 4:ti lateribus testaceo-diaphanis. Anus parvus, depresso, cinereus, subtus rima longitudinali. *Femina*: caput griseo-cinereum. Oculi mediocres, oblongi, sat late remoti, per orbitas proportione latas, cinereas, & vittam proportione angustatam, nigram, griseo-micantem, disjuncti. Thorax vittis 3 brunneis l. obscuris, media distinctiore. Abdomen ovatum, cinereum, basi saepe fascia testacea.

*Obs.* *Anth. canicularis* var. *b.*  $\varnothing$ . Zett. Ins. Lapp. I.e. ad *Aric. subpellucentem* n:o 176 pertinet. — *Musca canicularis* Linn. & *Musca domestica minor* Degeer. vix ejusdem speciei.

b.) Abdomen totum cinereum aut nigrum.

†. Venter in utroque sexu nudus aut nudiusculus.

α. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

*Pugillus* 1. Nervus transv. ord. leviter flexus. Antennæ longiusculæ. Alarum costa nuda aut subnuda. Oblongæ. (*Larva* ejusdem speciei hujus Pugilli "acephala ovato-attenuata spinu-

losa postice declivis; spinulis pinnato-fimbriatis; dorsalibus in seriebus duabus dispositis brevibus simplicibus stigmatibus posticis subtrilobatis, anticis exsertis gracilibus octo-digitatis; long. 3—4 lin. in Boletis carnosis putrescentibus habitans" & "pupa larvæ consimilis & brevius ovata, segmentis duobus anticis evanidis; long.  $2\frac{1}{2}$ —3 lin." a Nobil. D. Leon Dufour in Annal. des Sc. Natur. Extr. p. 5. describuntur.

189. *A. scalaris*: nigricans, capite albescente; ore fronteque non prominentibus; thorace nigro-bivittato; alis hyalinis, squamis albis; *mas*: oculis subcohaerentibus, abdome elliptico, glauco, vitta dorsali fasciisque nigris, tibiis intermediis intus tuberculatis; *femina*: oculis remotis, abdome ovato, subunicolor, pedibus, simplicibus. ♂♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fahr. Antl. 305. 106. ♂. Fali. Muscid. 69. 73. ♂♀. (sub qua plures species latent). *Authomyia* Meig. Dipt. 5. 141. 102. ♂♀. & 7. 326. 19. Maeq Buff. 2. 333. 2. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 681. 87. ♂♀. *Fannia* (Faunia?) *saltatrix* Rob. Desv. n:o 1. — *Anthomyia manicata* Leon Dufour Annal. des. Sciene. Natur. Extr. p. 5. n:o 2. ♂♀. videtur?

Hab. in foliis fruticum, per hortos & nemora totius Scandinaviae, a medio mensis Maii usque ad medium Oct., ubique frequentissima; scilicet in Suecia, Lapponia (alpibus exceptis), Norwegia usque ad Nordecap, & Dania, vulgaris; in copula saepissime capta; mares choreas in arborum umbra instituentes; feminae in ligno recenti Pini, & in fenestris saepe lectae. *Larvæ* in stereore præcipue humano degunt. Plures generationes (saltem 2 l. 3) anno observantur. Pupa onisciformis. (E Glogavia a D. Zeller, & e Kilia a D. Wiedemann communicata; ad

Berolinum, D. *Dahlbom*, qui feminam a *Crabrone* prædatam observavit).

*♂♀.* Affinis & similis priori, sed plerumque paullo major, & antennarum seta magis nuda, abdomine minime flavo-maculato, alarum nervo transverso forte non nihil magis flexo, ut & in ♂ tibiis intermediis tuberculatis, mox dignota. Tibiae antieæ basi plerumque anguste testaceæ. Alæ ima basi albescentes. *Mas:* abdomen glaucum, vitta dorsali & fascia in segmentorum 2, 3 & 4 margine apicali utrinque subabbreviata, nigris. Pedes intermedii: femoribus subtus fasciculatum pilosus, tibiis pone medium intus tuberculo nigro. *Femina:* abdomine subimmaculato, sæpe nigro, nitido, pedibus simplicibus. Reliqua ut in *Ar. caniculari*.

*Obs.* Larvæ subovales, onisciformes, depresso-nudæ, testaceæ, e 10 annulis (præter apicalem) constantes. Ad marginem lateralem singulo annulo (excepto ultimo) & dorsali & ventrali (unde ad utrumque latus duplex oritur series stylorum) adhæret dens modice longus, acutus, seu stylus (spinula) mobilis, membranaceus, uncinatus, utrinque ciliatus. Segmentum anale? (vix caput?) semirotundatum, deplanatum, disco breviter bicornutum, margine stylis 6 foliaceis, angustis, acutis, pennatis ornatum. Tales larvæ, a D. Prof. *Sparrman* in Act. Holm. 1806. p. 239. *T.* 6. f. A. B. discriptæ & depictæ, ex intestinis hominis egrediæ. Post statum metamorphoseos puparum in terra sub 3 a 4 hebdomat. imagines declaratae hujus speciei proventæ fuerunt. Exempla etiam quædam harum ipsissimarum & larvarum & imaginum a D. *Sparrman* observatarum acui adfixa, per benignitatem Cel. *Schönherr* communicata, jam ante oculos habeo.

**190. *A. manicata:*** nigricans, capite albescente; ore fronteque non prominentibus; thorace nigro-bivittato; tibiis antieis flavis, apice atris; alis hyalinis, squamis albis; *mas:* oculis cohærentibus, abdomine elliptico, glauco, singulo segmento in medio macula trigona nigra, tibiis

intermediis versus apicem incrassatis; *femina*: oculis remotis, abdomine ovato, subunicolore, pedibus simplicibus. ♂♀. (Long. 1½ fere 2 lin.).

*Anthomyia* Meig. 5. 140. 100. ♂♀. & 7. 327. 71. Macq. Buff. 2. 333. 1. ♂♀. *Musca scalaris* Fall. Muscid. 69. 73. variet. — *Anth. armillata* Zett. Ins. Lapp. 679. 76. ♀.

Hab. in Scandinavia, 3 Jun.—29 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Lund in horto botanico 19 Aug. in copula a D. *Dahlbom* capta, ad Esperöd, ipse; in Smolandia; in Ostrogothia rarius; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dalecarlia, D. *Bohemani*, qui observavit larvas in alvearibus, ubi apes extinetæ, degentes; in Jenitlandia ad diversorium Rätan; in Laponia Umensi in fenestra ad Lycksele ♀ semel.

♂♀. Simillima praecedenti, a qua femina vix differt nisi magnitudine paullo minori & tibiis anticus basi testaceis; mas vero oculis magis rehaerentibus, tibiis anticus flavis, apice tantum atris pilosis, ut & tibiis intermediis ad apicem incrassatis, nec intus tuberculatis, facile dignoscitur. Reliqua ut in priori. — Sub nomine *Ar. fasciculifera* nov. sp. mihi e Suecia superiore ♂ missus.

*Obs.* E pupa oblonga, utrinque leviter convexa, 10-annulata, testacea, glabra, nuda, in singulo annulo (& dorsali & ventrali) denticulo laterali minuto armata, imago exclusa, teste D. *Bohemani*, qui exemplar & pupæ & imaginis mihi communicavit.

191. *A. incisurata*: cinerea, capite albescente; ore fronteque non prominentibus; thorace fusco-bivittato; pedibus simplicibus, nigris; alis hyalinis, squamis albis;

*mas*: oculis subcohaerentibus, abdomine elliptico, glauco, vitta dorsali fasciisque nigris; *femina*: oculis remotis, abdomine ovato, fasciis brunneis, obsoletis. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 679. 79. ♂. *Anthom. impura* Zett. l. c. 683. 96. ♀.

Hab. in Scandinavia, 4 Jun.—28 Jul., passim; in copula pluries observata; scilicet in Suecia meridionali rarissime; in Ostrogothia ad Wadstena, etiam ad Gusum, D. *Wahlberg*, qui sub nomine "*A. scalaris*" misit; in Gottländia ad Nähr raro; in Bottnia boreali ad Pello in arenosis in societate cum *Ar. denticanda* (112) ♂ semel inventus; in Lapponia Umensi ad Lycksele; in inferalpinis Nordlandiae Norwegiae ad Tromsæ in fenestra domi individuum unicum femineum inventum. (Ad Gryphiam jam mense Majo a D. *Dahlbom* lecta; etiam e Glogavia a D. *Zeller* missa).

♂♀. Ab *Ar. scalaris*, 189, cui in ceteris simillima, differt thorace cinereo (nec nigricante), vittis fusca, pedibus in utroque sexu simplicibus, ut & nervo transv. ordin. levissime tantum flexo. Oculi per orbitas angustas albas in ♂ paullo sejuncti. Abdomen in illæsis individuis feminarum cinereum, fasciis dilute brunneis, obsoletis. — Vix *Anth. lepida* Meig. — Sub nomine *Anth. inermi* inter Amicos meos entomologicos olim divulgata.

192. *A. lugens*: atra, capite albicante; ore fronte-que non prominentibus; pedibus simplicibus; *mas*: oculis cohaerentibus, abdomine elliptico, cinereo, linea dorsali fasciisque abbreviatis nigris, alis fuscans, squamis sordide albidis. ♂. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scania & Ostrogothia rarissime, duo tantum specimina inveni.

♂. Similis *Ar. manicatae* (190), a qua tamen magnitudine paullo minore, thorace non vittato, pedibus omnibus nigris & simplicibus ut & alis magis fuscaneis, differt. Oculi magni, cohaerentes I. tantum linea omnium tenuissima, nigra, sat dense nigropilosa, levissime sejuncti. Antennae nigrae, seta nuda. Epistoma infra oculos non descendens, cinereum, certo situ argenteum. Palpi nigri, retracti. Thorax & scutellum atra, opaca. Tuberculum ani parvum, nigrum, nitidum. Abdomen subdepressum. Alarum nervi transversi subapproximati, horum ordinarius levissime flexus. Pedes simplices, parum pilosi. Halteres flavi. — Ab *Ar. serena* (208), cui similis, magnitudine nonnulli major, corpore non nitente, & valvulis squamarum inaequalibus, dignoscitur.

193. *A. cristata*: nigra (♂), aut cinerea (♀); opaca, pilosa, capite cinerascente, puncto supra antennas albo; ore fronteque non prominentibus; alis subfuscaneis, squamis sordide albidis, halteribus flavis; pedibus simplicibus; *mas*: oculis cohaerentibus, abdome ovato, subconvexo, cinereo, linea dorsali interrupta, nigra; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula, atra, abdome ovato, acuto, cinereo, immaculato. ♂♀. (Long. 1½—2 lin.).

*Musca meteorica* var. "femoribus simplicibus" Fall.  
Muscid. 61. 63. Descript. ♂.

Hab. in Suecia minus frequens; scilicet ♂ in Scania & Suecia media raro inventus; in Jemtlandia ad radicem alp. Mullsjellet etiam ♂ 27 Jul. 1840 semel; in Laponia Lulensi ad lacum Randijaur d. 12 Aug. 1843 ♂♀ rarissime, D. Boheman, qui mihi exemplum unicum utriusque sexus ad describendum nuperrime communicavit.

♂. Ab *Anth. lepida* Wied. & Meig., cui similis videtur, differt: thorace scutelloque opacis, nec nitidis; abdomine ovato, subconvexo, nec plano, ut & linea tantum dorsali interrupta nigra, nec vitta dorsali fasciisque nigris. Oculi sat arcte cohaerentes, vix linea nigra angustissima disjuncti; in illæsis individuis omnium tenuissime & pareissime puberuli. Frons antice anguste triangula & punctum vertieis, distincte pilosa. Seta antennarum subnuda. Punctum inter antennas album. Palpi breves, pilosi, nigri. Thorax ater. Abdomen cinereum, pubescens & pilosum. Anus parvus, inflexus, niger, nitidus. Nervi longitudinales 3 & 4 subparallelis l. forte versus apicem levissime divergentes; transversus ordinarius ante medium area insertus, subperpendicularis & leviter flexus. Squamæ flavidæ albidae, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Halteres flavi. Pedes simplices, modice pilei, nigri. — Caveas ne hanc cum *Ar. foreolata* (201) confundas.

♀. Similis mari, sed differt, toto corpore cinereo, pubescente vel parum piloso; oculis microscopice & tantum tenuissime puberulis, mediocriter distantibus, nempe per orbitas angustas cinereas & vittam frontalem latinseulam atram, antice (inter antennas) puncto distincto albo, & postice (in vertice) macula cinerea inscriptam, abdomine nudiusculo, subnitido, immaculato, acuto, ut & alis minus fuscans, basi subhyalinebus.

♀. An etiam hujus? Tota griseo-cinerea, opaca. Oculi modice remoti. Orbitæ proportione latæ & vitta frontalis proportione angustata, griseo-cinerea. Antennæ nigrae. Punctum inter antennas album nullum. Palpi nigri. Theracis dorsum vestigio vittarum 3 brunnearum. Abdomen ovatum, non pilosum, rudimento lineæ dorsalis interruptæ fusca. Alæ subhyalinæ. Squamæ albidae. Pedes nigri. In Blekingia in fenestra domi 15 Aug. capta.

194. *A. mutica*: nigricans (♂), aut obscure cinerea (♀); capite albicante; ore fronteque non prominentibus; alis subhyalinis, squamis albidis; pedibus simplicibus; mas: oculis cohaerentibus, abdomine elliptico, de-

presso, glauco, linea dorsali fasciisque abbreviatis nigris; pedibus intermediis subtus ciliatis; *femina*: oculis remotis, vitta frontali modice lata, nigra, abdomine ovato, obscure cinereo. ♂♀. (Long. ♂  $1\frac{3}{4}$ , ♀  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali & media rarius; in horto Lundensi Scaniae 3 Jun. 1839 in copula deprehensa; in Gotlandiae pratis ad Wamlingbo, Rhone & Slitö 5—19 Jul. 1841 tria specimina mascula inventa.

♂♀. Caput argenteo-micans. Punctum inter antennas album nullum. Antennae nigrae, seta omnino nuda, basi graciliter incrassata. Os infra oculos non descendens. Palpi retracti, nigri. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallelis 1. versus apicem leviter approximati; transversus ordin. fere perpendicularis, leviter flexus, paullo ante medium areæ insertus. Squamarum valvulae inæquales. Halteres flavi. Pedes nigri, medioeriter pilosi, simplices, tibiis intermediis in ♂ leviter versus apicem incrassatis. Ab *A. lepida* Meig. vix nisi thorace minus nigro, neque nitido, alis maris parum fuscanis, & puncto inter antennas feminæ albo nullo, differt. *Mas*: oculi magni fere cohærentes, orbitis tenuissimis, argenteis, continue (nec ut in priori interrupte) pilosis, tantum angustissime disjuncti. *Abdomen* pubescens, parce pilosum. Anus parvus, niger. Pedum intermediorum femora subtus & tibiae intus ciliata. *Femina*: oculi modice remoti. Orbitæ proportione sat latae, cinereæ. Vitta frontalis proportione non lata, nigra, postice grisea. Abdomen immaculatum, subnitens.

Var. b. ♂. similis var. a. sed thorace atro, alis squamisque fuscanis diversus, in Jemtlandia ad Mullfjellet 27 Jul. captus. *An propria species?*

195. *A. albipuncta*: nigra (♂), aut cinerea (♀); capite albicante; ore fronteq[ue] non prominentibus; puncto supra antennas niveo; alis subhyalinis, squamis albidis; abdomine ovato, convexo (♂) aut cinereo (♀);

pedibus simplicibus; *mas*: oculis coherentibus, tibiis posticis intus in medio fasciculo pilorum; *femina*: oculis remotis, vitta frontali lata nigra; tibiis posticis intus nudis. ♂♀. (Long. ♂  $1\frac{3}{4}$ , ♀  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Lund 10 Jun. 1838 unicum par in copula inveni. In Jemtlandia feminam legit D. Dahlbom.

♂♀. Similis *Ar. cristatæ* (193), a qua abdomine immaculato, alis maris minus infuscatis, nervis longitud. 3 & 4 exacte parallelis, transversis paullo magis approximatis, ut & tibiis posticis in ♂ intus in medio fasciculo pilorum 3 l. 4 erectorum. Punctum frontale magnum, album. Pedes pilosuli. Femora postica maris subtus in medio pilis 2 brevibus, approximatis, erectis. Reliqua ut in *cristata*.

*Pugillus* 2. Nervus transvers. ordinarius rectus. Pedes simplifices. Squamæ sub alis valvulis inæqualibus.

196. *A. Radicum*: antennis mediocribus nigricans (♂), aut cinerea (♀); capite albicante, ore fronteque paullo prominentibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario obliquo; squamis albis; *mas*: oculis coherentibus, thorace vittis 3 nigris, abdomine elliptico, plano, glauco-cinereo, linea dorsali incisurisque atris; *femina*: oculis remotis, vitta frontali nigra, antice fulva, postice cinerea, thoracis vitta dorsali, abdominisque ovati, cinerei linea dorsali, brunneis obsoletis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ —2 lin.).

*Musca* Linn. Fn. Su. 1810. ♂. Fall. Muscid. 72. 78. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 168. 148. & 7. 327. 38. Macq. Bufl. 2. 341. 35. ♂♀. Zett. Ios. Lapp. 681. 104. ♂♀. *Musca Napobrassicæ* Bjerkanter Act. Holm. 1780. p. 196. *Anth. Brassicæ* Wiedem. Zool. Mag. 1. p. 78. 27. ♂♀.

Hab. in floribus Umbellatarum, Compositarum, &c., etiam in graminosis, per totam Scandinaviam, a medio mens. Maij usque ad medium Sept., vulgatissima, in copula multoties deprehensa; scilicet in Scania longe frequentissima; in Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogothia; Gotlandia (ex. gr. ad Slitö, Ahlskog &c.), Nericia, & Uplandia, passim copiose; in Jemtlandia usque ad Skalstulan parce; in Lapponiis Umensi, Lulensi (ad Quick-jock) & Tornensi usque ad jugum alpinum adscendens, raro; in Dania frequens. (E Glogavia a D. Zeller & e S:t Sever Galliae a D. *Leon Dufour* missa. E Kilia a D. *Wiedemann* sub nomine: "Anthon. Brassicæ Hoffmigg." uterque sexus communicatus).

♂♀. Valde similis & affinis *Ar. striolata* 157, & *florali* 147; sed ab illa corpore paullo breviore & latiore prasertim abdomine, fronte nonnihil magis exserta, in utroque sexu ante antennas flavo-maculata (in ♀ tamen latius), abdomine maris pictura nigra distinctiore, feminæ vitta thoracis unica obsoleta & abdomine obscuriore, subimmaculato; a *florali* brevitate corporis, antennis forte paullo brevioribus, macula frontali flavâ, colore corporis feminæ paullo obscuriore; & ab utraque squamarum valvula superiore inferiorem non tegente, facile dignoscitur. Frons modice porrecta. Antennarum seta breviter puberula. Os distincte exsertum. Palpi longiusculi, subfiliformes, nigri, pilosi. Alarum costa nuda. Halteres flavi. Pedes pilosi. *Mas*: oculi brunnei, postice arte cohærentes. Abdomen pilosum. *Femina*: oculi rufi, modice remoti, orbitis sat latis, cinereis & vitta frontali modice lata, sejuncti. Abdomen pubescens.

*Obs.* Larvæ in radicibus *Raphani* & *Brassicæ*, quas destruunt, habitare dicuntur. Hæ larvæ 2 lin. longæ, 10-annulatae, apoda, albæ, capite acuto, apice nigro, cauda truncata, nigro-bipunctata, mens. Sept. mutantes in pupas oblongas brunneas, e quibus iterum post earum in terra hibernationem imagines circi-

ter 12 Maji anni sequentis excludebantur", a D. *Bjerkander* l. c. describuntur.

**197. *A. riparia*:** antennis longiusculis oblique porrectis glauca, capite argenteo; ore fronteque prominentibus; oculis in utroque sexu remotis; thoracis vittis 3, abdominalisque macula dorsali magna dentata, brunneis; alis hyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari; squamis albis. ♂♀. (Long. ♂  $1\frac{1}{2}$ , ♀ fere 2 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 67. 68. ♂♀. originaria. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 197. 199.

Hab. in plantis aquaticis ad ripas & litora fluminum & lacuum per Scandinaviam meridionalem & mediam, 20 Jul.—20 Aug., passim; scilicet in Scania ad Fogelsång, & Esperöd prope cisternam molarem; in Ostrogothia ad Gusum & ad litus lacus Wettern in primis ad Wadstena, frequens; in Gotlandia ad Lummelund; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Helsingia ad Kårböle, raro; in Norwegia ad Suul Wærdaliæ semel.

♂♀. Similis *Ar. litoreæ* (83) & *triangulæ* (92), sed a priori magnitudine nonnihil minore, seta antennarum nuda, nec pubescente, nervis transversis non infuscatis, horum ordinario perpendiculari, nec obliquo, longitudinalibus 3 & 4 parallelis, nec versus apicem paullo divergentibus, & oculis in utroque sexu fereaque remotis; a posteriori magnitudine saepe duplo majore, ore fronteque multo magis porrectis; & ab utraque colore corporis magis glaucescente, capite albidiore, antennis majoribus, oblique porrectis, nec incumbentibus, oculis minoribus, vitta frontali media oblongo-cordata argentea l. alba, utrinque linea altra marginata, ut & abdominalis vitta dorsali brunnea latissima, dentata, sèpissime continua, rarissime per lineolam medianam tenuem cinereum divisa, abunde dignoscitur. Antennæ nigrae. Palpi subclavati, nigri. Corpus, præsertim sub-

tus, schistaceum l. glaucum. Thoracis vittæ dorsales 3 brunneæ, approximatæ, interdum subconfluentes. Scutellum sæpe puncto utrinque brunneo. Abdominis ovati dorsum in singulo segmento media late trigona brunnea. Pedes validi, scistacei, pubescentes, sed parum pilosi, unguibus pulvillisque in utroque sexu parvis. Halteres pallidi. Abdomen in ♂ apice obtusum, ano parvo cinereo; in ♀ apice acutum. — Pedes in juvenilibus picei.

198. *A. infirma*: antennis longiusculis obscure cinerea, capite argenteo; fronte parum, ore non, prominentibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, squamis albis; *mas*: oculis cohærentibus, abdome lineari, plano, linea dorsali interrupta nigra. ♂. (Long. 1 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 136. 161? & 7. 327. 49?

Hab. in Dacia, in uno specimine sub nomine allato a D. Staeger communicata.

♂. Tota cinerea, opaca, pilosa. Caput albidum. Oculi postice arete cohærentes. Antennæ nigræ, seta nuda. Palpi parvi, nigri. Thorax convexus, vix vestigio linearum 3 nigrarum. Abdomen angustatum, lineare, depresso, pilosum, cinereum, linea media subinterrupta nigra, sed incisuris haud nigris, unde dubium oritur de identitate *Anth. infirmae* Meigeni. Alæ cinereo-hyalinae, nervo transv. ordin. paullo ante medium areæ inserto. Squamæ albæ, ciliatæ, valvula superiore inferiore non omnino tegente. Halteres albidi, clava majuscula. Pedes nigricantes, pilosi, pulvillis distinctis, albis. Anus non magnus, subinflexus, nigro-cinereus, subnitidus.

♀: fronte griseo-alba, vitta nigra, thorace supra dilutiore quam in ♂, & pedibus magis nigro-brunneis, a D. Meigen l. c. describitur, mihi ignota.

**199. *A. glaucescens*:** antennis longiusculis schistaceo-cinerea, subnitens, capite cano; ore fronteque non prominentibus; alis squamisque albidis, nervo transverso ordinario perpendiculari; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali subangustata, nigra aut ferruginea. ♀. ♂? (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in foliis fruticum rarissime; in Scania ad Lund, & in pratis ad Öja & Nähr Gotlandiae 7—20 Jul. tria specimina inveni.

♀. Colore corporis obscure glauco-cinereo, nitente, ore fronteque minime prominentibus, ut & alis albidis, ab atlinitibus dignoscitur. Immaculata, pilosa. Oculi mediocres, non late remoti, in viva rufi. Orbitae proportione sat latæ, cinereæ. Antennæ angustatæ, nigrae, seta nuda. Palpi retracti, nigri. Os infra oculos non descendens. Abdomen oblongo-ovatum, subconvexum. Nervus transv. ordinarius distincte ante medium areæ insertus. Costa brevissime subciliata. Squamae parvæ, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Halteres albi. Pedes validiusculi, piceo-nigri.

♂. Niger nitidus. Oculi approximati (non omnino cohærentes) per orbitas angustas argenteas & vittam frontalem tenuem atram, leviter disjuncti. Abdomen ellipticum, glaucescens, linea media & (certo situ) fasciis abbreviatis, nigris. Ani tuberculum mediocriter magnum, inflexum, nigrum, nitidum. Ale nervi, squamae & halteres albida. Pedes simplices. Reliqua ut in femina, cuius mas hic forte est? In Scania ad Esperöd semel deprehensus.

**200. *A. lacteipennis*:** antennis longiusculis cinereo-eana, capite concolore; ore fronteque parum prominentibus; alis squamisque lacteis, nervo transverso ordinario perpendiculari; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula nigra, macula postica elongato-cor data cinerea inscripta. ♀. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime; 2 specimina tantum lustravi, unum in Scania, & alterum in Gotlandiae insula Stora Carlsön 16 Jun. 1819, captum.

♀. Per colorem dilute cinerem, alas lacteas & squamas sat magnas niveas, valvulam superiorem inferiorem vix ultra dimidium tegentem, ab affinis facile distinguitur. Tota canescens, immaculata, opaca. Oculi non magni. Antennae angustatæ, nigrae. Epistoma infra oculos paullo descendens. Palpi nigri. Abdomen oblongo-ovatum, subconvexum, pubescens. Nervi transversi non late distantes. Costæ nuda. Squamæ parum ciliatae. Halteres flavi. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, pilosi, geniculis anticus tibiisque posterioribus in exemplo Gotlandico, obscure rufescens.

♂. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem subdivergentes.

201. *A. foveolata*: antennis longiusculis nigra, opaca, capite cinerascente, ore fronteque non prominentibus; nervo transverso ordinario recto; mas: oculis cohærentibus, puneto supra antennas albo; abdomine ovato, subconvexo, glauco, linea dorsali interrupta, nigra; alis subfuscans, squamis sordide albidis, halteribus nigris; pedibus simplicibus. ♂. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad alpem Åreskutan 1 Aug. 1810 semel deprehendi.

♂. *Ar. cristatae* (193), ut ovum ovo, similis, cuius igitur descriptio heic etiam valet.<sup>2</sup> Differt tantum alarum nervis: longitudinalibus 3 & 4 versus apicem nonnihil magis divergentibus, transversis paullo magis approximatis, halteribus nigris, nec flavis, ut & abdomine glaucescente (nec sordide cinerascente), in medio segmentorum 2, 3 & 4 (in specimine exsiccato) foveola transversa. Has vero notas tanti momenti esse puto, ut pro specificis eas jure habeas.

**202. *A. perpendicularis*:** antennis longiusculis nigricans (♂), aut obscure cinerea (♀); capite albicante; ore fronteque minime prominentibus; nervis transversis approximatis, perpendicularibus, rectis; squamis albidis; pedibus simplicibus; *mas*: oculis coherentibus, puncto intra antennas albo, alis leviter fuscaneis, abdomeine cinereo, linea dorsali subinterrupta, nigra; *femina*: oculis non late remotis, vitta frontali latiuscula, atra, alis hyalinis, abdomeine immaculato. ♂♀. (Long. ♂  $1\frac{1}{2}$ , ♀  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Fogelsång prope Lund unicum par copulatum inveni.

♂♀. Affinis *Ar. serenæ* (208). Subnitens. Antennæ nigrae, sela subnuda. Palpi nigri. Squamæ sub alis medioeres l. parvæ, albidæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem non integrum tegente. Halterum clava mutilata, petiolo remanente pallido. Pedes simplices, pilosi, piceo-nigri. *Mas*: oculi magni, arete & longe coherentes. Macula supra antennas alba distincta. Thorax niger. Abdomen ovato-oblongum, subdepressum, glan-eco-cinereum, lineola dorsali interrupta, nigra. *Femina*: oculi medioeres, oblongi, per orbitas tenues cinereas & vittam frontalem latiusculam atram, non late distantes. Punctum album supra antennas nullum. Abdomen subovatum, cinereum, vix maculatum.

**203. *A. veterima*:** antennis medioeribus late cinereis, capite cano; ore fronteque prominentibus; alis albidis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto, squamis albis; *femina*: fronte lata, cana, lineis 2 antice coherentibus nigris. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ – $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Esperöd in duobus speciminibus lecta.

♀. Similis *Ar. lacteipenni* (200), a qua ore fronteque magis porrectis, alis paullo longioribus & angustioribus, ut & nervis

longit. 3 & 4 versus apicem leviter divergentibus, præcipue differt. Cana, immaculata, opaca. Oculi parvi, sat late remoti, vitta frontali nigra per maculam elongatam cinereum postice divisa. Palpi & antennæ nigrae, seta nuda, basi incrassata. Abdomen ovatum, pubescens. Alæ albæ, non vero lacteæ, nervis transversis non late remotis. Squamae ut in *lacteipenne*. Halteres flavi. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, parce pilosi.

††. Venter in ♂ fasciculatum pilosus.

204. *A. barbiventris*: antenuis breviuseulis validis nigricans, capite argenteo-micante; ore fronteque modice prominentibus; abdome vitta dorsali nigra; alis hyalinis, basi nigricantibus, nervis longitudinalibus 3 & 4 subparallelis, transverso ordinario obliquo, levissime flexo; squamis albidis; mas: oculis subcoherentibus, abdome subcylindrico, ano infexo nigro nitido, ventre longe piloso. ♂. (Long. 1½—2 lin.).

*Anthomyia barbiventris* Bohem. in litteris 1843.

Hab. in Lapponiæ Lulensis floribus Salieis ad Tjomotis, sed præprimis in planicie alpis Walli juxta maculas nivosas una cum *Ar. froutata* (64) ad Quickjock Jul. 1843 a Dominis *Wahlberg, Boheman & Andersson* inventa, mihiique in pluribus exemplis benigne communicata.

♂. Per ventrem barbatum ab omnibus sui generis mox dignota. De cetero *Ar. humerellæ* infra n:o 228 sat similis & affinis. Oculi mediocres per orbitas tenuissimas albas & vittam frontalem angustam atram leviter disjuncti. Antennæ nigrae, seta subnuda seu tenuissime puberula, basi graciliter incrassata. Epistoma infra oculos descendens, apice exsertum. Palpi subclavati, atri, pilosuli. Thorax dorso nigricans, lineis 3 nigris in fundo obscurò parum distinguendis; pilosus. Vitta humeralis cinerea. Abdomen subcylindricum, versus apicem paullo

coaretatum, totum nigricans, nitens, supra pilosum, certo situ obscure cinereo-micans, linea dorsali nigra. Venter niger, versus basin fasciculo gemino, denso, e pilis longis (fere ad apicem abdominis extensis), horizontalibus, atris, nitidis, conflato. Alæ hyalinæ, ima basi nigricantes. Nervus transv. ordinari. mox ante medium areæ insertus. Costæ segmentum 1:um ciliatum; spinula adest. Squamæ parvæ, sordide albidae, valvula superiore inferiorem fere omnino tegente. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, nitentes, distincte setosi. Pulvilli mediocres, albi.

*Obs.* Teste Cel *Wahlberg* est nostra *Ar. lucidiventris* n:o 168 femina ad *Ar. barbiventrem*.

*Tribus 2.* Minutæ, aut minutissimæ.

*Subd. 1:ma.* Frons non prominens.

a. Oculi in ♂ cohærentes, in ♀ distantes.

\*). Squamæ sub alis halteresque in utroque sexu albida.

*Manipulus 1:mus:* costa alarum nuda.

*Pugillus 1.* Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli.

α. Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem tegente.

**205. *A. triquetra:*** antennis mediocribus; abdome cinereo, singulo segmento punctis 3 nigris; nervis transversis approximatis, ordinario subperpendiculari, recto; pedibus piceo-nigris; *mas:* oculis arete cohærentibus, thorace atro, opaco, postice griseo, abdome oblongo, subcylindrico, punctis nigris majusculis, alis squamisque fuscanis, femoribus intermediis subtus, in medio, spinulis 2,

tibiis posticis intus biseriatim ciliatis; *femina*: vitta frontali lata, atra, thorace cinereo, abdomine ovato, punctis minutis, alis hyalinis, squamis albis. ♂♀. (Long. ♀ 1, ♂ 1½ lin.).

*Anthomyia* Wiedem. Zool. Mag. I. p. 85. ♂. Meig. Dipt. 5. 162. 139. ♂♀. & 7. 327. 26. Zett. Ins. Lapp. 685. 105. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 73. 80. ♂♀. *Musc. lepida* var.  $\beta$ . Fall. Muscid. p. 77 certe est etiam hujus femina.

Hab. in floribus, foliis fruticum, fenestris &c., a primo vere usque ad serum autumnum, per hortos, prata & nemora, in Scandinavia, vulgaris, in copula multoties observata; scilicet in Scania ubique copiose; in Smolandia & Ostrogothia frequens; in Gotlandia raro; in Jemtlandia passim, ex. gr. ad Faxelfven, Ristansfors, Skalstugan & ad radicem Åreskutan; in Norwegia ad Suul Wærdalæ in jugo alpino situm; in Lapponia meridionali rarissime; in Dania non raro, D. Staeger. (E Kilia a D. Wiedemann, & e Glogavia in utroque sexu a D. Zeller, communicata). Mares choreas ducentes Augusto saepe vidi.

♂♀. Caput cinereum. Antennæ & palpi nigra, seta subnuda. Nervi transversi approximati. Halteres plerumque flavi. Pedes simplices. *Mas*: oculis miniatis; thoracis limbo postico griseo. Scutellum nigrum, margine summo griseo. Abdomen pilosum, griseum (interdum in medio subpellucidum), segmento I:mo plerumque fere toto nigro, in singulo reliquorum segmentorum punctis nigris 3, medio oblongo 1. linearis, lateralibus rotundatis, discretis; fere in triangulum dispositis, interdum confluentibus, raro obsoletis. Anus parvus cinerens. Alæ totæ (basi intensius) fuscaneæ, iridicolores. Femora intermedia subtus, mox ante medium, setulis 2 1. 3, exterioribus minoribus. Tibiæ posticæ intus sat longe pilosæ. Pulvilli parvi. *Femina*: tota

cinerea. Oculi per orbitas frontales angustas cinereas, & vitram frontalem proportione latam, nigram, modice disjuncti. Abdominis puncta lateralia in segmentis 1, 2 & 3 plerumque parva, rotundata, linea dorsali media obsoleta. Pedes parce pilosi. Reliqua ut in diagnosi.

206. *A. Macquarti*: antennis longiusculis; abdomine cinereo, singulo segmento punctis 3 nigris; nervis transversis subapproximatis, ordinario subperpendiculari, recto; pedibus piceo-nigris; *mas*: oculis arte cohaerentibus, thorace atro, opaco, postice griseo, abdome oblongo, conico-cylindrico, punctis nigris majuseulis, alis squamisque brunnescensibus, femoribus intermediis subtus, in medio, spinula unica, tibiis posticis utrinque ciliatis. ♂♀ (Long. 2 lin.).

*Atomogaster Macquarti* Staeger in litt. 24. Oct. 1812. *Atomog. triquetra* Macq. Buff. 2. 329. 1. T. 17. f. 11. ♂. (excelsus, synonymis).

Hab. in Scandinavia meridionali minus frequens; scilicet in Sæania ad Abusa rarius, ipse; e Dania in 2 speciminiis sub nomine allato a D. Staeger communicata.

♂. Simillima priori; a qua tamen magnitudine fere duplo majori, antennis paullo longioribus, nervis transversis, nisi fallor, non-nihil magis remotis, abdome forte magis depresso, & præ-primis femoribus intermediis subtus in medio spinula tantum unica, ut & tibiis posticis & intus & extus longe pilosis, vere distincta. Pulvilli mediocres. Cetera omnia exacte ut in antecedente.

207. *A. Staegeri*: antennis longiusculis; abdome cinereo, singulo segmento punctis 3 nigris; nervis transversis approximatis, ordinario subperpendiculari, recto; pedibus piceo-nigris, tibiis anterioribus tarsisque inter-

mediis fusco-testaceis; *mas*: oculis arcte cohaerentibus, thorace atro, opaco, postice griseo, abdomine oblongo, subcylindrico, punctis nigris majusculis, alis squamisque brunnescensibus, femoribus intermediis subtus, in medio, spinula unica, tibiis posticis extus longe ciliatis. ♂. (Long. fere 2 lin.).

*Atomogaster tibialis* Staeger in litt. 24 Oct. 1842. (non Macquarti & Meigeni eadem). Sub *Musca triquetra* Fall. & forte etiam sub *Anth. triquetra* Meig. latet. *Anthomyza triquetra* Zett. Ins. Lapp. 685. 105. ♂. (Illud tantum specimen ad Wilhelmina captum).

Hab. in Scandinaviae fruticibus & floribus passim, etiam in fenestris, mihi 26 Jun.—Jul.—7 Sept. obvia; scilicet in Scania ad Esperöd & Fogelsång; in Ostrogothia ad Lärketorp & Wadstena; in Lapponia Umensi ad Wilhelmina rarissime; e Dania specimen masculum a nobil. D. Staeger communicatum.

♂. Priori iterum simillima; sed tibiis anterioribus totis tarsorumque intermediorum articulis 3 primis testaceis; ut & tibiis posticis in ♂ externe longe pilosis, mox differt. Reliqua ut in priori.

*Obs.* *Atomogaster tibialis* Macq. Buff. 2. 330. 4. ♂: "niger, thorace subcinereo; abdomine obscure griseo, maculis 4 nigris; tibiis antice rufescensibus; alis hyalinis  $1\frac{1}{2}$  lin. long.", *Anthom. tibialis* Macq. Buff. 2. 338. 22. ♂. seu Meigen Dipt. 7. 332. 74. ♂: "nigra, nitida; abdomine cinereo-nicante: linea dorsali incisurisque nigris, tibiis antice testaceis", ut & *Spilogaster tibialis* Macq. Buff. 2. 295. 5. seu *Hylemyia* eadem Meig. Dipt. 7. 321. 55. aliæ certe sunt species in Scandinavia vix obviae, mihi saltem ignotæ. Interea nomen *tibialis*, intra eandem familiam sæpius repetitum, ausam confusionis facile præbet, ergo in meliorem mutavi.

208. *A. serena*: antennis mediocribus nigra nitida, capite argenteo; alis subhyalinis, squamis albis, nervis transversis approximatis, perpendicularibus; pedibus simplicibus, pilosis, rufo-piceis; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine oblongo, depresso, maculatim subhyalinato; *femina*: oculis orbitis albis & vitta frontali mediocriter lata nigra disjunctis, abdomine ovato-oblongo, acuto, nigro, nitido. ♂♀. (Long. circit. 1—1½ lin.).

*Musca* Fall. Museid. 76. 88. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 200. 206. Zett. Ius. Lapp. 685. 108. ♂♀.

Hab. in umbrosis & graminosis, libenter locis humidis, etiam in floribus Sorbi &c., per totam Scandinaviam, 10 Jun.—20 Sept., omnium vulgatissima, in copula sæpe deprehensa; scilicet in Suecia tota & præsertim meridionali longe frequentissima; in Gotlandia ad Kyllej & Thorsborg; in Jemtlandia usque ad Åreskutan & Mullfjellen procedens, in regionem nivalem ascendens; in Angermanniæ ad Hernösand; in Lapponiis: Umensi ad Ume-näs, ipse, & Lulensi ad Quickjock, D. Andersson; in Norwegia ad Dovre, Alstahaug, Levanger, Näs, Thynäs & Sunl (in jugo alpino), passim copiosissima; in inferalpinis Nordlandiæ ex. gr. ad Björkvik & Giebostad etiam frequenter occurrens; in Dania, D. Dahlbom. — Mares tempore sereno choreas in umbra arborum dueunt. (E Glogavia a D. Zeller missa, & ad Hamburgum a D. Dahlbom lecta).

♂♀. Similis *Ar. scalaris* (189) & *tugenti* (192), sed a priori pedibus simplicibus, a posteriori corpore magis nitente, & ultraque magnitudine paullo minore, ut & squamarum valvula superiore inferiorem legente, abunde differt. Antennæ angustæ, cinereo-micantes, seta subnuda. Epistoma infra oculos mini-

me descendens. Palpi nigri. Nervus transv. ord. rectus. Halteres flavi. Pedes s<sup>æ</sup>pissime obscure rufescentes, pilosi, tibiis posticis tantum extus parce setosis, tarsis nigris. *Mas:* oculi magni, sat arte cohærentes, linea tenuissima, alba angustissime disjuneti. Alæ levissime fuscanae. Abdomen cinereo-nigricans, in mortua subcorrugatum; interdum rufescenti subpellucidum, certo situ supra in medio singuli segmenti macula trigona obscuriori. Pedum posticorum femora subtus ciliata, tibiae intus breviter puberulæ. *Femina:* tota nigra, nitida. Caput album, vitta frontali nigra, opaca, orbitis albis. Alæ albo-hyalinæ, nervis albidis. Orbitæ oculorum s<sup>æ</sup>pē detritæ sunt, & tunc nigræ (nec albæ), subnitidæ evadunt.

*Obs.* *Musca serena* var.  $\beta$ . ♀. Fall. l. c. ad *Ar. Trollii* infra n:o 224 perlinet.

*Obs.* Specimina Lapponica hujus speciei plerumque pedibus totis nigris & abdome non hyalinato gaudent, vix tamen specie differunt, nam in ceteris quadrant.

209. *A. lepida*: antennis medioeribus nigricans ( $\delta$ ), aut cinerea ( $\varphi$ ); capite albicante; alis subhyalinis, nervis transversis modice remotis, ordinario subobliquo, squamis albis; pedibus simplicibus, pilosis, pieco-nigris; *mas:* oculis cohærentibus, abdome linearis, depresso, cinereo, linea dorsali incisurisque nigris, ano nigro, nitido; *femina:* oculis per orbitas sat latas, cinereas, & vittam frontalem medioeriter latam, nigram, modice disjunctis, abdome ovato, immaculato.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{1}{4}$  sere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 76. 90.  $\delta\varphi$ . certissime. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 686. 110.  $\delta\varphi$ . (Vix *Anth. lepida* Meig. 5. 140. 101., quæ describitur: longitudine 3 linear., & seminæ puncto frontali antico albo, thoracisque lineis 4 obscuris, quæ notæ nostræ *lepidæ* non competit). *Anth. lepida* Meig. potius in vicinitate *Ar. incisuralæ* nob. (191) est quærenda).

Hab. in foliis fruticum, floribus Salicium, Umbellatum &c., per Scandinaviae hortos, prata & silvas, 16 Maj.—2 Sept., vulgatissima, in copula multoties inventa; scilicet in Scania ubique frequentissima; in Smolandia, Ostrogothia & Gotlandia, passim; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia usque ad Rätan, Åreskutan, Mullsjellet & Skalstugan, non rara; in Dalecarlia, D. *Bohemian*; in Bottnia boreali ad Selet (*Wahlberg*) & Haparanda; in Lapponiis: Umensi ad Lycksele, Åsele & Barrsele, & Lulensi ad Quickjock; in Dania D. *Staeger*; in Norwegia ad Alstabaug, Levanger, Thynäs, Garnäs & Suul Wärdaliæ, haud parce. (Ad Hamburgum a D. *Dahlbom* lecta).

$\sigma\varphi$ . Per magnitudinem parvam, frontem minime prominulam, squamarum valvulam superiorem inferiorem tegentem, & maris abdomen ut in *Ar. Radicum* (196) pictum, ab affinibus facile dignoscitur. Tota opaca. Nervi transversi recti, in  $\sigma$  magis approximati quam in  $\varphi$ . Squamæ albidae. Halteres pallidi. Tibiae posticæ extus parce pilosæ. *Mas*: oculi sat arete cohærentes. Thorax & scutellum nigra. Abdomen pilosum, glaucescens, linea dorsali integra, & segmentorum fascia basali plus minus distincta interdum obsoleta, nigris. Anus parvus, niger, nitidus. Alæ leviter fuscæ. *Femina*: oculi modice remoti. Tota griseo-cinerea, immaulata, interdum vestigio abdominis linea dorsalis fuscæ. Alæ hyalinæ. Vitta frontalis nigra, macula verticis grisea.

*Obs.* Specimen masculum hujus speciei sub nomine: "Musca lepida Fall. seu Anth. muscaria Meig." semel etiam a D. *Staeger* obtinui. An hæ eadem sunt? Cfr. *Ar. muscaria* nob. n:o 162. *Musca* vero *lepidæ* var.  $\beta$ . Fall. l. c.  $\varphi$ . "abdomine utrinque punctis 3 distantibus nigris" ad *Ar. trinquetram* nob. 205 certe referenda.

210. *A. lugubrina*: antennis breviuseulis nitida,

nigra (♂), aut cinerea (♀); capite albicante; alis subhyalinis, nervis transversis subapproximatis, ordinario subobliquo, squamis albis; *mas*: oculis cohaerentibus, abdome elliptico, nigro-glaueo, linea dorsali fasciisque nigris, ano aculeato, pedum intermediorum femoribus subtus pilosis tibiisque versus apicem subincrassatis intus ciliatis; *femina*: oculis per orbitas latae cinereas & vittam frontalem angustatam atram disjuntes, abdome ovato, nigricante, nitente. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 687. 115. ♂.

Hab. in floribus Salicis & foliis fruticum, per Scandinaviam borealem, 27 Jun.—30 Jul., passim, in copula capta; scilicet in Jemtlandia boreali ad Mullfjellet, Stalltjernstugan & Skalstugan, non raro; in Lapponia Umensi ad Lycksele pareissime; in Lapponia Tornensi ad Juckasjervi semel; in Norwegia ad Alstabaug & Suul in jugo alpino, passim, atque in inferalpinis Nordlandiae ad Björkvik, rarissime.

♂♀. Similis *Ar. mutice* 194, & *serenae* 208, sed ab illa corpore subnitido, nee opaco, nervo transv. ordin. subobliquo, nee subperpendiculari, valvulis squamarum subæqualibus 1. superiore inferiorem fere tegente; & ab hac magnitudine paulo majore, nervo transv. ord. subobliquo, ut & maris abdome nonnihil latiore, minime pellucente, pedibus nigroribus, intermediorum structura & pubescentia, satis superque dignota. Antennæ mediocres 1. breviuscule, seta subnuda, basi graciliter incrassata. Os infra oculos non prominens. Palpi retracti, nigri. Squamæ sub alis parvæ, albide, valvula superiore inferiorem vix tota tegente. Halteres flavidæ 1. lividi. Polvilli parvi. *Mas*: linea frontali angustissima, nigra, tota ab antennis ad occiput sat dense pilosa. Thorax subnitens. Abdomen late ellipticum. pilosum, nitidum, plumbeum, linea dorsali subinter-

rupta, & in medio singuli segmenti macula ad marginem posticum, nigris; totum depresso, in mortua supra subinæquale. Ante tuberculum parvum inflexum nigrum, apice aculeo inlæxo nigro. Ala leviter fuscane. Pedes pilosi; intermedii: femoribus validis, apice subcoaretatis nudis, subtus totis sat longe nigro-ciliatis, tibiis a medio ad apicem subincrassatis, intus pube brevi erecta dense vestitis; postici graciliores, femoribus versus apicem utrinque ciliatis, tibiis intus nudis, extus longe, sed parce setosis. *Femina:* oculis modice remotis, orbitis cinereis proportione latis, vitta media atra proportione angusta. Thorax obscure cinereus. Abdomen ovatum, subcon vexum, acutum, depresso-pubescent, nigricans, nitidum. Ala hyalinæ, basi albicantes. Pedes simplices, pilosi.

**211. *A. inermella:*** antennis brevissimis obscure cinerea, immaculata, opaca, capite albido, macula frontali supra antenas lunata fulva; alis squamisque albis, nervo transverso ordinario perpendiculari; *femina:* oculis sat late remotis, ab domine ovato, subnitido. ♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; mihi a D. *Deutsch* in uno specimine missa.

♀. Per colorem corporis obscure cinereum, maculam frontalem lunatam fulvam, antenas brevissimas & alas albas, ab affinis dignoscitur. Frons minime prominens. Orbitæ oculorum angustæ, cinereæ. Vitta frontalis latiuscula, nigricans. Palpi minuti. Thorax subgibbus. Abdomen ovatum, subdepressum, nudiusculum, nigricans, nitens. Nervi longitudinales 3 & 4 sat late distantes, transversi modice remoti. Squamae parvæ, valvula superiore inferiorem omnino tegente. Halteres pallide flavi. Pedes validiusculi, nigri, parce setulosi. — Cum *Ar. Trollii* 224 non confundenda. Ab *Ar. lepidu*, 209, antennis brevioribus &c. differt.

**212. *A. latifrons:*** antennis brevissimis cinerea immaculata, opaca, capite canescente, macula supra anten-

nas subquadrata ferruginea ( $\textcircled{F}$ ); alis cinereo-hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, squamis albis; *femina*: oculis sat late remotis, abdomine ovato, subnitido.  $\textcircled{F}$ . (Long. 1 lin.).

Wahlberg in litt. 1813.

Hab. in Ostrogothia ad Gusum forte rarissime; a D. *Wahlberg* detecta mihiique in uno specimine communicata.

$\textcircled{F}$ . Affinis & similis priori, a qua vero magnitudine minore, colore corporis latius cinereo fere in griseum vergente, oculis rotundioribus, fronte leviter prominula, orbitis oculorum cinereis latioribus, vitta frontali angustiore, anticeque subquadratim flava, ut & alis non albidis, facile dignoscitur. Punctum verticis cinereum. Antennarum seta nuda, basi iucrassata. Abdomen obscurum, parum depresso, nitens. Alae praesertim ad costam leviter fuscanæ, basi dilutiores. Nervus costalis niger. Nervi transversi modice remoti. Squamæ minutæ. Halteres flavo-albi. Pedes nigri, parce pilosi. Antennis brevioribus &c. ab *Ar. lepida* 209, dignota.

213. *A. stigmatella*: antennis mediocribus nigra opaca, capite albicante; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, squamis albidis; *mas*: oculis coherentibus, abdomine lineari, depresso, cinereo, linea dorsali punctisque in singulo segmento duobus, nigris. ♂. (Long. 1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Lund a Stud. D. *Ingem. Pettersson* Jul. 1812 semel inventa.

$\textcircled{M}$ . Similis videtur *Anth. stigmatica* Meig. Dipt. 5. 167. 147. ♂., sed præter magnitudinem minorem differt etiam abdomine lineari, nec elliptico, incisuris non nigris, punto supra antenas albo nullo, ut & alarum basi magis obscura quam flava.

Oculi magni, arete cohærentes. Frons minime prominula. Antennæ subangustæ, nigræ, seta subnuda. Palpi mediocre, atri. Thorax vix vittatus. Pleuræ cinerascenti nigræ. Abdomen angustum, pilosum, cinereum.

**214. *A. Macula:*** antennis medioeribus cinerea, opaca, capite caescente, macula supra antenas flava; (♀); thorace lineis 3 brunneis; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, squamis albis; *femina:* oculis sat late remotis, abdome oblongo, acuto. ♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Sueciae pratis 24 Jun.—16 Jul., minus frequens; scilicet in Gotlandia ad Öja & Gothem, rarissime; in Jemtlandia ad Åreskutan & Skalstugan, parce.

♀. Similis *Ar. inermella* 211, & *latifronti* 212, sed a priori alis cinereo hyalinis, fronte leviter prominula, a posteriori magnitudine paullo majore, & ab utraque, antennis paullo longioribus, thorace lineis 3 dilute brunneis, ut & abdome hand nitido, recedit.

**215. *A. parvicornis:*** antennis brevissimis cinerea, immaculata, opaca, capite caescente; abdome nigro, nitido; alis hyalinis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, squamis albis; *femina:* oculis sat late remotis, abdome ovato, acuto. ♀. (Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.).

Hab. in Gotlandia rarissime; specimen descriptum in prato ad Öja 7 Jul. 1841 inveni.

♀. Similis *Ar. brevicorni* 146, & *seminitida* 183, sed ab illa ore fronteque hand prominentibus, ab hac antennis brevioribus, & costa magis nuda, & ab utraque, magnitudine paullo minore, dignoscitur. Ab *inermella* 211, cui etiam similis, fronte non flavo-maculata differt.

♂. Squamæ mediocre, valvula superiore inferiore non tegente.

**216.** *A. albicincta*: antennis breviusculis atra (♂), aut cinerea (♀); opaca, capite albicante; alis hyalinis, squamis albis, nervis transversis sulcatis approximatis, ordinario subperpendiculari; *mas*: oculis arete cohærentibus, abdome elliptico, fasciis tridentatis atris; *femina*: oculis remotis, abdome ovato, griseo, punctis in basi singuli segmenti tribus nigris. ♂♀. (Long. circiter  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 73. 81. ♂♀. *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 161. 138. ♂♀, & 7. 327. 28. Macq. Buff. 2. 338. 20. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 685. 106. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum & floribus Umbellatarum &c., per hortos & prata Scandinaviae, 2 Jul.—26 Aug., passim, in copula etiam aliquoties deprehensa; scilicet in Scania ad Esperöd, Lund, & Fogelsång, non raro; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Wadstena, Gusum (in floribus Angelicæ sylvestris) &c., haud parce; in Gotllandia ad Nähr, Gothem, Hoburg &c., sat frequens; in Westrogothia, D. *Dalman*; in Lapponia Umensi ad Lycksele, rarissime.

♂♀. Similis & affinis *Ar. pluviali* 173, & *praticolæ* 174, sed in variis diversa ut ex comparatione pateat. Antennæ nigrae, seta tenuissime puberula. Palpi subfiliformes, nigri. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, mediocriter pilosi. *Mas*: oculi magni. Thorax ater, humeris cinerascentibus; postice maculis 2 albis. Scutellum atrum. Metathorax canus, linea media nigra. Abdomen depresso, pilosum, albidum, singulo segmento fascia basali tridentata, atra. Anus parvus, cinereus. Alarum squamæ valvula superiore inferiorem non tegente. Alæ interdum leviter fuscaneæ ut in var.  $\beta$ . *Femina*: tota lâte cinerea. Oculi non late remoti, per orbitas angustas cinereas & vittam frontalem latiusculam nigram, sejuncti. Thorax lineis 3 dilute

brunneis, media plerumque distincta. Abdominis fasciæ ut in ♂, sed singula e maculis 3 trigonis majoribus aut minoribus, basi plus minus cohærentibus, interdum discretis, constat. Alæ hyalinæ, squamis ut in ♂.

*Pugillus* 2. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes.

217. *A. aërea*: antennis mediocribus atra (♂), aut cinerea (♀); capite albicante; nervis transversis subapproximatis, perpendicularibus, squamis albidis; abdomine ovato; *mas*: oculis cohærentibus, abdominis ineisuris tenuissime cinereis, alis fuscaneis, basi nigricantibus; *femina*: oculis remotis, vitta frontali modice lata atra, macula oblonga nigra nitidissima inscripta, abdomine griseo, subnitente, alis hyalinis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca aërea* Fall. Museid. 76. 89. ♂♀. originaria. *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 686. 109. ♂♀. ad partem (exclus. syn. Meigeni, quod ad *Ar. æream* 220 pertinet).

Hab. in foliis fruticum & floribus Umbellatarum, per hortos & prata Scandinaviae, etiam in litoribus marinis, 4 Jul.—29 Aug., passim, in copula capta; scilicet in Scania ad Esperöd &c., non rara; in Jemtlandia ad Skalstugan, parce; in Lapponia Lulensi ad Quickjock ♀, D. *Bohemian*; uterque sexus in Norwegia ad Thynæs. (E Glogavia ♀ a D. Zeller missa).

♂♀. *Ar. 7-notatæ*, 80, valde similis, sed nigredine abdominis in ♂ totum dorsum tegente, nec in maculas dilatatas digesta, dignota, ut & ♀ Jonge diversa. Frons & os leviter prominentia. Antennæ nigrae, seta subnuda. Palpi subfiliformes, nigri. Squamæ sub alis mediocre, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes simplices, subpilosæ, nigri. *Mas*: oculi magni, non arctissime cohærentes, linea tenuissima

nigra disjuncti. Thorax & scutellum atra, opaca. Abdomen rotundato-ovalum, parum convexum, pilosum, atrum, opacum, incisuris angustissime cinereis. Summus margo posticus etiam cinereo-micat, sed vix maculae laterales cinereæ distinctæ. In speciminiibus mortuis linea dorsalis tenuissima cinerea segmentum 3:ium transit. Alæ basi nigricantes. Squamæ sordide albidae, sed vix brunnescentes. *Femina:* cinereo-grisea, opaca. Orbitæ oculorum proportione sat latæ, cinereæ. Vitta frontalis modice lata nigra, macula media oblonga antice attenuata & fere ad antennas extensa, nigra, polita ornata. Abdomen ovatum, subconvexum, breviter pubescens, griseum, immaculatum, subnitens. Alæ cinereo-hyalinæ, squamis albidis. — In specimen Quickjockensi nervus transv. ordinar. leviter flexus; alias non discrepat. Sub specie Fallenia etiam *Ar. ærea*, 220, & *aterrima*, 221, latent. — Femina cum ♀ *Ar. occultæ* 95, non confundi debet.

218. *A. globuliventris:* antennis mediocribus atra, nitidissima, capite albido; pleuris abdominisque orbiculati basi albo-squamosis; alis hyaliinis, squamis albis, nervis transversis non late remotis, perpendicularibus; *femina:* oculis modice distantibus, vitta frontali nigra. ♀. (Long.  $\frac{3}{4}$  fere 1 lin.).

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; ad villam Esperöd in paroecia Mellby Scaniæ australis specimen unicum meuse Julio ante plures annos inveni; e Dania in Dyrhaven 31 Jul. 1842 capta sub nomine: "Coenos. nigra Meig. Coen. palustris Macq." nuper etiam a D. Staeger missa. (Individuum unicum ad Travemünde d. 1 Jul. 1838 quoque legit oculatissimus Dahlbom; & exemplum unicum sine synonymia e Silesia etiam communicavit D. Zeller).

♀. Minuta. Per corpus atrum, nitidissimum, glabriculum s. parce setosum, abdominis formam, pectoris abdominisque baseos al-

bedinem, ab omnibus aliis *Ariciis* facillime dignota. Forte novi generis? Frons non prominens. Oculi sat magni, oblongi, non late remoti. Orbitæ oculorum tennes, albidae. Vitta frontalis latiuscula, nigra, opaca. Epistomatis albidi apex antice leviter reflexus. Antennæ subangustatae, nigrae, seta subnuda, basi graciliter incrassata. Palpi breves, subfiliformes, nigri. Abdomen rotundatum, supra convexum, subitus planum, apice breviter acutum, totum atrum, nitidissimum, segmento 1:mo basi macula laterali cana, opaca (in specimine Silesiaco imprimis perspicua). Alæ albo-hyalinæ. Nervi longit. 3 & 4 fere paralleli, versus apicem tantum leviter divergentes; transversi modice remoti, perpendicularares, recti, sed horum medius ante medium alæ retractus, & ordinarius sat longe a margine interiore remotus. Nervi omnes tenues. Squamæ proportione medioeres, albæ, ciliatae, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Pedes medioeres, simplices nigri, nitidi.

*Obs.* An *Coenosia nigra* Meig. Dipt. 5. 216. 12.? Color autem corporis niger nitidissimus, pleuræ cinereæ, & epistoma maculaque ad abdominis basin, sunt majoris momenti notæ, quam ut silentio omnino pateriri debuissent, si identica fuisset. Tunc *Coen. atra* Meig. Dipt. 6. 377. 29. ♂. nostræ *globuliventri* propior mihi videtur, licet etiam dubium de ejus identitate in omissa commemoratione abdominis maculae albæ satis distinctæ, maneat.

*Manipulus 2:dus.* Costa alarum breviter ciliata.

**219.** *A. parvula*: antennis medioeribus cinerea, immaculata, opaca, capite albicante; alis hyalinis, nervis transversis subapproximatis, subperpendicularibus, infuscatis, costa leviter ciliata, spinula parva, squamis albis, antennarum seta pubescente; *mas*: oculis coherentibus, abdome subcylindrico, ano cinereo; *femina*: oculis late remotis, vitta frontali modice lata, nigra, abdome conico. ♂♀ (Long. 1—1 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 75. 85. ♂♀. vera. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 200. 205.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; in Scaniæ silva Esperödensi a Cel. *Fallén* detecta; deinde, & eodem loco, & simul in littore maris ad Raflunla prope eundem Esperöd d. 18—30 Jul. in utroque sexu etiam a me lecta. — In Gotlandia semel quoque inventa erit.

♂♀. Valde similis & affinis *Ar. pullulæ* 60, & *longulæ* 179; sed a priori nervo transverso ord. forte paullo magis perpendiculari & omnino recto, atque maris ano obtuso, cinereo, opaco, nec nigro nitido; a posteriori magnitudine minori & feminæ macula frontali nulla l. obsoleta; & ab utraque corpore immaculato, differre videtur. Frons leviter prominens. Antennæ nigrae. Palpi breves, subclavati, nigri. Ale cinereo-hyalinae. Nervi long. 3 & 4 paralleli. Costæ segmentum I:um ciliatum. Spinula adest. Squamæ parvæ, albæ, valvulis æquilibus. Halteres flavo-albidi. Pedes simplices, pilosi, nigri l. pieci.

\*\*). Squamæ sub alis halteresque in mare saltem nigricantia, illæ sapissime, hi interdum in femina, albida.

220. *A. ærea*: antennis medioeribus atra (♂), aut nigricans (♀); capite albicante; nervis transversis approximatis, perpendicularibus; *mas*: opacus, scutello anoque nitentibus, oculis arete coherentibus, abdomine elliptico, plano, nigro, maculis lateralibus cinerascentibus, alis fuscanis, squamis halteribusque nigricantibus; *femina*: nitens, oculis medioeriter remotis, fronte cinerea, vitta modice lata, cano-micante, abdomine anguste ovato, acuto, alis hyalinis, squamis halteribusque albis. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 157. 131. ♂♀. & 7. 326. 11.  
*Musca aërea* Fall. Muscid. 76. 89. variet. in descript.—  
*Anthomyza aërea* Zett. Ins. Lapp. 686. 109. ♂. specimen  
 Lyckselense.

Hab. in Scandinaviae fruticibus & floribus, Jul. Aug.,  
 passim, in copula pluries deprehensa; scilicet in Scania  
 ad utrumque Esperöd (& in paroecia Mellby & in paroecia  
 Tranås), non rara; in Ostrogothia ad Wadstena, paree;  
 in Norwegia ad Alstahaug prope Levanger in paroecia  
 Skogn bis capta.

♂♀. Similis *Ar. triquetrae* 205, & *aëreæ* 217, sed ab illa abdo-  
 minis pictura, & ab hac magnitudine nonnihil minore, nervis  
 long. 3 & 4 parallelis, maris squamis halteribusque, nigris, nec  
 albidis, & femina vitta frontali cana, nec nigra nitida, præcipue  
 differt. Frons & os minime prominula. Antennæ nigro-cine-  
 reæ, seta nuda. Palpi nigri. Alarum costa nuda, ima basi ci-  
 liata. Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem tegente.  
 Pedes simplices, nigri, pilosuli. *Mas:* totus ater, epistomate  
 albicante. Thorax postice nitens. Scutellum etiam certo situ  
 nitet. Abdomen disco opacum, limbo subnitens, totum ples-  
 trumque nigrum, incisuris tenuiter, & maculis lateralibus sub-  
 trigonis, cinereis; vel si mavis cinerascens, segmento singulo  
 macula fasciformi magna, nigra. Ani tuberculum nigrum, nitidum.  
*Femina:* tota nigra, levissime cinereo-micans, nitens.  
 Frons cinerea, vitta certo situ albo-1. plumbeo-micante.

*Obs.* In museo Falleni specimina hujus speciei cum *A. aërea*  
 mixta occurunt.

221. *A. aterrima:* antennis breviusculis opaca, atra  
 (♂), aut cinerea (♀); capite obscure cinerascente; nervis  
 approximatis, perpendicularibus; *mas:* oculis arete cohæ-  
 rentibus, abdomine elliptico, plano, incisuris tenuissime  
 cinereis, alis brunnescentibus, squamis halteribusque nigris.

cautibus; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula nigra, abdome ovato, maculis in segmento singulo tribus nigris, alis hyalinis, squamis halteribusque albidis. ♂♀. (Long. circiter 1 lin.).

*Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 157. 130. ♂. & 7. 326.  
8. *Chortophila* eadem Macq. Buff. 2. 327. 13? ♂. —  
*Musca aërea* Fall. Muscid 76. 89. variet.

Hab. in Scandinavia meridionali, 10 Jul.—15 Aug. rarius, etiam semel in copula capta; scilicet in Scania ad Fogelsång, Esperöd (& in paroecia Mellby & Tranås), &c., minus frequens; e Dania a D. Staeger sub nomine: *Chortoph. aterrima* Macq., & altera vice sub nomine: *Anthom. aërea* (aërea) Fall. Zett. Ins. Lapp. *Anth. aterrima* Meig." individua 2 mascula mihi communicata.

♂♀. Simillima priori, a qua magnitudine nonnihil minore, maris corpore toto intensius atro, holosericeo, opaco (nec thorace postire nitente), abdome subangustiore, tantum incisuris (seu lineis 3 transversis angustissimis) tenuissime cinereis, ano minore, opaco, nec nitente, alis paullo fuscoribus, fere brunneoscentibus, ut & feminæ corpore non nitente, vitta frontali latiori, atra (nec cano induta), macula tantum verticis cinerea, & abdome fere ut in feminæ *Anth. triquetrae* 205 picto, satis superque dignoscitur. Oculi in viva in utroque sexu obscure ferruginei. Pedes interdum obscure rufescentes l. pieci.

Var. b. ♂. alis hyalinis, de cetero in omni puncto varietati a. simillima; an juvenilis? In Ostrogothia ad Fredensborg prope Wadstena 10 Jun. 1840 in uno specimine a D. Dahlbom lecta.

222. *A. melanaria*: antennis longiusculis, nigra, nitida, pilosa, capite obscure ciuereo; alis hyalinis, nervis transversis modice remotis perpendicularibus, squa-

mis parvis halteribusque nigris; *femina*: oculis subap-proximatis, interstitio nigro. ♀. (Long. 1 lin.).

Hab. in Norwegia rarissime; ad Alstahaug prope Levanger in paroecia Skogn, d. 8 Jul. 1840 specimen unicum inveni. (E Glogavia a D. Zeller etiam in uno exemplo missa).

♀. Ab *Ar. occulta* 95, cui subsimilis, differt: magnitudine multo minore, colore intensius nigro, magis nitido, squamis multo minoribus, nigris, valvulis æqualibus, antennis nonnihil longioribus, oculis multo minus distantibus, ut & fronte subangusta-ta, nigra opaca. Abdomen ovatum, parum aentum. Alæ basi subfuscaneæ.

b. Oculi in utroque sexu remoti. (*Coenosia* Anet.).

223. *A. agromyzina*: antennis elongatis cinerea, immaculata, opaca, fronte nigra, epistomate albo; alis hyalinis, nervis transversis fere ante medium alæ approxi-matis, perpendicularibus, rectis. ♂♀. (Long.  $\frac{3}{4}$ —1 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 71. 84. ♂♀ typica. — *Anthomyia* Meig. Dipt. 5. 199. 201.

Hab. in Scandinavia meridionali & media, rarius; in Scania tamen in litore maris ad villam Esperöd a D. Fallén sat frequenter lecta; in soliis Alni ad eandem villam specimina utriusque sexus 15—25 Sept. ipse etiam legi; in Ostrogothia ad Gusum, & in Uplandia ad Hol-miam, a D. Wahlberg quoque deprehensa erit; ex Hafnia specimen femineum a D. Staeger missum.

♂♀. Antennis elongatis, angustis, epistomate subcoaretato, albo, corpore cinereo, nervis transversis in disco approximatis & oculis in utroque sexu distantibus, ab aliis affinibus mox

dignoscitur. Oculi magni, oblongi, non late remoti, fronte atra, opaca, macula verticis cinerea. Antennæ (præsertim in ♂) longitudine epistomatis, nigrae, seta nuda. Frons & os antice minime prominentia. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; transversus ordin. longe a margine remotus; nervi ad marginem interiorem obsolescunt. Costa omnino nuda. Squamæ minutæ, albæ, valvulis æqualibus. Halteres pallidi. Pedes simplices, nigri, saltem tibiis plerumque obscure rufescensibus. *Mas*: ab domine subcylindrico, ano rotundato; *femina*: obscura, ab domine anguste ovato, nitente.

224. *A. Trollii*: antennis breviusculis obscure cinerea, immaculata, subopaca, fronte nigra, lunula supra antennas fulva, orbita oculorum & epistomate albis; alis albo-hyalinis, nervis transversis modice remotis, perpendicularibus, rectis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca serena* var.  $\beta$ . ♀. Fall. Muscid. 76. 88.

Hab. in floribus Trollii europæi, intra corollam occulta, 20 Maj—24 Jun., in Scania ad Lund certis annis copiose, in copula sæpe lecta, nec alibi inveni. Ova oblonga, proportione magna, alba, 30 Maj. parientem vidi. In unoquoque flore sæpe 5—15 individua in societate periuntur.

♂♀. A priori, cui subsimilis, differt: magnitudine paullo majore, antennis in primis in mare multo brevioribus, macula supra antennas lunulata, fulva, in ♂ minuta, in ♀ plerumque perspicua, alis albidioribus, nervis transversis præprimis in ♀ paullo remotioribus, ut & longitudinalibus 3 & 4 parallelis. Frons etiam nonnihil latior, quam in præcedente, & abdomen in ♂ forte minus cylindricum. Anus in ♂ rotundatus, inflexus, niger, appendicibus 2 parvis ventralibus sussultus. Abdomen in ♀ ovatum, obscurum, nitens. Palpi parvi, nigri. — Affinis & similis *Ar. inermellæ* n:o 211.

225. *A. albatarsis*: antennis mediocribus cinereæ, immaculata, opaca, fronte nigra, orbita oculorum & epistomate albis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis modice remotis, perpendicularibus, rectis; *mas*: tarsorum anticorum articulis 3 basalibus albis. ♂♀. (Long. circiter 1 lin.).

Hab. in pratis Gotlandiae rarissime; ad Stenkyrka 30 Jul. 1841 uterque sexus captus.

♂♀. Magnitudo & corporis color ut in *Ar. agromyzina* 223, nervi transversi ut in *Ar. Trollii*. Frons leviter prominens. Oculi non magni, rotundati, modice remoti, vitta frontali modice lata, nigra, immaculata, opaca. Orbita oculorum & epistoma argenteo-micantia. Palpi nigri. Antennæ mediocriter longæ, latinsculæ, nigrae, seta subnuda. Abdomen in ♂ cylindricum, ano rotundato, cinereo, ventre tuberculis 2 parvis, nigris versus anum appendiculato; in ♀ conicum. Aleæ cinereo-hyalinæ, in ♂ leviter subfuscaneæ, basi in utroque sexu albidae, nervis longit. 3 & 4 parallelis. Squamæ & halteres ut in *agromyzina*. Pedes simplices, nigri, pilosuli, articulis 3 primis tarsorum anticorum in ♂ albis. Pulvilli parvi. — Cfr. *Anthomyza albimana* n:o 106, que huic valde similis videtur; an eadem?

*Subd. 2:da.* Frons prominens.

a. Nervi longitudinales 3 & 4 parallelis.

\*). Costa alarum nuda.

226. *A. albula*: antennis breviusculis cana, subimmaculata, opaca, capite subfuscato, albo; alis squamisque albis, nervo transverso ordinario subperpendiculari, recto; *mas*: oculis subcohaerentibus, abdomine coaretato, subdepresso; *femina*: oculis modice remotis, macula frontali flava, abdomine ovato. ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 71. 83. ♂♀. genuina. — (*Anth. albula* Meig. Dipt. 5. 102. 35 non est *Musca* eadem Falleni, sed est *Musca buccata* Fall., cuius femina ad *Aricium albescentem* nob. n:o 130 pertinet).

Hab. in Suecia meridionali & media rarissime; in Scania in horto Esperödensi a D. *Fallén*, & in Westrogothia a D. *Gyllenhal*, inventa.

♂♀. Similis *Ar. arenosæ* n:o 121, sed duplo minor & alatum costa magis nuda & inermi, differre videtur. Antennæ breviusculæ, validæ, nigrae, seta nuda, ima basi incrassata. Palpi nigri. Alæ albæ, nervis transversis modice distantibus. Squamæ parvæ, ciliatæ, albæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albi. Pedes simplices, nigri, cinereo-micantes, mediocriter pilosi, tibiis interdum, & geniculis summis plerunque, obscure ferruginantibus. *Mas:* frons & facies longe prominentes. Epistoma infra oculos descendens. Oculi oblongi, per orbitam elevatam albam non late disjuncti, linea frontali temui, fusca, tantum supra antenas observanda. Abdomen lineare, subdepressum, ad latera præsertim pilosum, totum cinereum, linea dorsali fusca plus minus perspicua. Anus inflexus, cinereus, opacus, appendicibus 2 parvis ventralibus sussultus. *Femina:* frons nonnihil minus prominens. Oculi minores, per orbitas sat latas, & vittam frontalem modice latam, fuscam, antice flavam, sejuneti. Abdomen ovatum, cinereum, subimmaculatum, parum pilosum.

*Obs.* Hanc speciem in copula deprehendere frustra quæsivi. Mihi igitur tantum verisimiliter est feminam allatam ad marem descriptum pertinere.

227. *A. cinerella*: antennis mediocribus obscure cinerea, opaca, capite argenteo-micante; ore fronteque subprominentibus; alis cinereo-hyalinis, nervis pallescentibus, transverso ordinario subobliquo, recto, squamis albis; *mas:* oculis cohærentibus, abdome subcylindrico,

linea dorsali interrupta, nigra, anō inflexo, cinereo; *femina*: oculis remotis, macula frontali flavā, abdōmine conico, subimmaculato. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 77. 91. ♂♀. vera. — *Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 686. III. ♂♀. (Vix *Anthomyia* eadem Meig. Dipt. 5. 100. 30).

Hab. in floribus præsertim Umbellatarum, per Scandinaviam, 1 Jun.—25 Sept., passim frequens; locis & aridis & humidis mihi quoque obvia; in copula aliquoties deprehensa; scilicet in Scania frequens; in Gotlandia ad Ruthe & Hoburg; in Ostrogothia ad Gusum & in Uplandia ad Holmiam, teste D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Åreskutan, raro; in Botniæ borealis floribus Salicis ad Haparanda verno tempore lecta; in foliis Betulæ albæ ad Lycksele & Stensele Lapponiæ Umensis, rarius; in Dania, D. *Staeger*.

♂♀. Per colorem corporis obscure cinereum, os & frontem non longe prominula, alas cinereo-hyalinas, nervos subtenues subferrugineos, nec nigros, transversum ordinarium saltem in ♂ subobliquum, costam nudam, maris oculos postice cohærentes, abdomen conico-cylindricum, linea dorsali interrupta, nigra, anum inflexum cinereum, ut & feminæ orbitas oculorum proportione latas, cinereas, villam frontalem modice latam, nigram, antice flavam ut & abdomen oblongum, acutum, vestigio lineæ dorsalis fuscæ, ab *Ar. longula* (179), & aliis affinibus similibusque, non quidem sine difficultate, certe tamen dignoscitur. Antennæ nigrae, seta subnuda. Palpi subsiliformes, nigri. Squamae, halteres & pedes ut in priori. In feminæ thoracis dorso sœpe vestigium lineolæ mediae dilute brunneæ. Femina similis *Ar. radicum*, 196, sed minor. Costa in ♀ brevissime subciliata.

*Obs.* *Auth. cinerella* Meig. I. c. § Ejusdem *Hylemyia cinerella* "alīs flavicantibus, seta antennarum breviter plumata.

alarum costa spinula nulla", ut & abdomine maris magis cylindrico quam "depresso", differt.

*Obs.* "Musca cinerella var.  $\beta.$  ♂♀." Fall. I. c. ad *Ar. humerella* nob. 228 pertinet.

228. *A. humerella*: antennis breviusculis nigricans ( $\delta$ ), aut cineraceens ( $\varphi$ ); capite albido; ore fronteque modice prominentibus; alis hyalinis, basi fuscanis, nervis: costali & longitudinali 1:mo crassiusculis, atris, ordinario subobliquo, recto; squamis albis; *mas*: oculis cohærentibus, pleuris cinereis, abdomine lineari, subdepresso, piloso, obscure cinereo, vitta dorsali nigra, apice subincrasato, auo inflexo, cinereo-micante; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula nigra, antice interdum anguste flava, abdomine ovato, subnitente, ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 686. 113. ♂♀. *Musca cinerella* var.  $\beta.$  ♂♀. Fall. Museid. 77. 91.

Hab. in floribus; etiam in foliis fruticum Salicis, Betulae &c., per Scandinaviam, 2 Jun.—28 Sept., vulgaris, in copula pluries capta; scilicet in Scania ubique frequentissima; in Smolandia, D. *Ljungb.* in Ostrogothia parce; in Gotlandia ad Östergarn, Nähr, Furillen, Hoburg &c.; in Dalecarlia ad Rörshyttan; in Jemtlandia ad Åreskutan & Mullfjellet usque ad Skalstugan, sat copiose; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Umenäs, passim; in Lapponia Lulensi ad Quickjoek, D. *Andersson*; in Norwegia ad Alstahaug, Thynæs, Suul Wærdaliæ, valde frequens, & in Nordlandia ad Björkvik, rarius; in Dania, D. *Dahlbom*. (In Germania ad Gryphian, Eldenam & Neuenkirchen jam mense Majo a Cel. *Dahlbom* inventa; & e Glogavia a D. *Zeller* quoque missa).

*♂♀.* Per antennas parvas, breves, frontem paullo, & oris marginem anticum distincte, prominentia, epistoma breve, retusum, alas basi plus minus fuscana, nervos: costalem & longitudinalem 1:imum suberassiores, atros, longitudinales 3 & 4 parallelos, transversum ordinarium paullo ante medium areæ insertum subobliquum rectum, squamas albas ciliatas, valvulis subæqualibus, maris caput supra subdepressum L. anterius declivum & abdomen lineare, subplanum, ut & feminæ vittam frontalem latiusculam atram, & abdomen ovatum subnitens, ab affinis dignoscitur. Antennæ nigrae, seta puberula. Tuberculum intra antennas cinereum. Palpi breves, subfiliformes, nigri, pilosi. Hanstellum elongatum, proboscide reflexa. Costa nuda & spinula nulla. Valvula squamarum superior inferiorem fere tegens. Halteres albidi. Pedes simplices, nigri, pilosi. *Mas:* oculi postice arce cohærentes. Frons antice triangula, macula supra antennas nigra, interdum ferruginea. Thorax nigricans, pleuris schistaceis, & in illæsis individuis macula humerali albescente. Abdomen cinereum, lineare, modice latum, in mortuis plerumque corrugatum, vitta dorsali, per incisuras quasi interrupta maculiformi, nigra. Anus non magnus, intlexus, cinereus; at apex abdominis saepe niger, nitidus. Pulvilli perspicui, albi. *Femina:* caput rotundatum, oculis rotundatis, orbitis cinereis. Macula supra antennas lunulata flavâ saepe adest. Palpi subelavati. Thorax cinereus, disco dorsali plerumque leviter fusco, humeris dilutioribus. Abdomen plus minus nitens. Pulvilli minutti. — Ab *Ar. transversali* 149, antennis brevioribus mox dignota.

Variat magnitudine, variat etiam colore plus minus intense nigro. Specimina Lapponica plerumque majora & obscuriora & præprimis alæ maris leviter fuscanae. Alæ in exemplis Scandinaviae inferioris sapissime hyalinæ, basi tantum fusciores, vix tamen specie diversis, nam in ceteris exacte congruunt. — Ab *Ar. intersecta*, 161, cui quoque similis, magnitudine paullo minorre, nervo transv. ord. minus oblique flexo, ut & pedibus nigris, nec piceis, hæc species differt.

**229.** *A. morionella*: antennis mediocribus tota atra, pilosa, capite obscurè cinereo; ore fronteque minus prominentibus; alis fuscaneis, basi obscurioribus, nervo transverso ordinario obliquo, subrecto; squamis sordide albidis; *mas*: oculis cohærentibus, abdome sublineari, subdepresso. ♂. (Long. circiter  $1\frac{1}{4}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 687. 114. ♂.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; in alpe Brattiksfjell 8 Jul. 1832 unicum exemplum legi.

♂. Similis priori, sed antennis paullo longioribus, ore fronteque minus exsertis, corpore toto nigriore, immaculato, alis obscurioribus &c., distincta. Oculi arete cohærentes. Abdomen subellipticum l. sublineare, depresso, distincte pilosum, nigrum, certo situ nigro-cinerascens, vitta dorsali atra. Anus inflexus, niger, stylis ventralibus, ni fallor, suffultus. Costa nuda. Squamæ parvæ. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, pilosi.

**230.** *A. frontella*: antennis longiusculis atra (♂), aut cinerea (♀); capite albido; fronte minus, ore non, prominentibus; alis subhyalinis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; *mas*: oculis cohærentibus, abdome linearí, depresso, alis leviter fuscaneis, squamis halteribusque nigricantibus; *femina*: oculis remotis, vitta frontali latiuscula atra, abdome oblongo, acuto. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$ — $1\frac{1}{2}$  lin.).

*Anthomyza* Zett. Ins. Lapp. 687. 116. ♂♀.

Hab. in Sueciæ borealis floribus Salicis, etiam in arena ad ripas fluminum, mense Jun. in copula capta, rarius; seilicet in Lapponia Umensi ad Lycksele; in Lapponia Tornensi ad Juckasjervi. (E Glogavia a D. Zeller in duobus exemplis missa).

♂♀. Priori valde similis, sed nervis transversis paullo magis approximatis, horum ordinario subobliquo, nec perpendiculari, maris alis minus infuseatis, squamis halteribusque obscurioribus, distincta. *Mas:* abdomine & pedibus sat dense pilosis. Anus parvus, inflexus, niger, nitidus. *Femina:* cinerea, subimmaculata, rudimento tantum linearum fuscarum trium in thorace, & unius in abdome. Orbitæ oculorum cinereæ. Vitta frontalis atra, postice macula cinerea, & antice interdum macula parva flava.

231. *A. cordifrons:* antennis mediocribus, validis, plumbea, opaca, capite albicante; ore fronteque parum prominentibus; alis subpallescentibus, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto, squamis albidis; *femina:* macula frontali cordata, fulva. ♀. (Long. sere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad radicem alp. Mullsjellet 24 Jul. semel inventa.

♂. In hae subdivisione major. Tota cinerea, immaculata. Caput albidum. Oculi mediores, oblongi, modice remoti, per orbitas cinereas & vittam frontalem latiusculam, in medio atram, antice supra antennas macula magna, cordata fulva ornatam & postice maruña cinerea notatam, sejuncti. Thorax setosus. Abdomen ovatum, pubescens. Alæ præsertim basi pallidæ, costa subnuda l. breviter tantum ciliata. Nervi transversi sat late remoti, ordinarius tamen mox ante medium areæ insertus. Squamæ ciliatæ, sordide albæ, valvula superiore inferiorem totam tegente. Halteres pallidi. Pedes validi, nigri, setosi. Prætereat antennæ nigrae, seta subnuda. Palpi longiusculi, subeylindrici, atri.

232. *A. mucronatella:* antennis longiusculis apice mucronatis, griseo-cinerea, opaca, subimmaculata, capite albicante; ore fronteque parum prominentibus; alis cinereo-hyalinis, nervo transverso perpendiculari, recto, squa-

mis albidis; *femina*: vitta frontali didyma, nigra. ♀ (Long. 1 lin.).

Hab. in Scandinavia media & boreali, 27 Jun.—30 Jul., minus frequens; scilicet in Gotlandia ad Gothem in uno specimine deprehensa; in Jenitlandia ad Mullsjellet, rarissime; in Norwegia ad Alstahaug, Levanger & Thynäs paullo frequentius.

♀. Parva, angusta. Oculi modice remoti, vitta frontali latiuscula, nigra, postice macula cordata cinerea. Antennæ longitudine fere epistomatis, angustæ, nigræ, apice superne mucrone minuto; seta subnuda, ima basi graciliter incrassata. Palpi parvi, filiformes, fusco-nigri. Thorax dorso vestigio linearum 3 dilute brunnearum. Abdomen oblongo-ovatum; cinereum, certo situ rudimento punctorum fuscorum dupli serie dispositorum. Alarum costa nuda. Nervi: longitudinales 3 & 4 fere paralleli I. forte ad apicem alæ levissime subdivergentes; transversi modice remoti, horum medius sat longe ante medium alæ retractus, & ordinarius longe ante medium areæ insertus. Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres pallidi. Pedes simplices, parce pilosi, nigri, geniculis anticis albis.  
♂, mihi ignotus, forte oculos etiam distantes habet. Auctorum *Cænosia* generi igitur hæc species subjecta erit.

233. *A. parva*: antennis brevibus nigricans (♂), aut cinerascens (♀), capite albicante; ore fronteque sub-prominentibus; alis hyalinis, basi subfuscatis, nervo transverso ordinario perpendiculari, recto; squamis albis; *mas*: oculis cohærentibus, ab domine linearis, depresso, piloso; *femina*: oculis remotis, vitta frontali mediocriter lata, nigra, ab domine oblongo-ovato. ♂♀. (Long. circiter  $\frac{3}{4}$ —1 lin.).

*Anthomyia* Macq. Buff. 2. 343. 42. ♂♀. *Anth. lepida* var. b. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 686. 110.

Hab. in floribus & foliis Salicis, per Scandinaviam, 20 Maj.—Jul.—11 Aug., passim minus frequens; in copula semel capta; scilicet in Scania ad Lund, Rästen &c., non rara; in Bottnia boreali juxta flumen Råneå; in Lapponia Umeosi ad Lycksele; e Dania sub nomine: "Anth. parva" Macq.; etiam in utroque sexu a D. Staeger benigne communicata.

♂♀. Minuta, opaca. Similis omnino *Ar. humerella* 228, a qua tamen magnitudine duplo & ultra minore, nervis: costali non atro, transverso ordinario perpendiculari, nec recto, ut & maris abdomine nigricante, vix cinerascente, certe distincta. Caput secundum utrumque sexum omnino ut in *humerella*. Squamæ parvæ, albæ, valvulis æqualibus. Halteres albidi. Pedes nigri, aut pieci. *Mas*: abdomine linearis, depresso, opaco, piloso, linea dorsali atra in fundo obscuro parum perspicua, ano parvo, nigro, alis basi saltem subfuscatis pedibus distincte pilosis; *femina*: abdomine oblongo, cinereo, immaculato, alis hyalinis.

\*\*). Costa alarum ciliata.

234. *A. curvicauda*: antennis medioeribus, validis, obscure cinerea, capite albo-nitente; fronte prominente, ore non reflexo; alis hyalinis, basi infuscatis, nervis: costali ciliato, atro, transverso ordinario perpendiculari; squamis albidis; *mas*: oculis subcohaerentibus, abdomine subcylindrico, nigricante, ano magno, inflexo, nigro, nitido, alarum nervis obscuris; *femina*: oculis remotis, vitta frontali modice lata, nigra, abdomine oblongo ovato, nigro, nitido, apice compresso. ♂♀. (Long. 1 $\frac{1}{4}$ —1 $\frac{1}{2}$  lin.).

*Anth. curvicauda* Wahlb. in litt.

Hab. in Scandinaviæ graminosis & floribus, 27 Jun.—30 Jul., minus frequens, in copula deprehensa; scilicet in Scania ad Lund semel; in Ostrogoth. ad Wadstena rarissime; in Uplandia ad Holmiam uterque sexus a D. *Wahlberg* lectus, nihilque communicatus; in Gotlandia ad Wamlingbo rariss.; in alpibus Darlecarlicis in copula a D. *Bohemian* capta; in Botnia boreali ad Råbäcken &c.; in Jemtlandia ad Mullsjellet parcissime, ipse; in Lapponia Lulensi ad Qwickjock ♂♀, D. *Andersson*. (Ad Eldena prope Gryphiam 28 Maj. 1842 etiam a D. *Dahlbom* lecta).

♂♀. Simillima *Ar. sepiae* (148); sed duplo minor, & ano maris paullo longius inflexo, atque abdomine feminæ magis nigro, nitido anque stylato, ut videtur distincta. Caput argenteomicat. Frons porrecta. Antennæ nigrae, seta nuda. Nervi transversi præsertim in ♂ subapproximati; longitudinales 3 & 4 paralleli. Squamæ parvæ valvulis æqualibus. Halteres flavi. Pedes simplices, nigri, pilosi. Thorax cinerascens, vestigio linearum 3 fuscarum. *Mas*: oculis non arete cohærentibus. Alæ ad nervos saltem infuscatae, basi nigricantes. Abdomen pilosum, parum nitens, obscurum, linea dersali atra. Venter versus anum styli 2 armatus. *Femina*: oculi modice distantes, orbitis cinereis. Vitta frontalis nigra, interdum brunnea. — Reliqua ut in *Ar. sepia*.

Var. b. ♀, alarum nervis omnibus distincte fuscedine cinctis; de cetero varietati a. simillima; in Ostrogothia ad Gusum a D. *Wahlberg* inventa.

Var. c. ♂, similis var. a., sed duplo major, & abdomine in medio subdepresso, pedibus crebrius pilosis, differt. Palpi breves, filiformes, longe pilosi. In Jemtlandia ad Skalstugan, & in Norwegia ad Thynäs lecta.

**235. *A. remotella*:** antennis mediocribus, validis, obscure cinerea, capite argenteo; fronte prominente, ore

non reflexo; oculis in utroque sexu late remotis; alis subhyalinis, basi infuscatis, nervis transversis subapproximatis, ordinario subperpendiculari recto; squamis albis; *mas*: abdome subcylindrico, ano infexo, nigro, nitido; *femina* abdome ovato, nitente. ♂♀. (Long. ♂ sere 1½ ♀ 1¼ lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad diversorum Forsa juxta radicem Mullsjellet unicum ♂ unicamque ♀ (non tamen in copula) 27 Jun. 1840 inveni.

♂♀. Simillima priori, a qua tamen capite forte magis argenteo, abdome feminæ leviter cinereo-micante, ut & præprimis oculis in utroque sexu late remotis, nempe per orbitas albas & vittam frontalem latiusculam nigrum disjunctis, certe diversa. *Coenosiæ species Auctorum.* — Thorax in ♂ vestigio linearum 3 fuscarum.

236. *A. albidella*: antennis longiusculis albo-cinerea, opaca, capite argenteo; fronte subprominente, ore vix reflexo; alis albidis, nervis transversis subapproximatis, ordinario subperpendiculari, recto, squamis albis; *mas*: oculis subcohærentibus, abdome subcylindrico, ano infexo, nigro; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali nigra, antice flava, abdome oblongo-ovato. ♂♀. (Long. sere 1½ lin.).

Hab. in floribus Salicis & soliis fruticum, per Sveciam borealem, rarius, 16 Jun.—20 Jul. mihi obvia, in copula etiam semel deprehensa; scilicet in Jemtlandia ad Skalstugan; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Stensele. — Varietatem pedibus discoloribus seu rufescentibus ut marem in copula cum semina pedibus nigris ad Lycksele inveni, forte juvenilem.

♂♀. Antennæ nigrae, seta pubescente. Palpi parvi, nigri. Thorax & abdomen albo-induta. Alæ albæ, costa distinete ciliata. Spinaula adest. Squamæ parvæ, albæ, valvulis æqualibus. Halteres albi. Pedes nigri l. rufescentes, setosi in primis in ♂. *Mas:* oculi mediocres, per orbitas subelevatas, tenuissimas, albas, & lineam tenuissimam nigram, angustissime disjuncti. Thorax rudimento lineæ mediae dilute brunnea. Abdomen angustum, subcylindricum, pilosum, certo situ linea dorsali fusca obsoleta. Tuberculum anale inflexum, nigrum, nitens. Styli ventrales ad-sunt. Pulvilli albi distincti. *Femina:* orbitæ oculorum cinereæ. Vitta frontalis nigra antice macula parva l. mediocri flavida, postice macula verticis cinerea. Abdomen cinereum l. album, parum nitens, puberulum, acutum. Pulvilli parvi. — Var. ♀ monstrosa alis apice emarginatis, nervo longitud. 4:to ad marginem interiorem alæ distinete recurvato.

237. *A. confidella:* antennis mediocribus cinerea, opaca, capite albicante; fronte parum, ore non, prominentibus; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis subapproximatis, ordinario perpendiculari, recto; *femina:* oculis modice remotis, vitta frontali nigra, abdome oblongo-ovato. ♀. (Long. 1— $1\frac{1}{3}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad radicem alpium Mullfjellen & Åreskutan 27 Jun., et 30 Jul., 2 specimina inveni.

♀. Similis priori, sed magnitudine paullo minore, corpore non albido, sed plumbeo, capite albicante, vix argenteo, fronte forte nonnihil minus prominente, alis minus albidis, costa paullo brevius ciliata, ut & vitta frontali nigra tantum in medio icerter subbrunnescente, distincta.

238. *dissit nervis:* antennis mediocribus obscure cinerea, opaca, capite griscente; fronte paullo, ore vix, prominentibus; alis hyalinis, nervis transversis longe re-

motis, perpendicularibus, rectis, squamis albis; *femina*: vitta frontali lata, obscura, ab domine oblongo. ♀. (Long. fere  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Norvegia media rarissime; ad diversorium Thynäs in parœcia Skogn d. 4 Jul. 1840 specimen descriptum deprehendi.

♀. In hac subdivisione major, setosa. Plumbea. Caput sordide griseum. Oculi parvi, rotundi. Vitta frontalis lata, sordide fusca, opaca. Antennæ nigrae, seta nuda. Thoracis dorsum vestigio vittarum 3 brunnearum subconfluentium. Abdomen oblongum, immaculatum. Alæ hyalinæ, nervo costali crasso, breviter ciliato, nigro. Spinaula adest. Nervus transv. ordinari. fere in medio areæ insertus. Squamæ parvæ, ciliatæ, albæ, valvulis æqualibus. Halteres albi. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes.

239. *A. longisquama*: antennis mediocribus cinerea, opaca, capite albo; fronte paullo, ore vix, prominentibus; alis albidis, nervis transversis modice remotis, ordinario perpendiculari, recto, squamis niveis, valvula superiore inferiorem vix ad dimidium tegente; *femina*: vitta frontali modice lata, nigra, ab domine ovato. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Lapponia Umeusi rarissime; in Betula ad Lycksele 1 Jul. semel inventi.

♂. Per structuram squamarum sub alis ab affinibus facillime dignoscenda. Valde quoque similis & affinis *Ar. lacteipennis*, 200, sed costa ciliata & nervis transversis paullo remotioribus differt. Tota setosa. Oculi mediocre, orbitis albidis. Vitta frontalis nigra, postice macula verticis ordinaria cordata, cinerea. Antennæ nigrae. Palpi parvi, atri. Thorax & scutellum late cinerea, immaculata. Abdomen oblongo-ovatum, convexum.

acentum, cinereum, immaculatum. Alæ cum nervis albide, extus latineulae, rotundatae. Nervus costalis breviter, sed sat dense nigro-ciliatus. Spinula parva. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem levissime subdivergentes; transversus ord. paullo ante medium insertus. Squamæ niveæ, hand ciliatæ, valvula superiore tantum inferioris basin tegente. Halteres albi. Pedes nigri.

b. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem subdivergentes. Costa subnuda. Squamæ albæ.

**240. *A. pilifera*:** antennis medioeribus nigra, subopaca, undique pilosa, capite nigro, albo-micante; fronte distincte, ore paullo, prominentibus; alis subhyalinis, basi nigricantibus, nervis transversis subapproximatis, ordinario subperpendiculari, recto, halteribus pallidis; *mas* oculis subcohaerentibus, abdomine elliptico, subdepresso, ano inflexo, nigro, nitido. ♂. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad radicem Åreskutan 24 Jun. & Skalstugan 16 Jul. bis lecta.

♂. Affinis *Ar. piligeræ* 47, sed multo minor & oculis non arete cohaerentibus, squamis sub alis minoribus, valvulis æqualibus, halteribus flavis, nec nigris, &c., abunde distincta. Ab *Ar. curvicauda*, 234, eni etiam similis præsertim ejus var. b., colore nigriore, abdomine magis depresso, pedibus adhuc hirsutioribus, costa nudiore &c., differt. Oculi per orbitas angustissimas obscuras & lineam frontalem tenuissimam nigram disjuncti. Facies distincte porrecta. Antennæ nigrae, seta fusca, puberula, ima basi inerassata. Palpi breves, filiformes, nigri, distincte pilosi. Pleuræ schistaceaæ. Abdomen ellipticum, depresso, pilosum, atrum, opacum, lateribus certo situ nigro-cinereo-micans. Anus crassiusculus, tuberculo majusculo, inflexo, nigro, nitido. — Alæ leviter fuscae, basi nigriores, costa brevissime ciliata, spinula parva. Nervi long. 3 & 4 versus

apicem levissime divergentes. Pedes nigro-picei, simplices, hirsutissimi. Pulvilli distincti, albi.

**241.** *A. alpica*: antennis mediocribus obscure cinerea, opaca, capite canescente; ore fronteque subprominulis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis subapproximatis, ordinario perpendiculari, recto; halteribus nigris; *mas*: oculis subappropinquantibus, abdomine elliptico, subdepresso, aro parvo, infexo, cinereo; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali latiuscula, nigrante, abdomine rotundato-ovato. ♂♀. (Long. 1 lin.).

Hab. in alpibus Jemtlandicis in regionem nivalem 3500 ped. supra mare adscendens, in ipsa nive ambulans, 2–30 Jul., minus frequens; in Jemtlandiae alpibus Åreskutan & Mullsjellet, atque in alpe Kälahög in Wärdalia Norwegica prope Suul, 5 specimina inveni.

♂♀. *Ar. lepidæ* 209, subsimilis, sed halteribus nigris atque maris oculis paullo distantibus, & ab haec & ab aliis affinibus mox dignota. Antennæ subvalidæ, nigræ, seta nuda. Palpi mediocres, nigri. Alæ cinereæ, nervo costali nudo & longitudinali 1:mo suberassioribus, nigrantibus. Nervi long. 3 & 4 versus apicem paullo divergentes. Squamæ albæ, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Pedes nigri, leviter cinereo-micantes, parce setulosi. *Mas*: oculi per orbitas tenuissimas albidas & vittam angustatam cinereo-nigram, opacam, sejuncti. *Femina*: oculi per orbitas mediocrem cinereas & vittam frontalem latiusculam, nigro-cinereum, distantes.

**242.** *A. atomaria*: antennis breviusculis obscure cinerea, opaca, capite albicante; ore fronteque parum prominulis; alis cinereis, nervis infuscatis, transversis approximatis, ordinario perpendiculari, recto; halteribus albidis; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine linearí, depresso;

so, ano parvo, inflexo, cinereo; *femina*: oculis modice remotis, vitta frontali nigra, abdome oblongo-ovato. ♂♀. (Long. circiter  $\frac{1}{2}$  lin.).

Sub *Anth. lepida* var. b. Zett. Ins. Lapp. 686. 110. latet.

Hab. in Suecia boreali & Lapponia valde rara; in Bottnia boreali ad flumen Råneå in floribus Salicis, & ad Lycksele Lapponiae Umensis, Majo & Junio aliquot specimina inveni.

♂♀. Minutissima. Antennæ parvæ, seta nuda. Palpi subclavati, nigri, basi fuscæ. Alarum costa nuda. Nervi longitudinales: 3 & 4 versus apicem paullo divergentes; 6:us mox infra basin alæ abruptus, & ne quidem in rudimento ad marginem interiorem continuatus. Squamæ minutæ, albæ, valvulis æqualibus. Halteres subfuscæ l. sordide albidi. Pedes nigri, parum hirti, in ♂ picei. *Mas* paullo obscurior, oculis cohærentibus. Abdomen angustum, lineare, depresso, in mortua transversim sulcatum, linea incisurali tenuissima in ipso sulco elevata. Alæ albidae, nervis omnibus fuscedine cinctis. *Femina* cinerea. Orbitæ oculorum cinereæ, vitta frontali modice lata, nigra. Abdomen anguste oblongum, acutum, obscurum. Alæ albicantes, nervis infuscatis.

*Obs.* In museo meo exstant præter descripta adhuc varia *Aricia* specimina feminea minora, in variis provinciis Scandinaviæ collecta, quorum quædam novas species forte constituere debent; sed cum alter sexus deest, ideoque interdum ne quidem subdivisionem, cui subjecta erint, pro certo determinare possum, & multo minus eorum differentiam specificam eruere valeo, eorum quoque descriptionem ad interim omittere coactus fui.

*Obs.* *Musca mutata* Fall. pedibus nigris instructa, ad *Aricium* quidem pertinet; sed ob magnam cum *rufina* aliisque *Anthomyzæ* speciebus affinitatem, ad *Anthomyzam* relata fuit & sub no 143 quærenda. De *Anth. albimana* 106 idem valet.

## 135. ANTHOMYZA\*) Zett. (ANTHOMYIA Auct.).

*Corpus* majoris aut mediæ, interdum minoris magnitudinis, ovatum interdum cylindricum; setosum. *Antennæ* inaequibentes, epistomate sæpiissime paullo breviores, modice latæ l. subangustatæ, compressæ, articulo ultimo 2:do duplo l. triplo longiore, basi seta dorsali biarticulata, longe plumata, aut pubescente, aut nuda. *Oculi* nudi, raro hirti; obscure ferruginei; in ♂ sæpe cohærentes aut saltem approximali; raro distantes. *Frons* rarius prominens; series setarum utrinque simplex ad antennarum basin continuata. *Epistoma* subperpendiculare, infra oculos nonnihil descendens, ore leviter reflexo; nudum. *Vibrissæ* nullæ aut spuriæ. *Setæ* mystacinæ plures, validæ. *Genæ*, & os subtus, pilosa. *Palpi* cylindrici, pilosi. *Thorax* sutura transversa. *Abdomen* 4-annulatum, ovatum, segmentis: 1:mo breviusculo, inermi, 2:do & 3:to margine apicali subsetulosis, 4:to toto parce setoso. *Alæ* subdivaricatae, abdomine paullo longiores; inermes, nervis ut in *Aricia* directis. *Spinula costæ* aut abest aut adest. *Squamæ* aut mediocres, inferior superiore normaliter major, prominula; aut parvæ; utraque breviter ciliata. *Pedes* pilosi & spinulosi, numquam dentati l. aculeati, tarsis semper inermibus; nigri aut rufescentes, tibiis semper testaceis l. rufis, interdum obscure ferrugineis (in *Anthom. mutata*, 147, tibiis tantum posticis in ♂ flavis. *Anth. albimana* pedibus fere totis nigris ob magnam cum *Anth. meante* affinitatem ad hoc genus quoque relata & sub n:o 106 invenienda). *Color corporis* sæpiissime obscurus, nigricans aut cinerascens, interdum flavescens l. testaceus. *Motu* plus minus agilis. *Volatus* haud rapidus. *Habitatio* imaginum in foliis fruticum, floribus, graminosis, fenestratis &c., larvarum in stercoratis, fungis, herbis putridis &c.; pupæ in terra degunt. *Differentia sexus*; mas: oculis plus minus cohærentibus, interdum modice

\*) ab ἄνθος, θο, & μύγαω, sugo. Hinc quoque nomen familiæ rectius scribitur *Anthomyzides*, quam *Anthomyides*, quod vocaretur, si nomen genericum a μύγα derivaretur.

remotis, ungvibus pulvillisque plerumque majusculis; *femina*: oculis late distantibus, ungvibus pulvillisque minoribus. Ab *Aricia*, cui valde similis, saepe ægre distinguitur, nisi pedes interdum totos, sed tibias semper, testacea l. rufescens consideres.

Species sequenti modo dispisci possunt:

*Divis. 1:ma.* Species nigricantes, cinerascentes

l. grisescentes. (*Anth. hæmorrhoum* var. a. ano, & var. b. abdomine toto, rufescens inbus, sub n:o 62 quærenda; *Anth. cincta* & *uliginosa*, ultraque corpore cinereo abdominalis basi flavo-subpellucido, in Divisione 2:da sub n:ris 127 & 128 inveniendæ).

*Sect. 1.* Corpus ovatum aut oblongum (nec cylindricum).

Oculi masculorum in fronte cohærentes l. saltem appropinquantes (in *A. spinicosta* 6, & *A. magnicorni* 31, oculi maris sat late remoti). Majores l. mediæ, raro minores.

A. Femora l. omnia l. antica saltem basi nigricantia. Tibiæ testaceæ. (In feminis *Anth. errantis* 1, var. b., *Angelicæ* 8., & *urbanæ* 17., femora omnia testacea).

\*). Seta antenuarum distincte & saepe longe plumata.

†. Oculi hirti (in femina interdum tenuissime & vix nisi microscopice pubescentes). Majores. *Aricia Macq.* & *Meig.*

1 *errans* Meig. (*Musca erratica* β. Fall.) ♂♀. 2 *signata* Meig. ♂♀. 3 *vagans* Fall. ♂♀. 4 *perdita* Meig. ♂♀. 5 *scutellata* Zett. ♂. 6 *spinicosta* Zett. ♀. (♂). 7 *laeta* Fall. ♂♀.

††. Oculi (in utroque sexu) nudi. *Hylemyia* Meig.

a). Abdomen aut linea dorsali angusta, vel maculis irregularibus, fuscis, micantibus, sed nullis punctis l. maculis determinatis ornatum; aut immaculatum.

α. Alarum nervus transvers. ordinarius rectus aut subrectus.

8 *Angelicæ* Scopol. ♂♀. 9 *tiucta* Zett. ♂. 10 *coarctata* Fall. ♂♀. 11 *nigricolor* Fall. ♂. 12 *fuscipes* Zett. ♀. 13 *ignobilis* Zett. ♀. 14 *subtessellata* Zett. ♀. 15 *immatura* Zett. ♀. 16 *vittipes* Wahlb. ♀.

β. Alarum nervus transv. ordin. plus minus sursum flexus. Corpus oblongum, abdomine saltem maris subconico (in *A. urbana* 17, ovoato). Alæ saepissime immaculatæ: nervis transversis fuscedine non cinctis (in *A. æquali* 175, quæ etiam sub hac subdivisione militat, infuscatis).

17 *urbana* Meig. (*Musc. Angelicæ* β. *rustica* Fall.) ♂♀.  
18 *conica* Wied. (*Hydrophoria* Macq.) ♂♀. 19 *dubitata* Fall. ♂♀. 20 *strigosa* Fabr. (*Musc. vagans* Panz. *M. conica* var. Fall.). ♂♀. 21 *nigrimana* Meig. ♂. 22 *operosa* Meig. ♂♀. 23 *coronata* Zett. ♀. 24 *linogrisea* Meig. ♂♀. 25 *vetula* Zett. ♂. 26 *brunneifrons* Zett. ♀.

b). Abdomen punctis l. maculis fuscis plerumque 2 l. 4 in disco locatis (in variet. *A. Quadrum* 27, interdum obsoletis, rarissime nullis). Frons vix l. parum prominens. Antennæ longiusculæ, angustatae, seta distincte pluina. Squamæ sub alis mediocre: valvula superiore inferiorem non tegente. Oculi maris approximati, non autem cohærentes; feminæ per vitam frontalem nigram, macula postica elongato-trigonæ cinerea divisam, sat late disjuncti. Oblongæ.

**27** *Quadrum* Fabr. (*Hylemyia* Meig. *Spilogaster* Macq. *Musca subpuncta* Fall.) ♂♀. 28 *anceps* Zett. (*Musc. quadrum* Fall. *Coenosia tigrina* Meig.?) ♂♀. 29 *depunctata* Fall. ♂♀. 30 *fuscata* Fall. (*Hylemyia* Meig.) ♂♀.  
\*\*). Seta antennarum aut breviter plumata, aut pubescens, aut nuda.

I. Antennarum seta breviter plumata. (*Anth. incerta* Zett. Ins. Lapp. vide *Cordyluram*).

†. Oculi hirti.

**31** *magnicornis* Zett. ♂.

††. Oculi nudi. Frons non prominens. Alarum nervus transv. ordin. rectus. Abdomen saepe nigro-punctatum. Species parvæ.

**32** *flavo-tibiella* Zett. ♀. 33 *troglodytes* Zett. ♂♀. 34 *vilis* Zett. ♀.

II. Antennarum seta pubescens. Species mediæ aut minores.

a. Abdomen nigro-punctatum (in ♀ *Anth. binotata* 38, immaculatum. — *Ar. Stægeri* nob. seu *Atomogastrem tibiale* Stæg.: tibiis obscure ferrugineis, ob summam cum *Aric. triquetra* affinitatem ab *Anthomyza* remotam & in *Ariciæ* genere collocatam ibique sub n:o 207 invenies). *Spilogaster* Macq.

**35** *consimilis* Fall. (vix *Anthom. compuncta* Meig.) ♂♀.

**36** *pertusa* Meig. ♂♀. 37 *fruterula* Zett. ♂♀. 38 *binotata* Zett. ♂♀. 39 *sororia* Zett. ♀. 40 *consors* Zett. ♀.

41 *protuberans* Zett. (*Anth. consimilis* Ins. Lapp. ♀. exclus. syn.) ♂♀. 42 *lineatipes* Zett. ♀. 43 *apicalis* Zett. ♀. 44 *cineraria* Zett. ♀. 45 *obscuripes* Zett. ♀.

**46** *pallipalpis* Zett. ♀. (♂).

b. Abdomen non nigro-punctatum.

- 47** *Sundewalli* Zett. ♂♀. **48** *socia* Fall. ♂♀. **49** *grandæva* Zett. ♀. **50** *deserta* Zett. ♂. **51** *denudata* Zett. ♂. **52** *socculata* Zett. ♂. **53** *verticella* Zett. ♀.

III. Antennarum seta nuda. Abdomen non nigro-punctatum. Oblongæ.

- 54** *frigida* Zett. ♂. **55** *rugulosa* Zett. ♀. **56** *fuscula* Fall. ♂. **57** *atricolor* Fall. ♂. **58** *depressiventris* Zett. ♂. **59** *atritarsis* Zett. ♂. **60** *tergina* Zett. ♀. **61** *dorsalis* Zett. ♀. **62** *hæmorrhoum* Zett. ♀. **63** *palliceps* Zett. ♀. **64** *niveipennis* Zett. ♀.

B. Femora & tibiæ omnia & tota flavo-ferruginea. (Feminæ *Anth.* *Angelicæ* & *urbanæ* femoribus omnibus ferrugineis sub nigris 8 & **17** inveniuntur). Tarsi nigri.

- a. Seta antennarum distincte plumata. Majores.  
\*). Squamæ sub alis magnæ aut majusculæ: valvula superiore inferiorem non tegente. Ovatæ.  
†. Oculi saltem maris hirti; in femina plerumque nudi aut subnudi. *Aricia* Meig.

**65** *erratica* Fall. ♂♀. **66** *4-notata* Meig.? ♂♀. **67** *basalis* Zett. ♂♀.

††). Oculi in utroque sexu nudi. *Hylemyia* Meig. *Aricia* Macq.

α). Scutellum flavum.

**68** *pagana* Fabr. ♂♀.

β). Scutellum concolor: cinereum.

**69** *impuncta* Fall. ♂♀. **70** *demigrans* Zett. (*Musc. depuncta* β. ♂. Fall.). **71** *modesta* Meig. ♂♀. **72** *vittifera* Zett. ♂. **73** *detrita* Zett. ♀. **74** *olivacea* Zett. ♀.

\*\*). Squamæ sub alis minusculæ: valvula superiore inferiorem tegente.

**75** *præpotens* Wied. (*Hylemyia* Meig. Macq.) ♂♀. **76** *ferrugineo-vittata* Zett. ♀.

b. Seta antennarum pubescens aut nudiuscula.  
Oculi nudi. Mediæ aut minores.

\*). Squamæ sub alis parvæ: valvula superiore inferiorem tegente.

†. Nervus transv. ordin. subperpendicularis, rectus.  
Costa inermis. (*Anth. Hyoscyami* vide 176).

**77** *conformis* Fall. ♀. **78** *calceolata* Zett. ♀. (♂). **79** *laticornis* Fall. ♀. **80** *deprimata* Zett. ♂♀. **81** *flavipalpis* Zett. ♂. **82** *mimula* Zett. ♂. **83** *maculipes* Zett. ♀. **84** *lunatifrons* Zett. ♀.

††. Nervus transvers. ordin. subobliquus, leviter inflexus.

**85** *Salicis* Zett. ♂.

\*\*). Squamæ sub alis mediocrest l. majusculæ:  
valvula superiore inferiorem non tegente.

**86** *viduata* Zett. (*Musca rufipes* Fall.) ♀. **87** *punctiventris* Zett. ♂. **88** *pubiseta* Zett. ♂.

*Sect. 2.* Corpus præsertim in masculis cylindricum aut subcylindricum. Antennarum articulus ultimus elongatus, linearis, compressus. Oculi oblongi, nudi in utroque sexu fere æqualiter & modice (raro late) subparalleliterque distantes. Squamæ sub alis minusculæ, valvula superiore inferiorem ad dimidium tegente. Nervus transversus ord. omnino rectus & sèpissime non infuscatus. Pulvilli in utroque sexu longiusculi. Mediæ aut plerumque minores. *Coe-*

*nosa* Auctorum \*). (*A. spinicosta* oculis in utroque sexu remotis sub n:o 6 invenienda).

A. Antennarum seta plumata.

- 89 *tigrina* Fabr. (vix Meig.) ♂♀. 90 *ciliatocosta* Zett. (an *Coenos. tigrina* Meig.?) ♂♀. 91 *flavicornis* Fall. ♂.

B. Antennarum seta pubescens aut brevissime puberula. Mediæ aut minores.

\*) abdomine punctis 4—8 nigris per paria dispositis.

†. Palpi nigri.

a. Femora omnia in utroque sexu nigricantia.

- 92 *meditata* Fall. ♂♀. 93 *exsul* Zett. ♂. 94 *nana* Zett. ♂♀. 95 *6-maculata* Meig. ♂♀.

b. Femora saltem in ♂ I. tota I. ad partem flavâ; in ♀ raro nigra.

- 96 *6-notata* Meig. ♂♀. 97 *bilineella* Zett. ♂♀. 98 *geniculata* Fall. ♂♀. 99 *pygmaea* Zett. ♂.

††. Palpi albi (*A. troglodytes* & *pallipalpis* in Sect. I:ma sub n:ris 33 & 46 querendæ).

- 100 *verna* Fabr. ♂♀. 101 *lacteipennis* Zett. ♂♀.

\*\*) abdomine punctis nullis. Palpi nigri.

α. femoribus flavis.

- 102 *intermedia* Fall. ♂♀. 103 *biocellata* Zett. ♀. 104 *trilineella* Zett. ♀.

β. femoribus nigricantibus.

- 105 *meaus* Meig. ♂♀. 106 *albimana* Wahlb. ♂♀. 107

\*) Species hujus Sectionis *Cordyluris* affines sunt; sed oculis magis oblongis, abdominis segmentis 4 (nec 6), squamis sub alis distinctioribus, valvulis inæqualiter magnis, &c. a *Cordylura* mox discernuntur.

*geuarum* Zett. ♀. 108 *fulvicornis* Zett ♀. 109 *flavimana* Zett. ♂.

C. Antennarum seta nodiuseula aut nuda. Palpi nigri. Species minutæ.

a. Abdomen nigro-punctatum l. nigro-maculatum.

\*). Femora l. tota l. saltem basi flava.

110 *8-punctata* Zett. (*strigella* Ins. Lapp. ♀.) ♂♀.

111 *pumila* Fall. (*albicornis* Meig.?) ♂♀. 112 *nigrifemur* Zett. (*nigrimana* Meig.?) ♂♀.

\*\*). Femora nigricantia, basi interdum angustissime flava.

113 *humilis* Meig. ♂♀. 114 *pulicaria* Zett. ♂♀.

b. Abdomen immaculatum.

115 *pedella* Fall. ♀. 116 *decipiens* Meig. ♂♀. 117 *tarrella* Zett. ♂♀. 118 *dealbata* Zett. ♂. 119 *metallipennis* Zett. ♀. 120 *ambulans* Meig. ♀.

*Divis. 2:da.* Species pallescentes. \*).

A. Antennarum seta sat longe & distincte plumata. Majores aut mediæ.

\*). Oculi in utroque sexu distantes, nudi. *Coenosia* Auctorum recentiorum.

121 *Fungorum* Degeer ♂♀. 122 *Graminum* Zett. ♂.

\*\*). Oculi in mare cohærentes aut subcohærentes.

\*) Ad hanc Divisionem refero omnes *Anthomyzæ* species, quæ aut totæ aut ad partem flavescent, h. e. thorace plus minus, sæpe toto, cinereo. Inter has exstant species: aut thorace toto cinereo vel nigricante, abdomine toto flavo; aut thorace plus minus cinereo, abdomine flavo; aut denique corpore obscurò, abdomine basi tantum plus minus (ex. gr. in *A. cincta* 127, *uliginosa* 128 & *alma* 140) pallescente.

a. Oculi in mare dense, in femina tenuiter hirti.

*Aricia* Macq. Meig.

- 123 *pallida* Fabr. ♂♀. 124 *Populi* Meig. ♂. 125 *scutellaris* Fall. ♂♀. 126 *abdominalis* Stæg. ♂. 127 *cincta* Zett. ♂.

b. Oculi in utroque sexu nudi. *Hylemyia* Meig.

- 128 *uliginosa* Fall. (*Spilogaster* ead. Macq.) ♂♀. 129 *graminicola* Zett. ♀.

B. Antennarum seta breviter plumata aut pubescens. Mediæ aut minores.

- 130 *postica* Zett. (an *Auth. posticata* Meig.?) ♂. 131 *maculiventris* Zett. ♂♀. 132 *mollicula* Fall. (*Coenosia nemoralis* Meig.) ♂♀.

C. Antennarum seta nudiuscula aut nuda. Oculi nudi. Mediæ aut minores.

*Tribus I:ma* thorace obscuro: nigricante aut cinerascente, interdum lateribus anguste scutelloque flavicantibus (in ♀. *A. transversæ* 134 thorace griseo-rufescente. — *A. Winthemii* forte huic tribui subdita, infra sub n:o 177 invenienda).

α). Frons non prominens.

\*. Squamæ sub alis medioeres, valvula superiore inferiorem non tegente.

- 133 *rufipes* Fall. ♂. 134 *transversa* Fall. ♂♀. 135 *cavucina* Zett. ♂. 136 *lattarsis* Stæg. ♂♀. 137 *consobrina* Zett. ♀. 138 *invisa* Zett. ♂. 139 *pallicornis* Zett. ♀. 140 *alma* Meig. (*Musc. uliginosa* var. Fall. *Auth. sputria* Zett. Ins. Lapp.) ♂♀. 141 *litoralis* Zett. ♀. 142 *pungicula* Zett. ♂. 143 *rufina* Fall. (non *Coen. rufina*

Meig. — *Anth. ocreata* Zett. Ins. Lapp. ♀.) ♂♀. 144 *hamata* Zett. (*Limnophora hamata* Macq. est ♂ hujus) ♀. 145 *impar* Zett. ♂♀. 146 *hians* Zett. ♂♀. 147 *mutata* Fall. ♂♀.

\*\*. *Squamæ sub alis parvæ: valvula superiore inferiorem totam tegente.*

†). *Palpi flavi, summa apice interdum obscuri.*

148 *flavipes* Fall. ♂. 149 *flavo-scutellata* Zett. ♂♀. 150 *tenera* Zett. ♂♀. 151 *zonata* Zett. ♀. (♂). 152 *tricolor* Zett. (*Coenos. bicolor* Stæg.) ♂.

††). *Palpi l. toti l. ad maximum partem nigri, basi sœpe flavi.*

153 *ruficeps* Zett. ♀. 154 *transgressa* Zett. ♀. (♂?).

155 *guttifrons* Zett. ♀. 156 *rotundicornis* Zett. ♂.

β). *Frons plus minus distincte prominens. Squamæ sub alis mediocres, valvula superiore inferiorem tegente. Nervus transversus ordinarius rectus. Oblongæ.*

\*. *Palpi toti flavi.*

157 *bicolor* Wied. Meig. (*Pegomyia* Macq.? Forte etiam *Anth. mitis* Meig.) ♂♀. 158 *strigipes* Zett. ♀. 159 *calyprata* Zett. ♀. 160 *scapularis* Zett. ♀. 161 *pubipes* Zett. ♀.

\*\*. *Palpi l. toti l. saltem apice nigricantes.*

162 *nigritarsis* Zett. (*Musca bicolor* Fall. var. — Vix *Anth. fulgens* Meig.?) ♂♀. 163 *stupida* Zett. ♀. 164 *lurida* Zett. ♂♀. 165 *notabilis* Zett. ♀. 166 *limbatella* Zett. ♂♀.

*Tribus 2:da thorace pallido, interdum vitta dorsali obscura. Antennarum seta nudiuscula.*

*Oculi nudi. Alatum costa inermis.*

α). *Squamæ sub alis mediocres, valvula superiore inferiorem non tegente. Majores.*

†. Alarum nervus longitudinalis 1:mus versus apicem setulosus. Oblonga.

**167 inanis** Fall. (*Pegomyia* Macq.) ♂♀.

††. Alarum nervus longitud. 1:mus inermis. Ovatæ.

**168 varians** Zeit. ♂♂. **169 flaveola** Fall. (non Fabr.) ♂♀.

**170 diaphana** Wied. (*Pegomyia* Macq.) ♂♀.

b). Squamæ sub alis parvæ, valvula superiore inferiorem tegente. Nervus transv. ordinarius rectus l. subrectus. Mediæ. Oblongæ.

**171 tunicata** Zett. ♀. **172 vittigera** Zett. ♂♀. **173 gilva** Zett. ♂♀. **174 ephippium** Zett. ♂♀.

#### *Species omissæ:*

**175 aequalis** Meig. (*Hylemyia eadem* Meig.) ♀. **176 Hysocymami** Panz. Meig. Wahlb. (*Musca* Reaum. *Pegomyia* Macq.) ♂♀. **177 Winthemi** Meig. (*Pegomyia* Stæg.) ♀.

#### *Divis. 1:ma. Species obscuræ.*

*Sect. I. Corpus ovatum. Oculi ♂ conniventes (in A. spinicosta, 6, paullo distantes).*

A. Femora saltem antica plus minus late nigricantia.

\*) *Seta antennarum plumata.*

†. Oculi hirti. (Majores).

1. *A. errans*: cinerea, antennis, thoracis lineis 4, abdominis maculis micantibus, femoribus antice basi, tarsisque omnibus & totis, nigricantibus; pedibus scutellique apice rufo-testaceis; alis hyalinis, nervis transversis insuscatis, ordinario incurvo; squamis pallescentibus; oculis maris subcohaerentibus. ♂♀. (Long. 3—3½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 112. 50. ♀. Zett. Ins. Lapp. 688. 119.

$\delta\varphi$ . *Aricia* Macq. Buff. 2. 287. 8.  $\delta\varphi$ . Meig. Dipt. 7.

314. 17. *Musca erratica* Fall. Muscid. 77. 92. var.  $\beta$ .  $\delta\varphi$ .

Hab. in truncis arborum viventium, etiam in ligno Pini sylvestris & Abietis recenter secato, &c., per Scandinaviam, 1 Jun.—Jul.—25 Aug., passim; in copula captata; scilicet in Scania ad Lund rarius; in Ostrogothia ad Wadstena, Gusum &c., non raro; in Westrogothia, D. *Gyllenhal*; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Åreskutan, Forsa, Mullsjellelet & Skalstugan, vulgaris; in Lapponia Umensi ad Stöttingsfjellet, in Lulensi ad Qwickjock, & in Tornensi ad Muonioniska, parce; in Dania freq., D. *Staeger*. (E Glogavia etiam ♀ a D. *Zeller* missa).

$\delta\varphi$ . Sat magna, cinerea. opaca. Caput late cinereum. Facies paullo ante oculos prominens. Oculi in ♂ distinete-hirti, per orbitas albidas tenues & lineam frontalem angustam nigram parum distantes; in ♀ minus hirti, per orbitas latiusculas cinereas & vittam frontalem latissimam nigram, late remoti. Antennæ longiusculæ, totæ nigrae. Epistoma infra oculos non-nihil descendens, margine antico subreflexo. Proboscis crassa & palpi subcylindrici, pilosi, nigra. Thoracis lineæ 4 nigrae, quarum mediæ tenuiores, integræ. Abdomen ovatum, griseum, maculis irregularibus, micantibus, fuscis, plus minus conspicuis, saepe obsoletis. Alæ totæ cinereo-hyalinæ, nervis transversis fuscedine cinctis, ordinario distinete curvo, ante medium areæ inserto. Nervi longitudinales versus apicem paullo divergentes, 3:ius nonnihil ante, & 4:ius paullo pone apicem alæ excurrentes. Nervi præterea ut in *Aricia* directi. Costa nuda. Squamæ magnæ, valvula superiore inferiorem ad medium tegente; flavidо-albidæ l. pallescentes. Halteres nudi, pallidi. Pedes mediocres, spinosi & pubescentes; ferrugineo-flavi. Coxæ cinerascentes. Femora antica in ♂ fere ad apicem, in ♀ basi, obscure cinerea. Tarsi omnes inernes & atri. Ungues & pulvilli in ♂ elongati. — Ab *Auth erratica*, 65,

cui valde similis, differt: magnitudine paullo minore, antennis totis nigris, femoribus anticis plus minus late obscuris, ut & oculis ♂ minus cohærentibus.

Var. b. ♀. femoribus omnibus rufis, alias var. a. simillima; frequens etiam in copula cum ♂ var. a.

**2. *A. signata*:** cinerea, antennarum articulo ultimo, thoracis vittis 4, abdominis maculis micantibus & linea dorsali interrupta, femoribus anticis basi, tarsisque omnibus & totis, nigricantibus; pedibus scutellique apice rufostaceis; alis hyalinis, nervis transversis infuscatis, ordinario incurvo; squamis albidis; oculis maris cohærentibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 113. 52. ♂♀. *Aricia* Macq. Buff. 2. 288. 10. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 314. 19.

Hab. in Scandinavia meridionali & media, Jul.—Oct., passim; scilicet in Scania ad Lund, & in Ostrogothia ad Wadstena &c., varia specimina utriusque sexus obtinni; e Dania ut ibi frequens incola a D. Staeger communicata.

♂♀. Similis priori, a qua tamen magnitudine minori, fronte & facie minus prominulis, antennarum articulis 1 & 2 rufis, thoracis vittis nigris nonnulli latioribus, ab domine præter maculas irregulares fuscas micantes etiam linea media interrupta nigra ornato, squamis sub alis albidiорibus, ut & oculis maris magis cohærentibus, facile dignoscitur.

**3. *A. vagans*:** obscure cinerea, antennis, thoracis vittis 4, abdominis linea dorsali, femoribus anticis basi, tarsisque omnibus & totis, nigricantibus; pedibus rufostaceis; alis basi squamisque lutescentibus, nervis transversis subinfuscatis, ordinario subcurvo; oculis maris appropinquantibus. ♂♀. (Long.  $3\frac{1}{2}$  — 4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 112. 51? Zett. Ins. Lapp. 688. 118.  
 ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 78. 93. ♂♀. typica. — *Aricia*  
 Macq. Bull. 2. 288. 9? ♂♀. — Meig. Dipt. 7. 314. 18?

Hab. in silvis, soliis fruticum, graminosis, floribus Umbellatarum, etiam in ligno recenter secato, per Scandinaviam, 20 Maj.—2 Sept., haud raro; scilicet in Scania ad Abusa, Tranås, Esperöd &c., non parce; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena, Lärketorp, sat frequens; in Upplandia ad Holmiam. D. *Wahlberg*; in Dalecarlia; in Jemtlandia ad Forsa juxta radicem Mullsjellet (in ligno Abietis) Jul. frequens; in Lapponia meridionali Umensi ex. gr. in alpe Stöttingsjellet, rarius; in Norwegia ad Evenås Nordlandiae freq.; e Dania a D. *Staeger* missa. (Ad Sedinum Germanorum 8 Jul. 1842 a D. *Dahlbom* lecta).

♂♀. Valde similis & affinis *Anth. erranti* n:o 1; sed magnitudine paullo majore, scutello toto obscure cinereo, nec apice rufescente, alis basi magis flavicantibus, abdomine linea tantum media obscura, nec quoque maculis fuscis inicantibus, ut & oculis tenuius hirtis maris paullo magis distantibus, dignata. Frons & facies modice prominulae. Caput albido-micans. Abdominis linea dorsalis fusca in segmentis 1, 2 & 3; sepe subinterrupta. Nervus transv. ordinar. modice 1. minus incurvus. Oculi ♂ per orbitas albas & lineam frontalem nigram paullo remoti. Punctum supra antennas albidum. Variat ♂ femoribus etiam intermediis basi obscuris.

*Obs.* Palpi in nostris speciminiibus, iisque plurimis, semper toti nigri, & interstitium frontale in ♂ non tenuerunt, unde dubium oritur de identitate speciei Fallenianæ & Meigenianæ.

4. *A. perdita*: cinerea, antennis, thoracis vittis 4, abdominalis linea dorsali interrupta pedibusque nigricantibus; scutelli summo apice, genubus tibiisque rufo-testaceis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis infuscatis,

ordinario incurvo, squamis albidis; oculis maris appropinquantibus. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 6. 376. 216. ♂. *Aricia* Meig. Dipt. 7. 311. 11.

Hab. in foliis fruticum &c., per Scandinaviam, 1 Jun.—1 Aug., passim, in copula etiam semel capta; scilicet in Scania ad Lund & Esperöd sat frequens; in Ostrogothia ad Gusum a Cel. *Wahlberg* lecta mihiique communicata; in Jemtlandia ad radicem Mullsjellet parce; in Lapponia Umensi ad Frederica raro; e Dania a D. *Stægger* sub nomine: \**A. exoleta* Meig. l. nov. spec.?\* in utroque sexu communicata. (E Glogavia a D. *Zeller* individuum masculum sine synonymia missum).

♂♀. Ab antecedentibus mox dignoscitur femoribus omnibus cinerascenti nigris (in ♀ femorib. posticis interdum ferrugineis), & præterea ab *Auth. signata* (2), cui de cetero similis, antennis totis nigris, oculis ♂ magis remotis ut & abdome præter maculam oblongam fuscam in medio segmentorum 1, 2 & 3, immaculato, certe diversa. Caput albo-cinereum, micanus. Frons & facies modice prominulæ. Oculi ♂ mediocriter, ♀ tenuiter hirti. Palpi toti nigri. Genæ infra oculos descendentes. Punctum supra antennas album nullum. Vittæ thoracis nigræ 4, quarum 2 mediae tenuiores. Scutelli margo apicalis plerumque rufescens. Abdomen postice setosum. Alæ basi parum stramineæ. Coxæ anticæ testaceo-cinereæ.

*Obs.* *Auth. exoleta* (*Aricia* nob.) Meig. major est & pedibus totis nigris gaudet.

5. *A. scutellata*: cinerea, antennarum articulo ultimo, thoracis vittis 4, abdominis linea dorsali, femoribus anticis basi, tarsisque omnibus & totis, nigricantibus; antennis basi, scutelli margine pedibusque, ruso-testaceis; alis cinereo-hyalinis, basi squamisque sordide pallescenti-

bus, nervis transversis infuscatis, ordinario incurvo; oculis maris arete cohaerentibus. ♂. (Long. 3 lin.).

Hab. in Suecia rarissime; in Ostrogothia ad Wadstena 2 specimina mense Julio inveni.

♂. Simillima *A. signata* (2), sed magnitudine paullulum majore, antennis basi obscurius testaceis, abdomine præter lineam dorsalem fuscum in segmentis 1, 2 & 3, subimmaculato seu maculis lateralibus fuscis micantibus vix ullis l. obsoletissimis, alis basi subpallescensibus ut & squamis sordide flavidis, nec albis, satis distincta. Frons & facies band prominentes. Oculi magni, perspicue hirti. Palpi nigri. Scutellum testaceum, macula basali cinerea. Abdomen postice setosum. Nervi longitudinales 3 & 4 apice leviter tantum divergentes. Reliqua ut in *Anth. signata*.

6. *A. spinicosta*: cinerea, antennis, thoracis vittis subquatuor, pedibusque, nigricantibus; geniculis tibiisque rufo-testaceis; alis cinereo-hyalinis, subimmaculatis, nervo transverso ordinario subflexo, costa ciliata, spinula distincta, squamis pallescentibus; *femina* puncto supra antenas albo. ♀. (♂). (Long. 3 lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi rarissime; ad Qwickjock mense Jul. a D. Prof. Boheman inventa, mihiique ad describendam in uno specimine benigne mutuo communicata.

♀. Abdomine immaculato, alarum costa a basi ad medium nigro-ciliata, spinula nigra perspicua ut & puncto supra antenas niveo, a præcedentibus præcipue dignoscitur. Similis *A. signata* (2), sed præter notas nuper allatas differt etiam: antennis totis nigris, thoracis lineis nigris fere tenuioribus, lateralibus obsoletis, scutello immaculato, abdomine oblongo-cylindrico, acento, subflavido-griseo (nec cinereo), alarum nervis transversis vix

I. parum infuscatis, ordinario leviter inflexo, squama sordide flavida, nec albida; ut & femoribus omnibus nigricantibus.

*Mas*, paullo minor & angustior, oculis sat late distantibus paullo tamen propioribus quam in ♀, cum femina ad Quickjock, deprehensus erit, mihi ignotus.

7. *A. lata*: albo-cinerea, capite argenteo, antennis, thoracis lineis 4, lateralibus interruptis, abdominis fasciis 3 undulatis pedibusque, nigricantibus, tibiis obscure testaceis; alis aqveis, nervis transversis fuscedine cinetis, ordinario inflexo, squamis albis; oculis maris appropinquantibus. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 106. 40. (immerito ad subdiv. oculis nudis relata) ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 664. 14. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 56. 42 ♂♀. *Aricia* Macq. Buff. 2. 292. 30. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 314. 15.

Hab. in succo stillante Qvercus & Betulæ, etiam in truncis arborum, 2—30 Jul., passim; seilicet in Scania ad Lindholmen, Esperöd, Beckaskog &c.; in Ostrogothia ad Gusum (*Wahlberg*), Wadstena, Lärketorp sat frequens; in Lapponia Umensi ad Åsele raro; in Nordlandia Norwegica ex. gr. ad Hackstén parcee.

♂♀. *Aricia hilari* (n:o 33) subsimilis. Oblonga, late cinerea, pulchre nigro-picta. Frons sub prominens. Caput argenteum, vitta frontali nigra, in ♂ angustata, in ♀ lata. Oculi tenuiter hirti. Antennæ longiusculæ, nigræ, seta distincte plumata. Epistoma apice reflexum & infra oculos descendens. Palpi cylindrici, nigri. Thoracis lineæ 4, harum 2 mediae angustiores ultra medium dorsi productæ, & 2 laterales interruptæ, adjacente utrinque extus ante alas macula oblonga ejusdem coloris; macula antescutellaris fusca. Scutellum cinereum, macula basali fusca. Abdomen cinereum, segmentis basi fasciis un-

dulatis fuscis, & maculis dorsi 4 oblongo-trigonis in lineam medianam dispositis, brunneis. Alæ hyalinæ, nervis transv. distincte infuscatis. Nervi longitudinales 3 & 4 apice divergentes. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ magnæ, albæ, valvula superiore inferiorem minime tegente. Pedes ut in diagnosi. Halteres flavi.

††. Oculi nudi.

a). Abdomen aut leviter l. indeterminate fusco-submaculatum; aut immaculatum.

α. Nervus transversus ordinarius rectiusculus.

8. *A. Angelicæ*: fronte haud prominente cinera-seنس, antennis, thoracis vittis 4, abdominis linea dorsali tenui, femoribus antieis (in ♂) basi, tarsisque omnibus, nigricantibus; pedibus rufescentibus; alis basi squamisque palecentibus, nervis transversis non infuscatis, ordinario subrecto; oculis maris subcohærentibus. ♂♀. (Long. 3—3½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 117. 59? ♂♀. Ahrens. Fn. 10. T. 25. Zett. Ins. Lapp. 688. 120. ♂♀. *Musca* Scopol. Ent. Carniol. 884? Fall. Muscid. 78. 91. ♂♀. certe. — *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 61. *Musca deceptoria* Schrank Austr. 458. 932.

Hab. in floribus Umbellatarum &c., plerumque locis sylvaticis, per Scandinaviam, 15 Jun.—17 Aug., passim frequentissima; in copula; scilicet in *Scania vulgaris*; in Ostrogothia frequens; in Gotlandia ad Färön, Sanda &c. parce; in Uplandia ad Holmiam & in Bahusia ad Marstrand, D. *Wahlberg*; in Lapponia Tornensi ad Muonioniska rarissime. (E Kilia a D. *Wiedemann* missa; & ad Hambur-gum lecta a D. *Dahlbom* communicata).

$\delta\varphi$ . Similis *Anth. vaganti* (3), paullo minor, & differt: colore minus obscuro, alis basi & squamis minus intense flavidis, nervo transverso ordinario magis recto seu leviter tantum flexo, vix infuscato, oculis nudis, in  $\sigma$  propioribus, ut & femoribus omnibus in  $\varphi$  plerumque rufo-testaceis. Oculi maris magni sat approximati, non vero arete cohaerentes, per lineam tenuissimam nigram, orbitasque angustissimas albas, angustissime disjuncti; feminæ per orbitas mediocrem cinereas & vittam frontalem latissimam, late remoti. Scutellum cinereum. Abdomen ovatum, convexum, cinereum 1. flavidocinereum 1. griseum, linea dorsali tenui in segmentis 1, 2 & 3 nigra, interdum obsoleta. Alarum nervi ut in prioribus directi, sed transversus ordinarius minus flexus, interdum subrectus. Var.  $\sigma$  femoribus intermediis basi etiam obscuris. — Cfr. *A. urbana* n:o 17.

9. *A. tincta*: fronte haud prominente cinerascens, antennis, thoracis vittis 4, abdominis linea dorsali tenui, femoribus anticis (in  $\delta$ ) basi, tarsisque omnibus, nigricantibus, scutelli limbo postico late, pedibusque fulvescentibus; alis basi squamisque pallescentibus, nervis transversis non infuscatis, ordinario subrecto; oculis maris subcohaerentibus.  $\delta$ . (Long. 3 lin.).

An *Anthomyia Angelicæ* Meig. Dipt. 5. 117. 59?  
(sed non Fallen eadem).

Hab. in Scania rarissime; ad Abusa prope Lund semel capta.

$\delta$ . Priori ut ovum ovo simillima, differt solummodo scutello rufo-testaceo, basi macula media subtriangulari indeterminata cinerea.

10. *A. coarctata*: fronte parum prominente cinerascens 1. flavescenti cinerea, antennis pedibusque nigrofuscis, tibiis testaceis; alis flavicantibus, nervis transversis rectis, non infuscatis, squamis parvis pallidis; mas: oœu-

lis subcohaerentibus, abdomine linearis, depresso; *femina*: macula supra antennas femoribusque posterioribus ferrugineo-flavis. ♂♀. (Long. circiter 2 lin.).

Var. a. ♂♀. tibiis testaceis.

Meig. Dipt. 5. 130. 85. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 690. 127. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 81. 108. ♂♀. *Hylemyia* Macq. Buff. 2. 322. 26. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 316. 41.

Hab. in floribus Umbellatarum, foliis fruticum, graminosis &c., per Scandinaviæ hortos, prata & silvas, 10 Jul.—15 Sept., vulgaris, in copula capta; scilicet in Scania ubique frequens; in Blekingia, D. v. *Borch*; in Smolandia, D. *Ljungh*; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c.; in Gotlandia ad Gothem, Stenkyrka, Furillen, Ruthe (in Pimpinella nigra), &c., passim; in Uplandia ad Holmian, Upsaliam &c.; in Helsingia ad Kårböle; in Jemtlandia ad Ristansfors; in Bottnia boreali ad Haparanda; in Lapponiis Umensi ad Lycksele & Tornensi ad Kare-suando, rarius; in Norwegia ad Næs Wærdaliae; in Dania. D. *Staeger*. (E Finlandia a D. *Sahlberg* & e Glogavia a D. *Zeller* communicata).

Var. b. ♂. tibiis saltem apice obscure testaceis, interdum sere nigricantibus.

*Anthom. leptogaster* Zett. Ins. Lapp. 666. 23. ♂.

Hab. cum var. a. passim; in Scania ad Esperöd, in Helsingia ad Kårböle, in Jemtlandia boreali ad Säther, Ristansfors, Åreskutan & Mullsjellet, in Lapponia ad Lycksele & Åsele, atque in Norwegia ad Næs, specimina hujus varietatis præsertim inveni.

♂♀. Valde affinis *Ariciae lascivae* (30) & *flavipenni* (31), praesertim quoad magnitudinem, habitum & formam abdominis maris similis, sed pedum colore differt. Corpus cinerascens, subimmaculatum. Frons leviter prominula. Os parum exsertum. Antennæ mediocres, nigrae, seta distincta, sed non longe plumata. Palpi mediocres, filiformes, nigri, pilosi. Nervi longitudinales: 3:tus in apice alæ excurrentes, & 4:tus versus apicem subparallelis. Nervus transv. ordinarius ante medium areæ insertus, subrectus l. leviter tantum flexus. Costa subciliata, spinula praesertim in ♀ distincta. Squamæ parvæ, sordide albidae, ciliatae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres flavi. Pedes spinulosi. *Mas:* oculi subcohaerentes, linea frontali atra angustissima, antice nonnihil latiore & interdum macula flava supra antennas. Abdomen angustum & supra & subtus sat longe pilosum, cinereum, incisuris obscurioribus, ano inflexo, cinereo, appendice terminato & stylis 2 ventralibus nigris sufflito. Pulvilli longiusculi, albi. *Femina:* oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem latiusculam, antice flavam, distantes. Abdomen lanceolatum, parum pilosum, cinereum, immaculatum. Pulvilli parvi, albi. — Variat etiam ♀ femoribus quoque posterioribus obscuris; ad Randijaur Lapponiae Luleensis, 12 Aug. rarius, D. Boheman.

11. *A. nigricolor:* fronte non prominente nigricans, subnitida, femoribus posterioribus tibiisque omnibus flavis; alis maris fuscans, nervis transversis rectis, squamis subfusciscentibus; *mas:* oculis cohaerentibus, abdome ovato. ♂. (Long. 2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 195. 195 (secundum Fall. transcripta). — *Musca* Fall. Muscid. 81. 101. ♂.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania in unico specimine a D. Fallén inventa.

♂. Obtuse ovata, subnitida, nigra. Oculi magni, arte cohaerentes, in mortua obscure ferruginei. Antennæ longiusculæ, an-

gustatæ, seta distinete plumata. Frons & facies non prominentia. Epistoma infra oculos non descendens, nec apice reflexum; totum obscure cinereum. Palpi subfiliformes, nigri, pilosi. Thorax ater, pilosulus. Abdomen ovatum, subconvexum, pubescens & pilosulum; obscure cinereum, linea dorsali interrupta & obsoleta, nigra. Anus non appendiculatus. Alæ præsertim ad costam leviter fumatae. Nervi ut in priori directi. Nervus transv. ordinarius omnino rectus; & costa nuda, & spinula vix illa. Squamæ mediocres, valvula superiore inferiorem non tegente; totæ sordide albidae. Halteres flavi. Pedes mediocres, pilosi, ferrugineo-flavi, anteriorum coxis femoribusque obscure cinereis. Tarsi omnes nigri. Pulvilli mediocres, albi.

**12. *A. fuscipes:*** fronte non prominente obscure cinerascens, thoracis lineis subquatuor abdominisque unica dorsali, fuscis; antennis linearibus pedibusque nigris, tibiis fusco-testaceis; alis hyalinis, nervis transversis rectis, squamis albidis; **femina:** fronte macula didyma, atra. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad villam Esperöd in paroecia Mellby 2 specimina inveni.

♀. Ovata, obscure cinerea, opaca. Caput griseum. Oculi sat late distantes, vitta frontali lata nigra, macula verticis trigona grisea. Antennæ longinsculæ, angustatæ, nigræ, seta distinete plumata. Epistoma infra oculos non descendens. Palpi subcylindrici, nigri. Thoracis lineæ 4 fuscae, quarum laterales obsoletæ. Abdomen ovatum, convexum, cinereum, posterius pilosulum, linea dorsali fusca, in segmentis 1 & 2 perspicua, in 3:to obsoleta. Alæ hyalinæ, nervis basi sordide albescentibus. Nervi ut in præcedente directi. Costa nuda. Squamæ & halteres ut in priore. Pedes nigri, tibiis obscure testaceis.

**13. *A. ignobilis:*** fronte non prominente obscure cinerascens, subnitens, immaculata, antennis linearibus, fe-

moribus anterioribus tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis hyalinis, nervis transversis rectis, squamis albidis; *femina*: fronte vitta didyma, atra. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Ostrogothia ad Gusum forte rarissime, mihi in uno tantum individuo a Cel. Prof. *Wahlberg* communicata.

♀. Tota nigrescenti cinerea, subnitida. Caput ut in priore constructum, cinereum, vitta frontali lata nigra per maculam verticis elongato-trigonam cinereum divisa. Antennæ cum seta, epistoma & palpi omnino ut in antecedente. Thorax antice rudimento linearum 4 tenuium fuscum. Abdomen ovalum, convexum, immaculatum. Alæ etiam quoad directionem nervorum ut in præcedente, sed costa leviter subciliata, & nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem nonnihil divergentes. Squamae & halteres ut in priore. Pedes ut in diagnosi.

**14. *A. subtessellata*:** fronte subprominente cinerascens, antennis validuseulis, thoracis vittis 4, abdominis linea dorsali maculisque obsoletis, pedibusque, nigris, tibiis testaceis; alis cinereo-hyalinis, nervis transversis rectis, squamis albidis; *femina*: vitta frontali medioeriter lata, atra. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; ad Lund Scaniae 2 specimina inveni.

♀. Oblonga, cinerea, opaca. Caput albidum. Frons nonnihil prominens. Oculi non magni, orbitis albis. Vitta frontalis modice lata, atra, antice subbrunescens, macula ocellorum cinerea. Epistoma subperpendiculare, infra oculos leviter descendens, apice haud reflexum. Antennæ latinuseulæ, nigrae, seta longe plumata. Palpi tenues, filiformes, nigri. Thoracis vittæ 4 parum determinatae, nigrae. Abdomen subconicum, griseum, postice pilosum, vitta dorsali fusca in segmentis basalibus continuata. In segmentis mediis maculæ submictantes fuscae inde-

terminatæ etiam observantur, sed valde obsoletæ & tantum certo situ conspicienda. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis præsertim basi pallidis. Nervi longitudinales 3 & 4 subparallelî, horum primus fere in apice alæ excurrens. Nervus transv. ordinarius rectus, subobliquus, mox ante medium areæ insertus. Costa subnuda. Spinula parva. Squamæ parvæ, sordide albidae, valvulis subæqualibus. Halteres flavi. Pedes nigri, setulosi, geniculis summis & tibiis totis testaceis.

Var. b. ♀. alis vix flavicantibus, abdomine vitta tantum dorsali obscura, maculis fusco-micantibus nullis, tibiis apice nigricantibus, alias var. a. simillima, e Lapponia Lulensis Quickjock a D. Wahlberg missa; hujus videtur.

**15. *A. immatura*:** fronte parum prominente carneo-canescens, antennis validiusculis tarsisque nigris; pedibus flavescenti-testaceis, femoribus anticis lète cinereis; alis cinerascentibus, nervis transversis rectis, infuscatis, squamis parvis, albidis, ♀. (Long. fere  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Esperöd semel capta.

♀. Parva, ovato-oblonga, tota rufescenti cinerea (an nuper exclusa?), opaca, setosa. Frons lata, concolor. Oculi parvi, late distantes. Antennæ latiusculæ, nigrae, seta distinete, sed subtiliter plumata. Epistoma breve, apice subreflexum. Palpi subclavati, lividi, apice nigri. Corpus immaculatum. Abdomen subconicum. Alæ cinereæ, nervis præsertim basi pallidis 1. albidis. Nervi: longitudinales 3 & 4 parallelî; transversi recti, subperpendiculares, infuscati, horum ordinarius paullo ante medium areæ insertus. Costa breviter ciliata. Spinula medioris. Squamæ minutæ, albidae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres pallidi. Pedes rufescentes, tarsis nigris. Femora antica latere exteriore cinereo-micantia.

**16. *A. vittipes*:** fronte subprominente cinerea, antennis longiusculis, thoracis linea media maculisque late-

ralibus hamiformibus, scutelli lateribus, abdominis maculis, femorum vittis supernis tarsisque, nigricantibus; pedibus rufo-testaceis; alis hyalinis, nervis transversis subrectis, squamis albidis; *femina*: vitta frontali nigra, postice bifida. ♀. (Long. circiter 3 lin.).

Wahlb. in litteris 1843.

Hab. in Suecia media rarissime; in trunco Betulæ albæ loco umbroso ad Gunnebo in paroccia Fåssberg prope Gothoburgum Westrogothiæ d. 21 Jun. 1841 a Prof. *Wahlberg* inventa.

♀. Cum speciem ipse non vidi, descriptionem plenam & adcuratam, quam mihi benigne communicavit eximus Detector, heic allegare volui. "*Ariciæ hilari* (n:o 33) proxima, pedibus rufo-testaceis &c. facile tamen distincta. Magnitudine fere *Anth. strigosæ* (infra 20), oblonga, cinerea. Caput totum sordide argenteum. Oculi nudi, sat late remoti, brunnei. Vertex linea (vitta frontali) latinœula nigra, postice abbreviata, bifida, setis longis, remotis, vix ad basin antennarum descendenteribus. Frons paullo prominens. Epistoma descendens, (apice) subreflexum, setis mystacinis pluribus, quarum una utrinque sat longa, genis rigide pilosis. Antennæ epistomate parum breviores, nigrae, spathulato-lineares, articulo ultimo basalibus simul sumtis duplo longiori, 2:do dense nigro-hirto & spina longiori divergente munito. Seta basi tantum subincrassata, longissime plumata. Thorax octofarium setosus, serie tertia a latere utrinque antice abbreviata, linea media angusta, obscure brunnea, basi apiceque abbreviata & macula hamiformi utrinque supra radicem alæ lata, atro-velutina; pleuris & pectore immaculatis. Pectus ante alas utrinque serie transversa sellatum medioerium, & sub illo vel supra pedes intermedios setis utrinque 2 longissimis. Scutellum setis 4 longis, 2 apice & una utrinque lateralí; medio cinereum, lateribus nigrum. Abdomen anguste conicum, pilosum, segmentis 3, 4 & 5 utrinque macula basali transversa, nigro-fusca, sub segmento

"antecedente fere retracta, segmentis 2 & 3 setis 3 apicalibus & una utrinque lateralí, sequentibus setis pluribus. Pedes longiusculi, coxis anticis cinereo-testaceis, posterioribus cineris, anterioribus præsertim setosis. Trochanteres testacei. Femora spinosa, rufo-testacea, superne vitta longitudinali subapicali, nigro-fusca, anticorum totam fere partem superiorem occupante. Spinæ femorum anticorum latere exteriori præser-tim obviæ, intermediorum apice utrinque & medio lateris anterioris, posticorum superne frequentiores. Femora tamen omnia subtus parcus spinosa. Tibiae rufo-testacea, spinosæ. Tarsi omnes toti alii, pulvillis parvis, albis. Alæ basi quoque hyalinæ, nervis fuscis, costa spinula minuta; nervo 3:to longitudinali in summum apicem excurrente, nonnihil versus 4:um curvato; transverso ordinario subrecto, paullo ante medium areæ inserto; transverso medio nervi auxiliaris præcise opposito; auxiliari paullo ante medium costæ desinente. Squamae & halteres albida". *Wahlb.*

*β. Alarum nervus transversus ordinarius flexus.*

Oblongæ plerumque. Alæ sèpissime immaculatæ.

**17. *A. urbana*:** fronte haud prominente cinerascens, antennis, thoracis vittis 4, abdominis ovati linea dorsali tenui, femoribus anticis (in ♂) basi, tarsisque omnibus, nigricantibus; pedibus rufescensibus; alis basi squamisque pallescentibus, nervis transversis non infuscatis, ordinario infexo; oculis maris subcohærentibus. ♂♀. (Long. 3— $3\frac{2}{3}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 118. 60. *Aricia* Macq. Buff. 2. 292.

**27. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 62. *Musca Angelicæ* var. *β. rustica* ♂♀. Fall. Muscid. pag. 79.**

Hab. in soliis fruticum & floribus, locis umbrosis sylvaticis, 1 Jun.—30 Aug., per Scandinaviam meridiona-

lem & medium, vulgaris; scilicet in Scania tota, Smolandia, Ostrogothia (ad Lärketorp, Wadstena &c.), Gotlandia (ad Ruthe, Nähr &c.), Nericia &c., frequenter visa; e Dania a D. *Staeger* missa.

$\delta\varphi$ . *Anth. Angelicae* (8) ut ovum ovo simillima. nec differt ab illa nisi nervo transverso ordinario distinctius flexo & ita in utroque sexu. Abdomen quoque in ♂ magis cinereum, nec flavido-cineraceens, & in ♀ maculis irregularibus fuseo-micantibus, sed valde obsoletis & certo tantum situ in rudimento observandis ornatum. Reliqua exakte ut in *A. Angelicae*.

18. *A. conica*: fronte sub prominente griseo-cinerae sens, antennis, thoracis lineis 4, lateralibus latioribus, abdominisque conici unica, pedibusque, nigris, tibiis obscure testaceis; alis squamisque flavicantibus; *mas*: oculis subcohærentibus, ano appendiculato; *femina*: vitta frontali lata, atra.  $\delta\varphi$ . (Long.  $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 97. 25.  $\delta\varphi$ . Wiedem. Zool. Mag. I. 4. p. 79. 29.  $\delta\varphi$ . Ahrens. Fa. 10. T. 23. Zett. Ins. Lapp. 689. 124.  $\delta\varphi$ . *Musca* Fall. Muscid. 83. 107. var. a.  $\delta\varphi$ . — *Hydrophoria* Macq. Buff. 2. 298. 1.  $\delta\varphi$ . *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 42.

Hab. in floribus Umbellatarum & truncis arborum locis silvaticis, per totam Scandinaviam, 5 Jun.—Jul.—Aug.—16 Sept., vulgatissima, in copula capta, etiam e pupa cylindrica, nuda, ferruginea exclusa; mibi in Scania, Smolandia, Ostrogothia, Gotlandia, Nericia, Uplandia, Jemtlandia usque ad Åreskutan, Mulfjellen & Skalstungan, in Lapponia Umensi, Lulensi & Tornensi per regionem silvaticam, Norwegia ad Næs & Sunl Wærdalæ, præsertim frequenter obvia; e Dania ut ibi non rara incola in utroque sexu a D. *Staeger* missa. (E Kilia a D. *Wiede-*

*mann, ex Hamburgo a D. Dahlbom, & e Glogavia a D. Zeller, etiam communicata).*

♂♀. Statura oblonga, thoracis lineis 4 nigris, quarum lateralibus latioribus, alis elongatis angustis, &c., ab affinibus dignoscitur. Subflavido-cinerea, opaca. Caput argenteo-micans. Frons paullo prominens. Antennæ mediocres, nigrae, seta distincte plumata. Epistoma breviter infra oculos descendens, apice parum reflexum. Palpi subfiliformes l. cylindrici, nigri. Scutellum cinereum. Abdomen conicum, griseo-flavidum, linea dorsali nigra, segmentis margine apicali setulosis. Alæ præsertim basi flavescentes. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallelis l. versus apicem tantum leviter subdivergentes; transversus ordinarius obliquus, modice l. distincte inflexus, fere in medio l. mox ante medium areæ insertus. Costa subnuda. Spinula parva adest. Squamæ mediocres, flavescentes, ciliatæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes mediocres, setosi, nigri, tibiis testaceis l. obscure ferrugineis. *Mas:* oculi subcohærentes, linea frontali nigra tenuissima, antice latiore, & orbitis angustissimis albidis, valde anguste disjuncti. Abdomen conicum, griseo-flavidum, linea media nigra. Anus tuberculo longe inflexo. Segmentum penultimum ventrale stylis 2 nigris munitum. Pulvilli elongati, albi. *Femina:* oculi per vittam frontalem latam atram, macula ocellorum cinerea inscriptam, & orbitas modice latas, albidas, remoti. Abdomen ovato-l. oblongo-conicum, flavo-griseum, maculis micantibus fuscis. Pulvilli parvi.

Var. b. ♂♀. paullo minor, abdomine in utroque sexu immaculato.

Zett. Ins. Lapp. l. c. var. b. ♂♀.

Hab in Lapponia rarissime; in alpium Tornensium ju o, in ipsa nive d. 12 Jul. 1821 in copula semel capta; ad Åreskutan Jemtlandiae 2 specimina 24 Jun. 1810 etiam inveni; in Lapponia Lulensi ♂ Jul. 1813 a D. Boheman lectus.

Var. c. ♂. simillima var. a. sed paullo minor, & differt abdomine cinereo, nec flavido-cinereo, linea media nigra. Valde affinis videtur *Anth. virginea* Meig. Dipt. 5. 96. 22. ♂. Duo tantum individua hujus vidi, unum in Ostrogothia & alterum ad diversorum Næs Norwegiae 8 Jul., capta.

*Obs.* *Anth. conica* var. c. ♀. nob. Ins. Lapp. ad *Anth. punctam* (29) pertinet; & Falleni *Muscæ conicæ* varietates: β. γ. & ε. ad *Anth. strigosam* (20) referendæ.

*Obs.* Varietatem femineam macula supra antennas parva, fulva, in alpib. Dalecarlicis legit D. Boheman.

19. *A. dubitata*: fronte subprominente nigra, nitida, capite albidente; thoracis antico vittis subquinis inchoantibus cinereis; tibiis obscure testaceis, alis squamisque flavicantibus; *mas*: oculis cohærentibus, ano appendiculato; *femina*: vitta frontali latiuscula, altra. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 195. 196. ♀. (secund. Fallén transcripta). *Musca* Fall. Muscid. 82. 102. ♀. typica.

Hab. in Suecia meridionali & media, rarius; in Scania ad Lund & Esperöd uterque sexus inventus; in Gotlandia ad Ejsta specimen masculum 2 Jul. 1841 legi.

♂♀. Valde similis & affinis priori, præsertim ejus varietati b.; sed differt: corpore toto nigro, nitido, in thoracis antico tantum maculis 4 1. 5 cinereis initium vittarum totidem indicantibus. Abdomen conicum, vix cinereo-micans. Squamae sub alis parvæ, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Reliqua omnia exacte ut in præcedente, ejus tamen varietas detrita vix existimanda.

20. *A. strigosa*: fronte parum prominente cinerascens, opaca, thoracis lineis 3, abdominalisque unica dorsali, fuscis; antennis pedibusque nigris; femoribus poste-

rioribus & macula supra antennas in ♀, tibiisque omnibus in utroque sexu, flavis; alis cinereis, squamis parvis, albidis; *mas*: oculis arete cohærentibus, abdominis segmento ventrali penultimo appendiculato. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 131. 87. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 689. 125. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 296. 61. ♂. *Hylemyia* Maeq. Buff. 2. 317. 3. ♂♀. Meig. Dipt. 7. 316. 41. *Musca vagans* Panz. Fn. 59. f. 18. ♀. var.? *Musca conica* var. β. ♂♀, γ. ♀. & ε. ♀. Fall. Muscid. pag. 84

Hab. in soliis fruticum, graminosis, floribus Achilleæ, Chrysanthemi &c., locis sylvaticis & nemoralibus, per totam Scandinaviam, 1 Jun.--20 Sept., ubique vulgatissima; nempe in Scania, Blekingia, Smolandia, Ostro- & Westrogolia, Gotlandia (ad Rhone, Stenkyrka &c.), Nericia, Uplandia, Jemtlandia (in Frösön & Åreskutan), mihi copiose obvia; in Bottnia boreali ad Haparanda & in Lapponia, rarius; in Norwegia ad Dovre, Alstahaug, Næs, Thynæs &c., iterum frequenter occurrent; e Dania ut ibi etiam frequens incola a D. Staeger communicata. (Ad Neuenkirchen Germaniæ jam 20 Maj. & iterum Septemb. a D. Dahlbom lecta; & e Glogavia atque Reinerzi Silesiæ plura individua mascula a D. Zeller missa; mares quoque e S:t Sever Galliæ a D. Leon Dufour 1811 obtinui). Larvæ in stercore bovino mens. Septemb. inveniuntur. Ova etiam in Fungis deponuntur, teste D. Robineau Desvoidy. In statu pupæ hybernant & mense Mayo in imagines declarantur.

♂♀. *Anth. conicæ* (18) simillima, magnitudine vero plerumque nonnihil minore, fronte paullo minus prominente, thoracis lineis tantum 3, alis & squamis vix flavicantibus, his valvulis

subæqualibus, ut & in ♂ oculis arctius cohærentibus & tuberculo anali non inlexo, segmento tantum ventrali penultimo stylis 2 munito, atque in ♀ femoribus saltem posterioribus maculaque supra antennas fulvo-flavis, satis superque distincta. Thoracis linea media brunnea lateralibus evidenter, vittiformis, in scutelli basin saepe continuata. Inter has lineas series punctorum fuscorum ad radicem setarum etiam plerunque observantur. Alæ basi vix pallescentes. Nervi longit. 3 & 4 paralleli, horum 3:tius in summo apice excurrens. Transversus ord. distincte inflexus. Costa subnuda; spinula adest. Squamæ albidae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albidi. *Mas:* abdomen anguste conicum, cinereum, linea media incisurisque fuscœ-nigris. *Femina:* orbitæ oculorum cinereæ. Vitta frontalis latiuscula atra, antice macula fulva, postice macula ocellorum cinerea. Abdomen oblongo-conicum, flavo-griseum, maculis micantibus fuscis obsoletis.

Variat ♂ tibiis anticis etiam obscuris; & ♀ femoribus omnibus ferrugineis. Variat quoque uterque sexus abdominis apice nigrante, nitente, detrito, quæ est *Musca conica* var. *ε.*  
Fall. l. e.

*Obs.* Femina hujus speciei sub nomine: "*Hylomyia strigosa* Macq." e S:t Sever a D. *Leon Dufour* missa.

21. *A. nigrimana:* fronte parum prominente cinerascens, opaca, thoracis lineis 3, abdominisque unica dorsali, fuscis, antennis, femoribus anticis in ♂, tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, squamis parvis, albidis; *mas:* oculis arete cohærentibus, abdominis segmento ventrali penultimo appendiculato. ♂. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 132. 88. ♂. & Ejusd. Dipt. 7. 316. 43.

Hab. in Scandinavia meridionali & media, rarius; in Scania ad Abusa, & in Ostrogothia ad Wadstena tria exempla inveni; e Dania specimen unicum mense Aug.

captum sub nomine allato mihi communicavit D. Staeger.

♂. Praecedenti ut ovum ovo simillima, & differt tantum magnitudine nonnihil majore, & femoribus posterioribus in ♂ ferrugineis, nec nigris.

*Obs.* An femina hujus speciei, mihi non rite cognita, inter varietatis *Anthomyzæ conicæ* Fall. (*Anth. strigosæ* nob.), ut opinatur D. Meigen l. c., quærenda, pro certo dicere non audeo. Pedum color affirmat, magnitudo major negat; observationes & præsertim copulatio individuorum observata in posterum decident.

22. *A. operosa*: fronte parum prominente cinerascens, opaca, antenuis, thoracis lineis 4, intermediis tenuissimis, abdominisque unica dorsali, pedibusque, nigris, tibiis testaceis; alis cinereis, squamis albidis; *mas*: oculis cohaerentibus, ano appendiculato; *femina*: vitta frontali atra. ♂♀. (Long.  $1\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 102. 33? ♂. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7.

316. 45?

Hab. in Scandinavia rarissime; ♂ e Dania sub nomine indicato a D. Staeger missus; ♀ in Scania semel capta.

♂. Simillima *Anth. conicæ* (18), sed magnitudine duplo & ultra minore, fronte nonnihil minus prominente, thoracis lineis intermediis subtilioribus, alis minus flavidantibus, squamis albidis, nec flavidis, &c., distincta videtur. Structura ani etiam ut in illa, tuberculum nempe anale nigrum inflexum, apice hamatum, & præterea styli 2 nigri conico-cylindrici, pilosi (pilis subtus in denticulum brevem subtus condensatis), versus anum vergentes & genitale inter se excipientes.

♀ forte hujus. Similis mari, sed oculi remoti per orbitas cinereas & vittam frontalem mediocriter latam, nigram, macula supra antennas parva, fulva.

*A. coronata*: fronte leviter prominente cinerascens, opaca, antennis, thoracis lineis 4, intermediis per lineolam brunneam divisis, abdominisque unica dorsali, pedibusque, nigris, tibiis testaceis; alis cinereis, squamis mediocribus, albidis; *femina*: vitta frontali latiuscula, atra, antice fulva, abdomine ovato. ♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Musca conica* var. ♂. ♀. Fall. Museid. p. 81.

Hab. in Suecia meridionali & media non frequens; in Scaniæ fluvio Höjeå ad Kjellby prope Lund in soliis Potamogetonum & Nymphææ in societate cum *Hydromyza (Cordylura) livente* Fall. medio mensis Julii 6 spēcimina inveni. Sub nomine: *A. brunneifrons* ex Holmia a D. *Wahlberg* missa. (E Glogavia sub nomine: *Anth. densa* Bouch. a D. *Zeller* etiam communicata).

♀. Ab *Anth. conica* (18), cui de cetero similis, differt: statura corporis magis ovata, præsertim abdomine latiore, subdepresso, macula supra antennas fulva, thoracis dorso præter lineas 4 ordinarias nigras etiam lineola media utrinque abbreviata brunnea l. ferruginea, alis magis hyalinis, immaculatis, nec flavidis, ut & squamis albidiioribus. Caput albicans. Frons subprominens. Orbitæ oculorum cinereæ postice (in vertice) levissime brunneæ l. griseæ, unde ad *Anth. brunneifrontem* (26) accedit. Vitta frontalis mediocriter lata, atra, antice ferrugineo-fulva, postice macula ocellorum trigona, grisea. Antennæ mediocre, nigrae, seta distincte plumata. Epistoma apice subreflexum. Palpi longiusculi, cylindrici, atri. Thoracis lineæ mediæ tenues. Abdominis lineola obscura vix nisi in segmentis mediis perspicua. In individuis bene conservatis maculae irregulares micantes fuscae observantur, at obsoletissimæ. Nervi longitudinales 3 & 4 subparallelē l. versus apicem levissime divergentes; transversus ordin. distincte inflexus, fere in medio areæ insertus. Costa nuda. Spinula nulla. Squamæ albæ, ciliatae, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres alb.

di. Pedes nigri, setosi, tibiis obscure testaceis, anticeis apice fuscis.

**24.** *A. linogrisea*: fronte leviter prominente flavescenti cinerascente, opaca, antennis, thoracis lineis 4, intermediis tenuissimis, abdominisque subeobiei unica dorsali, femorum anticum vitta superna, tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, squamis medioeribus, albidis; *mas*: oculis cohærentibus, tuberculo anali inflexo, nigro, segmento ventrali penultimo appendiculato; *femina*: vitta frontali modice lata, atra. ♂♀. (Long. 2½—fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 129. 82. forte. — *Hylemyia* Ejusdem 7. 317. 80?

Hab. in Scandinavia præsertim meridionali & media rarius; in Scania & Ostrogothia marem & feminam rarissime inveni; in Lapponia Lulensi ad Quickjock femina a D. *Bohemani* mense Julio 1843 lecta; ex Hafnia Danorum uterque sexus cum pupis cylindricis, glabris, ferrugineo-brunneis, e quibus egressus, sub nomine: "A. linogrisea Meig.", a D. *Staeger* benevole communicatus. (E Lubeca (Lybeck) a D. D. *Jac. Behrens* & C. J. *Milde* specimina feminea 1843 etiam missa).

♂♀. Valde affinis & similis *A. conica*, cuius varietatem olim putavi; sed vere differt: fronte forte paullo minus prominente, alis squamisque minus flavicantibus, ut & femoribus in utroque sexu flavo-ferrugineis, anticeis tantum superne vitta nigro-cinerea. Oculi etiam maris arctius cohærentes. Structura ani & segmenti ventralis penultiimi appendices omnino ut in *Anth. conica* (18) & *operosa* (22) descripta.

**25.** *A. vetula*: fronte non prominente cinerascente nigra, nitida, capite argenteo; alis cinereis, squamis majus-

culis, albis; pedibus flavis, femoribus anticis fuscis, tarsis omnibus nigris; *mas*: oculis appropinquantibus, abdominis segmento ventrali penultimo appendiculato. ♂. (Long.  $2\frac{2}{3}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime, mihi viva non obvia, sed e Suecia superiore in uno specimine a D. *Marklin* ante plures annos communicata.

♂. Similis *Anth. nigricolori* (11), a qua tamen corpore minus atro h. e. nigro, levissime cinereo-micante, abdome magis oblongo, oculis non cohærentibus, alis cinereis, nec fuscatis, nervis longit. 3 & 4 in apice alæ paullo divergentibus, transverso ordinario leviter inflexo aperte ante medium areæ inserto, ut & squamis albis, abunde distinguitur. Antennæ elongatae, angustæ, nigræ, leviter recurvatae, seta distincte, sed non longe plumata. Oculi per orbitas mediocriter angustas, albas, & vittam frontalem angustam nigram, non late distantes. Epistoma apice non reflexum. Thorax antie cinereo-micans, lineis 4 abbreviatis nigris. Abdomen leviter cinereo-micans, segmentis posticis setulosus. Tuberulum ani parum determinatum, sed styli 2 breves, cylindrici, nigri, pilosi in segmento penultimo ventrali observantur. Nervorum transversorum præsertim medius fuscedine subcinctus. Costa nuda; spinula nulla. Squamae albæ, valvula superiore inferiorem minime tegente. Pedes flavi, femoribus anterioribus fere ad apicem indeterminate, tarsisque omnibus, fuscis.

26. *A. brunneifrons*: fronte sub prominente obscure cinerascens, opaca, capite griseo; antennis pedibusque nigris, tibiis obscure testaceis; fronde, vittis thoracis 3, abdominisque unica dorsali, brunneis; alis cinereis, squamis albescentibus; *femina*: oculis late remotis, vitta frontali modice lata, atra. ♀. (Long. circiter  $2\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 690. 126. ♀.

Hab in Lapponia Tornensi rarissime; in silva abietina ad Wittangi 2 specimina d. 16—17 Jun. 1821 inveni. In succo extillante Betulæ albæ tempore vernali in Upplandia ad Holmiam, & in ripa arenosa humida fluvii Kama prope Quickjock Lapponiæ Lulensis ad finem mensis Julii, a D. Prof. *Wahlberg* quoque capta erit.

♀. Similis *Anth. conicæ* (18), sed capite flavido-griseo, nec argenteo-micante, fronte latiore, brunnescente, antennis nonnihil brevioribus & latioribus, epistomate paullo breviore, apice subreflexo, thoracis dorso obscuriore, ut & alis squamisque minus flavicantibus, dignota. — Oblonga. Frons & facies prominentes. Oculi per orbitas latae obscure brunneas & vittam frontalem atram disjuncti. Macula ocellorum grisea. Seta antennarum distincte plumata, apice nuda. Palpi elongati, cylindrici, nigri. Thorax dorso in fundo cinereus, lineolis nigris revera 4, tenuibus, sed per interstitia præserlim medium brunnea parum perspicuis, ita ut lineolæ duæ mediae cum interstitio quasi unam forment vittam medianam latam obscuram. Scutellum griseo-cinereum. Nerri tongitnd. 3 & 4 paralleli; transversus ord. distincte flexus. Costa nuda. Squamæ non magnæ, albidæ, valvula superiore inferiorem non omnino tegente. Pedes nigri, tibiis ferrugineis, anticis apice obscuris.

*Anth. æqualis* huic subdivisioni inserenda, vide n:o 175.

b.). Abdomen in disco bi- vel quadri-punctatum. Oblongæ. Frons haud prominens. Antennæ angustatæ. Squamæ sub alis mediocre, valvula superiore inferiorem non tegente. Oculi ♂ appropinquantes, ♀ per vittam frontalem didymam nigram late disjuncti.

27. A. *Quadrum*: cinerea, antennis, thoracis lineis 4 obsoletis, abdominis punctis 2 l. 4, pedibusque, nigris, geniculis tibiisque ferrugineis; alis cinereis, basi squamisque pallescentibus, nervo transverso ordinario subrecto,

haud infuseato; *mas*: oculis appropinquantibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{3}{4}$ — $3\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 93. 18. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 689. 121. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 297. 67. *Spilogaster* Maeq. Buff. 2. 295. 7. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 18. *Musca subpuncta* Fall. Muscid. 80. 97. ♂♀. *Mydiua dispar* Rob. Desvoid. n:o 4.

Hab in graminosis & foliis fruticum, per Scandinaviam meridionalem vulgaris, per borealem parcus, 1 Jul. — 30 Sept. obvia; in copula quoque capta; scilicet in Scania ubique frequens, praesertim ad littora marina vulgaris; in Blekingia, Ostrogothia & Gotlandia, parce; in Lapponia rarissime; in Norvegia ad Alstahaug & Levanger, rarius; in Dania non infrequens, D. Staeger. (Ex Hamburgo a D. Dahlbom missa.).

♂♀. Ab *Anth. Angelicæ* (8), cui subsimilis, differt: colore paullo dilutiore, thoracis lineis nigris obsoletioribus, alis basi vix flavicantibus, femoribus omnibus & punctis abdominis nigricantibus, & quod paullo minor. Seta antennarum mediocriter longe plumata. Epistoma subperpendiculare, apice non reflexum. Palpi cylindrici, nigri. Scutellum immaculatum. Abdominis segmenta 2 & 3 punctis aut 4, aut 2, aut nullis; plerumque subtriangularibus (in ♂), 1. rotundatis (in ♀); nigris aut fuscis. Segmenta margine apicali setosa. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; transversi parum infuscati, horum ordinarius subobliquus, subrectus 1. leviter tantum flexus, ante medium areæ insertus. Costa subnuda; spinula vix nisi in ♀ adest. Squamæ ciliatae & halteres, albida. Pedes nigri, setosi, genubus saltem posterioribus & tibiis omnibus rufis. *Mas*: caput argenteum. Oculi per orbitas tenues albas & vittam frontalem atram postice angustam, antice supra antennas dilatata, non late disjuncti. Abdomen oblongum, subconicum. Anus parvus, cinereus, apertura subtus nullis stylis ventralibus

in segmento penultimo prædita. Polvilli elongati, validi, albi.  
*Femina*: caput lète griseo-cinereum. Oculi per orbitas cine-  
 reas & vittam frontalem latam macula postica elongata trigona  
 divisam, late distantes. Abdomen ovato-oblongum, acutum.  
 Pulvilli minuti, albidi.

Var. ♀ femoribus posterioribus obscure ferrugineis, in copula  
 cum var. a. ♂, aliquoties capta.

28. *A. aueps*: cinerea, aut obscure cinerea, anten-  
 nis, thoracis lineis 4, abdominis punctis 2 l. 4, pedibus-  
 que, nigris, geniculis tibiisque ferrugineis; alis cinereis,  
 nervis transversis subfuscatis, ordinario subflexo, squa-  
 mis albidis; *mas*: oculis subcohaerentibus. ♂♀. (Long.  
 $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 689. 123. ♂♀. *Musca quadrum*  
 Fall. Muscid. 80. 99. ♂♀. (exclus. forte synon. Fabr.).  
*Musca meditata* var. β. Fall. Muscid. 87. 111. ♂♀.  
*Musca subpuncta* var. β. *confinis* Mas. Fall. Muscid. 80.  
 97. var. "thorace obscuro." *Musca tigrina* Fabr. Antl.  
 297. 66. var. ♀. Vix *Coenosia tigrina* Meig. Dipt. 5. 212.  
 2.?? & eadem Macq. Buff. 2. 344. l. T. 17. f. 14.??

Hab. in graminosis & foliis fruticum, etiam in Umbellatis, per Scandinaviam meridionalem & medium vul-  
 gatissima, borealem parce; 24 Jun. usque ad 24 Sept.  
 obvia, in copula etiam deprehensa; scilicet in Scania co-  
 piouse; in Smolandia & Ostrogothia (ad Wadstena, Gu-  
 sum &c.), passim; in Ölandia; in Gotlandia ex. gr. ad  
 Nähr, Gothem, Stenkyrka, Kellunge, Fårön, Furillen,  
 Slitö, Wamlingbo, Carlsön &c., frequens; in Uplandia ad  
 Holmiam, D. *Wahlberg*; sed supra hanc provinciam non  
 nisi rarissime mihi visa; in Dania non rara, D. *Staeger*.  
 (Sub nomine: "*Spilogaster quadrum* Macq." semina a

Nobiliss. D. *Leon Dufour* e S:t Sever Galliae co nmu ni-  
cata 1844).

♂♀. Simillima priori, sed plerumque paullo minor, & differt  
præterea: nervo transverso sèpissime paullo magis flexo & in-  
fuscato, alis basi squamisque minus pallescentibus, seta anten-  
narum forte nonnihil longius plumata, ut & oculis maris aretius  
cohærentibus. Reliqua, etiam quoad differentiam sexus, omni-  
no ut in antecedente. — Spinula in alarum costa sal distincta.  
Variat ♂ thorace paullo obscuriore, & hæc est Fallenii *Musca*  
*subpuncta* var. *confinis* genuina.

*Obs.* *Coenosiam tigrinam* Meigeni & Macquarli genninam,  
etiam nomine: "Coen. tigrina Macq." insignitam, nuperrime  
Nobilissimus D. *Leon Dufour* e S:t Sever Galliae in utroque  
sexu communicavit. Hæc vero per magnitudinem minorem,  
oculos in ♂ remotos, &c., a nostra *Auth. ancipite* distincta,  
vix in Scandinavia occurrit, mihi saltem non obvia, sed in  
Pineto ad Nenenkirchen prope Gryphiam a Cel. *Dahlbom*  
Sept. 1844 lecta,

29. *A. depuncta*: cinerea, antennis, thoracis lineis  
subquatuor, abdominis punctis 2 l. 4, femoribus anticis,  
tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis palle-  
scentibus, nervis transversis subinfuscatis, ordinario sub-  
recto, squamis albidis; *mas*: oculis cohærentibus. ♂♀.  
(Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 194. 194 (secund. Fall. descripta).  
Zett. Ins. Lapp. 689. 122. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 80.  
98. ♂♀. var.  $\alpha$ .

Hab. cum præcedente, Jul.—Sept., passim frequens,  
feminæ præsertim versus autumnum vulgares; scilicet in  
Scania ubique; in Smolandia & Ostrogothia etiam fre-  
quent; in Gotlandia ad Wamlingbo, Gothem &c., passim;  
in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; sed in provin-

ciis borealioribus ut in Botniis & Lapponiis non nisi rarissime obvia; e Dania in utroque sexu a D. *Staeger* missa. (E Wienna a D. *Zeller* specimen semineum obtinui).

♂♀. Priori iterum simillima; femoribus vero posterioribus flavo-ferrugineis mox dignota. Nervus quoque transvers. ordinari. plerumque magis rectus. Antennarum seta distincte plumata. Thoracis lineæ obscuræ intermedie angustæ, laterales obsoletæ. Puncta abdominis variant: 4, vel 2, vel nulla; in ♂ plerumque subtrigona, nigricantia, in ♀ sèpius rotundata, brunnea. Alæ præsertim basi pallescentes. Nervi transversi plus minus fuscedine cincti, ordinarius rectus, interdum leviter flexus. Pedes flavo-ferruginei, setosi, coxis omnibus, femoribusque anticus l. totis, l. saltem ad medium, cinereo-nigricantibus, tarsis omnibus & totis atris. — Variant: *mas* coxis saltem posterioribus fusco-testaceis; & *femina* femoribus intermediis basi etiam obscuris.

30. *A. fuscata*: lète cinerea, capite argenteo-micante, antennis, thoracis lineis 4, abdominis maculis dorsibus trigonis una serie dispositis, femoribus anticus tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto; squamis albis; *mas*: oculis appropinquantibus. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{2}$ —3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 126. 78. ♂♀. Tab. 41. f. 8. ♂. *Musca* Fall. Muscid. 85. 109. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 77.

Hab. in Scandinavia meridionali & media, 8 Maj.—15 Sept., passim, truncis arborum viventium sèpe insidens; scilicet in Scania ad Lund, Abusa, Esperöd &c. sat frequens; in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljung*; in Ostrogothia ad Gusum, Wadstena &c.; in Uplandia ad Holmiam,

D. D. Haeffner & Wahlberg; e Dania, D. Staeger. (E Reinerzi & Glogavia mascula a D. Zeller communicata).

♂♀. Pictura abdominis a prioribus affinibus dignota. Antennarum seta longe plumata. Epistoma apice leviter reflexum. Palpi nigri. Thoracis linea 4 fusca; laterales latiores, obsolete. Thorax postice macula dilute brunnea, quæ in scutelli basi continuatur, omnino ut a D. Meigen de *Anthom. trigonali* dicitur. Abdomen in singulo segmentorum 1, 2 & 3 macula media magna triangulari angulo aento versus basin ducto & ad marginem antecedentis segmenti continuato, fusca 1. brunnea. Anus ut in *Anth. quadrum* (27). Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem divergentes, transversus ordinarius subrectus aut leviter flexus. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ ut in prioribus constructæ; albæ. Pedes ferruginei, setosi, femoribus anticis plus minus late fuscis. Tarsi omnes nigri. Femora postica ad apicem postice setis 2 vel 3 majoribus. *Mas*: caput argenteum. Oculi per orbitas tenues albas & vittam frontalem angustatam nigram, non late distantes. Abdomen conicum. Anus parvus, muticus. Pulvilli longi, albi. Pedes longiusculi. *Femina*: caput canum. Oculi per orbitas cinereas & vittam latam griseo-nigram, late disjuncti. Abdomen oblongo-ovatum, irregulariter maculatum. Pedes mediocres. Pulvilli parvi.

*Obs.* In speciminiibus masculis bene conservatis oculi microscopice seu subtilissime & brevissime hirtuli. — Valde affinis *Anth. trigonali* Meig.

\*\*) Autennarum seta subplumata, pubescens, aut nuda.

#### I. Seta antennarum breviter plumata.

##### †. Oculi birti.

31. *A. magnicornis*: fronte prominente cæsio-cineraseens, capite argenteo-micante; antennis magnis, thoracis vittis subquatuor, abdominalisque unica dorsali, tarsis-

que, nigris; pedibus ferrugineis, femoribus ultra medium fuscis; alis cinereis, nervis pallescentibus, transverso ordinario recto; squamis albis; mas: oculis paullo distantiibus. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime, in Scania ad Esperöd specimen unicum legi.

♂. Per faciem porrectam, antennas grossas & oculos remotos ab aliis affiibus dignota. Nec *Coenosia* generis, nam abdomen ovatum, subdepressum seu parum convexum, minime cylindricum. Ovata, cæsio-cinerea. Frons distincte promiens. Oculi mediocres, hirti, per orbitas tenues albas & vittam frontalem latiusculam nigram, modice distantes. Antennæ longitudine ferre epistomatis declivi, validæ, latæ, nigræ, apice truncatæ. Epistoma apice parum reflexum, infra oculos nonnihil descendens. Palpi cylindrici, nigri. Thoracis vittæ nigræ parum discernendæ. Scutellum cæsum. Abdomen cinereum, vitta dorsali fusca in segmentis 1, 2 & 3 minus perspicua; segmentis posterioribus apice setosis. Anus occultatus. Nervi: longitudinales 3:tius prope apicem aë nonnihil versus 4:tum flexus, 4:tus rectissimus, subparallelis; transversus ordinarius subperpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ mediocres, albæ, valvula superiore inferiore non tegente. Halteres nudi, flavi. Pedes mediocres, setosi, flavo-ferruginei, coxis nigris, femoribus ultra medium brunneis, tarsis atris. Pulvilli parvi, albi. — Ni valde fallor specimen descriptum masculum est.

††. Oculi nudi. Frons non prominens. Nervus transversus ordinarius rectus.

32. *A. flavo-tibiella*: cinerea, antennis validiusculis, thoracis lineis subquatuor obsoletis, abdominisque una dorsali, pedibusque, nigris, tibiis flavis; alis cinereo-hyalinis, squamis albis. ♀. (Long. sere 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Dania forte rara, circa Hafniam a D. Dahl-bom semel lecta.

♀. Parva, cinerea. Oculi per orbitas tenues albidas & vittam frontalem latiusculam atram, maculam ocellorum cinereum includentem, modice remoti. Antennæ validæ, nigrae, seta breviter plumata. Palpi nigri. Scutellum cinereum. Abdomen ovatum, griseum, linea media fusca in segmentis 1, 2 & 3. Alæ, nervi, costa, squamae & halteres ut in priori. Pedes nigricantes, tibiis solum flavo-ferrugineis.

33. *A. truglodytes*: cinerea, thoracis lineis 2, abdominis punctis 6, femoribusque, nigris; palpis albis; antennis angustatis basi, tibiis tarsisque flavo-testaceis; alis cinereis, squamis parvis, albidis. ♂♀. (Long. 1—1½ lin.).

Zett. Ins. Lapp. 691. 131. ♀.

Hab. in Scania, Smolandia & Lapponia rarius; in copula; tantum sex individua Scandinavica lustravi; nempe unum ad Skärsjö Smolandiae captum, alterum in Abiete ad Karungi Bottniæ borealis 29 Maj 1821 lectum, tertium in paludosis ad Juckasjervi Lapponiae Tornensis 25 Jun. ejusdem anni inventum, 4:tum ad Thynäs Norwegiæ 4 Jul. 1840 deprehensum, & quintum ad Quickjock Lappon. Lulensis collectum; nuperrime etiam 6:tum ut Scaniæ incolam communicavit D. Boheman.

♂♀. Antennæ basi, & tarsi, rufa, palpi albi & abdomen 6-punctatum, speciem distinguunt, cum *A. pallipalpi* (46) non confundendam. Cinerea, opaca. Frons & facies minime prominentia. Frons lata, utrinque serie simplici valide setosa. Oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem latiusculam nigram, maculam posticam magnam trigonam griseam bisetosam includentem, disjuncti. Epistoma angustum, cinereum, infra oculos non descendens. Antennæ longiusculæ, angustatae, obscure testacea, basi rufescentes, seta tenuiter, non longe, sed distincte plumu-

lata. Seta utrinque mystacina valida, & setulae sub ore plures. Palpi graciles, penduli, proboscidi nigrae incumbentes, albi, non pilosi. Thoracis lineæ 2 dorsales obscuræ, obsoletæ. Abdomen ovale, punctis 6 oblongo-rotundatis late distantibus nigris in segmentis 2, 3 & 4; postice setulosum. Alarum nervi subpallescentes, longitudinales 3 & 4 paralleli. Costa nuda, spinula parva. Squamæ parvæ, albæ, valvula superiore inferiorem vix tegente. Halteres flavi. Pedes setosi, coxis cinereis, femoribus nigris, trochanteribus, geniculis, tibiis tarsisque ferrugineis. — *Obs.* In Ins. Lapp. l. c. longitudo corporis "4½" & palpi "nigri" imunerito dicuntur.

**34. *A. vilis*:** cinerea, antennis mediocribus, thoracis lineis 4, abdominis punctis totidem, pedibusque, nigris; tibiis obscure ferrugineis; alis cinereis, squamis parvis, albidis. ♀. (Long. 1 $\frac{2}{3}$  lin.).

Hab. in Smolandia cum præcedente, rarissime.

♀. Similis priori, sed epistomate latiore, margine apicali reflexo, antennis validioribus, totis, palpisque porrectis pilosis, nigris, alarum spinula costali distinctiori, pedibusque, exceptis tibiis testaceis, totis nigris, abunde dignota. Frons ut in antecedente. Thoracis lineæ 4 fuscæ, obsoletæ. Abdomen ovatum, acutum, punctis tribus paribus nigris, quorum ultimum vix observandum. Nervi transversi levissime infuscati. Reliqua ut in priore vel in diagnosi.

*Obs.* *Aath incerta* Zett. Ins. Lapp. 690. 128 ad *Cordyluræ* genus potius referenda.

## II. Seta antennarum pubescens.

a. Abdomen punctis nigris notatum (in ♀ *A. binotata* immaculatum).

**35. *A. consimilis*:** fronte haud prominente canescens, capite argenteo-micante; antennis cum seta subtili-

ter pubescente, thoracis lineis subbinis, abdominis punctis 6, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus rufo-ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis rectis, infuseatis, spinula costa minutissima; squamis albis; *mas*: oculis appropinquantibus; *femina*: oculis late remotis. ♂♀. (Long. 2—2½ lin.).

Meig. Dipt. 5. 201. 209. ♂. *Musca* Fall. Muscid. 85. 110. ♂. typica. — Zett. Ins. Lapp. p. 690. *Mas* Obs. sub *A. consimili*.

Hab. in Suecia meridionali & media, rarius; in Seania, D. *Fallén*; mascula in Bahusia, & in Götheborgs skärgård ex. gr. in Brännö, Winge, &c., 14—15 Jul. a Prof. B. F. *Fries* inventa, atque ad Marstrand & in Koön a Prof. *Wahlberg* lecta; femina vero ad Holmiam capta sub nomine "*A. depuncta*?" ab eodem Cel. *Wahlberg* mihi communicata.

♂♀. Similis *Anth. depuncta* (29), sed antennarum seta tantum breviter & subtiliter pubescente, nec plumata, ut & oculis maris minus coherentibus, dignota. Antennæ longiusculæ, non validæ, nigrae, basi sœpe fusco-rufescentes. Epistoma superpendiculare, parum infra oculos descendens. Palpi nigri, pilosi. Thoracis lineæ subquatuor, laterales obsoletissimæ, intermediae in ♂ nigrae, in ♀ brunneæ. Scutellum cinereum, immaculatum. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter subdivergentes; transversus ordinarius distinete ante medium areæ insertus, subobliquus, omnino rectus. Spinula costæ vix ulla. Squamæ medioeres, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres flavi. Pedes pilosi, fusco-ferruginei, femoribus anticis obscurioribus, tarsis omnibus atris. *Mas*: oculi per orbitas tenues argenteas & lineam frontalem angustam, antice paullo dilatataam, non late disjuncti. Abdomen conicum, setosum, canum, maculis 6 majusculis, subapproximatis, trigonis,

atris, nempe 2 in singulo segmentorum 1, 2 & 3. Anus multicus. Pulvilli majusculi, albi. *Femina*: oculi per orbitas mediocre, cinereas, & vittam frontalem latissimam maenla ocellorum trigona cinerea inscriptam, late disjuncti. Abdomen subovatum, cinereum, maeulis 6 mediocribus, subrotundatis, nigris, eodem ordine ac in ♂ locatis. Pulvilli minuti.

*Obs.* Vix *Anthomyia compuncta* Meig. Dipt. 5. 147. 111? ♂♀, ubi *Musca consimilis* Fall. ut synonym. refertur; dum pedes in specie Meigeniana "nigri" dicuntur.

*Obs.* *Anth. consimilis* nobis Ins. Lapp. ♀ ad *Anth. protuberantem* infra n:o 41 pertinet.

36. *A. pertusa*: fronte haud prominente cinerea, capite argenteo-micante; antennis cum seta subtiliter pubescente, thoracis lineis subquatuor, abdominis punetis 4, femoribus anticeis tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto, spinula costæ vix ulla, squamis albidis; *mas*: oculis cohaerentibus; *femina*: oculis modice remotis. ♂♀. (Long. 2—2½ lin. & ultra).

Meig. Dipt. 5. 119. 61? ♂. — *Spilogaster* Macq. Buff. 2. 294. 3. ♂. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 83? — Sub varietatibus *Muscae depunctæ* Fall. latet.

Hab. in Dania & Suecia rarius; in Dyrhaven prope Hafniam 11 Aug. 1812 a D. Staeger inventa mibiique sub nomine descripto communicata; in Scania ad Esperöd & in Ostrogothia ad Wadstena 4 Aug.—5 Sept. a me quoque lecta.

♂♀. Similis priori, a qua magnitudine plerumque nonnihil maiore, oculis maris magis cohaerentibus per orbitas tenues argenteas tantum angustissime disjunctis, antennis nonnihil longioribus plerumque totis nigris, colore corporis cinereo in flavidum levissime s<sup>e</sup>p<sup>e</sup> vergente, abdome interdum cano, maeulis

ejusdem nigris tantum 4 (in segmento 1 nempe nullis), nervo transv. ordinario plus minus flexo, nec exacte recto, squamis minus albis, seu s<sup>e</sup>p<sup>e</sup> albo-flavidis, femoribus posterioribus tibiisque omnibus flavis, nec fusco-ferrugineis, dignoscitur. Alae præterea longiusculæ, haud latæ, spinula costæ minuta, & reliqua ut in præcedente. Palpi filiformes, pilosi, nigri. Thoracis lineæ s<sup>e</sup>p<sup>e</sup> brunneæ. *Femina*: oculis per orbitas cinereas & vittam frontalem latam didymam nigram modice distantibus. — Variat ♂ femoribus anticis brunneis l. fusco-ferrugineis.

**37. *A. fratercula*:** fronte haud prominente cinerascens; antennis cum seta pubescente, thoracis vittis 4, abdominis punctis 6, femoribus tarsisque, nigris; tibiis ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto, spinula costæ minuta; squamis albidis; *mas*: oculis coherentibus; *femina*: oculis late distantibus, femoribus posticis rufis. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia rarissime; ad Esperöd Scaniae semel inveni; in Ölandia ad Gärdslösa 25 Jun. 2 specimina capta; in Jemtlandia verno tempore in copula a D. *Böheman* deprehensa.

♂♀. Priori similis, sed differt: capite cinereo, minus argenteo-micante, ut & in ♂ pedibus nigricantibus, geniculis posterioribus indeterminate, tibiisque omnibus, ferrugineis. Maculae abdominis 6, distinctæ, trigonæ, nigræ; in segmento 1:mo 2 minores, oblongæ, quæ in specie præcedente tantum rudimentariae. *Femina*: oculis per orbitas cinereas & vittam frontalem latam nigram, didymam, late disjunctis; femoribus anticis apice late, posterioribusque totis, rufo-flavis.

**38. *A. binotata*:** fronte subprominente griseo-cinerascens, capite albido; antennis cum seta pubescente, thoracis lineis binis, abdominis (maris) punctis 2, femoribus anticis vitta superna, tarsisque omnibus, nigris; pedi-

bus luteis; alis basi squamisque flavescentibus, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto; *mas*: oculis subcoherentibus; *femina*: oculis sat late remotis, abdome immaculato. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

*Anthom. impuncta* var. b. Zett. Ins. Lapp. 691.

### 133. ♂♀.

Hab. in Suecia boreali alpestri, minus frequens; in copula; scilicet in Jemtlandia boreali passim; in alpibus Dalecarlicis & Lulensis a D. Prof. *Bohemus* lecta; in Norwegia ad Alstahaug, Tromsö, Bossekop &c., haud rara. In Suecia meridionali ♀ etiam semel capta.

♂♀. Per femora lutea, antica superne vitta lata elongata nigra ornata, frontem paullo prominulam, abdomen maris maculis tantum 2 in segmento 2:do feminæque immaculatum, alas basi squamasque flavescentes, ut ♂ oculos maris non intime conexos, orbitis albis (sed nulla linea frontali nigra) anguste disjunctos, a prioribus & præcipue ab *A. pertusa* (36), dignoscitur. Caput album, nitens. Antennæ elongatae, atræ. Palpi nigri. Thoracis lineæ 2 mediæ tenues fuscae, laterales vittæformes, obsoletæ. Abdomen in ♂ conicum, pilosum, griseum, maculis fuscis in segmento 2:do 2 majoribus, in 1:mo etiam 2 minoribus, approximatis, obsoletis; in ♀ ovatum, acutum, immaculatum. Alarum nervi ut in *A. pertusa* directi. Costa subnuda; spinula nulla. Squamæ & halteres, flava. Pedes setosi. — Secundum observationem Professoris *Wahlberg* specimina hujus speciei in lapidibus ad fluvium Koma & Randijaur prope Quickjeck Lapponiæ Lulensis versus finem mensis Junii & initium Julii haud rara erunt. — Variat ♀ abdome flavescenti cinerea; & femoribus antieis aut totis ferrugineis aut basi nigris.

39. *A. sororia*: fronte subprominente griseo-cinerascens, antennis, thoracis lineis 2, abdominis punctis to-

tidem, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto; squamis albidis; *femina*: oculis late remotis. ♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Ostrogothia forte rarissime; mihi non obvia, e Gusum in uno specimine missa a D. *Wahlberg*, qui eaudem in Lapponia Lulensi ad Quickjock etiam invenit.

♀. Similis priori, sed vix ejus femina, nam alis basi concoloribus, nec flavescens, squamis albis, femoribus obscure lutescentibus ut & anticis fere totis nigricantibus, differt. Caput late cinereum, nitens, certo situ macula in epistomate utrinque inter antennarum basin & oculos parva subquadrata fusco-micanter. Abdomen ovatum, convexum, acutum, flavidocinerenum, punctis 2 rotundis, brunneis in segmento 2:do. Nervus transv. ordinarius subperpendicularis, subrectus, distincte infuscatus. Costa breviter subciliata; spinula adest. Femora antica nigricantia, apice praesertim subtus ferruginea; intermedia basi etiam obscura. Reliqua ut in femina *Auth. pertusa* n:o 36.

40. *A. consors*: fronte paullo prominente cinerascens, capite cano; antennis, thorace lineis 2, abdominis punctis 4, femoribus anticis basi, tarsisque omnibus, nigris; alis cinereis, nervis transversis rectis, infuscatis, costae spinula mediocri, squamis albis; *femina*: oculis modice late distantibus. ♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Scania valde rara; ad Esperöd tantum 2 individua inveni.

♀. A priore, cui de cetero similis, differt: fronte forte nonnihil magis prominula, ab domine magis cinereo, punctis rotundis brunneis 4 (nec 2) in segmentis 2 & 3, alarum spinula costali distinctiori, ut & femoribus anticis vix ultra medium obscuris, intermediis totis ferrugineis.

11. *A. protuberans*: fronte distinete prominente canescens; antennis, thoracis lineolis 2 tenuibus, abdominis punctis 4, pedibusque, nigris; tibiis ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis infuscatis, ordinario subrecto, spinula costali distincta, squamis albis; *mas*: oculis subremotis; *femina*: fronte latissima, cana. ♂♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

*Anth. consimilis* Zett. Ins. Lapp. 690. 129. ♀. (exclus. synon. omnibus).

Hab. in Scandinavia boreali alpestri, 28 Jun. 13 Aug., rarius; scilicet in Lapponia Luleensi ad fluvium Kama prope Quickjock uterque sexus in lapiditus, D. *Bohemus*; inter Alten & Kautokeino Finmarkiae occidentalis ♀, ipse. (E Glogavia a D. Zetterer quoque communicata).

♀. Oblonga, subcylindrica, late cinerea. Caput cinereo-album, nitens. Oculi non magni, per orbitas latas, canas, & vittam frontalem latam, cinereum, opacam, latissime remoti. Series setarum frontalium utrinque simplex. Antennae mediocres, nigrae, seta distincte pubescente, non vero plumata. Facies prominens, & epistoma infra oculos descendens, apice non reflexum. Palpi subfiliformes, nigri, pilosi. Thorax setosus, lineolis 2 approximatis, tenuissimis, antice perspicuis, postice evanescentibus plerumque cum 2 aliis tenuibus ferrugineis obsoletis alternantibus 1. in illas abientibus. Scutellum immaculatum. Abdomen acutum, maculis 4 rotundatis, brunneis in segmentis 2 & 3. Alae albido-cinereæ. Nervi longit. 3 & 4 versus apicem leviter divergentes, transversus ordin. levissime curvatus, aperte ante medium areæ insertus. Costa brevissime nigro-ciliata; spinula gemina, distincta. Squamæ mediocres, albæ & halteres ut in priori. Pedes nigri, setosi, geniculis summis & tibiis rufo-ferrugineis. — *O's.* In specimine Luleensi color canus in flavidum supra migrat.

♂. Simillimus feminæ, sed fronte triplo angustiore, abdome

subconico, ano obtuso, infexo, stylis 2 nigris pilosis in segmento ventrali penultimo suffulto, ut & pulvillis majoribus, albis, diversus. Oculi per orbitas albas & vittam frontalem canam paullo distantes, non vero tam longe remoti ac in *Cocno-siis* genuinis.

42. *A. lineatipes*: fronte non prominente canescens, antennis cum seta tenuiter puberula, femoribus antieis totis, posterioribusque superne vitta brevi, tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; thoracis lineis 3, abdominisque punctis 4, brunneis; alis hyalinis, nervis transversis rectis, non infuscatis, costa nuda; squamis albis; *femina*: oculis modice distantibus. ♀. (Long. circiter 2 lin.).

Hab. in Suecia boreali & Norwegia media, rarissime; ad Åreskutan Jemtlandiæ, atque ad Alstahaug & Levanger in paroec. Skogn d. 8 Jul. 1 Aug. 1840. inveni. — In Smolandia ad Skärsjö semel quoque inventa.

♀. Similis & affinis *Anth. consimili* (35); sed fronte paullo minus lata, thoracis lineis 3, alarum nervis transversis non infuscatis, pictura pedum &c., differt. Oblonga, late cinerea & flavidо-cinerea. Frons minime prominens. Oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem latiusculam nigram, postice cinereo-maculatam, modice remoti. Antennæ brevinsculæ, non late, seta breviter puberula. Facies non prominens. Epistoma infra oculos non descendens. Palpi nigri, pilosi. Scutellum immaculatum. Abdomen lanceolato-subcylindricum, griseum, maculis rotundis, parvis, brunneis, obsoletis. Alæ basi subpalescentes. Nervi: longitud. 3 & 4 subparallelis; transversus ordinari. non longe ante medium areæ insertus. Costa nuda & spinula nulla. Squamæ albidae, valvulis remotis, superiori nempe elevata & ni fallor, quam inferiore paullo minore. Halteres albi. Pedes flavo-ferruginei, femoribus antieis fere ad apicem, intermediis vitta superna media, angusta, utrinque abbreviata, & posticis vitta superna a medio ad apicem, tarsisque omnibus, nigris.

43. *A. apicalis*: fronte haud prominente cinerascens, antennis cum seta tenuissime puberula, pedibusque nigris; femorum basi tibiisque ferrugineis; thoracis lineis 2, abdominisque punctis 6, brunneis; alis cinereis, nervis transversis rectis, non infuscatis, costa nuda, squamis albis; *femina*: oculis modice distantibus. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali & alpestri minus frequens, 15 Jul.—2 Aug. mibi obvia; nempe ad Skalstugan & radicem alpium Mullsjellen; in Lappon. Lulensi ad Quickjock, D. *Wahlberg*; in Dalecarliæ alpibus etiam a D. *Bohemus* lecta; in Norvegia ad Suul rarissime.

♀. A præcedente, cui de cetero similis, dignoscitur: thorace sublineato, abdominis punctis 6, majoribus, ut & pedum pictura. Antennarum seta brevissime puberula. Thoracis lineæ brunneæ 2 perspicue, 3:ta s. intermedia parum observanda. Abdominis puncta 6, majuscula, rotundata, brunnea, in segmentis 1, 2 & 3. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes; transversus ordinarius perspicue ante medium areæ insertus, perpendicularis, rectus. Costa subnuda 1. brevissime subciliata. Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem vix 1. non omnino tegente. Pedes nigri, trochanteribus omnibus, femorinque posteriorum basi plus minus late, ferrugineis. Femora posteriora interdum ferruginea a medio ad apicem determinate nigra. — Opinante D. *Wahlberg* hæc est femina *Anth.* *8-punctata* n:o 110.

44. *A. cineraria*: fronte haud prominente cinerascens, antennis cum seta pubescente, thoracis lineis 2, abdominis punctis 6, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis cinereis, nervis transversis rectis, infuscatis, spinula costali gemina, squamis albis; *femina*: oculis modice distantibus. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Norwegia media rarissime; ad Oestre Næs Wærdalæ 8 Jul. 1840 inveni.

♀. Simillima *Anth. sororiae* (39) & *apicali* (43), sed ab illa magnitudine minore, fronte non prominente, abdominis maculis 6 (neque tantum 2), alarum costa distinctiori, ut & fronte modice lata, & ab hac antennis paullo longioribus, seta perspicuus pubescente, nervis transversis infuscatis, spinula costali praesente, ut & femoribus posterioribus ferrugineis, intermediis tantum basi leviter nigricantibus, differt.

**45. *A. obscuripes*:** fronte leviter prominente cinerascens, antennis cum seta pubescente, thoracis lineis 2, abdominis punctis 4, pedibusque, nigris, tibiis obscure testaceis; alis cinereis, nervis transversis rectis, infuscatis, spinula costali distineta, squamis albidis; *femina*: oculis modice remotis. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; in cacumine alpis Åreskutan in regione nivali specimen descriptum 2 Aug. 1840 deprehendi.

♀. Similis *Aath. consorti* (40), sed differt: thorace obscuriore, femoribus nigris, & tibiis fusco-ferrugineis. Antennæ longiusculæ, seta elongata, basi distincte pubescente. Palpi nigri. Thoracis lineæ laterales vix ullæ. Abdominis puncta 4, rotunda, brunnea, obsoleta, in segmentis 2 & 3. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem subdivergentes; transversi distincte fuscedine cineti, reliqui pallescentes. Costa vix ciliata, sed spinula gemina adest. Alæ præterea latiusculæ. Squamæ mediocres, albidae, parum ciliatae, valvula superiore inferiorem minime tegente. Halteres sordide albidi. Pedes nigri, setulosi, tibiis fusco-testaceis, anticis præsertim obscuris. Femora subbreviscula.

**46. *A. pallipalpis*:** fronte haud prominente cinerascens, antennis, abdominis punctis 6, pedibusque, nigris, antennarum basi tibiisque ferrugineis; palpis albidis; alis

cinereis, nervis transversis rectis, infuscatis, costa nuda, squamis albis; *femina*: oculis late distantibus. ♀. ♂). (Long. 1½ lin.).

Hab. in Scandinavia præsertim boreali, Jun. Jul., Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd semel lecta; in Smolandia atque Dalecarliae alpibus, D. *Bohemian*; ad urbem Luleå veruo-tempore, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Åreskutan 3 specimina inveni; in Lapponia Lulensi ad Jockmock, D. *Andersson*; in Norwegia alpestri ad diversorium Suul Wärdaliae rarissime, D. *Dahlbom*.

♀. Similis *Anth. troglodytes* (33), & *vernæ* (100), sed a priore antennarum seta brevius & tenuius puberula, alarum nervis transv. infuscatis &c., & a posteriore magnitudine majore &c., dignoscitur. Valde quoque affinis *Anth. almæ* infra n:o 140, an ejus ♀? — Oblongo-ovata, undique setosa, obscure cinerea. Oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem latam nigrum postice cinereo-maculatum, sat late remoti. Antennæ breviusculæ, subangustatæ, nigro-cinereæ, basi rufescentes. Epistoma infra oculos non descendens, canum. Palpi parvi, subelavati, albidi, nigro-pilosæ; vix tamen *Lispæ* generis. Thorax lineis 2 remotis, brunneis, interdum parum perspicuis. Abdomen ovatum, subdepressum, cinereum, punctis s. maculis 6 rotundis, atris, nempe 2 & 2 in singulo segmentorum 2, 3 & 4. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli; transversus ordinarius rectus paullo ante medium areæ insertus, fusciline perspicue cinctus. Costa subnuda. Spinula vix ulla. Squamæ mediocres, albidae, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres albi. Pedes nigri, tibiis ferrugineis, tarsis fuscis.

Var. b. ♀. simillima var. a., cum qua habitat, & differt tantum abdominis segmentorum margine apicali anguste albescente. Hæc varietas *Anth. almæ* infra n:o 140, propius accedit, sed colore corporis cinereo, nec cano, ut & ab domine toto opaco, nec basi albo-subpellucido, differre videtur.

*Obs.* *Mas Anth. pallipalpis*, mihi plane ignotus, in Lapponia Lulensi cum femina descripta inventus fuerit, teste D. *Wahlberg* in litteris.

b. Abdomen punctis nigris nullis.

**47.** *A. Sundewallii*: fronte leviter prominente flavido-cinerascens, antennis cum seta tenuiter pubescente, thoracis vittis 4, abdominisque unica dorsali, pedibusque, nigris; tibiis obscure testaceis; alis cinereis, basi squamisque flavescentibus, nervis transversis rectis, haud infuscatis, costa subeiliata, spinula gemina praesente; *mas*: oculis appropinquantibus; *femina*: oculis modice remotis. ♂♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia boreali, 10 Jul—4 Aug., minus frequens; in copula visa; scilicet in Jenitlandia ad Åreskutan, Mullsjellen & Skalstugan; in alpibus Dalecarlicis, D. Prof. *Bohemani*, & in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. *Wahlberg*. (E Silesia specimen masculum etiam communieavit D. *Zeller*).

♂♀. Valde similis & affinis *Anth. conicae* (18); sed antennarum seta breviter puberula, minime plumata, alarum nervis: longitudinalibus 3 & 4 versus apicem subdivergentibus, transverso ordinario subperpendiculari, recto, nec subobliquo & flexo, paullo longius ante medium areæ inserto, costæ ciliis & spinula nonnihil evidentieribus, ut & oculis maris paullo magis remotis, differt. Caput subflavidum, palpis nigris. Abdomen oblongum, vitta 1. linea dorsali nigra in segmentis 1, 2, & obsolete in 3:to, continuata. Pedes nigri, geniculis & tibiis testaceis. ♂: abdomen apice obtusum, ano rotundato, infexo; ♀: abdomen apice acentum.

**48.** *A. socia*: fronte hanc prominente cinerascens, capite albicante, antennis validis cum seta tenuissime pu-

berula, thoracis vittis, abdominis linea dorsali pedibusque nigris; tibiis testaceis; alis cinereis, basi subflavidis, nervo transverso ordinario subsfexo, costa nuda, squamis albidis; *mas*: oculis cohærentibus, abdomine sublineari, depresso; *femina*: oculis modice remotis, abdomine ovato. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  fere 2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 201. 208. ♀. *Musca* Fall. Muscid. 82. 104. ♀. typica.

Hab. in soliis fruticum per hortos & prata Sueciæ, 15 Jul.—Aug.—15 Sept., passim; in fenestris etiam rarius deprehensa; nempe in Scania ad Lund &c. parco; in Ostrogothia ad Gusum, D. *Wahlberg*, ad Wadstena frequenter, ipse. (In Finlandia, D. *Sahlberg*).

♂♀. Caput argenteo-micans, antennis sat validis palpisque nigris.

Oculi rufescentes. Thoracis vittæ 4 nigræ vix nisi antice conspicienda. Abdominis vitta dorsalis nigra, subinterrupta. Alæ non latæ. Nervi præsertim basi pallescentes. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallelis; transversus ordin. paullo flexus, ante medium areæ insertus. Costa nuda. Spinula nulla. Squamæ ut in *Anth. pallipalpi* (46). Halteres flavi. ♂: oculi in medio frontis cohærentes, per orbitas tenuissimas albas confluentes parum distantes. ♀: oculi per orbitas albas & villam frontalem latam nigram modice distantes.

Var. b. ♀. Simillima var. a., & vitta frontali supra antennas lutescente tantum diversa. In Ostrogothia ad Wadstena d. 5 Aug. cum var. a. rarissime visa.

49. *A. grandæva*: fronte prominente griseo-crenata, antennis cum seta pubescente, thoracis vittis 4, femorum antecoruni basi, tarsisque omnibus, nigris; pedibus fusco-ferrugineis; alis basi squamisque flavescentibus. nervo

transverso ordinario recto, infuscato, costa nuda; *femina*: oculis modice distantibus. ♀. (Long. 3 lin.).

Hab. in Dalecarlia, D. Boheman, qui eam in uno specimine pro descriptione mutuo communieavit; a me numquam lecta.

♀. Inter majores. Similis *Auth. Angelicæ* (8), sed antennarum seta distincte pubescente, non vero plumata, fronte magis prominente &c., diversa. Oblongo-ovata, obscure cinerascens. Frons modice prominens. Oculi per orbitas cinereas & vittam frontalem latam, nigram mediocriter remoti. Punctum supra antennas albidum. Antennæ longiusculæ, validæ, nigrae, apice rotundatae. Epistoma declivum, argenteo-micans (infra antennarum basin juxta oculos utrinque certo situ macula nigra notatum), infra oculos descendens, apice reflexum. Palpi cylindrici, fusco-nigri, pilosi. Thoracis vittæ nigrae haud determinatae. Abdomen ovatum, nigrum, subnitidum, leviter cinereo-micans, acutum. Alæ leviter subfuscato-hyalinæ, basi flavescentes. Nervi: longit. 3 & 4 apice leviter divergentes; transversus ordin. subobliquus, rectiusculus, paullo ante medium areae insertus, fuscedine cinctus. Costa nuda; spinula nulla. Squamae mediocres, ciliatae, valvula superiore inferiorem ad dimidium tegente. Halteres pallidi. Pedes setulosi, obscure ferruginei, femoribus anticis a basi ad medium nigricantibus. Tarsi omnes nigri.

50. *A. deserta*: fronte haud prominente obscure cinerascens, antennis cum seta pubescente, thoracis vittis 4, abdominis ovali linea dorsali tenui, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus obscure ferrugineis; alis subfuscato-hyalinis, basi squamisque flavescentibus, nervo transverso ordinario recto, costa nuda; *mas*: oculis subcohærentibus. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Jenitlandia boreali rarissime; in ligno Abie-

tis recenter secato ad diversorum Forsa juxta radicem  
Mullsjellet d. 30 Jul. 1840 specimen descriptum inveni.

♂. Simillima priori, sed vix ejus mas, nam magnitudine paullo minore, fronte non prominula, antennis nonnihil angustioribus, epistomate perpendiculari, nec declivo, margine apicali non reflexo, palpis atris, alis paullo magis fomatis (unde fuscedo circa nervum transv. ordinar. minus perspicua), ut & femoribus anticis totis nigricantibus, satis superque differt. Oculi cōharentes, per orbitas tenuissimas albas parum disjuncti.

51. *A. denudata*: fronte parum prominente obscurè cinerascens, capite argenteo; antennis cum seta tenuissime puberula, femoribus anticis totis, intermediis basi, tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis hyalinis, basi subpallescens, nervo transverso ordinario recto, squamis albis, costa nuda; mas: oculis subcohærentibus, abdome oblongo. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarius; in Scania ad Esperöd 3 individua legi.

♂. Similis priori, a qua tamen corpore angustiore, seta antennarum multo brevius puberula, abdome oblongo, convexo, cinereo, immaculato, alis magis hyalinis, ut & squamis albidioribus, abunde & vere dignoscitur. Frons leviter subprominens. Antennæ longiusculæ, angustatae. Thoracis vittæ parum distinguendæ. Abdomen setosum. Styli 2 breves, obtusi, nigri, in segmento ventrali penultimo. Nervus transv. ord. interdum leviter infuscatus. Pedes ferrugineo-testacei, femoribus anticis fere ad apicem, intermediis fere ad medium, posticisque immo basi, nigris. Tarsi omnes atri. Pulvilli magni. Reliqua ut in precedente.

52. *A. socculata*: fronte haud prominente cinerea, subcylindrica, capite argenteo, antennis cum seta tenuiter puberula, thoracis lineis 2, abdominis unica dorsali, pedi-

busque, nigris; tibiis flavis; alis flavidо-hyalinis, nervo transv. ordinario recto, costa subciliata, spinula parva, squamis parvis, albis; *mas*: oculis subcohærentibus, abdome subconico. ♂. (Long. sere 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad radicem alp. Åreskutan a D. *Dahlbom* d. 24 Jun. 1840 semel deprehensa.

♂. Statura corporis subcylindrica a reliquis hujus subdivisionis discrepat. Læte cinerea, setosa. Caput ut in priore. Thorax antice lineis 2 nigris. Scutellum immaculatum. Abdomen conico-cylindricum, canum, linea dorsali subcontinua, nigra. Anus tuberculo sat magno, elongato, inflexo, nigro. Alæ subpallentes, nervis ut in antecedente directis, costa brevissime subciliata & spinula parva. Squamæ parvæ, ciliatæ, albæ, valvula superiore inferiorem omnino tegente. Halteres albi. Pedes setosi. Coxæ & femora graciliora, nigra. Tibiæ flavae. Tarsi atri. Pulvilli mediocres, albi.

53. *A. verticella*: fronte non prominente obscure cinerascens, capite cano, antennis cum seta nudiuscula, pedibusque, nigricantibus, tibiis tarsisque obscure ferrugineis; alis albido-hyalinis, nervis pallescentibus, transverso ordinario recto, costa subnuda, squamis parvis, albis; *femina*: oculis sat late remotis, macula supra antennas fulva, abdome conico. ♀. (Long. sere 1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 691. 130. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi, ubi tantum unicum exemplar 1821 inveni.

♀. Parva, oblonga; an hujus aut *Coenosiarum* subdivisionis? Nigricans l. obscure cinerea. Caput albidum, peristomate rufescente. Oculi non magni, per orbitas cinereas & vittam frontalem nigram antice macula fulva, postice puncto ocellorum ci-

nereo notatam, sat late disjuncti. Antennæ mediocres & palpi, nigra. Abdomen subnitens. Alæ albido-pallescentes, nervis longit. 3 & 4 subparallelis, transverso ordinario recto, paullo ante medium areæ insertus. Costa nuda. Spinula nulla. Squamae minutæ, ciliatæ, albæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albi. Pedes fusco-ferruginei, femoribus nigricantibus. An junior, nuper exclusa?

Var. b. ♀. similis var. a., sed tarsi nigri, & peristomium non rufescens. *Anth. dealbata* Zett. Ins. Lapp. 695. 154. ♀. Ad Almsele Lapponiæ Umensis seapel 24 Jul. 1832 inventa.

*Obs.* Specimen Scanicum, quod etiam in Ins. Lappon. l. c. refertur, ad aliam speciem seu ad *Anth. lunatifrontem* (84) pertinet. — Cum *Anth. niveipenni* (64), fronte prominente instructa, non confundi debet nostra *A. verticella*. Cfr. quoque *Anth. dealbata* infra n:o 118.

### III. Seta antennarum nuda. Ohlongæ.

54. *A. frigida*: fronte leviter prominente cinerascens, capite argenteo, antennis, thoracis vittis 3, pedibus anticis tarsisque omnibus, nigris; femoribus tibiisque posterioribus ferrugineis; alis subhyalinis, basi flavescensibus, nervo transverso ordinario inflexo, costa subnuda, squamis parvis, albidis; mas: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 3 lin.).

Hab. in Scandinavia boreali rarissime; scilicet in ligno Abietis recente ad Forsa prope Mullsjellet Jemtlandiæ d. 21 Jul. 1810 a D. Dahlbom capta; in jugo alpino Norwegiæ ad Kong Carl Johans Klev Wærdaliae 11 Jul. ejusdem anni, ipse; in frutice Salicis ad templum Quickjock Lapponiæ Luleensis mense Julio 1843 in unico exemplo etiam a D. Wahlberg lecta.

♂. Simillima *Anth. strigosæ* (20), sed antennarum seta nuda mox dignota. Oculi magui cohærentes. linea tantum tenuissi-

ma, alba, ex orbitis orta, levissime disjuncti. Antennæ mediores, nigrae. Epistoma infra oculos parum descendens, apice non reflexum. Palpi subfiliformes, nigri. Thoracis vittæ 3, latiusculæ, nigrae, indeterminatæ. Scutellum immaculatum. Abdomen oblongo-conicum, griseum l. cinereum, vitta dorsali certo situ perspicua obscura; segmentis omnibus margine apicali distincte setoso. Anus tuberculo inflexo. Nervi longit. 3 & 4 versus apicem leviter divergentes. Costa levissime ciliata; spinula parva. Squamae proportione parvæ, longe ciliatae, albidae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres albi, basi fuscæ. Pedes setosi; antici: breviusculi, toti nigri; posteriores longiusculi, ferruginei, tarsis atris. — Variat ♂ pedibus anticis flavis, coxis, femorum vitta superna tarsisque totis, nigris; in Dalecarliæ alpibus a D. Boheman inventus; vix diversus.

55. *A. rugulosa*: fronte prominente cinerea, capite argenteo, antennis validis, thoracis lineolis 2, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus ferrugineis; alis basi, squamisque parvis, subpallescensibus, nervo transverso ordinario recto; costa subciliata; *femina*: oculis modice distantibus, vitta frontali altra. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime; ad Skalstugan 16 Jul. unicum specimen legi.

♀. Similis priori, sed minor & differt: fronte magis prominente, antennis nonnihil latioribus, epistomate magis descendentem, palpis magis clavatis, atris, thoracis lineolis 2 tenuibus nigris in medio approximatis, postice evanescentibus, interstitio in disco brunnescente, abdome ovali, alis paullo latioribus, nervo transv. ord. recto, nec flexo, costa subciliata, ut & pedum anterius femoribus apice tibiisque totis ferrugineis, nec pedibus anticis totis nigris. Oculi & abdomen in specimine mortuo (forte casu) rugulosa.

56. *A. fuscula*: fronte non prominente nigricans, capite albiente, thoracis humeris cinereis, abdome ova-

li, griseo, linea dorsali interrupta, nigra; alis basi, squamisque parvis, subpallescentibus, nervo transverso ordinario recto, costa nuda; tibiis obscure ferrugineis; *mas.*: oculis subcohaerentibus. ♂. (Long. 2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 174. 158. ♂♀. & Ejusdem 7. 327. 63.  
*Musca* Fall. Muscid. 86. 113. ♂. typica.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; duo tantum specimina vidi unum a Cel. Fallén, alterum a me, utrumque in silva ad villam Esperöd in paroec Mellby Scaniæ, capta.

♂. Frons & facies convexæ. Oculi magni per orbitas tenuissimas albas & lineam frontalem tenuem nigrum anguste disjuncti. Antennæ breviusculæ, angustatæ, & palpi, nigra. Thorax niger, subnitens, vitta humerali cinerea. Abdomen ellipticum, subdepressum. Ani tuberculum haud inflexum. Alæ subhyalinæ, basi pallescentes. Nervi longit. 3 & 4 paralleli. Spinula costæ nulla. Squamæ parvæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres pallidi. Pedes mediocres, setulosi, nigri, tibiis fuscotestaceis. Pulvilli mediocres.

♀: "fronte alba, vitta lata nigra (in speciminibus nuper exclusis fulvescente). Thorax parum nigricans seu griseus, nigro-lineatus. Abdomen ovatum, plano-convexum", a D. Meig. l. c. describitur a me non rite cognita.

57. *A. atricolor*: fronte haud prominente atra, nitida, capite argenteo-micante; genubus tibiisque ferrugineis; alis leviter fumatis, nervo transverso ordinario recto, subinfuscato, costa nuda; squamis mediocribus, albidis; *mas.*: oblongus, oculis coharentibus. ♂. (Long. sere  $2\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 201. 207. ♂. *Musca* Fall. Muscid. 82. 103. ♂. typica.

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel deprehensa.

♂. Per colorem totius corporis nigrum, nitidum, a ceteris affinis bus mox dignota. Oculi magni, cohærentes, per orbitas albidas tenuissimas, tantum in medio frontis angustissime disjuncti; in viva rufi. Antennæ longiusculæ, angustatæ, nigro-fuscæ. Epistoma perpendicularre, infra oculos parum descendens, nec apice reflexum. Palpi cylindrici, nigro-fusci, pilosi. Abdomen ovale, subconvexum, segmentorum margine apicali setulosum. Anus parvus, inflexus. Styli 2 breves, obtusi in segmento ventrali penultimo. Alæ subangustatæ, hyalinæ, leviter fumatae, una basi pallescentes. Nervi: longitudinales 3 (in summo apice sub-declinatim flexus excurrens) & 4 subparallelæ l. parum versus apicem divergentes; transversi recti, leviter infuseati, horum ordinarius obliqui, paullo ante medium areæ insertus. Costa subnuda; spinula nulla. Squamæ albidae, parum ciliatae, valvula superiore inferiorem ad dimidium tegente. Halteres pallidi. Pedes mediocres, setosi, nigro-picei, femoribus præsentim posterioribus apice sat late tibiisque omnibus rufo-testaceis. Tarsi atri. Pulvilli longiuseuli, albi.

58. *A. depressiventris*: fronte haud prominente atra, opaca; abdome cinereo, linea dorsali interrupta, incisurisque, femoribus anticus superne, tarsisque omnibus, nigris; alis squamisque fuscanis, nervo transverso ordinario recto, costa nuda; mas: oculis arce cohærentibus, abdome sublineari, depresso. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Laponia Luleensi ad Quickjock, ubi æstate 1843 a D. Boheman detecta, mihiique in uno specimine pro descriptione communicata.

♂. Oculi magni, sat arce cohærentes, linea tantum frontali omnium tenuissima supra antennas dilatata, nigra, angustissime sejuneti. Frons vix prominens, nigra. Antennæ mediocres, nigrae. Epistoma perpendicularre, griseum, apice non reflexum.

Palpi filiformes, nigricantes. Thorax ater, opacus, antice certo situ rudimento linearum fuscarum. Abdomen lineare, depresso, pilosum, cinereum, linea dorsali interrupta, atra, segmentis basi late fuscis. Anus inflexus, corniculis 2 nigris in segmento ventrali penultimo. Alæ non latæ, totæ fuscaneæ. Nervi longitudinales 3 & 4 parallelæ; transversus ordinarius superpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus. Costa mutica; spinula nulla. Squamæ parvæ, fuscæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres flavi, clava sat magna, rotundata. Pedes mediocre, pilosi, nec setosi, rufo-ferruginei, femoribus anticis superne, coxisque omnibus, nigro-fuscis. Tarsi atri. Pulvilli mediocre, albidi.

59. *A. atritarsis*: fronte subprominente cinerea, capite argenteo-nicante; antennis, femoribus tarsisque nigris; thoracis lineolis 2, abdominisque unica dorsali, fuscis, obsoletis; tibiis testaceis; alis basi, squamisque parvis, sordide flavidis, nervo transverso ordinario recto, costa nuda; mas: oculis approximatis, abdome oblongo. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi, forte rarissima, a D. Andersson capta & missa.

♂. Similis *Anth. socculatæ* (52), & *rugulosa* (55); sed apriore seta antennarum nuda, fronte paullo magis prominente, thoracis antico lineolis 2 approximatis tenuioribus, alis subfumatis, squamis sordide albidis, tuberculo anali cinereo, minore &c.; a posteriore antennis nonnihil brevioribus, femoribus omnibus nigro-cinereis &c.; & ab utraque magnitudine paullo minore, differt. Oculi per orbitas tenues albas & lineolam frontalem angustissimam nigræ, anguste distantes. Antennæ breviuscule, validæ. Palpi atri. Thorax utin *Anth. rugulosa* pictus. Abdomen oblongo-subcylindricum, cinereum, linea dorsali fusca in segmentis 1, 2 & 3. Segmenta margine apicali setulosa. Ale fla-

vido-cinereæ, basi leviter ferruginantes. Nervi long. 3 & 4 subparallelî. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ pallidæ, ciliatæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres flavi. Pedes medios, nigricantes, genibus anguste tibiisque totis ferrugineis. Tarsi atri. Pulvilli medios, albidi.

**60. *A. tergina*:** fronte haud prominente cinerea, antennis breviuseculis pedibusque nigris, tibiis obscure testaceis; thorace vittis 3 fusca; alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto, costa subnuda, squamis parvis, albis; *femina*: oculis late remotis. ♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania semel capta.

♀. Subovata, cinerea, opaca. Frons lata, grisea, lunula supra antennas rufescens. Epistoma latum, cinereum, nonnihil infra oculos descendens. Palpi nigri. Thorax vittis 3 brunneis, in disco subconfluentibus. Scutellum puncto basali brunneo, obsoleto. Abdomen oblongo-ovatum, glauco-cinereum, apice acutum. Nervi: long. 3 & 4 subparallelî, transversus ordinarius perpendicularis, rectus, nonnihil ante medium areæ insertus. Spinula costalis minuta. Squamæ parvæ, ciliatæ, albæ, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres flavi. Pedes nigricantes, setosi, tibiis testaceis.

**61. *A. dorsalis*:** fronte prominente cinerea, antennis breviuseculis pedibusque nigris, tibiis testaceis; thoracis disco fusco, alis hyalinis, nervo transverso ordinario recto, costa subnuda, squamis parvis, albis; *femina*: oculis late remotis. ♀. (Long. 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Scania ad Esperöd, ubi unicum exemplum inveni.

♀. Simillima priori, nec ab ea differt nisi fronte magis prominente, thoracis disco dorsali fere toto late brunneo, brunneidine nempe vix in lineas digesta, ut & nervo transv. ordinario fere

in medio areæ inserta. Oculi parvi, rotundi. Frons tota grisea, opaca. Epistoma infra oculos descendens, antice breve, apice leviter reflexum. Palpi nigro-fusci. Antennæ breviusculæ, sed validæ. Nervi long. 3 & 4 paralleli. Costa inermis. De cetero ut in præcedente.

62. *A. hæmorrhoum*: fronte prominente obscure cinerasceens, capite rufescente, antennarum articulo ultimo, femoribus anticis tarsisque omnibus nigris; alis basi, pedibus abdominisque segmento ultimo flavis; nervo transverso ordinario recto; costa subciliata; squamis parvis; *femina*: oculis modice renotis. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 692. 138. ♀.

Hab. in graminosis, plerumque locis uliginosis, per Scandinaviam 22 Maj.—25 Aug. minus frequens; scilicet in Scania, ad Abusa prope Lund passim, ad Esperöd parce; in Jemtlandia ad Faxelfven usque ad Åreskutan & Skalstugan frequens; ad Storsand Bottniæ borealis in paroecia ÖfverLuleå; in Lapponia Umensi a D. Dahlbom rarissime 1832 capta, & in collectione Illustr. Fahræi conservata; in Salice lapponum in Lapponia Lulensi ad Quickjock, D. Wahlberg; in Dalecarlia, D. Boheman; in Dania 23 Maj. 1841, D. Staeger.

♀. Per capitis & ani colorem mox dignota. Affinis *Anth. conformi* (77). Ovata, obscure cinerea, opaca, setosa. Caput flavo-rufescens. Oculi per orbitas albantes & vittam frontalem latam fulvam, puncto ocellorum cinereo notalam, sat late se-juncti. Epistoma infra oculos paullo descendens, apice leviter reflexum. Antennæ validiusculæ, nigræ, basi sæpissime rufescentes, seta basi incrassata. Palpi parvi, subfiliformes, fusci, apice sæpe nigri. Thorax subimmaculatus. Abdomen ovatum, acutiusculum, cinereum, segmento ultimo testaceo. Alæ cinereæ, basi pallescentes. Nervi longitudinales 3 & 4 versus apicem

levissime divergentes; transversus ordinarius perpendicularis, rectus, nonnihil ante medium areæ insertus. Costa subciliata, spinula mediocri. Squamæ minutæ, ciliatæ, sordide albidae, valvula superiore inferiorem tegente. Halteres flavi. Pedes mediocre, flavi, femoribus anticis fuscis. Tarsi omnes atri. — Seta antennarum microscopice tantum puberula.

Var. b. ♀. juvenilis, abdomine toto ferrugineo, incisuris obscuris; ad Skalstugan rarissime.

**63. *A. palliceps*:** fronte subprominente obscure cinerascens, capite rufescente, antennis totis, femoribus anticis tarsisque omnibus nigris; pedibus flavis; alis cinereis, nervo transverso ordinario recto; costa subciliata; squamis parvis; *femina*: oculis modice remotis. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in Jemtlandia rarissime; ad alpem Nullsjellet  
27 Jul. 1840 semel inventa.

♀. Simillima priori, sed magnitudine paullo minore, fronte nonnihil minus prominente, oculis modice remotis, vitta frontali fulva postice (prope orbitas) nigra, antennis totis nigris, alis cinereis, basi pallescentibus, abdomine toto cinereo, ut & pedibus anticis nigrioribus, tibiis tantum obscure testaceis, differt. Reliqua ut in præcedente. Cum *Anth. conformi* (77) non confundenda.

**64. *A. niveipennis*:** fronte prominentे canescens, antennis, abdomine ovato nitido, pedibusque nigris; vitta frontali tibiisque ferrugineis; alis albis, nervo transverso ordinari. recto; costa subciliata; squamis parvis, albis; *femina*: oculis modice remotis, macula frontali fulva. ♀. (Long.  $1\frac{2}{3}$  lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scania ad Esperöd specimen descriptum legi.

♀. Ovata, cana, opaca. Oculi parvi, per orbitas latus cinereas & vittam frontalem angustatam antice luteam, sat late disjuncti. Antennae mediocres l. breviuscule, seta nigra, medio alba, basi incrassata. Epistoma subdeclivum. Palpi subfiliformes, nigri, pilosi. Abdomen nigrum, nitidum, breviter pilosulum. Alæ albidae. Nervi: longit. 3 & 4 paralleli; transversus ordinarius & costa omnino ut in *Anth. hæmorrhoum* (62). Squamæ etiam ut in illa, sed totæ albæ. Halteres flavi. Pedes nigri, setosi, geniculis posterioribus tibiisque omnibus testaceis. Tibiæ posticæ apice obscuræ.

B. Femora omnia & tota flava l. ferruginea.  
Tarsi nigri.

a. Seta antennarum plumata.

\*). Squamæ sub alis majuscule: valvula superiore inferiorem non tegente.

†. Oculi saltem in ♂ hirti; in ♀ plerumque nudi. *Aricia Meig.*

65. *A. erraticæ*: cinerea, antennarum articulo ultimo, thoracis vittis 4, abdominisque maculis micantibus, nigro-fuscis; antennis basi scutelloque rufescentibus; alis hyalinis, nervo transverso ordinario infexo, infuscato; ♂♂: oculis coherentibus; *femina*: oculis late remotis. ♂♀. (Long. 3½—4 lin.).

Meig. Dipt. 5. 111. 49. ♂♀. *Musca* Fall. Museid. 77.  
92. ♂♀. *Aricia* Macq. Buff. 2. 287. 7. ♂♀. T. 17. f. 1.—  
Meig. Dipt. 7. 311. 16.

Hab. in foliis fruticum & truncis arborum viventium, per hortos & prata Scandinaviae meridionalis & mediæ, 10 Jul.—21 Sept., passim; scilicet in Scania ad Lund,

Abusa, Tranås, Esperöd, Beckaskog &c., sat frequens; in Ostrogothia ad Wadstena & Gusum; in Gotlandia in Fårön parce; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Dania D. D. *Staeger* & *Dahlbom*. (E S:t Sever Galliae a Nobiliss. D. *Leon Dufour* 1844 communicata).

*C. Q.* Magna, ovata, griseo-cinerea, opaca, fortiter setosa. Caput canum. Frons parum prominens. Antennæ longiusculæ, proportione angustatæ, nigræ, articulis 1 & 2 totis, & 3 basi, plurimque rufis; apice rotundatæ; seta longe plumata. Epistoma subperpendiculare, infra oculos descendens, apice leviter reflexum; rufescenti albidum, in medio (sub antennis) obscurum. Palpi cylindrici, nigri, pilosi. Proboscis pilosa. Thoracis lineæ 4 nigræ. Scutellum testaceo-rufescens. Abdomen late ovatum, cinereum, maculis irregularibus, fuscis & olivaceis micantibus marmoratum; sat valide setosum. Alæ basi leviter flavido-fuscanæ. Nervi: longitud. 3 & 4 leviter curvati, nec exacte recti, versus apicem nonnihil divergentes, ita tamen ut 3:tius paullo ante summum apicem excurrat, & 4:tus pone apicem alæ exorrens levissime versus 3:tium remotum flectatur: transversus ordinarius obliquus, distincte inflexus, paullo pone medium areæ insertus. Costa (excepta basi ciliata) omnino nuda; spinula nulla. Squamæ magnæ, latæ, ciliatæ, albidae, leviter fuscanæ, valvula superiore inferiorem ad dimidium tegente. Halteres albidi. Pedes mediocres, toti cum coxis ferruginei, tarsis atris. *Mas:* oculi magni, distincte hirti, rufo-ferruginei, cohærentes, orbitis tantum tenuissimis albidis angustissime se-juncti. *Pulvilli* elongati, albidi. *Femina:* oculi subnudi per orbitas mediocres cinereas & vittam frontalem latam obscuram, late distantes. *Pulvilli* minores.

66. *A. 4-notata*: cinerea, antennarum articulo ultimo, thoracis lineis 4, abdominisque maculis totidem subtrigonis obsoletis, nigro-fuscis; antennis basi rufescenti-bus; alis hyalinis, nervo transverso ordinario infexo, in-

fuscato; *mas*: oculis subcohærentibus; *femina*: oculis late remotis. ♂♀. (Long. 2½—3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 113. 53? ♂. — *Aricia Macq.* Buff. 2. 289. 13.? ♂. — Meig. Dipt. 7. 314. 20?

Hab. in Scandinavia meridionali & media, 2 Jul.—10 Sept., passim frequens; scilicet in Scania ad Abusa, Grönby, Tranås, Esperöd &c., sat vulgaris; in Smolandia, D. *Ljungb*; in Ostrogothia ad Wadstena & Lärketorp, non parce; in Gotlandia in Furillen, raro; e Dania in utroque sexu sub nomine allato etiam a D. *Staeger* communicata.

♂♀. Priori simillima, sed magnitudine duplo minore, fronte paullo magis prominente, antennarum articulo ultimo toto nigro, scutello cinereo, nec rufescente, abdominis maculis in segmentis 2 & 3 quatuor fuscis subtrigonis (interdum obsoletis), nec maculis irregularibus, ut & oculis in ♂ minus arete cohærentibus, satis & vere distincta. Alarum nervi longitud. 3 & 4 versus apicem magis etiam divergentes. Costa breviter subciliata; spinula parva. Squamæ albidae. Femora antica extus in ♂ sæpe vitta tenui, abbreviata, nigra. Abdomen feminæ maculis 4 & linea dorsali media sæpe valde obsoletis, fuscis. Reliqua ut in præcedente. Similis etiam *Anth. signatæ* (2); sed *A. signata* abdominalis pictura, scutelli apice ruso, femoribus anticis basi nigricantibus, ut & oculis maris magis cohærentibus, ab *A. 4-notata* differt.

*Obs.* Synonyma *Meigeni* ♂ *Macquarti* dubia sunt, quia antenas totas "nigras" describunt. De colore pedum *Anth. signatæ* præterea silent hi auctores, unde etiam dubium oritur.

**67.** *A. basalis*: cinerea, antennis, thoracis vittis 4, abdominalisque unica dorsali, nigris; alis hyalinis, basi squamisque flavescientibus, nervo transverso ordinario inflexo, leviter infuscato; *mas*: oculis cohærentibus; *femina*: oculis modice distantibus. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 691. 134. ♂♀. — (Sub Fallenianis *Musca vagante*, & *M. Angelicæ* var. *β. rustica*, hæc species etiam latet).

Hab. in soliis fruticum &c., per Scandinaviam meridionalem & medium, Jul. Aug., sat vulgaris; scilicet in Scania frequens; in Blekingia, Smolandia & Ostrogothia, passim; in Dovre Norwegiae, D. Boheman; e Dania sub nomine: *\*A. basalis* Zett. ♂♀. *Aricia vagans* Meig. ♂. uterque sexus a D. Staeger communicatus.

♂♀. Ab *Anth. vagante* (3), cui valde affinis, per magnitudinem paullo minorem, femora omnia rufa, ut & oculos maris arctius cohærentes, dignoscitur. A priore, cui etiam similis, antennis totis nigris, abdomine tantum linea dorsali fusca, nec rudimento macularum nigrarum, alis basi squamisque magis flavidis, ut & oculis in ♂ magis cohærentibus, & in ♀ modice tantum remotis, differt. Flavescenti cinerea. Caput obscure cinereum. Antennæ, palpi tarsique, atra. Frons parum prominens. Epistoma apice reflexum. Antennarum seta longe plumosa. Abdomen ovatum. Alarum nervi ut in priore directi, fuscedine parum ciuiti. Pedes ferruginei. *Mas:* oculi distincte hirti. *Femina:* oculi brevissime & tenuissime puberuli, per orbitas mediocres, cinereas, & vittam frontalem latam, nigras, modice sejuncti.

††. Oculi in utroque sexu nudi.

α). Scutellum flavum.

68. *A. pagana*: flavescenti cinerea, antennis, thoracis vittis 4, abdominis unica dorsali, tarsisque, nigris; scutello, alarum basi, squamis pedibusque flavis; nervo transverso ordinario parum flexo, haud infuscato. ♂♀. (Long. 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 116. 58. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 691. 132. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 288. 23. Fall. Muscid. 79. 95. ♂♀.

*Aricia* Macq. Bufl. 2. 290. 21. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt.  
7. 316. 60.

Hab. in floribus Umbellatarum, foliis fruticum &c., per Scandinaviam, 10 Jun.—16 Sept., vulgaris; scilicet per totam Scaniam, Blekingiam, Smolandiam, Ostro- & Westregothiam, frequens; in Gotlandia ad Westö in Hall; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia boreali ad Undersåker & Åreskutan, passim; in Norwegia rarius, ex. gr. ad Thynæs prope Levanger, & ad Bossekop Finmarkiæ; in Dania frequens, D. D. *Lund, Staeger* & *Dahlbom*. (Ex Hamburgo a D. von *Winthem* communicata).

♂♀. *Anth. basali* (67) valde affinis & similis, sed scutello toto flavo-subpellucido & oculis in utroque sexu nudis, mox dignota. Caput albicans. Anteunarum seta distincte plumata. Oculi ♂ arcte cohærentes, ♀ per orbitas cinereas & vittam frontalem latam nigrā postice cinereo-maculatam, late distincti. Thoracis obscuri vittæ nigrae latæ. Abdominis linea dorsalis fusca posterius evanescens. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem perspicue divergentes. Transversus ordinarius plus minus flexus, interdum leviter infuscatus. Costa subnuda, spinula vix ulla. Pulvilli maris mediocres albi. — Variat femina vitta frontali fulva; forte juvenilis.

*Obs. Anth. humeralis*: cinerea, antennis, thoracis vittis 4, abdominis unica dorsali, tarsisque, nigris; macula humerali, scutello, alarum basi, squamis pedibusque flavis; nervo transverso ordin. parum flexo, haud infuscato; ♀. (long. 2 $\frac{3}{4}$  lin.); species, priori simillima, sed magnitudine nonnihil minore & callo humerali magno quadrato flavo, diversa, in uno specimine sine nomine a Prof. *Sahlberg* e Finlandia communicata, intra Scandinaviæ fines adhuc, quantum noverim, non inventa; sed e Neu York mihi quoque missa.

$\beta$ ). Scutellum cinereum.

69. *A. impuncta*: flavescenti cinereo, antennis, thoracis lineis 4 obsoletis, tarsisque, nigris; antennarum basi, palpis pedibusque flavis; alis cinereis, basi squamisque sordide albidis, nervis transversis subrecteis, subinfuscatis; *mas*: oculis cohaerentibus; *femina*: oculis late remotis. ♂♀. (Long. 2½ fere 3 lin.).

Meig. Dipt. 5. 118. 61. ♂♀. Zett. Ins. Lapp. 691. 133. var. a. ♂♀. — *Musca* Fall. Muscid. 79. 96. ♂♀. *Aricia* Macq. Buff. 2. 293. 31. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 63. ♂♀.

Hab. præsertim in floribus Umbellatarum, per Scandinaviæ hortos, prata & silvas, 3 Jul.—15 Sept., passim frequentissima; scilicet in Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, vulgaris; in Ölandia; ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Gotllandia ad Nähr, Öja &c.; in Lapponiis: Umensi ad Stensele & Åsele, Tornensi ad Muoniomiska; in Norwegia ad Bossekop Finniarkiae; in Dania, D. *Stægger*. (Ex Hamburgo a D. *Dahlbom*; & e Glogavia a D. *Zeller*, communicata. E S:t Sever Galliæ a D. *Leon Du-four* missa).

♂♀. Similis *Anth.* 4-notatæ (66), sed thoracis lineis obscurioribus, palpis pallidis, seta antennarum modice plumata, ab domine immaulata, ut & nervo transverso ordinario minus flexo, dignota. Frons parum prominens. Epistoma albicans, apice vix reflexum. Scutellum immaulatum. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem leviter divergentes, transversus ordinarius saepè paullulum flexus, plus minus infuscatus. Costa parum ciliata. Spinula parva. Oculi maris plus minus arte cohaerentes; feminæ late remoti, vitta frontali nigræ postice macula trigona cinerea.

*Obs.* Feminam *Crabronis patellati*, feminam hujus speciei occasam secum ad nidum trahere pro sustinenda prole, vidi D. Dahlbom.

**70.** *A. demigrans*: cinerea, antennis fuscis, basi rufis; thoracis lineis 4 obsoletis, abdominis maculis totidem, tarsisque, nigris; palpis pedibusque flavis; alis cinereis, basi squamisque sordide albidis, nervis transversis rectis, infuscatis; *mas*: oculis cohaerentibus. ♂. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

*Musca depuncta* var. β. ♂. Fall. Muscid. 80. 98.

Hab. in Scania ad Lund, Esperöd &c., passim.

♂. Priori ut ovum ovo similis, & non nisi antennis magis rufescens, interduo totis testaceis, ut & abdominis maculis 4 trigonis nigris, certo situ perspicuis, omnino ut in *Anth. 4-notata*, differt. Oculi cohaerentes. Caput albicans. Antennæ longisculæ, seta distincte plumata. Nervi transversi plus minus infuseati. Costa vix ciliata. Spinula nulla. Squamæ albæ. (Cfr. *Anth. punctiventris* n:o 87).

**71.** *A. modesta*: cinerea, antennis, palpis, thoracis lineis 4 obsoletis, abdominis maculis totidem, tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, nervo transverso ordinario subrecto, subinfuscato, squamis albidis; *mas*: oculis cohaerentibus; *femina*: oculis modice distantibus. ♂♀. (Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{3}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 119. 63. ♂♀. *Aricia* Macq. Buff. 2. 293. 32. ♂♀. *Hylemyia* Meig. Dipt. 7. 316. 82.

Hab. in soliis plantarum per Scandinaviam meridionalem mense Aug. rarissime; marem a D. Staeger e Dania, & feminam ad Lund Scaniae a D. Dahlbom captam, obtinui.

♂♀. A precedente, cui de cetero simillima, differt tantum antennis obscurioribus & palpis totis nigris. Antennæ nigræ, basi

obscure rufescentes. Nervi transversi plus minus infuscati.  
Alarum costa iu ♀ brevissime ciliata, spinula parva.

**72.** *A. vittifera*: cinerea, antennis fuscis; capite argenteo; thoracis vittis subquatuor, abdominis unica dorsali, tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, nervo transverso ordinario subrecto, subinfuscato, squamis albis; *mas*: oculis subcohærentibus. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Scania rarissime; ad Esperöd in paroccia Mellby semel leeta.

♂. Valde similis *Anth. fusca* (30), a qua vero magnitudine paullo minore & femoribus etiam anticeis flavis dignota. A priori, cui etiam similis, magnitudine minore, abdomine depresso, cano, vitta dorsali inæquali, nigra, nec punctis 4 nigris notato, squama sub alis albidiore, ut & oculis in ♂ non tam arete cohærentibus, nempe per orbitas tenuissimas albas anguste distantibus, differt. Antennæ anguste, seta longe plumata. Thoracis vittæ laterales obsoletæ. Abdomen oblongum, pilosum, ano non inflexo. Alarum costa nuda, spinula nulla.

**73.** *A. detrita*: nigricans, subnitida, leviter cinereo-pollinosa; capite albicante; palpis tarsisque atris; pedibus lividis; alis cinereis, nervis transversis rectis, non infuscatis, longitudinalibus 3 & 4 versus apicem divergentibus; squamis albidis; *femina*: oculis modice remotis, vitta didyma nigra. ♀. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Ostrogothia ratissime; ad Wadstena 29 Aug. 1831 inventa.

♀. *Anth. impuncta* (69) quodammodo similis, sed colore nigriori, nitidiore, magnitudine minore, antennis palpisque totis nigris, &c., mox dignota. Caput album, vitta frontali sat lata, atra, per maculam posticam elongato-cordatam, cinereum divisa. Antennæ mediocres, nigricantes, seta distincte plumata. Thorax niger, nitidus, antice vittis inchoantibus cinereis, parum

perspicuis. Scutellum nigrum, margine apicali cinerascente. Abdomen ovatum, nigrum, nitens, leviter cinereo-pollinosum, polline certo situ in maculas irregulares, micantes, condensato. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis: basi pallidis, longitudinalibus 3 & 4 versus apicem divergentibus, transversis rectis. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ mediocres, albidae, parum ciliatae. Halteres flavi. Pedes medios, pilosi, fusco-flavi, tarsis nigris.

**74. *A. olivacea*:** nigricans, subnitida, leviter cinereo-pollinosa; capite albicante, palpis tarsisque atris; pedibus flavis; alis cinereis, nervis transversis rectis, non infuscatis, longitudinalibus 3 & 4 parallelis, squamis albidis; *femina*: oculis modice remotis, vitta didyma nigra. ♀. (Long.  $1\frac{3}{4} - 2\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Scania rarius; in Fogelsång prope Lund & ad Esperöd occidentalem in paroecia Tranås, pauca specimen inveni.

♀. Simillima praecedenti, sed differt: pedibus purius flavis & præcipue nervis longitudinalibus 3 & 4 magis parallelis, horum 3:to in summo apice alæ excurrente. Antennæ basi piceæ. Thorax nigro-cinerascens. Abdomen olivaceo-nigrum, nitidum, leviter cinereo-pollinosum. Alarum costa brevissime subciliata, spinula minuta. Reliqua ut in priori.

\*\*). Squamæ sub alis minusculæ: valvula superiore inferiorem tegente.

**75. *A. præpotens*:** cinerea, capite argenteo-micante; antennis, palpis, thoracis vittis lateralibus, abdominis linea dorsali, tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, nervo transverso ordinario inflexo; *mas*: oculis subcoharentibus, ab domine conico, ano testaceo; *femina*: oculis mediocriter remotis, vitta frontali lutescente, abdo-

mine oblongo-ovato, apice acuto, cinereo. ♂♀. (Long. 2 $\frac{1}{2}$   
sape usque ad 4 lin.).

Wiedem. Zool. Magaz. 1. 1. 83. 36. Meig. Dipt. 5.  
127. 80. ♂♀. Ahrens. Fn. 10. 24. *Musca* Fall. Muscid. 83.  
106. ♂♀. *Hylemyia* Macq. Buff. 2. 316. 1. ♂♀. T. 17. f.  
8. ♂. Meig. Dipt. 7. 317. 78. T. 71. f. 11. ♂. (figura bona).

Hab. in graminosis umbrosis, foliis fruticum & præsertim in truncis arborum viventium, raro in Umbellatis; per Scandinaviam meridionalem & medianam, 25 Jun.—10 Sept., passim copiose; scilicet in Scania ad Lund, Kjellby, Rästen, Abusa, Grönby, Lindholmen, Sandhammar, Esperöd &c., vulgaris; in Smolandia ad Skärsgö; in Westrogothia ad Gothoburgum, D. *Wahlberg*; in Ostrogothia ad Gusum, Lärketorp, Wadstena in Krogängen, &c., frequens; in Gotlandia ad Rhone, Nähr, &c., passim; sed supra Nericiam hæc species mihi non obvia; in Dania rarius, D. *Staeger*. (Mares e Glogavia 13 Jun. captos communicavit D. *Zeller*).

♂♀. Inter longiores. Oblonga, dilute cinerea, opaca. Statura *Auth. conicae* (18), sed major. Frons paullo prominens. Epistoma subperpendiculare, apice haud reflexum. Antennæ mediocres, nigrae, articulo 2:do apice rufo, seta longe plumata. Palpi longiusculi, subcylindrici, atri, pilosi. Thoracis vittæ laterales perspicuae, & lineæ 2 mediae tenues, nigrae. Scutellum cinereum, immaeulatum. Abdomen cinereum, lineola in segmentis 1 & 2 nigra. Segmentorum omnium margo apicalis setosus. Alæ pallide cinereæ. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem divergentes, transversus ordinarius obliquus, distinete inflexus, fere in medio areæ insertus. Costa brevissime ciliata, spinula mediocris. Squamæ mediocres, albidæ, valvula superiore longe ciliata. Halteres pallidi. Pedes longiusculi, setosi, flavi, tarsis atris. Mas: oculi magni, per orbitas tenuis-

simas albas angustissime disjuncti. Ani tuberculum inflexum, ferrugineum. Pulvilli magni. *Femina*: oculi oblongi, per orbitas proportione latas, albas & vittam frontalem modice latam, antice luteam, in medio saepe nigram, postice macula cordata cinerea notatam, mediocriter disjuncti. Punctum supra antennas album.

**76. *A. ferrugineo-vittata*:** cinerea, capite albante; antennis, palpis, abdominis linea dorsali, tarsisque, nigris; pedibus flavis, thoracis vittis 3 brunneis; alis cinereis, nervo transverso ordinario subrecto; *femina*: oculis sat late remotis, vitta frontali fulva. ♀. (Long. 2— $2\frac{1}{2}$  lin.).

Hab. in hortis & pratis Sueciae mediae, 5—20 Jul., rarius; nempe in Smolandia ad Skärsjö, D. *Ljungsh*; in Ostrogothia ad Lärketorp; in Gotllandia ad Näbr & Öja.

♀. Priori affinis; sed magnitudine multo minore, antennis totis nigris, capite albido, sed minus argenteo-micante, vitta frontali proportione latiore, oculis minoribus, thoracis dorso vittis 3 abbreviatis dilute brunneis s. ferrugineis, alarum costa minus ciliata, nervis longitudinalibus 3 & 4 subparallelis, transverso ordinario subperpendiculari & leviter tantum flexo, ut & alis cinereo-hyalinis, non pallescentibus, abunde distincta. Reliqua ut in praecedente.

b. Seta antennarum pubescens aut nudiuscula.  
Mediae aut minores.

\*). Squamæ sub alis parvæ: valvula superiore inferiorem tegente.

†. Nervus transversus ordinarius subperpendicularis, rectus. Costa inermis. (*Anth. Hyoscyami* huic seriei etiam subjectum vide n:o 176).

**77.** *A. conformis*: fronte subprominente grisescens, capite albo-rufescente; antennis mediocriter longis tarsisque nigris; antennarum palporumque basi, vitta frontali ( $\text{♀}$ ), pedibusque, flavo-luteis; alis cinereis, basi pallidis; *femina*: oculis modice remotis.  $\text{♀}$ . (Long. 2 lin.).

Meig. Dipt. 5. 180. 167.  $\text{♀}$ . & 7. 328. 90. *Musca* Fall. Muscid. 82. 105.  $\text{♀}$ . typica.

Hab. in Scandinavia, 20 Jul.—16 Aug., rarius; scilicet in Scania orientali ad Östratorp & Esperöd, parce; in Uplandia ad Holmiani, teste D. *Wahlberg*; in Jemtlandia boreali ad Stalltjernstugan prope jugum alpinum, passim; e Dania a D. *Staeger* communicata.

$\text{♀}$ . Similis *Anth. haemorrhoum* (62), sed femoribus omnibus flavis & ano cinereo præcipue dignota. Cinerea aut flavidо-grisea. Oculi per orbitas albo-rufas & vittam frontalem latiusculam fulvam, postice cinereo-maculatam, disjuneti. Antennæ latiusculæ, nigrae, apice rotundatae, articulis 1 & 2 flavo-rufis; seta nuda. Epistoma non longe descendens, albo-rufum, apice leviter reflexum. Palpi flavi, apice subelavati, nigri. Thorax vestigio linearum nigrarum. Scutellum immaculatum. Abdomen ovato-oblongum, apice acutum, dorso rudimento lineæ mediae fusce; segmentis margine apicali setosis. Alæ cinereæ, basi pallidæ, costa subnuda, spinula nulla. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallelis seu versus apicem vix divergentes, horum 3:tiis in summo apice alæ excurrentes; transversus ordin. perpendicularis, exacte rectus, paullo ante medium areæ insertus. Squamæ sordide albidae, ciliatae. Halteres pallidi. Pedes medios, flavi aut flavescentes, femoribus anticis superne interdum vestigio vittæ fusce. Tarsi atri.

**78.** *A. calceolata*: fronte subprominente cinerascens, capite cano; antennis palpisque totis, tarsisque, atris; vitta frontali ( $\text{♀}$ ) pedibusque flavo-luteis; alis ci-

*nereis; femina*: oculis modice remotis. ♀ (♂). (Long. 2— $2\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Scandinavia præsertim meridionali & media rarius; in Scania ad Esperöd, in Ostrogothia ad Lärketorp; etiam in Jemtlandia ad radicem Åreskutan 21 Jun. a me inventa; e Dania a D. Staeger ut nov. spec. missa.

♀. Simillima priori, palpis vero antennisque totis, nigris, capite albicante, vix rufescente, ut & alis basi parum pallescentibus, in primis differt. Vitta frontalis latiuscula, ferruginea. Antennæ longiusculæ, validæ, seta nuda. Corpus cinereum. Abdomen certo situ maculis irregularibus fusco-micantibus, obsoletis. Alæ basi leviter albicantes. Pedes flavi, coxis cinereis, tarsis atris. Reliqua ut in antecedente.

♂.  $2\frac{1}{2}$  lin. long. Oculi cohærentes, per orbitas tenuissimas albas angustissime tantum disjuncti. Vitta frontalis supra antennas anguste triangularis flava. Regio ocellorum triangularis obscura. Abdomen oblongum, subdepressum, pilosum, cinereum, linea dorsali nigra; ano haud inflexo. Alæ basi pallescentes. Squamæ inmediocres & halteres alba. Pulvilli elongati. Reliqua ut in femina adumbrata, cuius mas specimen descriptum, in Lapponia Lulensi ad Quickjock a D. Boheman 1743 inventum, forte habeatur. Simillimus quoque *Anth. Salicis* (85), cuius varietatem crederem, nisi obstaret nervus transversus ordinarius in *Anth. calceolata* magis rectus.

79. *A. laticornis*: fronte prominente obscure cinerascens, capite albo-rufescente; antennis latiusculis tarsisque atris; antennarum palporumque basi, vitta frontali (♀), pedibusque, fulvo-flavis; alis cinereis, basi pallidis; *femina*: oculis sat late remotis. ♀. (Long.  $2\frac{1}{4}$  lin.).

Meig. Dipt. 5. 202. 210. ♀. (secund. Fall. transcripta).

— *Musca* Fall. Muscid. 86. 112. ♀. originaria.

Hab. in Suecia rarissime; in Scania unicum individuum inveni; in Ölandia etiam capta, testante D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad diversorium Skalstugan prope jugum alpinum Norwegiae d. 16 Jul. 1840 legit D. *Dahibom*.

♀. *Anth. conformi* (77) valde affinis & simillima, nec ab ea differt nisi magnitudine paullulum majore, capite subbuccato, antennis nonnihil latioribus, basi purius fulvis & flavis, ut & vitta frontali fulva paullo forte latiore.

80. *A. deprimata*: fronte parum prominente cinerascens, capite albicante; antennis validis, palporum apice, abdominis linea dorsali tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis hyalinis; *mas*: oculis arete cohaerentibus, ab domine linearie, depresso; *femina*: oculis mediocriter remotis, vitta frontali modice lata, ferruginea, ab domine lanceolato. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia, 2 Jun.—15 Aug., rarius; nempe in Scania ad Lund & Sandhammar; in Suecia media: ex. gr. in Ostrogothia ad Fredensborg prope Wadstena; in Jemtlandia boreali ad Mollsjellet & Stalltjernstugan. Larvae in fungis ad Kjeflinge Scaniae 20 Sept. 1835 inventae, quæ cito in pupas cylindricas nudas brunneas abierunt, e quibus imagines ntriusque sexus 27 Jul. 1836 egressæ.

♂♀. *Anth. calceolatae* 78, similis, sed magnitudine paullo minor, fronte minus prominente, antennis (in primis in ♀) proportione nonnihil validioribus, oculis maris arctius cohaerentibus, &c., dignata. Oblonga, cinerea. Caput argenteo-micans. Antennæ nigricantes, apice rotundatae, seta nuda. Epistoma perpendiculare, infra oculos parum descendens, apice vix reflexum. Palpi flavi, apice nigri. Thorax & scutellum immaculata. Alæ hyalinæ, basi subalbicantes. Nervi: longitudinales 3 & 4 parallelī, non late remoti, horum 3. ins in apice 1. ferre pone sumnum apicem alæ excurrens; transversus ordinat.

perpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus. Costa nuda. Spinula nulla. Squamæ parvæ & halteres, alba. Pedes cum coxis flavi, tarsis nigris. *Mas:* oculi magni, in medio frontis arele cohærentes, macula supra antennas triangulare, fusca. Abdomen lineare, depresso, griseum, linea dorsali & incisuris late obsecuris. Anus haud inflexus. Styli 2 parvi, obtusi, nigri in segmento-ventrali penultimo adsunt. *Femina:* oculi per orbitas mediocres, albidas, & vittam frontalem modice latam, fulvam, postice macula cordata cinerea notatam, modice disjuncti. Abdomen lanceolatum, pilosum, cinereum l. griseum, subimmaculatum.

81. *A. flavipalpis*: fronte haud prominente obscure cinerascens, capite argenteo-micante; palpis flavo-albis; antennis validis, abdominis linea dorsali tarsisque nigris; pedibus flavis; alis cinereis; *mas:* oculis arete cohærentibus, abdomine linearie, depresso. ♂. (Long. 2 lin.).

Hab. in Lapponia Umensi ad Wilhelmina, ubi descriptum specimen die 15 Jul. 1832 inveni, tunc temporis cum *Anth. flavipede* (118) commixtum.

♂. Simillima priori, a qua vix nisi palpis albidis l. pallide flavis dignoscitur. Antennæ basi piceæ. Thorax dorso nigricans. Abdomen pisosum, canum, linea dorsali nigra, & fasciis 4 latiss, fasciis in basi segmentorum 1, 2, 3 & 4. Lamina bidentata seu emarginata, nigra, in segmento ventrali penultimo (vix aliter ac in præcedente) adest. Femora antiea supra fusa. Cetera ut in priori. Ab *Anth. flavipede* abdominis colore discrepat.

82. *A. mimula*: fronte subprominente obscure cinerascens, capite argenteo-micante; antennis medioeribus, palpis, abdominis linea dorsali tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis fumato-cinereis; *mas:* oculis arete cohærentibus, abdomine linearie, basi depresso. ♂. (Long. 2 $\frac{1}{4}$  lin.).

Hab. in Suecia rarissime.

♂. Priori iterum simillima, fronte vero non nihil magis prominula, antennis mediocribus, palpis totis nigris, abdomine apice subclavato, segmentis non fuso-fasciatis, alis leviter fuscans, mox dignoscenda. Femora omnia cum coxis lutea. Dentes 2 breves, remoti, nigri in segmento penultimo ventrali adsunt. Reliqua ut in antecedente.

**83. *A. maculipes***: fronte subprominente cinerascens, capite ochraceo; antennis mediocribus, palpis, femorum posteriorum macula apicali, tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis hyalinis, basi pallidis; *femina*: oculis modice remotis. ♀. (Long. 2 lin.).

Hab. in Jemtlandia boreali rarissime, ad radicem Åreskutan 24 Jun. 1810 lecta,

♀. Ab *Anth. conformi*, 77. cui de cetero similis, differt: capite toto ochraceo, nec rufescente, antennis palpisque totis atris, alarum nervis longitudinalibus 3 & 4 exakte parallelis & paullulum magis approximatis, ut & pedibus pallidius flavis, femoribus posterioribus ad apicem superne macula nigra notatis.

**84. *A. lunatifrons***: fronte haud prominente cinerascens, capite albicante; antennis mediocribus, palpis tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cinereis; *femina*: oculis late remotis, vitta frontali lata, nigra, macula supra antennas flava. ♀. (Long. 1½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in frutice ad Esperöd Scaniæ 21 Sept. semel captata.

♀. A proxime praecedentibus, quibus affinis, dignoscitur: magnitudine paullo minore, & fronte latiore, nigra, macula tantum ante antennas lunata flava. Oculi non magni, subrotundati. Antennæ validæ, sed non longæ, seta nuda. Epistoma breve, infra oculos haud deswendens. Palpi parvi, fusi. Thorax immaculatus. Abdomen ovato-lanceolatum, fusco-piceum, nitens

(an in detrito?). Alæ cinereæ, ima basi pallescentes. Nervi ut in *Anth. maculipede*, 83. Squamæ minutæ. Halteres flavi. Pedes cum coxis sordide flavi, tarsis obscurioribus. Cum *Anth. verticella* (53), quæ femora nigra habet, non confundenda.

††. Nervus transversus ordinar. subobliquus, leviter inflexus.

85. *A. Salicis*: fronte parum prominente cinerascens, capite argenteo-micante; antennis, palpis, abdominis linea dorsali tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cinereis; basi pallescentibus; mas: oculis cohærentibus. ♂. (Long. 2 fere  $2\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 692. 135. ♂.

Hab. in Suecia media & boreali rarissime; scilicet in Ostrogothia ad Lärketorp d. 10 Jul. 1823, unicum specimen, & in Lapponiæ Tornensis floribus Salicis ad Juckasjervi d. 30 Jun. 1821 duo individua, inveni.

♂. Similis *Auth. conformi* (77), & *calleolatæ* (78) ♂, sed ab illa capite argenteo, nec rufescente, antennis palpisque totis nigro-fuscis, nec basi flavescentibus, ab hac antennis palpisque obscuris, nec atris, abdomine minus depresso, ano infexo, & ab utraque fronte nonnihil minus prominente, ut & nervo transverso ordinario paullo flexo, nec recto, differt. Oculi magni, sat arete cohærentes. Seta antennarum mediocrium nuda. Palpi subfiliformes. Thorax vestigio linearum nigrarum. Abdomen oblongum, depresso-subcylindricum, cinereum, linea dorsali nigra subcontinua. Segmenta margine apicali setosa. Alæ longiusculæ, præsertim basi pallescentes. Nervi long. 3 & 4 subparallelis. Costa subnuda, spinula vix ulla. Squamæ parvæ, ciliatæ & halteres, alba. Pedes antici ferruginei, posteriores flavi, tarsis omnibus atris.

\*\*). Squamæ sub alis mediores l. majuseculæ: valvula superiore inferiorem non tegente.

86. *A. viduata*: fronte non prominente obscure cinerascens, capite albicante; antennis mediocribus, palpis tarsisque, nigris; pedibus flavo-luteis; alis basi squamisque flavescentibus; *femina*: oculis non late remotis. ♀. (Long.  $2\frac{2}{3}$  lin.).

*Musca rufipes* Fall. Muscid. 85. 111. ♀. certissime. (♂ ibidem allatus potius ad *Anth. rufipedem* infra n:o 133 pertinet).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; duo tantum individua lustravi, unum e collectione Falleniana accep-tum, alterum in Scania captum.

♀. Ovata, nigricans, subnitens. Oculi magni, oblongi, per orbitas mediocres, albas, & vittam frontalem modice latam, nigram, proportione anguste distantes. Frons & facies convexae extra oculos vix 1 parum productae. Epistoma perpendicularare, argenteo-micans, infra oculos parum descendens, apice haud reflexum. Antennae incumbentes, nigrae, seta nuda. Palpi nigri. Thorax nigricans, lineis 2 mediis nigris, macula humerali cinerea. Abdomen ovale, obscure griseum, immaculatum, parum pilosum. Alae cinereae, basi flavicantes. Nervi: longitudinales 3 & 4 sat late remoti, subparallelis; transversus ord. leviter flexus, paullo ante medium areae insertus. Costa subinermis; spinula nulla. Squamæ & halteres flava. Pedes medios, pilosi, fulvi, coxis cinereo- micantibus, tarsis atris, pulvillis parvis, albis.

*Obs.* *Anth. rufipes* ♂: genuina, abdome rufescenti ab *Anth. viduata* differt, in Divis. 2:da sub n:o 133 quærenda.

87. *A. punctiventris*: fronte non prominente obscure cinerascens, capite albicante; antennarum elongatiorum articulo ultimo, thoracis lineis 4, abdominis maculis totidem, tarsisque, nigris; palpis albis; antennis basi pedibusque ruso-flavis; alis cinereis, basi, squamisque sordi-

de albidis, nervis transversis rectis, infuscatis; *mas:* oculis coherentibus. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime.

♂. Simillima *Anth. demigranti* (70), a qua fere tantum antennarum seta brevissime & subtiliter (nec distincte) plumata dignoscitur. A priori, cui quoque affinis & similis, differt: antennis basi rufis, seta puberula, nec nuda, palpis albidis, oculis sat intime coherentibus, abdominis maculis 4 fuseis (ut in *A. demigrante*), alis basi squamisque minus flavidis, nervo transv. ord. magis recto & leviter infuscato, spinula costæ parva, ut & pulvillis albis majoribus.

*Obs.* Sub *Musca depuncta* var. β. ♂. Fall. Muscid. 80. 98. latet.

88. *A. pubiseta*: fronte parum prominente cinerascens subimmaculata, capite argenteo-micante; antennis elongatis, palpis tarsisque, nigris; pedibus flavo-luteis; alis basi squamisque sordide flavidis, nervo transverso ordinario leviter flexo, subinfuscato; *mas:* oculis subcoherentibus. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in Scavia ad Lund semel inveni.

♂. Oblonga, cinerea, opaca. Frons leviter prominula. Oculi per orbitas albas & lineam frontalem, tenuissimas, anguste disjuncti. Antennæ elongatæ, angustæ, nigræ, basi piceæ, seta brevissime & subtiliter puberula. Epistoma infra oculos nonnihil descendens, apice leviter reflexum. Palpi filiformes, nigri. Thorax vestigio linearum 2 medianum nigrarum. Abdomen oblongum, griseo-cinereum, immaculatum, tenuiter pilosum. Anus parvus, subinflexus. Nervi longitudinales 3 & 4 subparallelis seu versus apicem levissime tantum divergentes. Costa subnuda; spinula vix ulla. Halteres flavi. Pedes mediocres, rufoflavi, tarsis atris, pulvillis magnis, albis.

*Sect. 2.* Corpus præsertim in ♂ cylindricum aut subcylindricum. Antennæ elongatæ. Oculi oblongi, nudi, in utroque sexu fere

æqualiter & non late disjuncti. Squamæ sub alis non magnæ, valvula superiore inferiorem tegente. Nervus transversus ordinarius omnino rectus & sæpissime non infuscatus. Mediae aut plerumque minores. *Coenosia* Auctor. (*Anth.* *spinicosta*, oculis ♂ remotis, vide n:o 6).

#### A. Seta antennarum plumata.

89. *A. tigrina*: fronte nonnihil prominente cinerascens, antennis, palpis, abdominis punctis 4, pedibusque, nigris; genubus tibiisque ferrugineis; alarum costa nudiuscula, spinula nulla. ♂♀. (Long. 2 lin.).

*Musca* Fabr. Antl. 297. 66. certe. *Coenosia* Macq. Buff. 2. 341. 1? ♂♀. — Vix eadem Meig. Dipt. 5. 212. 2? — Sub *Musca meditata* Fall. Muscid. 87. 114. deser. var. "antennis seta perspicue plumata" latet.

Hab. in Sueciæ meridionalis & mediæ graminosis & plantis aquaticis, etiam in floribus Chrysanthemi & Achilleæ, vulgaris, Jul.—Sept. obvia, in copula deprehensa; scilicet in Scania ubique frequens; in Smolandia (*Ljungh*) & Ostrogothia passim; in Gotlandia ad Nähr &c., raro; & Dania utrumque sexum sub nomine allato obtinui a D. Staeger. (E Kilia a D. Wiedemann & ex Hamburgo a D. Dahlbom missa). Testante *Fabricio* rapina congenitum victitat.

♂♀. Cinerea. Caput in ♂ argenteo-, in ♀ sordide albo-micans. Vitta frontalis modice lata, nigra, macula postica cinerea. Antennæ incumbentes, nigræ, articulo 2:do supra albo-micante, seta distinete, sed non longissime plumata. Epistoma infra oculos non longe descendens. Palpi longiusculi, leviter clavati; nigri, interdum basi fuscæ l. pallidi. Thorax vix rudimento linearum fuscarum. Abdomen parce setosum, punctis l. maculis 4 rotundatis, nigro-brunneis in segmentis 2 & 3 localis, &

in ♂ interdum linea dorsali brunnea obsoleta. Alæ cinereæ, nervis longit. 3 & 4 subparallelis seu versus apicem levissime divergentibus; horum 3:to fere in apice alæ excurrente. Nervus transv. ordin. rectissimus, perpendicularis, nonnihil ante medium areæ insertus, reliquis vix l. parum obscurior. Squamæ ciliatæ & halteres nudi, albida. Pedes mediocres, setosi, nigri, genibus præsertim posterioribus, tibiisque totis, ferrugineis. Pulvilli in utroque sexu longiusculi, albi. *Mas*: ab domine oblongo-cylindrico, incurvo, apice subclavato, ano inflexo; *femina*: ab domine oblongo-lanceolato, apice acuto. — Variat ♂ ab domine punctis nigris 6, nempe quoque 2 minutis in segmento 4:to.

*Obs.* Cel. Meig. l. c. de sua *Coenos. tigrina* in descriptione dixit: "Flügel mit einem Randdorne", unde dubium oritur an non illa potius ad sequentem seu nostram *A. ciliatocostam* sit referenda. Synonymon Fabricii mihi indubium videtur, dum Cel. Wiedemann specimen nostris simillimum ut "Fabricii Muscam tigrinam genuinam" communicavit.

90. *A. ciliatocosta*: fronte nonnihil prominente cinerascens, antennis, palpis, abdominis punctis 4, pedibusque, nigris; antennarum basi, genibus tibiisque ferrugineis; alarum costa basi perspicue ciliata, spinula distincta. ♂♀. (Long. 2 lin.).

An. *Coenosia tigrina* Meig. Dipt. 5. 212. 2? ubi vero antennæ nigræ dicuntur.

Hab. cum priori, 10 Aug.—25 Sept., minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd & Björnstorps (*Dahlbom*), passim; in Smolandia; in Ostrogothia ad Lärketorp rar.

♂♀. Simillima priori, sed antennis basi rufescens & alarum costa præsertim a basi ad spinulam erectam distincte ciliata, mox dignoscitur. Nervi transversi quoque magis infuscati, &

puncta abdominis in mare minora. — Affinis & similis etiam *Anth. Quadrum* (27), sed oculorum distantia discrepat.

**91. *A. flavicornis*:** fronte parum prominente cineraceens, antennis sordide pallescentibus; palpis tarsisque nigris; thoracis lineis 3, abdominalisque punctis 6, brunneis, obsoletis; pedibus flavis; alis cinereis, costa breviter subciliata. ♂. (Long. fere 2 lin.).

*Musca* Fall. Muscid. 88. 117. ♂. typica secundum specimen originarium.

Hab. in Scania rarissime.

♂. Similis *Anth. intermediæ* (102), sed antennis pallidioribus, femoribus omnibus flavis, & abdome punctato, distincta. Cinerea. Caput albicans, vitta frontali nigricante. Antennæ (in specimine velusto) basi obscuræ, articulo ultimo linearie, angusto, sordide flavido; seta subplumata. Epistoma infra oculos parum descendens. Palpi subfiliformes. Thorax lineis 3 dilute brunneis. Abdomen subcylindricum, incurvum, parce setosum, punctis tribus paribus dilute brunneis, obsoletis, in segmentis 2, 3 & 4. Anus rotundatus, cinereus, tuberculo inflexo, rufescente. Lamellæ 2 styliformes, ferrugineæ in segmento ventrali penultimo adsunt. Alæ cinereæ, nervis flavidis. Nervi: longitudinalis 3 & 4 parallelis; transv. ordin. perpendicularis ante medium areae insertus. Costa subciliata, at spinula vix illa. Squamæ non magnæ, parum ciliatae, & halteres, flavido-albæ. Pedes validi, cum coxis flavi, nigro-setosi, tarsis obscuris. Puvilli mediocres l. longiosculi, albi.

♀. Similis mari descripto, sed nonnihil minor, antennis obscurioribus & abdome subimmaculato distincta. Fall. I. e.; an hujus? Scania.

B. Seta antennarum pubescens aut puberula. Mediae aut minores.

\*) abdome nigro-punctato.

†. Palpi nigri.

a). Femora omnia in utroque sexu nigricantia.

92. *A. meditata*: einerea, antennis, abdominis punctis 4, femoribus tarsisque, nigris; trochanteribus, genibus tibiisque testaceis; squamis sub alis albis. ♂♀. (Long. circit. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 692. 139. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 87. 114. ♂♀. (exclus. syn. *M. meditabunda* Fabr.). *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 219. 19. ♂.

Hab. in foliis fruticum per hortos, prata & silvas Scandinavie, 20 Jun.—15 Aug., vulgaris, in copula pluries capta; scilicet in Scania, Blekingia, Smolandia & Ostrogothia, ubique frequens; in Gotllandia ad Gärde, Gothem, Stenkyrka, Wamlingbo &c., non paree; in Ölandia & ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia Loreali ex. gr. ad diversorum Lund juxta radicem Åreskutan frequens; in Norwegia ad Dovre, D. *Bohemian*, & in Nordlandia ad Evenäs, non rara. (E Glogavia a D. Zeller communicata).

♂♀. Griseo-cinerea, opaca, setosa. Caput albidum. Oculi non magni, ferruginei. Vitta frontalis medioeris, nigra, postice macula cordata cinerea. Frons leviter prominens. Antennæ lineares, nigrae, articulo 2:do apice superne albo-micante, seta subtiliter pubescente. Epistoma subperpendiculare, infra oculos paullo descendens. Palpi leviter clavati, nigri, pilosi. Thorax & scutellum immaculata. Abdomen punctorum brunnescentium duobus paribus in segmentis 2 & 3. Alæ cinereo-hyalinae, nervis longitud. 3 & 4 subparallelis, transverso ord. perpendiculari, perspicue ante medium areæ inserto. Costa subnuda; spinula nulla. Squamæ mediocres haud ciliatæ, albæ. Halteres flavi. Pedes medios, setosi, nigri, trochanteribus, femoribus apice, tibiisque totis, flavo-testaceis, Pulvilli mediocres, albi.

*Mas*: abdomine cylindrico, incurvo, ano inflexo cinereo, appendicibus 2 sat magnis, lamelliformibus nigro-cinereis in segmento ventrali penultimo; *femina*: paullo major, abdomine oblongo, acuto, — Var. b. ♂ corpore obscuriore. Variat etiam c. ♀ thorace brunneo-sublineato; ad Westö Gotlandiae 24 Jul.

Obs. Sub *Musca meditata* Fall. plures species latent.

93. *A. exsul*: lète cinerea, capite cano, antennis, abdominis punctis 4, pedibusque, nigris; tibiis testaceis; squamis sub alis albis. ♂. (Long. 2½ lin.).

Hab. in Suecia media rarissime, unicum exemplum masculum a D. *Gyllenhal* missum.

♂. Similis *Auth. consimili* (35), sub quo nomine in collectione etiam diu asservata fuit, sed fronte magis prominente, oculis latius remotis, alarum nervis transversis non infuscatis, spinula costæ distinctiore &c., facile dignota. Interstitium frontale inter oculos modice latum, totum canum, opacum, vitta ordinaria nigra nulla, sed squamula supra radicem antennarum albida. Seta antennarum tenuiter pubescens. Thorax antice lineolis 2 nigris tenuissimis. Abdomen subcylindrico-conicum, seu fere ovato-conicum, maculis 4 dilute brunneis in segmentis 2 & 3. Anus haud infexus, nec appendiculatus. Alæ cinereæ, nervis ut in *A. consimili* directis. Costa breviter subciliata, spinula mediocri. Squamæ ut in priori. Pedes nigricantes, geniculis tibiisque fusco-ferrugineis, harum anticis obscurioribus. Pulvilli elongati, albi.

94. *A. nana*: cinerea, capite albicante, antennis, abdominis punctis subsenis, pedibusque, nigris; tibiis testaceis; squamis sub alis albis. ♂♀. (Long. ♂ 1⅓, ♀ 1⅔—1⅖ ln.).

Hab. in Suecia meridionali mense Julio rarius; ♂ & ♀ in Scania ad Lund & Esperöd in copula capti. (Spe-

cimen unicum semineum etiam e Glogavia a D. Zeller missum).

$\delta\varphi$ . Parva. Frons non prominens. Oculi non late & in utroque sexu aequi, distantes, vitta frontali nigra. Antennæ atræ, articulo 2:do apice superne puncto albo. Seta pubescens. Palpi nigri, filiformes, apice leviter clavati. Thorax subimmaculatus, lineis brunneis rudimentariis. Alæ cinereo-hyalinæ, nervis long. 3 & 4 subparallelis, transverso ordinario non exactissime recto, sed levissime flexo. Spinula costalis nulla. Squamæ mediocres, lacteæ. Halteres pallidi. Pedes nigri, geniculis anticis summis tibiisque omnibus ferrugineis. Pulvilli mediocres, albi. *Mas*: antennarum seta tantum puberula. Abdomen cylindricum, maculis 8 brunneis in segmentis 1, 2, 3 & 4, quarum 4 intermedii distinctioribus. Nervus transv. ordinarius distincte ante medium areæ insertus. Costa nuda. *Femina*: antennarum seta pubescens. Abdomen conicum, acutum, griseum, punctis 4 brunneis in segmentis 2 & 3, & saepè linea dorsali tenuissima, brunnea. Nervus transv. ordinari. modice ante medium areæ insertus. Costa brevissime subciliata.

95. *A. 6-maculata*: lète cinerea, capite albo, antennis, abdominis punctis 6, pedibusque, nigris; tibiis imabasi ferrugineis; squamis sub alis albis.  $\delta\varphi$ . (Long. circiter 1 lin.).

*Coenosia* Meig. Dipt. 7. pag. 335.  $\delta$ .

Hab. in Scandinavia, mihi rarissime obvia; nempe in Scania semel deprehensa; in prato Färöensi Gottlandiae 24 Jul. 1841 ♀ semel lecta; in Jemtlandia boreali ad Mollsjellet etiam in uno specimine inventa; e Dania a D. Staeger sub nomine allato in utroque sexu missa. (E Moabite prope Berolinum, ubi 12 Jul. 1842 capta, a D. Dahlbom, & e Glogavia sine synonymia a D. Zeller, communicata).

$\delta\varphi$ . Minuta; priori minor eique valde similis & affinis, sed pedibus fere totis nigris, tibiis tantum ima basi ferrugineis, praeceps differt. Thorax feminæ plerumque obsolete brunneo-trilineatus. Reliqua ut in priore.

b.). Femora saltem in  $\delta$  plus minus flava; in  $\varphi$  raro nigra.

96. *A. 6-notata*: griseo-cinerea, capite canescente, antennis, abdominis punctis 6, tarsisque, nigris; thoracis lineis 3 brunneis; pedibus flavis; squamis sub alis mediocribus, albis.  $\delta\varphi$ . (Long.  $1\frac{3}{4}$ —2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 691. 146.  $\delta$ . *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 213. 5.  $\delta\varphi$ . Macq. Buff. 2. 346. 8.  $\delta\varphi$ .

Hab. in Scandinavia praesertim meridionali & media, 15 Jun.—2 Aug., passim, in copula capta; scilicet in Scania ad Lund, Esperöd &c., parce; in Smolandia, D. *Ljungb*; in Ostrogothia ad Gusum (*Wahlberg*) & Lärketorp; in Gotllandia ad Ruthe, Kellunge &c. haud rara; in Medelpadia raro; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Åsele; in Norwegia ad Alstahaug & Levanger atque in inferalpinis Nordlandiæ ex. gr. ad Hacksten; & Dania in utroque sexu a D. *Staeger* sub nomine allato communicata.

$\delta\varphi$ . Frons non prominens. Oculi modice late remoti, vitta frontali latiuscula, nigra. Antennæ elongatæ, angustæ, nigræ, puncto albo in apice superno articuli 2:di, seta subtiliter pubescente. Epistoma perpendicularare, apice non reflexum, infra oculos hanc descendens. Palpi, subfiliformes, pilosi, nigri, apice parum crassiores. Thorax lineis 3 brunneis plerumque perspicuis. Alæ cinereæ, basi sordide albantes. Nervi: longitudinales 3 & 4 subparallelis, horum 3:tius in apice l. mox infra summum apicem alæ excurrens; transversus ord. perpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus; costa subnuda, spinula in  $\delta$

nulla, in ♀ minuta. Pedes cum coxis flavi, in ♂ plerumque immaculati, in ♀ sappissime coxarum basi femoribusque anticis ultra medium nigro-cinereis. Tarsi atri. *Mas*: abdomen cylindricum, maculis tribus paribus brunneis distinctioribus, ano rotundato, inflexo, cinereo. Pulvilli mediocres. *Femina*: abdomen ovato-lanceolatum, maculis tribus paribus brunneis plerumque valde obsoletis, interdum vix ulla, ano acuto. Pulvilli parvi.

Var. b. ♂ femoribus anticis superne vitta plus minus perspicua, fusca. Plerumque paullo minor.

Var. c. ♂ punctis abdominis 8 brunneis. Zett. I. c. var. Ad Wilhelmina Lapponiae Umensis semel.

*Obs.* Ab *A. intermedia* infra n:o 102, cui affinis & similis, differt: magnitudine nonnihil minore, femoribus anticis in ♂ flavis, ut & abdomine in utroque sexu maculato, nec nisi similem cum simili in copula junctam vidi; ergo hæ species distinctæ videntur, nec varietates ejusdem ut voluit Auctor Thesium in Entom. Zeitung Sedin. 1841. p. 26.

97. *A. bilineella*: cinerea, capite albo, antennis, abdominis punctis 6, tarsisque, nigris; thoracis lineis 2 brunneis; pedibus flavis; squamis sub alis parvis, albis; *mas*: abdomine cylindrico, femoribus omnibus flavis; *femina*: abdomine lanceolato, femoribus anticis nigricantibus. ♂♀. (Loug. fere 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 691. 149. ♂♀.

Hab. in Suecia boreali, 22 Jun.—16 Aug., rarius, in copula bis capta; scilicet in Jemtlandia ad Åsarne; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Åsele.

♂♀. Priori simillima, nec differt ab illa, nisi capite forte albidoire, thoracis lineis tantum binis, ut & squamis sub alis paullo minoribus. Thorax maris fere immaculatus. Cetera ut in præcedente.

98. *A. geniculata*: schistaceo-cinerea, capite albo, antennis, abdominis punctis 6, pedibusque, nigris; femoribus posterioribus basi late, tibiisque anterioribus totis, flavis; alis albo-hyalinis, nervis transversis subappropinquantibus, squamis parvis, albis. ♂♀. (Long. 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 694. 145. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid.  
89. 120. ♂. *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 219. 20. ♂. T. 45.  
f. 10. — Macq. Buff. 2. 347. 16.

Hab. in graminosis locis aridis, sed etiam in plantis aquaticis capta, per Scandinaviam, 30 Maj.—Jun. Jul.—15 Sept., passim frequens, praesertim ♂ vulgaris; scilicet in Scania ad Esperöd in monte Stenshusvud minori, ad Ralunda in littore maris, &c., sat frequens; in Smolandia, D. Boheman; in Ostrogothia ad Wadstena parce; in Gotlandia ad Nähr & Gothem; in Jemtlandia ad diversorium Forsa & radicem Mullsjellet; in Lapponia Umensi ad Lycksele raro; e Dania a D. Staeger communicata. (E Glogavia a D. Zeller missa).

♂♀. Affinis *Auth. 6-notata* (96), sed duplo & ultra minor, pendente colore ab illa & a proximis facile dignota. Caput ut in priori. Palpi parvi, filiformes, nigri. Thoracis linea binæ fuscæ valde obsoleta. Abdomen etiam ut in *A. bilineella*. Nervi longitudinales 3 & 4 non exactissime paralleli, sed versus apicem levissime divergentes; transversus ord. rectissimus, perpendicularis, distinete ante medium areæ insertus. Costa breviter ciliata. Squamæ parvæ, lacteæ. Halteres albidi. Pedum coxae omnes & femora antica, cinereo-nigra. Femora posteriora a basi ad medium l. fere ultra medium flava, deinde nigra. Tibiae anteriores testaceæ, posticæ nigrae l. piceæ. Tarsi omnes atri. Pulvilli mediocres, albi. — *Femina*: femoribus posterioribus flavis, versus apicem superne plus minus late infuscatis. Variat ♂ punctis abdominis fuscis obsoletis. — Cum

*Anth. 8-punctata* (110), cui quoad pedum colore similis, non confundenda.

99. *A. pygmaea*: cinerea, capite albo, antennis, abdominis punctis 6, femoribus anticis totis, posticis annulo apicali, tarsisque omnibus, nigricantibus; pedibus flavis; thoracis dorso griseo; alis cinereis, nervis transversis approximatis, squamis parvis, albis. ♂. (Long.  $\frac{3}{4}$  lin.).

*Coenosia pusilla* Staeg. in litt. 24 Oct. 1842.

Hab. in Scandinavia meridionali rarissime; in Scania ad Esperöd semel inveni; e Dania specimen typicum a D. Staeger obtinui.

♂. Minuta. Simillima præcedenti, sed præter magnitudinem minorem differt quoque pedum colore & alarum nervis transversis magis approximatis. Caput ut in priori, vitta frontali nigro-cinerea. Abdomen maculis tribus fuscis obsoletis. Coxæ cinereæ. Pedes pallide flavi, femoribus anticis fere ad apicem, posticis annulo ante apicem, tarsisque omnibus fusco-nigris.

*Obs.* Nomen Staegeri *pusilla* rejicere coactus fui, ne cum *Anthom. pusilla* Meig., quæ alia est species, confundatur.

††. Palpi albi. (*Anth. troglodytes* & *pallipalpis* in Sect. I:ma sub n:ris 33 & 46 quærendæ).

100. *A. verna*: cinerea, capite, incisurisque tenuissime, albidis; palpis pallidis; antennis rufis, articulo ultimo, abdominis punctis 6, femoribusque, nigris; alis cinereis; pedibus testaceis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 693. 113. ♂♀. *Musca* Fabr. Antl. 304. 101. Fall. Muscid. 87. 116. ♂♀. *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 214. 6. Macq. Buff. 2. 346. 9.

Hab. in graminosis & floribus per littora maris, prata & hortos Scandinaviae, 24 Jun.—28 Sept., vulgaris, in copula; scilicet in Seania ubique frequens; in Smolandia & Ostrogothia passim; in Gotllandia ad Ruthe, Gothem &c.; in Nericia ad Kärr; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Lapponiis rarius, ut in Umensi ad Wilhelmina, & Tornensi ad Juckasjervi; in Norwegia ad Næs Wærdaliæ, & Björkvik Nordlandiæ, parce; in Dania, D. *Dahlbom*. (E Kilia a D. *Wiedemann* missa).

♂♀. Pusilla. Similis *Anth. troglodytes* (33), sed corpore magis cylindrico &c. dignota. Caput ut in proxime praecedentibus constructum. Frons lata, cinerea, vitta didyma nigra. Antennæ rufescentes, articulo ultimo nigricante, seta tenuiter puberula. Palpi parvi, albi. Thoracis lineæ fuscæ rudimentariæ. Abdomen cinereum, incisuris tenuiter albis, punctis tribus paribus in segmentis 2, 3 & 4 lineaque dorsali nigris. Alæ cinereæ, basi albidae. Nervi longit. 3 & 4 versus apicem subdivergentes, transversi modice remoti, horum ordinarius paullo ante medium areæ insertus. Costa subnuda; spinula parva. Squamæ non magnæ, albæ. Halteres albidi. Coxæ & femora cinereo-nigra; trochanteres, genua, tibiae & tarsi flavo-ferruginea; tarsi postici sape fusciores. Pulvilli parvi.

101. *A. lacteipennis*: cano-cinerea, capite albido; palpis pallidis; antennis rufis, articulo ultimo, abdominis punctis 6, femoribusque, nigris; alis albis; pedibus testaceis. ♂♀. (Long. 3—1 lin.).

Hab. in graminosis, interdum locis paludosis, plerumque in pratis, raro in Pinn inventa; in insula Gotllandia, 24 Jun.—30 Jul., nec alibi a me deprehensa, ibi vero sat frequenter obvia, ex. gr. ad Martebo, Westö, Nähr, Gothem, Färön &c. E Skärsjö Smolandia a D. *Ljungb* quoque missa.

♂♀. Valde similis praecedenti, sed magnitudine paullo interdum duplo minore, alis albis &c., dignota. Seta proportione evidentius quoque pubescente quam in priore. Abdominis incisuræ vix albidiores. Reliqua ut in precedente. Affinis etiam *Auth. uliginosæ* (128) & *almae* (140), sed præter magnitudinem minorem differt eliam abdomen basi concolore, nec pallido, ut & alis immaculatis, nec nervis transversis infuscatis. Cum *Auth. dealbata* (118), & *flavimana* (109), vix confundi potest.

\*\*) abdomine immaculato. Palpi nigri.

α.) femoribus flavis.

102. *A. intermedia*: cinerea, capite albicante, antennis, femoribus antieis tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, squamis sordide albidis. ♂♀. (Long. 2 lin. & ultra).

Zett. Ins. Lapp. 693. 140. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid.

87. 115. ♂♀. *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 214. 7. ♂♀.

Hab. in foliis fruticum per hortos & prata Scandinaviæ, 22 Jun.—2 Sept., vulgatissima, in copula sæpiissime capta; scilicet in Scania, Smolandia & Ostrogothia, passim copiose; in Ölandia; in Gotllandia ad Fårön, Nähr, Gothem, Stenkyrka, Thorsborg, Kyllej &c., frequens; in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Helsingia ad Kårböle; in Jemtlandia ad radicem Åreskutan, Undersåker, &c.; in Laponia Umensi ad Lycksele raro; in Norwegia ad Christianiam (*Dahlbom*), Næs Værdaliae, Thynæs, Alstahaug & Levanger, &c., sat frequens; e Dania a D. D. *Staeger* & *Dahlbom* communicata.

♂♀. Statura fere & similitudo *Auth. meditatae* (92), sed corpore nonnihil angustiore, magisque cylindrico, abdomine immaculato, ut & femoribus posterioribus totis flavis, differt. Cinerea

1. *flavido-cinerea.* Caput albicans. Oculi non late distantes, vitta frontali nigra, macula postice cinerea. Frons non prominens. Antennæ elongatæ, angustatæ, nigræ, articulo 2:do superne puncto albo; seta pubescente. Epistoma perpendiculare, infra oculos haud descendens, nec apice reflexum. Palpi tenues, filiformes, fuscocinerei. Corpus immaculatum. Nervi long. 3 & 4 subparallelis, transversi modice distantes, perpendicularis, recti, horum ordinarius paullo ante medium areæ insertus. Costa nudiuscula; spinula nulla. Squamæ parvæ, albidæ, ciliatæ. Pedes mediocres, flavi, coxis omnibus, femoribus anticus, tarsisque omnibus, nigris. *Mas:* abdomine cylindrico, incurvo; ano inflexo, cinereo; pulvillis elongatis; *femina:* abdomine lanceolato, acuto; pulvillis mediocribus. — Variat ♂ femoribus posterioribus superne ad apicem lineola brevi, nigricante. *Gottlandia;* *Norwegia.*

*Obs.* Var. b. ♀. femoribus omnibus flavis; Zett. Ins. Lapp. l. c. var. b. est distincta species ad *Auth. biocellatum* (103) pertinens.

*Obs.* *Anthomyia intermedia* Meig. Dipt. 5. 102. 34. (seu *Hylemyia* eadem Meig. Dipt. 7. 316. 46.) alia est species Faunæ nostræ forte peregrina.

103. *A. biocellata:* cinerea, capite albicante, antennis tarsisque nigris; pedibus cum coxis flavis; abdomine basi macula utrinque pallida; thoracis lineolis 2 brunneis; alis cinereis, squamis albis. ♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{3}{4}$  lin.).

*A. pumila* var. d. ♀. Zett. Ins. Lapp. 694. 147.

Hab. in Scandinavia media, at præsertim boreali, 2 Jul.—25 Aug., rarius; scilicet in Smolandia ad Skärsjö semel capta; in Helsingia ad Kårböle; in Jemtlandia ad Faxelfven, Mullfjellet &c.; in Lapponia Umensi ad Wilhelmina rarissime; in Norwegia ad Alstahaug, Thynæs, Levanger, & Næs Wærdalæ.

♀. Valde similis priori, a qua tamen magnitudine paullo minore, thorace bruneo-bilineato, abdome ad basin utrinque macula

irregulari pallida, squamis sub alis paullo minoribus, ut & femoribus omnibus cum coxis flavis, vere differt. Venter quoque saltem basi pallidus. Cetera ut in priori.

Var. b. ♀. an hujus? Cana, femoribus anticis obscuris, thoracis lineolis rudimentariis; de cetero varietati a. similis. In Gotlandiae Färön ad Olle Hau, & in Jemtlandia ad Åreskutan & Mullsjellet 3 specimina inveni.

**104. *A. trilineella:*** cinerea, capite albescente, antennis tarsisque nigris; pedibus flavis, femoribus anticis superne vitta fusca; thorace brunneo-trilineato; alis cinereis, squamis albidis. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 695. 151. ♀.

Hab. in Lapponia Umensi rarissime; in silva ad Stensele 3 Jul. 1832 unicum exemplum inveni.

♀. Similis *Anth. intermediae* (102), sed colore corporis forte laetius cinereo, thoracis lineis 3 angustis brunneis obsoletis, ut & femoribus omnibus flavis, anticis superne striga longitudinali fusca notatis, distincta. Antennarum seta distinete pubescens. Coxæ flavae, anticæ basi, posteriores ad dimidium, cinereæ. Reliqua omnia exacte ut in *Anth. intermedia*.

β.) femoribus nigricantibus.

**105. *A. means:*** cinerea, capite albicante, antennis pedibusque nigris; geniculis omnibus trochanteribusque intermediis rufis; thorace obsolete brunneo-bilineato; alis cinereis, squamis parvis, albidis. ♂♀. (Long. circiter 1 $\frac{3}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 695. 150. ♂♀. *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 216. 10. ♂♀. Macq. Buff. 2. 346. 10. ♂♀.

Hab. in graminosis, per prata & silvas Scandinaviae præseritim borealis, 24 Jun. - 6 Sept., passim; in copula; in fenestris etiam errabunda obvia; nempe in Scania ad

Räften, D. *Dahlbom*, ad Esperöd, ipse; in Sömlandia raro; in Ostrogothia ad Gusum; in Uplandia ad Carlberg prope Holmiam, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Åsarne, Mullsjellet & Skalstugan, sat frequens; in Lapponia Umensi ad Lycksele & Barrsele; in Lapponia Lulensi ad Quickjock (*Wahlberg*); in Norwegia a Dovre (*Bohemus*) usque ad Næs Wærdaliae & Suulstuen in jugo alpino, non rara. (E Reinerzi Silesiae a D. *Zeller* communicata).

♂♀. Simillima *Anth. intermediæ* (102), sed paullo minor, & femoribus nigris præcipue dignota. Obscure cinerea. Thorax lineis dorsalibus 2 fuscis, in ♂ parum perspicuis. Pedes nigricantes, trochanteribus in primis intermediis geniculisque omnibus & summis rufis. Tibiæ etiam in ♀ interdum obscure testaceæ. Anus maris cinereo-nigricans, sed vix nisi in detritis nitidus. Reliqua ut in *Anth. intermediæ*.

106. *A. albimana*: cinerea, subimmaculata, opaca, antennis pedibusque nigricantibus; tarsis anticis basi in ♂ albis; alis in utroque sexu subfuscatis, basi squamisque albidis. ♂♀. (Long. 1½ lin.).

Wahlb. in litteris 5 Nov. 1841.

Hab. in Ostrogothia, ubi uterque sexus in foliis Betuleæ albæ ad Gusum d. 21 Maii 1842 a Professoribus *Wahlberg* & *Bohemus* passim deprehensus.

♂♀. Speciem hanc ipse non vidi, quare descriptionem ejus exactam a Cel. *Wahlberg* datam intactam reddam. "*Anth. albimana* ♂♀. Affinis *Anth. meanti*. Long. 1½ lin. Cinerea opaca. Oculi nudi, in utroque sexu latius remoti, interstitio maris diuidit oculi latitudinem, feminæ tetam attingente, orbitis albo-micantibus, vitta media, superne bifida, nigricante vel antice, præsertim in semina, fulvescente. Frons sub prominula. Epistoma descendens, subperpendiculare, ore non reflexo, setis utrinque 2 mystacinis longioribus. Anteunæ epistomate paullo

breviores, articulo 3:to oblongo, seta tenuiter puberula, anten-na dimidio longiori, basi leviter incrassata, ibique nigra, cetero fusca. Palpi nigri. Thorax obsoletissime fusco-3-lineatus. Ab-domem immaculatum, maris lineare, ano rotundato, feminæ ovato-lanceolatum. Alæ plus minus infuscatae, basi cum squamis albidae, costa breviter ciliata, spinulis 2 armata. Nervi 3 & 4 longitudinales leviter curvati at 3:tiis in ipso apice alæ excurrit & exitu longius solito a 2:do distat. Nervus trans-versus ordinarius rectus. Halteres pallide testacei. Pedes nigri-cantes, spinulosi, feminæ simplices, tarsis omnibus concoloribus. Femora antica maris extus longius spinosa, tarsisque ejusdem paris articulis 2 primis albis, nigro-pubescentibus, subdilatatis & in junctura subflexis, tertio supra fuscescente subtus albo, 4 & 5 nigris. Pulvilli albi, maris elongati." — Huic similis & affinis videtur nostra *Aricia albifarsis* n:o 225; sed cum ambas comparare mihi non licuit de identitate earum dubitem, praesertim cum una alterave nota essentialis in descriptione Wahl-bergianæ speciei cum nostra *albitarsi* hand congruit. \*)

107. *A. genarum*: fusco-grisea, immaculata, subnitida, antennis pedibusque nigris, tibiis testaceis; epistoma-te descendente, sordide albo-corneo; alis basi squamisque albidis, costa subciliata, spinula distincta. ♀. (Long. 2 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 695. 153. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; in summo al-

\*) Postquam hæc plagula cum supra annotatis jam typis mandata erat, duo specimina mascula *Aanth. albimanæ* Wahlb. a Cel. Boheman mihi communicata fuerunt, e quorum comparatione cum individuis nostræ *Ariciae albifarsis* manifeste constat, has ut duas allatas species, utpote ad descriptionem *albitarsi* jam conjeci, non nisi unius ejusdemque esse. Deleatur igitur no-men *albimana*, & species *Aricia albifarsis* audiat. Id tantum addam, quod exempla Gotlandica Ostrogothicis paullo minora sint, sed de cetero nullum discrimen detegere potui.

pium jugo in nive ambulans d. 12 Jul. 1821 individuum unicum inveni.

♀. Species dubia, an hujus Sectionis? Frons sub prominula & epistoma sat longe descendens, flavo-albo-virnea fere ut in *Aricia myopina* (117). Antennæ elongatae, angustæ, palpique, atra; seta pubescente. Oculi parvi, non late remoti. Apertura oris magna. Abdomen subovatum, acutum. Alæ cinereæ, basi albidae. Nervi ut in *Anth. intermedia* (102) directi. Costa breviter ciliata, spinula gemina nigra. Squamæ non magnæ, ciliatae, sordide albæ. Halteres albidi. Pedes fuso-nigricantes, geniculis tibiisque flavis, tarsis atris.

**108. *A. fulvicornis*:** cinerea, immaculata, antennis fulvis; femoribus nigris, tibiis tarsiisque flavis; alis hyalinis, squamis parvis, albis. ♀. (Long. vix  $\frac{3}{4}$  lin.).

Hab. in Lapponia Lulensi rarissime; sub nomine: *Anth. flavigornis*, exemplum a D. *Wahlberg* missum.

♀. Minuta. Forte hujus Sectionis. Tota cinerea, opaca, setosa. Caput albido-flavo-griseum, vitta frontali nigra, macula verticis cinerea. Oculi subrotundati, modice late distantes. Frons non prominens. Antennæ incumbentes, totæ flavo-fulgæ, seta obscura, tenuiter puberula. Epistoma subdeclinatum, infra oculos haud descendens. Instrumenta cibaria in specimine viso retracta. Seta mystacina utrinque unica, tenuissima. Abdomen ovale, supra subdepressum. Alæ hyalinæ, irideæ. Nervi: longitudinales 3 & 4 parallelis; transversi subappropinquantes, horum ordinarius perpendicularis, rectus, distincte ante medium areæ insertus. Costa brevissime ciliata, at spinula nulla. Squamæ minutæ, albidae, valvulis subæquis. Halteres flavi. Coxæ & femora nigricantia, geniculis tibiisque flavis. Tarsi testacei, articulo ultimo obscuro.

*Obs.* *Anth. flavigornis*: antennis rufescensibus, seta subplumata, ab domine brunneo-punctato, femoribus flavis, &c., a nostra *fulvicorni* dignota, sub n:o 91 quærenda, hujus mas esse non potest.

109. *A. flavimana*: cana, antennis tarsisque nigris; pedibus obscure rufescentibus, anticeis dilutioribus; alis albicantibus, squamis niveis. ♂. (Long.  $\frac{2}{3}$  lin.).

Hab. in Gotlandia, cum *Anth. lacteipenni* (101) rarissime inventa.

♂. Minuta, tota cana l. albicans. Frons non prominens, tota albida. Oculi oblongiusculi, sat late remoti. Antennæ incumbentes, augustæ, nigricantes, seta tenuissime puberula. Palpi tenuissimi, fusi. Proboscis longiuscula, nigra. Abdomen cylindricum, incurvum. Anus inflexus. Alæ albescentes, nervis ut in priori directis. Costa nuda, spinula nulla. Squamæ proportione mediocres, vix ciliatæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Halteres albi. Pedes posteriores obscure rufescentes, antici rufo-flavi. Coxæ omnes cinerascentes. Tarsi omnes fusco-nigri. Pulvilli parvi, albi. Cum *Anth. lacteipenni* & *dealbata* (118) non confundi debet.

C. Seta antennarum nudiuscula aut nuda. Palpi nigri. Minutæ.

a. Abdomen nigro punctatum.

\*). Femora flavescentia.

110. *A. 8-punctata*: cinerea, antennis, palpis, abdominis maculis 8, pedibusque, nigris; femoribus posterioribus basi late, tibiisque omnibus, flavis; thorace brunneo-bilineato; alis cinereis, basi squamisque parvis, albidis. ♂♀. (Long.  $1\frac{1}{2}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 693. 141. ♂. — *Anth. strigella* Zett.  
Ins. Lapp. 695. 152. ♀.

Hab. in Scandinaviae borealis & Lapponiae Salicetis, 25 Jun.—30 Jul., passim; scilicet in Jemtlandia boreali

ad Mollsjellen & Skalstugan haud raro; in Lapponia Umeensi ad ripas Wojmsjön, atque inter Tresunda & Nastansjö, parce, D. Dahlbom; in Lapponia Lulensi ad Quickjock mas lectus a D. Boheman; in Norwegia ad diversorum Snulstuen Wärdaliæ in jugo alpino situm, sat frequens.

♂♀. Per colorem pedum ab affinibus facile dignoscitur. Similis *Anth. geniculatæ* (98), sed magnitudine multo majore, seta antennarum adhuc subtilius puberula fere nuda, abdominis maculis brunneis majoribus subtrigonis octo (nec punctis brunneis minusculis rotundatis sex), tibiis omnibus flavis, ut & nervis transversis magis remotis, abunde ab illa dignota. Caput albomicans. Frons non prominens. Oculi oblongi, modice distantes, vitta frontali nigra. Antennæ nigrae, puncto in apice articuli 2:di albo. Palpi leviter clavati, nigri. Thorax lineis 2 brunneis. Abdomen in ♂ cylindricum, in ♀ lanceolatum, punctorum 4 paribus in utreque sexu brunneorum. Nervi longit. 3 & 4 paralleli. Costa subnuda; spinula nulla. Squamæ parvæ, valvulis subæquis. Halleres albidi. Pedes cinereo-nigri, femoribus posterioribus a basi ad medium, geniculis tarsisque omnibus rufo-flavis. Pulvilli albi, in ♂ elongati, in ♀ breves. Abdominis ultimum par macularum brunnearum in ♀ saxe obsoletum; hinc abdomen 6-maculatum ut in Ins Lapp. de *Auth. strigella* dicitur, quæ certe est ♀ hujus.

*Obs.* Prof. Wahlberg putat (ut in litteris mihi nuperrime dixit) nostram *Auth. apicalem* n:o 43 hujus feminam esse.

**III.** *A. pumila*: cinerea, antennis, palpis, abdominis punctis 6, tarsisque, nigris; pedibus flavis; alis cineris, basi squamisque albis. ♂♀. (Long. fere 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 694. 117. ♂♀. *Musca* Fall. Muscid. 88. 119. ♂♀. typica. — *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 221. 25. forte quoque *Coenosia albicornis* Meig. Dipt. 5. 220. 21? ♂♀. & Macq. Buff. 2. 348. 17? ♂♀. — Staeg. in litt.

Hab. in graminosis locis & aridis & paludosis, per prata & hortos Scandinaviæ, 2 Jul.—6 Sept., vulgaris; in copula deprehensa; scilicet in Scania ubique frequens; in Ostrogothia passim; in Gotlandia ad Sanda, Öja, Gothem &c.; in Uplandia; in litoribus graminosis Balusiaæ ad Marstrand, D. *Wahlberg*; in Jemtlandia ad Mullsjellet & Skalstugan passim; in Lapponiis: Umensi ad Wilhelmina, Stöttingsjellet & Lycksele; in Lulensi ad Quickjock (*Wahlberg*); & in Tornensi ad Kengis & Wittangi; in inferalpinis Nordlandiæ Norvegiae ad Björkvik raro; in Dania frequens. (E Finlandia a D. *Sahlberg* & e Lubeca a D. D. *Behrens* & *Milde* quoque missa).

♂♀. A priore, cui similis, differt: magnitudine minore, abdominis punctis vix nisi tribus paribus (nam punctorum par in segmento 1:mo, quod par quartum esset, tantum in rudimento adest), ut & femoribus omnibus & totis flavis. Antennæ nigrae, albo-micantes. Thorax vix lineatus. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem subdivergentes; transversus ordinari. perpendicularis, rectus, perspicue ante medium areæ insertus. Costa breviter subciliata; spinula nulla. Squamæ non magne, albæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Pedes flavi, coxis anticis basi, intermediis ad medium, posticisque totis, cinereis. Tarsi nigri. Reliqua ut in praecedente. Affinis *Anth. decipiens* n:o 116, & vix nisi abdominis punctis discrepans.

Var. b. ♂. similis var. a., femoribus posticis ante apicem annulo fusco-notalis. In Jemtlandia ad Skalstugan 16 Jul. semel inventa.

Var. c. ♀. similis var. a., femoribus anticis nigris. Zett. I. c. var. c. ♀. In copula cum mare var. a., ad Muonioniska Lapponiæ Tornensis 17 Aug. 1821 capta.

*Obs.* Sub nomine *Coenos. albicornis* Meig. individua mascula hujus speciei mihi communicavit D. *Staeger*.

*Obs.* *Anth. pumila* var. b. ♂. Zett. Ins. Lapp. l. c. est *Anth. decipiens* (116), & var. d. ♀. Ins. Lapp. est *Anth. biocellata* (103).

112. *A. nigrifemur*: cinerea, antennis, palpis, abdominis punctis 6 obsoletis, femoribus anticis tarsisque omnibus, nigris; pedibus flavis; alis cinereis, squarnis parvis, albis. ♂♀. (Long. circiter 1 lin.).

*Coenosia nigrimana* Meig. Dipt. 5. 215. 9? ♀.

Hab. in Suecia rarissime; mares 2 in Scania, & feminam unicum in insula Gotllandia, inveni.

♀. Long.  $1\frac{1}{4}$  lin. Similis priori, sed femoribus anticis obscuris dignota. Thorax lineis 2 brunneis. Alarum costa vix ciliata. Femora antica nigro-fusca, basi apiceque anguste ferrugineis. Cetera ut in praecedente.

♂. An hujus? Long. vix 1 lin. Similis feminæ descriptæ. Thorax subimmaculatus. Alarum costa brevissime subciliata. Valde affinis & similis *Anth. pygmaea* (99); sed annulo fusco ante apicem femorum posticorum nullo, & nervis transversis non omnino tam approximatis ac in *A. pygmaea*, differt. — Nomen triviale *nigrimana* jam sub specie 21 receptum.

\*\*). Femora nigricantia.

113. *A. humilis*: cinerea, antennis, palpis, abdominis punctis subsenis, pedibusque, nigris, semorum imabasi, geniculis tibiisque flavo-testaceis. ♂♀. (Long. 1— $1\frac{1}{4}$  lin.).

*Coenosia* Meig. Dipt. 5. 220. 23? ♂.

Hab. in graminosis Scandinaviæ, 15 Jul.—20 Sept., passim; etiam in copula semel capta; scilicet in Scania ad Lund & Kjellinge; in Smolandia ad Skärsjö, D. Ljungb; in Ostrogothia ad Wadstena &c.; in Gotlandia ad Gothem

rar.; in Dalecarlia ad Rörshyttan; in Jemtlandia ad Åsarne & Skalstugan; in Lapponia meridionali rarissime; in Norwegia ad Suul Wærdaliæ parœ; semina e Dania sub nomine *Coen. albicornis*, & altera vice ut *C. pedellæ* Fall. communicata. (Ad Neuenkirchen in Meklenburg Strelitz jam d. 20 Maj 1812 individua seminea a D. D. Hornschuch & Dahlbom lecta).

♂♀. Similis *Anth. pedellæ* (115), sed abdominis punctis distincta.

Cinerea (♂), aut grisescens (♀). Caput albidum. Oculi modice remoti, vitta frontali nigra, certo situ cinereo-micante, præsertim in ♂. Antennæ nigrae, puncto albo in apice articuli 2:di. Palpi parvi, filiformes, nigro-fusci. Thorax in ♂ subimmaculatus, in ♀ vestigio linearum brunnearum. Alæ cinereæ, basi albicantes. Nervi: longitudinales 3 & 4 versus apicem parum leviter tantum divergentes; transversi modice remoti, perpendicularares, recti, horum vero ordinarius perspicue ante medium areæ insertus. Costa subtilissime subciliata; spinula nulla. Squamæ non magnæ, albæ, valvulis inæqualibus. Halteres albi. Pedes nigricantes, femoribus basi angustissime apiceque anguste, tibiisque totis, rufo-flavis. Pulvilli parvi. *Mas:* abdome cylindrico, punctis suboctonis, brunneis, & præterea sæpe linea media dorsali interrupta ejusdem coloris. *Femina:* abdome lanceolato, punctis 6 brunneis obsoletis.

*Obs.* *Coenos. perpusilla* Meig. Dipt. 5. 218. 18. ♀ a nostra *A. humili* vix distincta videtur.

114. *A. pulicaria*: cinerea, antennis, palpis, abdominis maculis 6, pedibusque, nigris, femorum ima basi geniculisque rufis; thoracis disco brunnescente. ♂♀ (Long. ♂ 3, ♀ 1 lin.).

Hab. in Scandinavie graminosis, 20 Jun.—15 Aug., minus frequens; scilicet in Scania ad Esperöd semel; in

Jemtlandia ad Forsa juxta radicem Mullsjellet raro; in Norwegia ad Thynæs uterque sexus parce; e Dania sub nomine *Coenos. pedella* ♂ communicatus.

♂♀. Simillima priori, sed magnitudine præsertim maris paullo minore, thoracis dorso infuscato, abdominalis maculis majoribus, ut & pedibus fere totis nigricantibus, femoribus tantum basi plus minus anguste, geniculisque anguste, flavis, nec tibiis totis testaceis, differt. Thorax præsertim in ♂ disco leviter brunnescens l. ferruginans. *Mas:* abdomen cylindricum, dorso maculis 6 l. 8 obscure brunneis subconfluentibus, unde fere totum dorsum fuscum l. brunnescens apparel. *Femina:* abdomen lanceolatum, dorso maculis 4 l. 6, magis discretis, minoribus, subrotundatis, obsoletiusculis, & in fundo sæpe detrito & obscuro plerumque minus perspicuis, sæpiissime tamen ita remanentibus & designatis, ut hæc nostra *A. pulicaria* per has maculas ab affinibus *Anth. decipiente* (116) & *pedella* (115) facile discerni queat.

b. Abdomen immaculatum.

115. *A. pedella*: cinerea, antennis, palpis pedibusque nigris; femorum ima basi, geniculis tibiisque testaceis. ♀. (Long. circiter 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 693. 111. ♀. *Musca* Fall. Muscid. 88. 118. ♀. (♂ ibidem allatus non verus est, sed tantum individuum semineum abdomine compresso, ut ex collectio-  
ne Falleniana vidi). — *Coenosia* Meig. Dipt. 5. 216. 11. (secund. Fall. transcripta).

Hab. in graminosis, plerumque locis aridis, per hor-  
tos, litora marina, prata & campos Scandinaviae, a 24  
Jun. usque ad 5 Octob., mihi vulgariter obvia; scilicet in  
Scania, Smolandia, Ostro- & Westrogothia, sat frequens;  
in Gotllandia ad Färön, Gothem, Nähr, Öja &c., passim;  
in Uplandia ad Holmiam, D. *Wahlberg*; in Lapponiis;

Umensi ad Wilhelmina, & Tornensi ad Kengis &c., parce; in inferalpinis Nordlandiae Norwegiae ex. gr. ad Lyngen rarius; in Dania, D. Staeger. (In hortis Gryphieis Jul. 1843 D. Dahlbom legit).

♀. Obscure cinerea, immaculata. Simillima *Anth. humili* (113), sed abdomine non nigro-punctato distincta. Thorax non linearis. Nervi longitudinales 3 & 4 paralleli. Cetera ut in ♀ *A. humili*. Abdomen in detritis interdum nigrum, subnitidum.

**116. *A. decipiens*:** cinerea, antennis, palpis pedibusque nigris; femoribus totis coxisque anticis in mare, geniculis in femina, tibiisque in utroque sexu, flavis. ♂♀. (Long. circiter 1 lin.).

*Coenosia* Meig. Dipt. 5. 218. 17. ♂♀. Macq. Buff. 2.

**347. 14. ♂♀.**

Hab. in Scandinaviae graminosis, per hortos, prata & pascua, 22 Jun.—4 Aug., vulgatissima, praesertim in provinciis borealibus passim copiose; in copula multoties capta; scilicet in Scania ubique frequens; in Smolandia & Ostrogothia passim; in Gotlandia ad Furillen, Öja, Hoburg, Gothem &c.; in Jemtlandia ad Åreskutan, Mollsjellet, Skalstugan &c., valde frequens; in Lapponia Suecia Umensi rarius; in Norvegia ad Alstahaug, Levanger, Näs, Sunl Wærdaliæ & Kongstuen (in ipso jugo alpino situm), frequentissime, ut & in Finmarkia ad Bossekop, raro; e Dania a D. Staeger missa. (Ad Jungfern-Heide & Moabite prope Berolinum 7—12 Jul. 1812 a D. Dahlbom in pluribus individuis lecta. E Glogavia ♂ a D. Zeller communicatus).

♂♀. Priori iterum simillima, & feminae utrinusque speciei frequenter confusæ, nec differunt nisi femoribus ima basi & saepè etiam

trochanteribus in *A. pedella* ferrugineis, iisdem vero partibus in *A. decipiente* nigris. Interdum autem trochanterum apex in *decipiente* etiam rufescit. An igitur tantum varietas unius ejusdemque speciei? Sed ad *A. pedellam* nullum marem, at feminam *A. decipientis* cum mare femoribus flavis instructo junetam s<sup>e</sup>pe, inveni. *Mas:* abdomen compresso-cylindricum, glauco-cinereum. Coxæ anticæ ima basi, intermediæ ad dimidium, posticæ totæ, glaucescentes. Trochanteres, femora & tibiæ omnia & tota flava. *Femina:* abdomen lanceolatum, griseum. Genua tibiæque flavo-testacea.

Variat ♂ femoribus posticis ante apicem annulo fusco. *A. pumila* var. b. ♂. Zett. Ins. Lapp. 694. 147. In Jemtlandia atque in Lapponia Umensi ad Umenäs. — Variat etiam ♀ tibiis præsertim posticis obscuris. In Gotlandia ad Gothem & Öster-garn, atque in Jemtlandia ad Frösön, Åreskutan & Mullsjölet &c.; in Lapponia Lulensi, D. Andersson; atque ad Thynæs Norwegiæ, D. Dahlbom.

117. *A. tarsella:* cinerea, antennis, palpis tarsisque nigris, coxis omnibus, femoribus tibiisque flavis; femoribus anticis in ♀ fuscis. ♂♀. (Long. 1—1 $\frac{1}{4}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 694. 148. ♂♀.

Hab. in Lapponia Umeusi rarissime; in solis Betulæ ad Badstuträsk 20 Jul. 1832 unicum par copulatum deprehendi.

♂♀. Priori ut ovum ovo simillima, & differt tantummodo coxis omnibus & totis, femoribus tibiisque in utroque sexu flavis, femoribus solum in ♀ in medio latissime obscuris. Forte etiam paullo major. Cum ♀ *Anth. intermediae* (102) non confundenda.

118. *A. dealbata:* cana, antennis, palpis pedibusque nigris; trochanteribus, geniculis tibiisque obscure ferrugineis; alis albis. ♂. (Long. 1 lin.).

Zett. Ins. Lapp. 695. 154. ♂. (specimen semineum ibidem descriptum ad *Anth. verticellam* var. b. hujus operis n:o 53 pertinet.).

Hab. in Suecia meridionali rarissime; in frutice silvæ Esperöd in paroecia Mellby Scaniæ 16 Sept. 1818 semel deprehendi. In Ölandia, teste D. *Wahlberg*.

♂. Similis *Anth. pedellæ* (115), sed corpore alisque albidiорibus dignota. Tota cana, immaculata. Caput album, vitta frontali cinereo-nigra. Frons non prominens. Antennæ modice longæ, angustæ, nigræ, puncto apicis articuli 2:di albo. Abdomen cylindricum, incisuris albidis. Alæ niveæ. Nervi: longitudinales 3 & 4 paralleli; transversus ordinari. perpendicularis, rectus, perspicue ante medium areæ insertus. Costa nuda; spinula nulla. Squamæ proportione insecti mediocres, niveæ, valvula superiore inferiorem non tegente. Pedes nigro-cinerei, trochanteribus, geniculis summis tibiisque obscure rufescensibus. Tarsi nigri. Pulvilli non magni, albi.

*Obs.*, ab *Anth. verticella* (53) & præsertim ejus varietate b. per corpus cylindricum, albidum, maculam supra antennas flavam nullam, alas albidiores ut & squamas paullo majores, valvulas inæqualibus; ab *Anth. niveipenni* (64) per frontem non prominentem, maculam frontalem flavam deficiente, & squamarum valvulas sub alis inæquales; & denique ab *Anth. lunatifronte* (84) per magnitudinem minorem, femora nigricantia, nec flava, &c., quibus hæc nostra *A. dealbata* similis, in primis distinguitur.

**119. *A. metallipennis*:** nigricans, capite albicante; antennis mediocribus, palpis pedibusque nigris; tibiis basi testaceis; alis cinereis, metallice nitentibus, basi squamisque parvis, albidis. ♀. (Long.  $1\frac{1}{3}$  lin.).

Zett. Ins. Lapp. 695. 155. ♀.

Hab. in Lapponia Tornensi rarissime; a D. *Deutsch* in uno specimine communicata.

♀. Similis *Auth. meanti* (105), sed non nihil minor, magis obscura & antennis validioribus dignota. Tota nigricans, subnitens (an in detrita?). Caput argenteo-nigricans, vitta frontali nigra. Facies non preminens. Antennæ validiusculæ, nigrae, seta nuda. Abdomen lanceolatum. Alæ metallice nitent, basi albidae. Nervi: longitudinales 3 & 4 paralleli, transversi modice distantes, horum ordinarius subperpendicularis, rectus, paullo ante medium areæ insertus. Squamae parvæ, albidae, valvula superiore inferiore tegente. Halteres albi. Pedes nigri. Tibiae præsertim antice basi pallescunt. Species dubia forte hujus Sectionis!

120. *A. ambulans*: nigra, subnitida, antennis pallidisque concoloribus; capite albicante; pedibus flavis, femoribus anticis (in ♀) tarsisque omnibus nigricantibus; alis cinerascentibus, squamis minutis, albidis. ♀. (Long. fere 1 lin.).

*Coenosia* Meig. Dipt. 5. 217. 13. ♀.

Hab. in Suecia media rarissime; in Gotlandia ad Ejsta specimen descriptum 2 Jul. 1841 legi.

♀. Minuta. Tota nigra, subnitens, pleuris nigro-cinerascentibus. Caput albicans. Frons non exserta, vitta nigra. Antennæ longiusculæ, angustatæ, nigrae, seta nuda. Palpi parvi, nigri. Abdomen lanceolato-cylindricum. Alæ cinerascenti hyalinae, levissime fusco-subtinctæ, certo luminis situ metallice nitentes, basi dilutiiores. Nervi: longitudinales 3 & 4 exacte paralleli; transversi modice distantes, horum ordinarius perpendicularis, rectus, ante medium areæ insertus. Squamae minutæ, albæ, valvulis aequalibus. Halteres albi. Pedes cum trochanteribus flavi, coxis, femoribus anticis tarsisque omnibus nigris. Femorum antecorum summus apex flavidus.















SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01027 4041